

А 200
177

СЛОВАРЬ РАСТЕНИЙ

ДИКОРАСТУЩИХЪ И РАЗВОДИМЫХЪ

на огородахъ, въ комнатахъ, садахъ, теплицахъ,
парникахъ, грунтовыхъ сараяхъ

и

ВЪ ОРАНЖЕРЕЯХЪ,

съ описаніемъ способа ухода за ними и ихъ отличительныхъ
признаковъ.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

съ дополненіемъ

УКАЗАНИЯ: ВЪ КАКОМЪ МѢСЯЦѢ КАКИЯ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВЪ
ОЗНАЧЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ.



ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА О. И. КОЛЕСОВА.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1879.

82

СЛОВАРЬ РАСТЕНІЙ

ДИКОРАСТУЩИХЪ И РАЗВОДИМЫХЪ

на огородахъ, въ комнатахъ, садахъ, теплицахъ,
парникахъ, грунтовыхъ сараяхъ

и

ВЪ ОРАНЖЕРЕЯХЪ,

съ описаніемъ способа ухода за ними и ихъ отличительныхъ
признаковъ.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ

съ дополненіемъ

УКАЗАНІЯ: ВЪ КАКОМЪ МѢСЯЦѢ КАКІЯ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВЪ
ОЗНАЧЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ.

СОСТАВИЛЪ

П. АЛАБИНЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА Ѳ. И. КОЛЕСОВА.

1879.

Типографія д-ра М. А. Хана, Поварской пер., д. № 1.

СЛОВАРЬ РАСТЕНИЙ

ДИКОРАСТУЩИХЪ И РАЗВОДИМЫХЪ.

Хотя у насъ издано много руководствъ для ухода за растеніями, но мы, изъ практики, знаемъ: какъ трудно любителю во множествѣ этихъ, быть можетъ и весьма хорошихъ изданій, отыскивать необходимыя указанія относительно ухода за тѣмъ или другимъ растеніемъ, особенно если любитель хочетъ заняться, напримѣръ, и садоводствомъ — воздушнымъ и комнатнымъ, и огородничествомъ.

Желаніе устранить таковыя затрудненія для любителей растительнаго царства, побудило насъ къ составленію настоящей книги.

Матеріалами при составленіи этого «Словаря» служили намъ, сочиненія: Бекетова, Регеля, Рего, К. Миллера, Лухманова, Люкаса, Ботаническій Словарь Анненкова (изд. 1859 г.), Лѣсной Словарь, Энциклопедическій лексиконъ (изд. Плюшара), Журналъ Садоводства Россійскаго Общества Любителей Садоводства, Вѣстникъ Россійскаго Общества Садоводства, Журналъ «Садовникъ и Огородникъ», Вѣстникъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства, «L'illustration Horticole» съ 1862 по 1873 г., «Flor des serres», съ 1845 по 1873 г. и другія періодическія изданія.

«Словарь растений» не представляетъ собою ученаго труда, который внесъ бы рядъ новыхъ изслѣдованій либо открытій въ науку, или предъявлялъ бы претензію быть ея полнымъ и всестороннимъ истолкователемъ. Задача этого изданія несравненно болѣе скромная. Цѣль его — облегчить любителю цвѣтоводства, во всѣхъ его видахъ, садоводства и огородничества, пріисканіе необходимыхъ ему указаній способовъ ухода за тѣмъ или другимъ растеніемъ и при томъ отысканіе по каталогамъ сѣменоторговцевъ и садоводовъ тѣхъ растений, разведеніемъ которыхъ желалъ бы заняться любитель, или тѣхъ именно, о которыхъ ему необходима справка въ данное время.

Чтобы этотъ «Словарь» сдѣлать возможно болѣе полезнымъ любителямъ растительнаго міра, мы нашли необходимымъ предпослать ему краткое указаніе распредѣленія занятій по времени: въ саду, огородѣ и другихъ садовыхъ заведеніяхъ.

Начинаемъ наши указанія съ того періода года, въ который начинается по преимуществу отдыхъ растенія, а слѣдовательно и ухаживающаго за нимъ человѣка, т. е. съ глубокой осени, а именно съ октября, когда начнутся уже морозы.

Октябрь.

Въ теплицѣ (*).

Температуру поддерживать отъ 8 до 12° R. На ночь рамы закрывать ставнями, открывая теплицу съ восходомъ солнца.

Вообще уменьшить поливку растений. Особенно заботиться, какъ и во всю, впрочемъ, зиму, о томъ, чтобы ни въ теплицѣ, ни въ

(*) *Теплица* обыкновенно предназначается для разведенія и содержанія растений жаркихъ и теплыхъ странъ. Въ этихъ видахъ устраиваются помѣщенія различныхъ системъ. Напр.: двускатныя и односкатныя.

Вообще теплица строится на сухомъ и возвышенномъ мѣстѣ. Она закладывается преимущественно на каменномъ фундаментѣ, ниже поверхности земли, что даетъ возможность меньше расходовать топлива и воздухъ въ ней не отличается вредною для растений сухостью.

Обыкновенно двускатную теплицу обращаютъ фронтомъ на востокъ или западъ, а односкатную — на югъ.

Крышѣ двускатной теплицы даютъ угловатую форму, причемъ наклонъ рамъ теплицы для тропическихъ растений даютъ отъ 35 до 40°.

Въ односкатной теплицѣ, при наклонѣ въ 35°, задняя стѣна надъ переднею должна возвышаться на 11,20 вершковъ на каждый аршинъ вышины передней стѣны, а при наклонѣ въ 45° — на 1 аршинъ.

Такимъ образомъ, если передняя стѣна, при наклонѣ въ 45°, имѣетъ два аршина вышины, то задняя стѣна должна быть 4 аршина вышины.

Тотъ же расчетъ принимается въ соображеніе при постройкѣ двускатной теплицы, съ тою только разницею, что онъ относится не къ задней стѣнѣ теплицы, а къ срединѣ опоръ, на которыхъ лежатъ ея рамы; т. е. при наклонѣ въ 45°, середина тепличныхъ опоръ должна быть выше боковыхъ стѣнъ аршиномъ на каждый ихъ аршинъ. Такимъ образомъ, если боковыя стѣны двускатной теплицы будутъ вышиною въ 2 аршина, середина ея опоръ должна быть 4 аршина.

Теплицу лучше всего строить изъ дерева, насыщеннаго азотно-кислымъ желѣзомъ,

Мы не станемъ входить здѣсь въ архитектурныя подробности спо-

оранжереѣ не было капли, а если гдѣ таковая окажется, то до ея устранения, принимать изъ подъ ней растенія,

При этомъ надлежитъ принять за правило, чтобы съ того времени, во всю осень и зиму поливка не производилась водой, только что принесенной со двора. Воду должно готовить въ теплицѣ, для дневной поливки внося ее съ предыдущаго вечера.

Тщательно очищать растенія отъ сухихъ листьевъ и всякой гнили.

Амариллисы, аарониковыя растенія, геснеріи держать совсѣмъ сухо и въ теплѣ.

Соборъ постройки тепличнаго зданія, трудно-объяснимы безъ необходимыхъ при этомъ чертежей, отсылая нашихъ читателей къ специальнымъ по этому предмету руководствамъ. Сдѣлаемъ только нѣсколько практическихъ указаній по этому предмету.

Шпалы, на которыя укрѣпляются оконныя рамы, должны ложиться не ниже какъ на 5 футовъ отъ поверхности земли.

Если стѣны теплицы каменные, то во всякомъ случаѣ на нихъ должно положить продольные брусья, въ которые и укрѣпляютъ шпалы.

Если теплица широка, то ея верхнюю настилку поддержать рядомъ колоннъ, при чемъ стыки шпалъ, въ поперечномъ и стоячихъ брусьяхъ, необходимо дѣлать возможно плотнѣе, промазать ихъ масломъ и тщательно замазать замазкой.

Рамы не дѣлать шире $1\frac{1}{2}$ аршина, и если только возможно, то непременно двойныя, либо вѣвая въ одну раму два стекла, оставляя между ними промежутокъ не болѣе полувершка.

Въ верхней части рамы, черезъ каждыя два — въ третьей имѣть форточку.

Стекло для рамъ употреблять обыкновенное, бѣлое или полубѣлое, но не гнутое и безъ пузырей.

При теплицѣ должны быть стѣны или, по крайней мѣрѣ, двойныя двери, обитыя войлокомъ и плотно запирающіяся.

Теплица закрывается досками, а затѣняется отъ солнца, лучше всего, шторами изъ драпи.

Внутри теплицы дѣлается кирпичный ящикъ, для установки растеній, вышиною въ переднюю стѣну и такой ширины, чтобы удобно было поливать посреди стоящія растенія. Подъ ящикомъ пропускается

Приставляют тацеты и глянцы, преимущественно, такъ называемые, парижскіе (*).

Въ разводочный *парничекъ* начинаютъ сажать черенки (**) хвойныхъ и вересковыхъ растений.

Въ оранжереѣ (**).

Температуру держать: ночью 2° R, а днемъ до 4°. Оранжерея закрывается ставнями съ закатомъ солнца и открывается съ восходомъ.

боровъ или трубка термосифона. Въ ящикѣ дѣлаются перекладки, постилаютъ по нимъ крышу и наполняютъ его древесными опилками или корьемъ, въ которое и ставятъ горшки съ растеніями. Нагрѣваютъ ящикъ теплымъ корьемъ съ февраля, т. е. въ періодъ, когда растенія начинаютъ трогаться въ ростъ.

Вокругъ теплицы, на вышинѣ, одинаковой съ ящикомъ, дѣлаются полки или столы изъ неплотно сколоченныхъ досокъ.

При основаніи шпаль можно оставить между стѣною и полками мѣсто для посадки въ грунтъ вьющихся растений, которыя могутъ быть пущены по стѣнамъ теплицы.

Лучше всего отапливать теплицу посредствомъ термосифона — горячей водой.

(*) Способъ выгонки *яацинтовъ*, смотри: ст. 948. *Hyacinthus. Тацетовъ* — см. ст. 1233 — *Narcissus*.

(**) Способъ дѣланія *черенковъ* и устройства разводочнаго *парника*, см. стр. 4—6.

(***) Обыкновенно, *оранжерея* имѣетъ до 10 арш, ширины и произвольную длину. Одна сторона оранжереи состоитъ изъ рамъ и должна быть обращена къ югу. Оранжерею строятъ, большею частию на каменномъ или кирпичномъ фундаментѣ. Боковыя и заднюю стѣны преимущественно возводятъ бревенчатыя. Переднюю стѣну устраиваютъ изъ двухъ рядовъ рамъ: передняго ряда, поставленнаго стоймя и втораго, надъ ними, покатою. Крышу дѣлаютъ покатою къ задней стѣнѣ. Посреди оранжереи ставятъ рядъ колоннъ. На крышѣ устраиваютъ ставни, которыми закрываютъ верхнія рамы оранжереи. Ставни эти обыкновенно на петляхъ и спускаются веревками на блокахъ. Остальныя покатыя рамы закрываются досками другъ къ другу плотно пригнанными. Стоячія рамы закрываются приставляемыми къ нимъ

Разумѣется, мы говоримъ про оранжерею съ одиночными рамами, имѣющая же двойныя рамы, всю зиму, не требуетъ никакихъ ставней.

Поливка растений производится умѣренная, водою принесенною наканунѣ, вечеромъ. Растенія очищаются отъ всякой гнили.

Послѣ перваго мороза вносятся вынутые изъ земли корни Георгинъ; имъ даютъ обсохнуть въ теченіи нѣсколькихъ дней и послѣ того ихъ кладутъ въ зимнее помѣщеніе, на нарочито устроенныя, если позволило мѣсто въ оранжереи, полати или на полки, либо переносятъ въ сухой подвалъ, гдѣ хранить ихъ на сухомъ пескѣ. Также поступаютъ съ корнями Мирабилисовъ.

Еъ цвѣтникѣ (*).

Изъ цвѣтника выкапываютъ и переносятъ въ подвалъ, про-

ставнями. Въ оранжереѣ устраиваютъ печь съ боровами, идущими вдоль стѣнъ. Ко входнымъ дверямъ пристраиваютъ сѣни. Около переднихъ рамъ устраиваютъ полки для растений. Большія растенія устанавливаютъ на земляномъ полу оранжереи и даже сажаютъ въ грунтъ.

(*) *Цвѣтникъ* надлежитъ устраивать на почвѣ плодородной, но не слишкомъ тучной, рыхлой, не болотистой, на мѣстѣ хорошо освѣщаемомъ, но защищенномъ, по возможности, отъ вѣтра, особенно отъ сѣвернаго.

Цвѣтникъ долженъ быть всегда очищенъ отъ сорныхъ травъ и земля вокругъ цвѣтовъ всегда должна быть взрыхлена.

Цвѣтникъ обыкновенный никогда не должно засаживать слишкомъ густо, но и большихъ прогалинъ между посаженными цвѣтами не должно оставаться. Достоинство обыкновеннаго цвѣтника заключается не въ количествѣ находящихся въ немъ растений, а въ красотѣ каждаго изъ нихъ. Другой характеръ имѣютъ цвѣтники, вошедшіе въ употребленіе въ послѣднее время, такъ называемые — узорчатые, которые представляютъ собою какъ бы цѣлые рисунки, а потому должны состоять изъ густо сидящихъ другъ около друга растений, своими цвѣтами представляющихъ какъ бы одно цѣлое. Впрочемъ, такого рода цвѣтники, дѣйствительно представляющіе собою верхъ изящества, доступны только цвѣтоводамъ, располагающимъ средствами приготовить для этихъ цвѣтниковъ весьма значительное количество растений.

стѣнокъ или оранжерею корни растений не выносящихъ зимы на открытомъ воздухѣ, также мальвы, гвоздики, розы, равно горшечные экземпляры нѣкоторыхъ растений, предназначенныхъ для пристановки раннею весною, наконецъ, приготовленные для весенняго цвѣтенія въ оранжереѣ: желтофіоліи, осенніе и зимніе левкои.

Изъ грунта выкапывается: резеда, гвоздика, львиный зѣвъ, вербены, анютины глазки, хризантемы, левкои, разумѣется тѣ, которые въ цвѣту, сажаются въ горшки и ставятся въ оранжерею, чтобы сохранить ихъ для весенней посадки въ грунтъ, а также, чтобы имѣть ихъ возможно дольше время въ цвѣту.

Высаживаютъ въ горшки: астры, лѣтніе левкои и другіе, покрытые цвѣтами лѣтники, собственно, чтобы сохранить ихъ цвѣты возможно дольше время, для комнатъ и букетовъ.

Съ наступленіемъ морозовъ остающіяся на зиму въ грунтѣ растенія, обертываютъ соломой, пригибаютъ къ землѣ и закрываютъ или рублеными еловыми вѣтками или сухимъ листомъ. Тѣмъ же листомъ, мохомъ или ельникомъ, покрываютъ болѣе нѣжныя, зимующія въ грунтѣ растенія, срезанные подъ корень, напр. деклинтры, мальвы, зимующій макъ, анютины глазки, гіацинты, тюльпаны, нарцисы, грунтовые лиліи и розы, изъ которыхъ послѣдніе, предварительно пригибаютъ къ землѣ и ею же заваливаютъ.

Можно высѣвать нѣкоторыя растенія прямо въ цвѣтникъ, собственно тѣ, которыя предполагено оставить на все лѣто на мѣстѣ посѣва, преимущественно бордюрные, а равно такія растенія, которыя не терпятъ пересадки, напр. Макъ-махровый.

Вообще при посѣвѣ прямо въ грунтъ не слѣдуетъ засыпать вовсе слишкомъ мелкихъ сѣменъ, а ихъ достаточно только прижать досочкой.

Лѣтники сѣютъ въ цвѣтники весною, лѣтомъ и осенью, какъ мы это увидимъ далѣе.

Лучше всего, когда взойдутъ растенія въ площадяхъ, ящикахъ или парникѣ, и дадутъ по нѣсколько листковъ, разсадить ихъ или въ парникѣ, или въ нарочито устроенныя, защищенныя гряды, либо посадить по нѣсколько штукъ въ самые маленькіе горшки. Когда корни растенія хорошо разовьются и растеніе видимо окрѣпнетъ, въ свое время пересаживать его въ цвѣтникъ, изъ горшечка — стуломъ.

Въ огородѣ (*).

Убираютъ овощи и возятъ навозъ для спаржи и шампиньоновъ.

Долголѣтнія корневыя и двухлѣтнія растенія, въ первый годъ, большею частью, не цвѣтуція вовсе, какъ напр.: штокъ розы, голландскія гвоздики и др. надлежитъ сѣять въ концѣ мая, пересадить черезъ 4 недѣли затѣмъ въ сентябрѣ посадить на мѣсто, въ цвѣтникъ.

Сѣмена, долго не всходящія, какъ напр. изъ однолѣтнихъ: кавалерскія шпоры, адонисъ, датура и др.; изъ долголѣтнихъ: флоксъ, бріонія и др., высѣваютъ въ грунтъ осенью, но до промерзанія земли.

(*) Огородъ обыкновенно устраивается близъ воды, на мѣстѣ открытомъ къ югу, преимущественно на черноземной почвѣ, такъ какъ на удобреніе всякой другой почвы, чтобы сдѣлать ее вполне пригодною подъ огородъ, надлежитъ употребить много времени и произвести значительныя затраты.

Огородъ долженъ быть непремѣнно обнесенъ оградой: каменной, деревянной, земляной, изъ живой изгороди или просто глубоко вырытою канавой.

Назначенная подъ огородъ земля глубоко распахивается, удобряется съ осени, весною вновь перепашивается и баронуется до полного взрыхленія.

Весною, послѣ того какъ земля провянетъ и подвергнется выше-сказанной бороновкѣ, огородъ раздѣляютъ на гряды, причѣмъ оставляется удобный проѣздъ и проходъ во все пункты огорода.

Гряды дѣлаютъ до двухъ аршинъ ширины, правильныя, ровныя, отбивая ихъ по шнуру. Канавки между грядами оставляютъ шириною въ $\frac{3}{4}$ арш. изъ которыхъ землю выбрасываютъ на гряды, возвышая ихъ такимъ образомъ до 6 вершковъ. Гряды тщательно разравниваются граблями, при чемъ выбрасываются сорныя травы и ихъ коренья.

Когда будетъ приближаться время посѣва того или другаго растенія, надлежитъ, при сомнѣніи въ свѣжести и годности сѣмянъ, предварительно посѣва испытать степень всхожести сѣмени, проростивъ его въ сырѣмъ войлокѣ, фланелѣ или въ сукнѣ.

Сѣять на гряды отнюдь не слѣдуетъ слишкомъ густо.

Гряды должны быть тщательно опалываемы отъ сорныхъ травъ,

Спаржеvníкъ (*).

Продолжается выгонка спаржи.

Въ лабазѣ (**).

Складываются овощи способами указанными въ своемъ мѣстѣ. Температуру въ этомъ хранилищѣ соразмѣряютъ съ наружной; для этого или отворяютъ отдушины и двери или закупориваютъ ихъ.

Вносятъ заготавливаемые для посадки зимой корни: эстрагона, щавеля, цикорія.

Въ овецной теплицѣ (***)

Температуру держать на 0°R.

Сажаютъ щавель, цикорій, мелкую свеклу. Сѣютъ крессъ салатъ.

по мѣрѣ ихъ выростанія, но при полгѣ грядъ должно сорыть травы выдергивать непремѣнно съ корнемъ, поэтому полоть удобнѣе въ сырое время чѣмъ въ засуху.

При засадкѣ и засѣвѣ огорода, одного и того же сорта растеніе, не сажать нѣсколько лѣтъ сряду на одномъ и томъ же мѣстѣ.

(*) Уходъ за спаржей и устройство спаржеvníка смотри стр. 70—72.

(**) Лобазомъ называется устраиваемый осенью на самомъ огородѣ небольшой срубъ, въ которомъ хранятъ нѣкоторые овощи и чтобы таковые не мерзли закрываемый снаружи соломой. Срубъ этотъ весною разбираютъ.

(***) Теплицу для раннихъ овощей и зелени устраиваютъ слѣдующимъ образомъ. Роютъ произвольной длины и незначительной глубины яму шириною двѣ сажени. На ямѣ дѣлаютъ срубъ, при чемъ заднюю стѣну поднимаютъ въ 3¹/₂ арш. а переднюю на 2¹/₂ арш. ту и другую считая отъ дна ямы. Посреди теплицы ставятъ столбы въ сажень другъ отъ друга. На столбы кладутъ брусъ и отъ него, къ задней стѣнѣ, потолокъ. Отъ бруса вверху идетъ навѣсъ вышиною до двухъ аршинъ и отъ него, къ каждой стѣнѣ, крыша. По среди теплицы изъ бревень или досокъ дѣлаютъ парникъ, оставляя кругомъ его проходъ аршина въ два. Парникъ долженъ имѣть наклонъ равный наклону рамъ и въ полуаршинномъ отъ нихъ разстоя-

На рамы накладываютъ ставни или доски и сверху покрываютъ соломистымъ навозомъ.

Шампиньонникъ (*).

Продолжаютъ разводить шампиньоны.

ни. Парникъ набиваютъ навозомъ, какъ обыкновенный. Отъ верхняго бруса къ передней стѣнѣ кладутъ стропила съ вынутыми пазами и съ наклономъ къ передней стѣнѣ, на 2 арш., и на нихъ кладутъ рамы. Въ одномъ изъ угловъ теплицы дѣлаютъ печь; отъ которой борова проводятъ по всей теплицѣ. Полки для растений устраиваютъ по всѣмъ стѣнамъ. Въ одной изъ стѣнъ дѣлаютъ дверь и къ ней пристраиваютъ сѣни.

(*) Тамъ гдѣ предполагается выводить шампиньоны въ значительномъ количествѣ, устраиваютъ особыя помѣщенія или шампиньонники.

Для этого на сухомъ мѣстѣ выкапываютъ ровъ длины соответствующей размѣрамъ предполагаемаго производства, глубиною до 2-хъ арш., шириною до 2-хъ сажень. Внутри этого рва вставляютъ деревянный срубъ или забираютъ стѣны досками въ стойки, вровень съ поверхностью земли. Затѣмъ ставятъ стропилы, упирающіяся на столбы или срубъ, на краяхъ ямы, такъ чтобы конекъ былъ отъ дна ямы не ниже $3\frac{1}{2}$ аршинъ, покрываютъ ихъ досками и наваливаютъ на нихъ землю на аршинъ толщиною, и хорошо ее утаптываютъ. Посреди шампиньонника устраиваютъ дверь съ притворомъ. Внутри дѣлаютъ горизонтальныя полки, по три съ каждой стороны питомника, съ невысокою обшивкою каждой, что придаетъ имъ видъ мелкихъ ящичковъ. Нижняя полка имѣетъ своимъ дномъ земляной полъ, а двѣ прочія въ ровномъ надъ нею разстояніи другъ отъ друга. Посрединѣ шампиньонника, между полками оставляютъ проходъ, въ которомъ устраивается желѣзная печь съ проведеніемъ дымовыхъ трубъ чрезъ весь шампиньонникъ. На вышеупомянутыя полки крѣпко набивается слой свѣжаго, конского навоза, толщиною въ полъ аршина. Навозу даютъ остыть. Затѣмъ, въ небольшія ямки дѣлаемыя въ навозѣ на разстояніи $\frac{1}{4}$ арш. одна отъ другой, кладутъ по горсти зародышей, (шампиньонной плесени), заваливаютъ ямки вынутымъ изъ нихъ навозомъ и прикрываютъ еще тонкимъ слоемъ навозной

Во фруктовомъ саду (*).

Осматриваются и очищаются отъ суши деревья и кусты, причемъ съ деревьевъ соскабливается мохъ и обмазываютъ ихъ раство-

земли, примѣшавъ къ ней нѣкоторое количество дерновой. Все это уравниваютъ и прищепываютъ лопатой.

Въ навозѣ должна быть ровная температура, не менѣе 10—12°R. Еслибы во время сильныхъ морозовъ температура значительно понизилась, то протапливаютъ желѣзную печь.

Поливать начинаютъ, когда покажутся грибы, тепловой водой, и то весьма умеренно.

Если посѣвъ шампиньоновъ будетъ какъ обыкновенно сдѣланъ въ августѣ, то грибы появятся, самое позднее, черезъ 6 недѣль и сборъ ихъ будетъ производиться всю зиму. Посѣвъ можетъ возобновляться нѣсколько разъ зимою.

(*) Мѣсто для фруктоваго сада выбирается по возможности, болѣе защищенное отъ продолжительныхъ вѣтровъ, но отнюдь не глухое, имѣющее нѣкоторый склонъ къ югу, не болотистое, не заливаемое весенней водой и нѣсколько возвышенное.

Лучшую почву для фруктовыхъ садовъ можно опредѣлить только примѣняясь къ извѣстной мѣстности.

Опытные садоводы совѣтуютъ:

а) въ сухомъ климатѣ, гдѣ дожди рѣдки, садъ разводить на черноземѣ съ глинистой подпочвой;

б) въ мѣстности изобильной дождями избирать почву черноземную, съ пескомъ, на подпочвѣ глинистой въ смѣси съ пескомъ;

в) въ мѣстности средняго свойства, т. е, гдѣ воздухъ не слишкомъ сухъ и не слишкомъ влаженъ, гдѣ дожди смѣняются ясной погодой, выбираютъ для сада мѣсто на подпочвѣ глинистой или суглинистой, — черноземное съ супескомъ.

Если садъ разбить на сыромъ мѣстѣ, то деревья сажаютъ весной; если на сухомъ — то осенью.

Деревья для пересадки должны быть вынимаемы изъ грунта въ туманный или, такъ называемый, сѣрый день, при чемъ корни выкопаннаго дерева тщательно защищаютъ отъ солнца и воздуха мокрыми рогожами или мокрою соломой либо сѣномъ.

Дерево отъ дерева сажаютъ на разстояніи трехъ саженъ, въ ямы приготовленныя за нѣсколько мѣсяцевъ до пересадки и до этого

ромъ въ водѣ коровьяго навоза и глины. Молодые деревья обертываютъ соломой или осокой, очень нѣжные сорта — рогожами и даже войлокомъ. Малину пригибаютъ къ землѣ и закрываютъ сухимъ листомъ.

время остающіеся наполненными навозомъ. Ямы должны быть вдвое больше корней сажаемыхъ деревъ.

При посадкѣ дерева, на корни бросается; во-первыхъ верхній слой вынутой изъ ямы земли, конечно достаточно разрыхленной, потомъ уже нижній слой.

Предварительно посадки дерева, въ яму вбивается прочный коль или шесть, къ которому потомъ и привязывается посаженное дерево.

Сажая дерево нѣсколько подрѣзаютъ его корни, также отрѣзываютъ всѣ поврежденные части корня сажаемаго дерева.

При посадкѣ тщательно расправляютъ корни дерева и стараются чтобы насыпаемая земля облегла всѣ части корней, между которыми не должно оставаться пустыхъ, не заполненныхъ землею, пространствъ. Сажать должно такъ чтобы корни дерева сидѣли не глубже того, какъ они сидѣли прежде, т. е. были бы только покрыты землей, а у сидящихъ на сухой почвѣ чтобы на корняхъ было всего на вершокъ земли. Послѣ посадки обминаютъ ногами землю у корней и привязываютъ дерево къ колу, но не туго, чтобы оно могло нѣсколько осѣсть, вмѣстѣ съ осадкою земли. Затѣмъ дерево поливаютъ, а на совершенно сухой почвѣ, поливаютъ еще до совершенной засыпки корней землею, на столько чтобы въ ямѣ образовалась у корней жидкая грязь, послѣ чего засыпаютъ корень землей.

При пересадкѣ большихъ деревъ наблюдаютъ чтобы дерево было посажено тою же стороною къ сѣверу, какою оно сидѣло въ грунту до этого.

Деревья подрѣзываютъ до начала движенія соковъ, при чемъ вѣтку подрѣзываютъ у самаго глазка, въ косвенномъ направленіи изнутри. Деревья всегда держать въ чистотѣ отъ нарастающихъ на корѣ лишаевъ, а почву вокругъ тщательно освобождаютъ отъ сорныхъ травъ и взрыхляютъ ее. Если почва не питательна, то ее удобряютъ, вкапывая перегорѣлый навозъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ деревьевъ и поливая его кровью.

Когда фруктовые деревья еще молоды, ихъ, въ жаркое время, поливаютъ.

Съютъ въ питомникъ (*) яблонь и грушу.
Дички для зимней прививки вносятъ въ подвалъ.

(*) Питомникъ для разведенія и воспитанія молодыхъ деревцевъ необходимо имѣть въ каждомъ фруктовомъ саду.

Почву для питомника должно выбирать преимущественно бывшую уже подъ огородамъ и не заросшую сорными травами.

Для разсадки молодыхъ деревцевъ, земля должна быть глубоко перепахана или перекопана съ осени.

Мѣсто избранное для питомника должно быть защищено отъ сѣвернаго вѣтра, напримѣръ какой-либо постройкой, заборомъ, живою изгородью или просто древесными аллеями.

Сѣмена для посѣва берутъ отъ хорошихъ сортовъ деревьевъ, здоровыхъ и крѣпкихъ.

Сѣмена съютъ осенью на гряды, такихъ же размѣровъ какъ обыкновенныя, огородныя, бороздами, которыхъ дѣлаютъ до пяти. Землю только прикрываютъ сѣмена, не придавливая ихъ и потомъ, въ видѣ защиты отъ птицъ, набрасываютъ на гряду хвойныхъ вѣтотъ или слегка присыпаютъ соломой.

Въ случаѣ крайности можно производить посѣвъ весною, сберегая зимою сѣмена въ прослойкѣ съ землею въ погребѣ или простѣнкѣ, гдѣ бы не было очень тепло,

Когда деревца, въ первый годъ достигнуть отъ 4 до 6 вершковъ, ихъ разсаживаютъ на заранѣе приготовленные гряды, въ разстояніи до 6 вершковъ другъ отъ друга.

Когда деревца достигнуть 12 верш. и толщины мизинца, изъ нихъ выбираютъ лучшія и прививаютъ ихъ или глазкомъ, или въ рошечъ, на разстояніи 4 — 5 вершковъ отъ земли, дѣлая прививку преимущественно на сторонѣ дерева обращенной къ сѣверу.

Прививать глазкомъ слѣдуетъ въ іюль, а именно тогда, какъ только второй сокъ деревьевъ начнетъ подниматься.

Прививка въ рошечъ производится весною, во всякое время. Этимъ способомъ прививаютъ преимущественно большія деревья.

Когда деревца достигли полутора аршина вышины, ихъ пересаживаютъ на разстояніи до 10 верш. другъ отъ друга, гдѣ и оставляютъ до окончательной пересадки на мѣсто.

Деревца достигшее двухъ аршинъ вышины подчищаютъ, чтобы образовать ему крону.

XVII

Предназначаемыя для весенней посадки фруктовых дерева и ягодные кустарники заваливаются толстымъ слоемъ сухой земли и такъ оставляются на зиму.

Для весенней посадки готовятъ почву, глубоко ее перепахивая или перекапывая.

Срѣзаются прививочные сучки и въ подвалѣ, въ концѣ мѣсяца, закапываются въ землю.

Землянику, предназначенную для ранней выгонки, вносятъ въ оранжерею.

Сдѣланные отводки земляники, посаженные на грядахъ, покрываютъ сухимъ листомъ или мохомъ. Между кустами клубники и земляники взрыхляютъ землю и кладутъ перепрѣлый навозъ, получаемый при очисткѣ парниковъ.

Ноябрь.

Въ теплицѣ.

Температуру поддерживать отъ 10 до 15°R. Тщательно очищать растенія отъ всякой гнили. Приставлять для цвѣтенія гіацинты, тюльпаны, ландыши, крокусы, — конечно не всѣ имѣющіеся экземпляры вмѣстѣ, а по частямъ, отъ времени до времени, что и продолжать въ слѣдующіе мѣсяцы.

Приставляютъ для выгонки въ цвѣтъ розы, китайскую сирень, дейчій и др. кустарныя растенія и начинаютъ ихъ подрѣзку. Само собою, пристановку этихъ растеній и ихъ подрѣзку дѣлаютъ не всѣхъ одновременно имѣющихся въ теплицѣ, а по частямъ, съ нѣкоторыми промежутками во времени, чтобы видѣть эти растенія въ цвѣту возможно болѣе продолжительное время.

Поливку производить такую же, какъ и въ октябрѣ.

Закрываютъ оранжерею передъ закатомъ солнца и открываютъ когда воздухъ нѣсколько уже обогрѣется отъ солнца.

Въ оранжереѣ.

Температуру поддерживаютъ отъ 3 до 5°R. Оранжерею держать открытою тоже время дня что и теплицу.

Пересаживаютъ лиліи, луковичныя южныхъ странъ, альстреме-

XVIII

рин, циперарин и кальцеоларин, предназначенныя для цвѣтенія зимою и весною.

Поливка производится самая умѣренная. Левкои и желтофіолитнательно очищаются отъ завялыхъ листьевъ, что продолжается всю зиму, до того какъ эти растенія зацвѣтутъ.

Въ цвѣтникахъ.

Къ корнямъ болѣе нѣжныхъ растеній, оставленныхъ на зиму въ грунтъ и закутанныхъ подваливаютъ сухаго навоза или листьевъ, либо сѣна, а въ предохраненіе растенія отъ мышей, по мѣрѣ выпаденія снѣга, обтаптываютъ его вокругъ растенія, отчего мыши не могутъ къ нему пробраться, такъ какъ обыкновенно они дѣлаютъ ходы подъ снѣгомъ, по землѣ. Очищаютъ кустарники отъ гусеницъ.

Въ огородѣ.

Возять навозъ для набивки раннихъ теплицъ.

Въ спаржезвннкѣ.

Продолжается выгонка паровой спаржи.

Въ лобазѣ.

Температура держится на 0°R.

Цвѣтной капустѣ, посаженной въ лобазѣ, сдѣлавшей цвѣтъ, обрубаютъ корни и переносятъ капусту эту на ледникъ; невышедшая же въ цвѣтъ очищается отъ завялыхъ листьевъ и оставляется на мѣстѣ.

Въ овощной теплицѣ.

Ухаживается за крессъ-салатомъ, цикоріемъ, щавелемъ и пр.

Въ шампиньонникѣ.

Продолжаютъ дѣлать шампиньоны.

Въ фруктовомъ саду.

Обминаютъ снѣгъ вокругъ деревьевъ и кустарниковъ, въ предохраненіе отъ мышей.

Въ грунтовомъ сараѣ (*).

Сарай закрывается на зиму.

Декабрь.

Въ теплицѣ.

Температуру поддерживать отъ 8 до 12°R.

(*) Грунтовой сарай для содержанія фруктовыхъ деревь нѣжныхъ породъ или для полученія раннихъ фруктовъ, устронвается въ землѣ и надъ землей.

Для *углубленнаго* грунтоваго сарая въ землѣ выкапываютъ яму произвольной длины, шириною до 8 арш. и глубиною 2¹/₂ арш. Вынутую изъ ямы землю выбрасываютъ на ея края и тѣмъ образуютъ покатый на обѣ стороны валъ. Чтобы не осыпались стѣны ямы, ихъ укрѣпляютъ камнемъ, досками или плетнемъ. Съ одной стороны сарая дѣлаютъ входъ и спускъ съ навѣсомъ. По гребню ямы кладутъ обвязку, въ которую укрѣпляютъ стропила и если яма широка, то посрединѣ ея ставятъ столбы, которыми и подпираютъ конекъ. Поперекъ стропилъ кладутъ рѣшетникъ, который на зиму покрываютъ соломой, сѣномъ или камышомъ.

Грунтовые сараи *поверхъ земли* дѣлаютъ деревянныя или каменные, произвольной длины, и тоже шириною не больше 8 арш. причемъ заднюю стѣну сарая поднимаютъ на 4¹/₂ арш. а переднюю обыкновенно обрамцаемую на югъ — на 3 арш. Стропила дѣлаютъ на одинъ скатъ.

Когда деревья сильно вырастутъ, то односкатную покрывку сарая превращаютъ въ двухъскатную, причемъ стропила кладутъ однимъ концомъ на высокую стѣну, а другимъ на конекъ, который образуютъ поставивъ посреди сарая 8-ми аршинныя столбы и соединивъ ихъ, между собою, брусомъ. Южную стѣну разумѣется поднимаютъ при этомъ до высоты сѣверной стѣны.

Дѣлаютъ грунтовые сараи и съ рамами. При этомъ заднюю стѣну поднимаютъ на 5 арш. а переднюю на 3 арш. Такіе сараи на зиму покрываютъ ставнями.

На лѣто, грунтовой сарай, въ защиту деревьевъ отъ птицы затягиваютъ старой рыболовной сѣтью.

XX

Ставни открывать на то только время, когда видно солнце, или, если солнца не видно, то только на нѣкоторое время около полудня.

Пристанавливать центифольныя розы и кустарныя растенія.

Прививать розы, камеліи, азалеи, рододендроны и пр. дѣлать ихъ черенки, сажая въ разводочный парничекъ.

Поливка растеній самая умѣренная.

Въ оранжереѣ.

Температура отъ 3 до 5°R.

Открывается оранжерея съ восходомъ солнца и закрывается съ закатомъ.

Растенія тщательно очищаются отъ бѣлой вши.

Въ цвѣтникахъ.

Имѣютъ тоже наблюденіе за оставленными въ грунту растеніями что и въ ноябрѣ.

Въ огородѣ.

Окучивается срезанный навозъ, предназначенный для парниковъ.

Въ спаржевникѣ.

Продолжается выгонка паровой спаржи.

Въ шампиньонникѣ,

Дѣлаются шампиньоны.

Въ фруктовомъ саду.

Если садъ внѣ города — тщательно оберегается отъ зайцевъ.

Январь.

Въ теплицѣ.

Температуру поддерживаютъ отъ 10 до 12°R.

Поливку къ концу мѣсяца нѣсколько усилить, но дѣлать ее къ краю горшка и только тѣхъ растеній, которые очевидно ее требуютъ. Потребность эта обыкновенно опредѣляется не степенью сухости зем-

ли на ея поверхности, а звукомъ самаго горшка производимымъ постукиваніемъ по немъ. Надо замѣтить, что если земля въ горшкѣ суха, то онъ какъ бы звенитъ, когда по немъ шелкаютъ согнутымъ пальцемъ. Цвѣтоводу вообще на поливку надлежитъ обращать строжайшее вниманіе. Излишняя сухость при содержаніи растенія также ему вредна какъ и излишняя сырость. Излишняя сухость корней растенія обнаруживается вялостью листьевъ, излишняя сырость — желтизною ихъ. Если замѣчается послѣдній признакъ страданія растенія, то поливка тотчасъ на нѣкоторое время прекращается, а между тѣмъ взрыхляется верхній слой земли въ горшкѣ, въ которомъ сидитъ растеніе и осматривается не засорилось ли водосточное отверстіе и пропускаетъ ли оно воду.

Сажать въ парничекъ черенки питтоспорумовъ, камелій, азалей, миртъ и др. Приготовлять отводки растеній.

Пристанавливать къ цвѣту амариллисы, розы, азалеи, бульденежи, миндаль, дейчии и пр., также ягодные кустарники перенося ихъ изъ оранжереи.

Приготовить тепличный парникъ, сѣять въ немъ самые ранніе огурцы, редисъ, салатъ.

Приводятъ въ порядокъ растенія; обмываютъ ихъ, очищаютъ отъ вшей и тли и подвязываютъ.

Въ оранжерей.

Температура отъ 3 до 5°R.

Поливка крайне умѣренная.

Растенія очищаются отъ бѣлой вши. Обрѣзываютъ сухіе и искаженные растенія сучья.

Приготовляютъ къ цвѣту: розы, сирени, древесные піоны, воздушные жасмины, вейгеліи, дейчии и пр.

Сѣютъ и сажаютъ сѣмена оранжерейныхъ растеній.

Прививаютъ центифольныя розы къ шиповнику.

Въ цвѣтникахъ.

Занятій нѣтъ.

Въ огородѣ.

Съ половины мѣсяца сваживаютъ и окучиваютъ навозъ для набивки раннихъ парниковъ.

Въ спаржевникѣ.

Для продолженія выгонки сваживается въ кучу мелкій конскій навозъ.

Въ овоцной теплицѣ.

Начинають набивать теплицу согрѣвшимся въ свое время оку-ченнымъ для того навозомъ. Когда навозъ загорится, накладываютъ на него куски мерзлой земли, присыпая сверху талою землею, потомъ землю выравниваютъ и сѣютъ на ней: салатъ-латукъ, шпинатъ, капуста, предварительно проростивъ сѣмена, съ тѣмъ чтобы когда растенія взойдутъ разсадить ихъ въ парники, наконецъ сажаютъ: редисъ, эстрагонъ, лукъ для зелени.

Въ шампиньонникѣ.

Чтобы имѣть шампиньоны около мая, мѣшаютъ мелкій, свѣжій конскій навозъ съ $\frac{1}{3}$ крупнаго, конскаго же солоmistаго навоза, и когда онъ согрѣется набиваютъ имъ поля.

Въ фруктовомъ саду.

Сѣмена косточковыхъ фруктовыхъ деревьевъ и кустарниковъ, предназначаемыя для посѣва, кладутъ въ ящики, въ перемежку со слоями сыраго песка и держатъ въ подвалѣ прикрывъ, въ предохраненіе отъ мышей.

Весь мѣсяцъ наблюдаютъ за стоящими въ подвалѣ растеніями и очищаютъ ихъ отъ плесени и гнили.

Въ персиковой или виноградной (*) оранжереѣ.

Температуру держать на 6°R.

Пересаживаютъ фруктовые, каочныя деревья. Вносятъ: вишни, сливы, абрикосы, персики изъ грунтоваго сарая, подрѣзываютъ ихъ и приставляютъ къ свѣту или приводятъ въ порядокъ сидящіе въ грунту.

Виноградъ обрѣзываютъ и развязываютъ на шпалеру.

(*) Помѣщеніе для винограда не требуетъ, большею частію, ка-кого либо особеннаго устройства. Виноградъ содержать или въ оранжереѣ или въ теплицѣ.

Въ парникахъ (*).

Въ концѣ мѣсяца начинаютъ набивать парники.

Въ лобазѣ.

Перебираютъ и очищаютъ загнивающія овощи и ихъ листья.

Если лобазъ начинаетъ промерзать, селдерей въ немъ сложенный закрываютъ соломой и рогожами а самый лобазъ прикрываютъ навозомъ и снѣгомъ.

Обыкновенно въ оранжереѣ виноградъ сажаютъ просто въ грунтъ, около колоннъ и развязываютъ его въ шпалеру.

Въ теплицахъ виноградъ сажаютъ въ тонкостѣнные, кирпичные ящики, около переднихъ рамъ, близъ борова. Лозы развязываютъ по рамамъ.

Сажаютъ виноградъ осенью, но предпочитаютъ ей весеннюю посадку.

Содержать виноградъ въ оранжереѣ или въ теплицѣ слѣдующимъ способомъ.

Въ первый годъ послѣ посадки позволяютъ винограду расти произвольно.

На второй годъ обрѣзаютъ подъ корень всѣ виноградныя лозы, за исключеніемъ двухъ сильнѣйшихъ, — ихъ обрѣзываютъ только выше третьей или четвертой почки отъ пенька.

На третій годъ повторяютъ ту же обрѣзку на оставленныхъ двухъ лозахъ, отчего вырастаетъ отъ корневища множество побѣговъ, причемъ на четвертый годъ эти самые побѣги дадутъ плодъ.

(*) *Парники*, большею частью, устраиваются слѣдующимъ образомъ. На нѣсколько возвышенной мѣстности, защищенной отъ сѣвера, вырываютъ канаву произвольной длины, глубиною 2 арш. шириною до 3-хъ арш. Вокругъ канавы кладутъ срубъ въ два бревна для задней стѣны и въ одно для передней, обращенной на югъ. Срубъ этотъ покрываютъ рамами шириною до 2-хъ арш. каждая, для чего въ верхнихъ частяхъ сруба вынимаютъ пазы. Рамы эти должны лежать подъ угломъ отъ 25 до 35°.

Февраль.

Въ теплицѣ.

Температуру держать отъ 10 до 12°R, а въ орхидейной теплицѣ отъ 12 до 15°R.

Поливать также какъ и въ январѣ, но нѣсколько сильнѣе къ концу мѣсяца.

Начинаютъ пересаживать растенія (*).

(*) При пересадкѣ стараются давать растенію такую именно землю, которая для него наиболѣе пригодна, Для того, чтобы имѣть къ тому возможность заготавливаютъ съ осени различнаго сорта землю. Въ цвѣтоводствѣ наиболѣе употребляются слѣдующіе сорта земли.

а) *Вересковая* земля, находится лишь на песчаной почвѣ, на открытыхъ лѣсныхъ прогалинахъ, поросшихъ верескомъ и черникой и на рѣдколѣсьи имѣющемъ такой же характеръ. Такъ называемая вересковая земля образуется отъ перегной хвои, вереска, мха, лиственъ, лишаевъ, иголь можжевельника. Земля эта обыкновенно лежитъ слоемъ въ нѣсколько дюймовъ толщины и ее снимаютъ вплоть до песчаной подпочвы,

Болотная земля. Это растительный перегной, образовавшійся или подъ водою, или при постоянномъ ея вліяніи. Болотную землю берутъ пластомъ, не толще 4-хъ дюймовъ, потому что только верхній слой этой залежи, на который сильно и постоянно вліялъ воздухъ, годенъ для употребленія и то всегда съ примѣсью песку.

Лиственная земля. Состоитъ изъ перегнившихъ лиственъ, древесныхъ остатковъ и хвои.

Искусственно готовятъ листовенную землю сваливая листь въ плоскія кучи и примѣшивая туда же хвою, гдѣ таковая есть и древесныя опилки. Всю эту смѣсь перемѣшиваютъ раза три въ годъ. Такая земля на другой уже годъ дѣлается пригодною для нѣкоторыхъ растеній, особенно для примѣси къ другимъ землямъ.

Дерновая земля готовится слѣдующимъ образомъ. Дернины, толщиною въ четверть, складываютъ въ кучи. Черезъ нѣсколько времени эту кучу перерываютъ, что повторяютъ въ лѣто раза два. Черезъ годъ ее просѣваютъ на грохотъ и она идетъ въ дѣло.

Песокъ долженъ быть рѣчной или наносимый весенней водою.

Объютъ и сажаютъ глоксиніи, геснеріи, всѣ клубневые и горшечныя растенія.

Если имѣется парникъ, гдѣ можно производить дальнѣйшую выгонку раннихъ цвѣточныхъ растеній и вообще въ южной мѣстности, то высѣвають растенія теплыхъ странъ, также резеду, флоксы, вербены, анютины глазки, петунію, левкои, аврикули.

Продолжать прививку тѣхъ же растеній, что и въ январѣ. Размножать дѣленіемъ корней: папоротники, канны, бегоніи, послѣднія посредствомъ ихъ листьевъ.

Землянику, когда покажется ея цвѣтъ, поливають жидкимъ удобреніемъ и провѣтриваютъ ее въ ясные и теплые дни.

Въ оранжереѣ.

Температуру держать отъ 3 до 5°R.

Поливка умѣренная. Тщательное наблюденіе за чистотою растеній. Растенія пересаживаютъ. Дѣлаютъ черенки: камелій, фуксій, рододендроновъ, пеларгоній, геліотроповъ. Пристанавливаютъ душистую, деревянистую фіалку и сажаютъ въ горшки гладіолусы.

Въ цвѣтникахъ.

Занятій нѣтъ.

Лучше если песокъ заготовленъ хотя за годъ до употребленія и пролежитъ все это время въ кучѣ, на солнцѣ, причемъ куча эта также нѣсколько разъ будетъ перерыта.

Навозъ употребляется преимущественно двухъ родовъ: конскій и коровій.

Конскій навозъ берется выбрасываемый изъ парниковъ, чистый, безъ примѣси навоза свиного или овечьего, но возможно менѣе имѣющій соломы. Такой навозъ обыкновенно сваливается въ кучу, перевертывается нѣсколько разъ и не прежде употребляется, пока не приметъ видъ земли.

Коровій навозъ собираютъ зимою мерзлый и безъ соломы, складываютъ въ кучу, непременно на мѣстѣ хорошо освѣщенномъ солнцемъ, нѣсколько разъ перекапываютъ и не употребляютъ пока не превратится въ землю.

Въ огородѣ.

Окучивается навозъ для парниковъ.

Въ парникѣ.

Набиваютъ остальные парники. Въ половинѣ мѣсяца рассаживаютъ всходы салата; сбываютъ петрушку, шпинатъ; сажаютъ горохъ, по немъ — салатъ — латукъ или кочанный, морковь-коротель, редисъ. Въ концѣ мѣсяца высѣваютъ для рассадки впослѣдствіи: сельдерей, лукъ — порей, капуста ранняя.

Въ овощной теплицѣ.

Въ замѣнѣ употребленнаго вновь сбывается крессъ салатъ, сажается щавель, цикорій, лукъ, мелкая свекла и петрушка.

Въ концѣ мѣсяца парникъ набивается загорѣвшимся свѣжимъ навозомъ подъ высадку арбузовъ, дынь, огурцовъ, при чемъ первые два овоща сажаютъ въ маленькіе горшки, а огурцы высѣваютъ прямо въ грунтъ.

Во фруктовомъ саду.

Пересаживаютъ большія деревья, какъ фруктовые, такъ и дикорастущія, съ замерзшимъ вокругъ корни комомъ земли, въ заранѣе приготовленные для нихъ ямы, до того бывшія набитыми древеснымъ листомъ.

Въ персиковой и виноградной оранжереѣ.

Температуру постепенно доводятъ до 15° R. Въ половинѣ мѣсяца начинаютъ пристановку фруктовыхъ и кустарныхъ деревь.

Мартъ.

Въ теплицѣ.

Ночью поддерживаютъ температуру до 12° R, а днемъ притѣняютъ растенія отъ солнечныхъ лучей. Растенія опрыскиваютъ, дорожки поливаютъ, чтобы воздухъ былъ влажнѣе; усиливаютъ поливку самыхъ растеній; въ ясные дни теплицу провѣтриваютъ.

Въ этомъ мѣсяцѣ пересадка тепличныхъ растений должна быть окончена.

Сажаютъ черенки всѣхъ древесныхъ и кустарныхъ растений въ разводочный парничекъ, а также размножаютъ ремонтантныя розы, дѣлая черенки изъ обрѣзаемыхъ побѣговъ рано цвѣтнхъ экземпляровъ.

Дѣлаютъ посѣвъ всѣхъ лѣтнихъ цвѣтовъ, а также зимнихъ и осеннихъ левкоевъ, желтофіолъ, раннихъ овощей, эрфуртской цвѣтной капусты, стурцевъ, дынь и арбузовъ для парниковъ.

Въ оранжереѣ.

Температура отъ 3 до 5° Р. Поливка растений усиливается.

Оканчивается пересадка и прививка растений. Въ концѣ мѣсяца начинаютъ раздѣлять корни георгинъ по числу побѣговъ, сажаютъ ихъ въ горшки и приставляютъ къ свѣту, когда пойдутъ сильно въ ростъ. Изъ лишнихъ побѣговъ георгинъ или обламываемыхъ нечаянно при раздѣленіи корней дѣлаютъ черенки, сажая въ парникъ. Сажаютъ въ горшки мирабилисы. Землянку для ранней выгонки приставляютъ возможно ближе къ свѣту и даютъ ей воздуху, открывая въ ясные дни, форточки съ 11 часовъ утра до 2 часовъ пополудни.

Въ цвѣтникахъ.

Занятій нѣтъ.

Въ огородѣ.

Въ концѣ мѣсяца переносятъ каріофель въ тепло, чтобы скорѣе далъ ростки, для болѣе быстрого роста послѣ посадки его.

Артишоки и кукурузу мочатъ и оброшиваютъ въ мокрой тряпкѣ или войлокѣ; проросшіе сѣмена ежедневно отбираютъ и кладутъ въ горшокъ на мокрое полотно, горшокъ ставятъ въ кадку со снѣгомъ, въ помещеніе, гдѣ онъ не таялъ бы сильно и не замерзалъ. Съ зимовавшаго въ грядахъ шавеля сбрасываютъ снѣгъ.

Въ парникахъ.

Сажаютъ рассаду качаннаго салата, раннюю цвѣтную капусту, редисъ; сѣютъ сѣмена картофеля, шпинатъ, укропъ, петрушку; огуречные высадки пересаживаютъ изъ теплицы во второй половинѣ мѣсяца.

Въ особый парникъ сѣютъ капусту, сельдерей и порей, въ началѣ мѣсяца: ранніе сорта, для высадки на гряды въ началѣ мая, а поздніе въ половинѣ мѣсяца—для высадки въ концѣ мая.

Дѣлаютъ не глубокіе парники для кочаннаго салата и цвѣтной капусты. На время накладываютъ на эти парники рамы съ овощной теплицы, пока въ ней перебиваются парники, а потомъ, когда рамы опять туда понадобятся, на эти парники, рѣшеткой, накладываютъ толя и покрываютъ ихъ рогожами.

Въ паровыхъ грядахъ (*).

Освобождаютъ гряды отъ снѣгу и когда начнетъ таять земля, сѣютъ на нихъ ранній шпинатъ.

Въ шампиньонникѣ.

Съ потолка сваливаютъ снѣгъ.

Въ овощной теплицѣ.

На свѣжій переносятъ высадки арбузовъ и дынь, огуречныя же высадки сажаютъ въ грунтъ парника. Въ парникѣ, гдѣ уже сидѣли высадки, снимается земля, навозъ перебивается и когда загорится, наваливается новая земля и вторично сажаются огурцы, арбузы и дыни. Въмѣсто употребленнаго уже шпината и салата, сажаютъ арбузы, дыни, огурцы и бобы на свѣжей землѣ по перетрясенному навозу.

Въ подвалѣ.

Въ ясную и теплую погоду провѣтриваютъ подвалъ и постоянно очищаютъ находящіяся тамъ горшечныя деревья и кусты. Хранив-

(*) *Паровая гряда* представляетъ собою канаву произвольной длины, глубиною въ аршинъ, шириною въ два аршина, канаву эту плотно набиваютъ навозомъ и на нее кладутъ слой земли, въ четверть толщины. Гряды обставляются досками или обкладываются бревнами. На эту обвязку кладутъ стеклянныя рамы либо, на ночь, вмѣсто рамъ кладутъ рогожи или рамы, натянутыя коленкоромъ или холстомъ; наконецъ, иногда вмѣсто рамъ употребляютъ соломенные щиты.

XXIX

шіеся съ осени въ подвалѣ закопанными въ землѣ черенки крыжовника и смородины сажаютъ въ холодный парникъ или въ оранжерѣе, въ ящики.

Во фруктовомъ саду.

Прививаютъ дички фруктовыхъ деревъ и кустарниковъ, сохранившіеся въ подвалѣ. Раскутываютъ, смотря по погодѣ, менѣе нѣжныя фруктовыя деревья, въ срединѣ или въ концѣ мѣсяца.

Если оттаяла земля, пересаживаютъ деревья и кустарники.

Начинаютъ выстѣвать сѣмена фруктовыхъ деревъ и кустарниковъ.

Въ грунтовомъ сараѣ.

Снимаютъ нѣкоторую часть зимней крышишки съ сарая и начинаютъ отворять дверь для воздуха.

Въ персиковой и виноградной оранжерей.

Температуру поддерживаютъ до 10° R. Утромъ опрыскиваютъ растенія, пока они зацвѣтутъ, но съ этого времени понижаютъ температуру до 8° R. и перестаютъ ихъ опрыскивать, чтобы не сбить цвѣта и не дать загнить его чашечкамъ. Когда виноградъ зацвѣтетъ, прищипываютъ его побѣги.

Апрѣль.

Въ теплицѣ.

Теплица только изрѣдка протапливается, чтобы поддерживать въ ней теплоту ночью до 10° R., а днемъ притѣняютъ отъ сильныхъ солнечныхъ лучей и въ теплые дни даютъ свѣжаго воздуха.

Растенія опрыскиваютъ и сильнѣе поливаютъ, тщательно ихъ очищая отъ вшей и тли.

Молодые лѣтники, также сѣменные ценераріи и кальцеоларіи рассаживаютъ въ горшки и лишь онѣ окрѣпнутъ, переносятъ ихъ или въ оранжерею или въ парникъ, въ послѣдній же высаживаютъ всходы арбузовъ, дынь и огурцевъ.

Вновь пересаживаютъ фуксіи и геліотропы.

Въ горшки съ лиліями, если луковицы вылѣзутъ изъ земли, подсыпается земля.

Внимательно наблюдается за разводочнымъ парничкомъ и тѣ черенки которые пошли въ ростъ пересаживаются въ маленькіе горшечки и потомъ, когда окрѣпнуть, переносятъ ихъ въ парникъ. Съ этого времени наблюдение за черенками не должно быть прекращаемо и пересадка ихъ изъ парника продолжается и впредь.

Въ оранжереѣ.

Температура до 4° R. Въ теплые дни провѣтриваютъ оранжерею и тщательно очищаютъ растеніе отъ вшей и тли, а въ предохраненіе отъ нападенія этихъ насекомыхъ, окуриваютъ растенія табакомъ. По утрамъ растенія опрыскиваютъ и усиливаютъ ихъ поливку.

Въ цвѣтникахъ.

Цвѣтникъ приводится въ порядокъ во всѣхъ отношеніяхъ. Очищаются и исправляются дорожки и газоны; клумбы перекапываются и взрыхляются. Подчищаются и раздѣляются кустарники и въ концѣ мѣсяца дѣлается посѣвъ менѣе нѣжныхъ лѣтнихъ. Открываются менѣе чувствительные къ холоду, зимовавшія въ грунтѣ растенія, при чемъ они дѣлятся и размножаются. Въ началѣ мѣсяца снимаютъ покрывку съ кустарниковъ и съ посаженныхъ осенью луковицъ. Высаживаютъ въ грунтъ розы. Дѣлаютъ отводки грунтовыхъ розановъ, подстригая ихъ прежде, чѣмъ они тронутся въ ростъ. Подстригаютъ живую изгородь прежде, чѣмъ раскроется почка ихъ составляющихъ растеній.

Въ огородѣ.

Перегной, заготовленный для удобренія, развозится по мѣстамъ. И на теплыхъ и на обыкновенныхъ грядахъ сѣютъ для поздней посадки кочанную капусту и брюкву, а также сажаютъ лукъ, для зелени.

Съ наступленіемъ теплаго времени, въ концѣ мѣсяца, пересаживаютъ на гряды, изъ погреба назначенную на сѣмена брюссельскую и савойскую капусту брюкву и рѣпу.

Въ лабазѣ.

Овощи изъ лабаза переносятся на ледникъ, а лабазъ разбирается и убирается до осени.

Въ разсадникѣ (*).

Пересаживаютъ сѣменную капусту изъ подваловъ.

Высѣваютъ кочанную капусту для поздней разсадки и цвѣтную, чтобы имѣть ее въ июлѣ, туда же сѣютъ петрушку и укропъ.

Въ спаржевникѣ.

Продолжается выгонка спаржи. Для этого заготавливается навозъ, при чемъ его раздробляютъ возможно мельче. Въ концѣ мѣсяца впускаютъ поверхность спаржевыхъ грядъ, наваливаютъ на нихъ согрѣвшійся навозъ и прикрываютъ его землею.

Въ шампиньонникѣ.

Разваливается земля въ длину потолка теплицы и для охлажденія температуры вынимается одна доска.

Въ парникахъ.

Раскрываютъ парники съ земляникой, посаженной съ осени и покрываютъ ихъ стеклянными рамами.

Переставляютъ въ теплые парники изъ оранжереи горшечную землянику, давшую уже плодъ.

Продолжаютъ набивать парники подъ арбузы, дыни, огурцы и бобы.

Дѣлаютъ парникъ съ весьма тонкой набивкой навоза, сѣютъ разныхъ сортовъ брюкву и салаты, для разсадки на грядкахъ.

Во фруктовомъ саду.

Подрѣзываютъ деревья и кусты. Въ тихую погоду прививаютъ дички. Въ концѣ мѣсяца высаживаютъ изъ подвала привитые дички, на мѣста заранѣе приготовленные.

Сѣмена косточковыхъ фруктъ, сохранившіеся съ осени въ прослой-

(*) Нѣчто въ родѣ парника, но безъ навоза: большой ящикъ на четырехъ столбахъ, аршина на полтора отъ земли. На ночь его обыкновенно покрываютъ рогожами, на день открываютъ, посѣвы его притѣняютъ отъ солнца.

кѣ съ землей, пересыпаютъ въ сырой песокъ и ставятъ въ тепло, гдѣ дають имъ прорости и тогда высѣвають въ грунтъ.

Почву, если она не перекопана съ осени, перекапываютъ глубоко до 6 вершковъ.

Продолжаютъ пересадку деревъ и кустарниковъ.

Май.

Въ теплицѣ.

Топка теплицы больше не производится развѣ въ холодной полосѣ, во время утреннихъ заморозковъ и то слегка. Напротивъ, растенія притѣняютъ отъ солнечныхъ лучей и въ жаркіе дни, какіе иногда бываютъ въ маѣ, въ теплицу дають доступъ свѣжему воздуху. У дынь прорѣзываютъ плети, разсаживаютъ въ горшки послѣдніе лѣтники или пересаживаютъ ихъ на теплые гряды, либо въ парникъ.

Отцвѣтшія растенія, въ концѣ мѣсяца, выставляютъ на воздухъ, болѣе нѣжныя на ночь, внося подъ крышу или прикрывая ихъ.

Въ сранжереѣ.

Температура до 5° R., а потому топка болѣе почти не производится.

Поливка сильная, георгины и мирабилисы, въ половинѣ мѣсяца, выносятъ на воздухъ, но на ночь прикрываютъ соломенными щитами или досками, высаживая ихъ въ грунтъ въ концѣ мѣсяца.

Приносятъ изъ подвала: гортензіи, розы, азалеи, китайскія сирени и пока не пойдутъ въ ростъ, ставятъ ихъ въ тѣнь.

Въ концѣ мѣсяца выставляютъ на воздухъ: гвоздики, штокр-розы, лефкои, желтофіолы, дицликтры, дигиталисы, хвойныя растенія, лавры, радодендроны и др. менѣе чувствительныя къ холоду растенія.

Въ цвѣтникахъ.

Открываютъ остальные растенія, зимовавшія въ грунтѣ. Сажаютъ въ грунтъ розаны. Высѣваютъ въ грунтъ сѣмена двулѣтнихъ и вѣточныхъ растеній. Пересаживаютъ, въ концѣ мѣсяца, въ цвѣтникъ изъ парниковъ или изъ оранжереи, менѣе нѣжныя лѣтніе цвѣты, а также георгины, имѣя, впрочемъ, всегда наготовѣ соломенные колпаки для покрытія этихъ послѣднихъ, въ случаѣ морозовъ.

XXXIII

Въ огородѣ.

Перекапываются гряды. На возвышенныхъ мѣстахъ, гдѣ земля скорѣе просыхаетъ, сажаютъ раннія капусты: цвѣтную, красную, брюссельскую и савойскую. Сѣютъ: петрушку, морковь, лукъ сѣянецъ, кривель, укропъ, шпинатъ, свеклу, горохъ и пр. Сажаютъ лукъ саженецъ, артишоки, эстрагонъ, спаржу, картофель, — въ концѣ мѣсяца: огурцы и фасоль. Разсаживаютъ изъ парника лукъ, — порей и сельдерей.

Всѣ всходы тщательно опалываютъ, что продолжаютъ исполнять и въ слѣдующіе мѣсяцы, по мѣрѣ заростанія грядъ сорными травами.

Въ спаржевникѣ.

Приготовленный въ прошломъ мѣсяцѣ навозъ разваливается по грядкамъ и прикрывается землей.

Въ парникахъ.

Набиваются новые парники, а освободившіеся отъ разсады перебиваются для посадки на нихъ дынь и арбузовъ.

Въ разсадникѣ.

Сѣется цвѣтная капуста для поздней разсадки, салаты: качанный и ромень. Въ началѣ мѣсяца сажаются дыни для разсадки въ іюнѣ.

Во фруктовомъ саду.

Выставляютъ на воздухъ изъ подвала горшечные деревья и кусты. Въмѣсто погибшихъ кустиковъ земляники на грядкахъ, сажаютъ новые. Дички оставшіеся на сѣменныхъ грядкахъ непривитыми по недостаточному развитію, пересаживаютъ въ питомникъ. Прошлогогодні черенки смородины и крыжовника пересаживаютъ на другія гряды. Приготавливаютъ новыя гряды для земляничной разсады.

Въ грунтовомъ сараѣ.

Раскрываютъ сарай.

Юль.

Въ теплицѣ.

Растенія затѣняютъ отъ солнца. Теплицу провѣтриваютъ. Выносятъ на воздухъ и въ холодную оранжерею всѣ растенія за исключеніемъ самыхъ нѣжныхъ. Остающіеся въ теплицѣ растенія сильно поливаютъ и опрыскиваютъ, послѣ того какъ солнце перестанетъ припекать.

Въ оранжереѣ.

Растенія выносятся на воздухъ, при чемъ тщательно осматриваются, очищаются, обрѣзываются и подвязываются къ новымъ кольямъ.

Вынесенныя на воздухъ растенія или закапываются съ горшками въ грунтъ, или ставятся на поверхность земли и такъ укрѣпляются чтобы ихъ не валило вѣтромъ.

Камеліи, азалеи, радодендроны и пр. дорогія растенія ставятся въ мѣста защищенныя отъ лучей полуденнаго солнца и сильныхъ, господствующихъ въ мѣстности, вѣтровъ, также, по возможности, отъ пыли.

Въ жаркое время, какъ въ этомъ, такъ и въ слѣдующемъ мѣсяцѣ, при бездождіи, растенія опрыскиваютъ, при возможности, два раза въ день: раннимъ утромъ и подъ вечеръ.

Тѣ растенія, которыя оставлены въ оранжереѣ, затѣняются въ жаркое время и въ оранжереѣ постоянно держится свѣжій воздухъ, для чего, большею частью, вынимаютъ нѣсколько рамъ или всѣ нижнія, гдѣ таковыя устроены.

Въ цвѣтникахъ.

Въ началѣ мѣсяца пересаживаютъ изъ парниковъ и теплицы остальные сорта лѣтнихъ цвѣтовъ; приводятъ цвѣтники въ окончательный порядокъ, очищаютъ газоны и стригутъ ихъ, по мѣрѣ выростанія травы и въ сухую погоду поливаютъ ихъ.

Высаживаютъ на особыя гряды изъ парника или ящиковъ: желтофіоль, зимніе и осенніе левкои, сажая ихъ въ такомъ разстояніи другъ отъ друга, чтобы они могли разростись и вполне развиться для содержанія въ оранжереѣ зимой.

Высаживаются въ грунтъ пеларгоніи, фуксіи, канны, голландскія гвоздики и въ началѣ мѣсяца хвойныя растенія.

Нѣкоторыя растенія изъ оранжерей и теплицы переносятся въ цвѣтникъ, и вкапываются въ землю съ горшками.

Въ огородѣ.

Подсаживается изъ разсадника капуста, вмѣсто погибшихъ экземпляровъ. Капустная расада окучивается послѣ того, какъ ее ополють, окучиваютъ картофель.

Въ концѣ мѣсяца сажаютъ позднюю цвѣтную капусту, чтобы успѣла въ сентябрѣ.

Сѣютъ шпинатъ, укропъ, редисъ. Сажаютъ качанный салатъ. Въ концѣ мѣсяца высѣваютъ салаты успѣвающие въ сентябрѣ, послѣ расадки на гряды въ іюлѣ, для сохраненія въ прокъ.

Расправляютъ и даютъ такое направленіе огуречнымъ плетямъ, чтобы онѣ лежали равномерно по грядамъ.

Уничтожаютъ насѣкомыхъ, особенно червь на капустѣ и яички положенныя гусеницей, подъ ея нижними листьями.

Во фрунтовомъ саду.

Опалывается земляника и между ея кустиками или укладывается мохъ или рассыпаются древесныя опилки.

Прищипываютъ и подвязываютъ растенія пущенныя шпалерами.

Вокругъ деревьевъ полютъ и разрыхляютъ землю, что продолжаютъ во все лѣто, по мѣрѣ заростанія земли травой и сорными растеніями.

Въ персиковой и виноградной оранжерей.

Обрѣзываютъ у винограда всѣ слабыя побѣги.

Іюль.

Въ теплицѣ.

Относительно защиты растеній отъ солнца и поливки ихъ принимаются тѣже мѣры, что и въ іюнѣ.

Разводятъ черенками: глосини, вербены, пеларгоніи, петуніи и др.
Ремонтируютъ теплицу: печи, борова, рамы.

Въ оранжереѣ.

Оставленные въ оранжереѣ растенія притѣняютъ. Двери и рамы оранжереи держатъ открытыми. Растенія сильно поливаютъ и опрыскиваютъ, какъ оставшіеся въ оранжереѣ, такъ и выставленные, — но камелии, рододендроны, азалеи, которые уже дали ростъ, не опрыскиваютъ болѣе, а напротивъ, въ дождливое лѣто вносятъ въ оранжерею. Оранжерея ремонтируется.

Пересаживаютъ выставленные на воздухъ фуксіи и гортензіи, чтобы онѣ цвѣли въ августѣ. Пересаживаютъ отцвѣтшія розы.

Въ цвѣтникахъ.

Дѣлаютъ отводки петуній, вербенъ, голландскихъ гвоздикъ, центифольныхъ розъ. Вынимаютъ изъ земли отцвѣтшіе тюльпаны, гиацинты, тацеты, нарциссы, — обрѣзываютъ ихъ зелень и просушиваютъ ихъ въ затѣненномъ, сухомъ мѣстѣ, на воздухѣ.

Сѣютъ, приготовляя для зимы, резеду, левкои и для весны кальцеоларіи и цинераріи.

Начинаютъ собирать сѣмена, по мѣрѣ ихъ дозрѣванія, что и продолжаютъ въ слѣдующіе мѣсяцы, при этомъ обрѣзываются подъ корень завялые стебли растеній.

Въ огородѣ.

На мѣста освободившіяся отъ снятыхъ овощей, сѣютъ: шпинатъ, укропъ, кервель, сажаютъ салатъ.

Перья рѣпчатого лука пригибаютъ къ землѣ, чтобы крупнѣе была его луковица.

Разсаживаютъ салаты для осени.

Сажаютъ зимнюю рѣдьку и сѣютъ китайскую.

Въ разсадникѣ.

Сѣютъ салатъ на рассаду для зимняго употребленія.

Въ парникахъ.

Съ дынь, огурцевъ и бобовъ — снимаютъ рамы.

Во фруктовомъ саду.

Вкапываютъ перепрѣлый навозъ въ разрыхляемую вокругъ деревьевъ землю. Прививаютъ спящимъ глазкомъ яблони, груши и вообще деревья съ толстой корой, если время сухое — то въ половинѣ мѣсяца, а если дождливое — то въ концѣ.

Землянику для пристановки высаживаютъ изъ грунта въ горшки.

Августъ.

Въ теплицѣ.

Относительно поливки и притѣненія растений употребляются тѣ же приемы, что и въ два предыдущіе мѣсяца.

Растенія сильно окоренившіяся, переваливаютъ въ болѣе просторныя горшки.

Растенія вносятъ съ воздуха.

Въ оранжереѣ.

Въ концѣ мѣсяца растенія вносятъ съ воздуха въ оранжерею. Въ началѣ, послѣ этого переноса, нижнія рамы въ оранжереѣ не вставляются и вообще оставляется прежній доступъ свѣжаго воздуха въ оранжерею. Потомъ нижнія рамы приставляются только на ночь, чтобы растеніе постепенно отучалось отъ открытаго воздуха. Болѣе не опрыскиваютъ растенія. Поливка ихъ уменьшается и производится собственно по утрамъ, чтобы въ теченіи дня земля могла, хотя не много, пообсохнуть.

Гиацинты, тюльпаны, тацеты сажаютъ въ горшки, какъ указано въ статьѣ о *гиацинтахъ*. Отцвѣтшія глоксиніи, лиліи и гладіолусы, вынимаютъ изъ земли и кладутъ въ сухое мѣсто, освободивъ ихъ отъ увядающей зелени.

Въ цвѣтникахъ.

Дѣлятъ и пересаживаютъ зимующія растенія. Предназначенныя къ пристановкѣ сирени, розы и другія кустарныя растенія, ставятъ на сухое солнечное мѣсто и мало поливаютъ. Въ началѣ мѣсяца окулируютъ розы на спящій глазокъ. Пересаживаютъ предназначаемыя для содержанія зимою въ оранжереѣ; примулы, цинераріи и кальцео-

ляри. Высаживаютъ изъ грунта въ горшки, назначаемыя для зимней пристановки: зимніе и осенніе левкои, желтофіолі и штокъ розы.

Георгины оказавшіяся не махровыми, вырѣзають подѣ корень въ цвѣтникахъ, замѣняя ихъ махровыми и означаютъ, подвязкою ерлыковъ, колера ихъ и форму для необходимой сортировки при зимнемъ храненіи. Многолѣтнія травянистыя растенія пересаживаютъ на новыя мѣста.

Въ шампизонникѣ.

Набиваютъ навозомъ.

Въ парникахъ.

Снимають рамы и относятъ ихъ на храненіе.

Въ огородѣ.

Подвязываютъ для бѣленія салатъ эндивій. Выбирають лукъ рѣпчатый и сѣянецъ.

Въ свощной теплицѣ.

Въ началѣ мѣсяца сѣють редисъ, салатъ — латукъ, кервель и сажаютъ кочанный салатъ.

Въ персиковой и виноградной оранжереѣ.

Подстригаютъ и подвязываютъ виноградныя лозы.

Во фруктовомъ саду.

У яблонь и грушъ пущенныхъ шпалерами, укорачиваютъ побѣги и подвязываютъ ихъ вѣтви, наконецъ — ущемляютъ ихъ для образованія плодовыхъ глазковъ.

Молодую землянику пересаживаютъ для зимовки на особыя гряды, а у старой обрѣзываютъ усы.

Сентябрь.

Въ теплицѣ.

Уменьшаютъ поливку и провѣтриваніе растеній, производя его только въ самые теплые дни.

Пазы оконныхъ рамъ задопачиваютъ и замазываютъ. Въ холодныя ночи рамы закрываютъ ставнями.

По немногу просушиваютъ печи и борова, изрѣдка отапливая ихъ, но не закрывая трубъ.

Въ оранжереѣ.

Начинаютъ слегка протапливать печи, чтобы обсушить борова, но трубъ не закрываютъ.

Поливку растений уменьшаютъ а луковичныхъ растений вовсе прекращаютъ. Отучаютъ растенія отъ наружнаго воздуха.

Въ цвѣтникахъ.

Въ началѣ мѣсяца вынимаютъ изъ грунта фуксіи, пеларгоніи, голландскія гвоздики, канны, мирабилисы, львиный зѣвъ, прочія многолѣтнія травянистыя растенія сберегаемыя на зиму въ оранжереѣ, также привитые на воздухъ розы ремонтанты и вѣчно цвѣтушія.

Сажаютъ въ грунтъ лиліи, гіацинты, тюльпаны, нарцисы, тацеты и др. луковичныя, которыя желаютъ имѣть въ цвѣту раннею весною, въ грунтѣ. Пересаживаютъ кустарники и деревья когда опадеть ихъ листь. Назначаемыя для пристановки къ цвѣту кустарники очень мало поливаютъ, а въ дождливое время кладутъ на бокъ, впрочемъ оставляя на воздухъ до октября.

Для сохраненія георгинъ въ цвѣту возможно дольше время имѣютъ на готовѣ соломенные колпаки, которыми ихъ въ случаѣ заморозковъ и покрываютъ. Назначаемыя для прививки зимою дички, высаживаютъ въ горшки. Сажаютъ въ горшки окоренившіеся отводки: петуній, гвоздики. Пересаживаютъ лиліи на новыя мѣста.

Въ огородѣ.

Начинается уборка овощей. Перегной изъ парниковъ выкидывается на гряды.

Въ парникахъ.

Земля изъ парниковъ вываливается въ кучу обставленную досками; навозъ выбрасывается на гряды; парники набиваются сухимъ навозомъ чтобы не промерзали и закрываются старыми досками чтобы не забивались снѣгомъ.

Въ овощной теплицѣ.

Накладываются рамы. Сажаютъ коренья: щавеля, цикоріи и мелкой свеклы. Сѣютъ крессъ салатъ.

Въ лобазѣ.

Строится лобазъ для храненія овощей, обыкновенно на огородѣ.

Въ спаржевникѣ.

Начинается выгонка паровой спаржи.

Въ шампиньонникѣ.

Продолжаютъ дѣлать шампиньоны.

Во фруктовомъ саду.

Глубоко перекапываютъ землю для весенней посадки деревьевъ и для того же готовятъ ямы.

Очищаютъ стволы деревьевъ; вырѣзываютъ лишнія вѣтви. Сѣютъ вишню. Выкапываютъ предназначенныя для прививки дички, переносятъ въ подвалъ и приваливаютъ ихъ землей.

Дѣлаютъ черенки смородины и крыжовника и сажаютъ ихъ въ холодный парникъ.

Дѣлаютъ малину и вообще ягодные кустарники. Высаживаютъ въ холодные парники землянику для ранняго плодошенія.

5-го Апрѣля 1879 г.

г. Самара.

1. *Abelia floribunda*. Изъ семейства *Caprifoliaceae*, маленький оранжерейный кустарникъ съ крупными, малиновыми цвѣтами; боится сырости, размножается отводками (*).

Другой видъ. *A. uniflora*. Цвѣты бѣлые съ розовымъ.

(*) Отводками растеніе размножается только въ тѣхъ случаяхъ, когда оно трудно разводится черенками, или когда растеніе очень рѣдко и дорого.

Отведеніе растенія производится слѣдующими способами: а) готовятъ особой формы маленькій горшекъ съ разрѣзомъ во всю его вышину на одной сторонѣ и съ нѣсколькими дырками у краевъ. Въ этотъ разрѣзъ вводятъ отводимую часть растенія, наполняютъ горшекъ землею и посредствомъ проволоки, продѣтой въ дырочки, сдѣланныя въ верхнемъ краѣ горшка, или посредствомъ подведенныхъ подъ горшекъ подставокъ, устанавливаютъ горшечекъ и укрѣпляютъ его такъ, чтобы введенная въ него часть растенія не измѣняла своего естественнаго положенія. Въ отводимой части дѣлается горизонтальный надрѣзъ, идущій до половины, или вмѣсто надрѣза ниже глазка и тотчасъ подъ глазкомъ обертывается и туго стягивается проволока, которая при этомъ перерѣзываетъ кору. Горшечекъ съ отведеннымъ растеніемъ аккуратно поливаютъ, потому что разъ засушивъ образуемые отводкомъ корешки,—ихъ почти невозможно воскресить.

Отводокъ отрѣзается прочь только тогда, когда онъ вполне хорошо окоренился. Отрѣзъ долженъ идти вровень съ горшкомъ. Ножь сначала впускается на треть толщины отводка, потомъ черезъ нѣсколько времени, на половину, затѣмъ на двѣ трети и наконецъ отводокъ совсѣмъ отрѣзывается.

Отводокъ въ первое время послѣ отрѣзки хорошо поставить въ теплый парникъ, подъ раму.

б) Вмѣсто горшка употребляютъ свернутый рожкомъ листовой цинкъ и в) вмѣсто горшка употребляютъ бересту, дѣлая изъ нея

2. **Abelmoschus esculentus.** Изъ семейства **Malvaceae.** *Абель-мозъ съдобный.* Дикорастущее въ Америкѣ растение; разводится во всѣхъ жаркихъ странахъ для сѣменъ, составляющихъ суррогатъ кофея.

Другой видъ: **A. moschatus.** Сѣмена его идутъ для выдѣлки помады и духовъ.

3. **Abies. Ель.** Изъ семейства **Coniferae-Abietineae.** Нѣкоторые виды этого хвойнаго, дикорастущаго дерева разводятся въ садахъ и паркахъ, служа имъ украшеніемъ; нѣкоторые же могутъ существовать у насъ только въ оранжереѣ. Ель имѣетъ красно-бурую кору; корни растущіе, преимущественно, въ горизонтальномъ положеніи; цвѣтетъ въ періодъ пятидесятихъ годовъ своей жизни; даетъ смолу; хорошій строевой матеріалъ; кора этого дерева употребляется при дубленіи кожъ; отваръ ея пишекъ имѣетъ лечебныя свойства.

Ель размножается, преимущественно, посѣвомъ сѣменъ весною; любитъ глинистую почву, смѣшанную съ черноземомъ и хрящемъ.

Виды Ели: **A. picea. (A. excelsa).** *Ель обыкновенная.* Имѣетъ тонкія, четырехгранныя иглы.

A. americana alba. *Американская бѣлая или синяя ель.* Имѣетъ бѣлую кору, шишки овально продолговатыя, до 3-хъ дюймовъ длины.

A. nigra. *Е. приморская,* съ маленькими шишками; растетъ въ С. Америкѣ.

A. balsamea. *Е. бальзамическая,* американская. Иглы ея, если ихъ потерѣтъ, даютъ сильный, бальзамическій запахъ.

A. canadensis. *Е. Канадская,* съ плоскими иглами; кора идетъ на выдѣлку кожъ, которымъ придаетъ темно-красный цвѣтъ.

A. Nordmaniana. Растетъ на Кавказѣ.

A. Willimsonii. A. Frazeri.

маленькій кузовокъ или бурачекъ, а также надрѣзанную часть растенія просто туго обертываютъ толстымъ слоемъ зеленого мха и этотъ клубокъ держать постоянно влажнымъ.

Въ остальномъ при употребленіи, способовъ, изложенныхъ въ пунктахъ б) и в) поступаютъ какъ сказано въ пунктѣ а).

Послѣдніе четыре вида переносятъ наши зимы на открытомъ воздухѣ, только будучи надежно прикрыты соломой, листомъ и рогожами.

A. pectinata. *Пихта обыкновенная*, съ плоскими, широкими, мягкими иглами; имѣетъ пирамидальную форму; достигаетъ 180 футовъ высоты, покрыта довольно гладкою, бѣловатою корою.

A. Cephalonica. Растетъ въ Греціи, у насъ содержится въ оранжереѣ.

A. pinsapo. Растетъ въ Испаніи.

A. Tsuga. Изъ Японіи.

A. iezoensis. Оранжерейное растеніе требуетъ песчаной земли; размножается черенками, даетъ большую совершенно почти синюю шишку.

A. lasiocarpa. A. nobilis. A. amabilis. A. grandis. Четыре послѣдніе вида растутъ въ Сѣверной Америкѣ.

4. **Abobra viridiflora.** Однолѣтнее грунтовое растеніе; требуетъ много тепла, а потому уходъ за нимъ очень труденъ и разведеніе его неудобно.

5. **Abronia augusta.** Изъ семейства *Nyctagineae*. Однолѣтнее оранжерейное растеніе.

Другой видъ. **A. umbellata.** Австралійское, однолѣтнее грунтовое растеніе, съ розовыми, на розовыхъ черенкахъ, цвѣтами, распространяющими, особенно вечеромъ, сильный ароматическій запахъ ванили. Въ началѣ Марта сѣется въ плошку, лишь взойдетъ — разсаживается въ ящикъ или плошку и выставляется на солнце, когда же у растенія образуются два—три листка и совершенно прекратятся морозы — высаживается въ грунтъ; но такъ какъ это растеніе требуетъ большаго тепла, то лучше держать его въ горшкахъ или подъ стеклянными рамами. Любитъ вересковую землю въ смѣси съ луговою.

6. **Abrus praecatorius.** *Дикая Лакрица. Молитвенная Лiana.* Выющееся растеніе съ блѣдно-пурпуровыми цвѣтами и съ красными сѣменами различныхъ видовъ и цвѣтовъ: черными, бѣлыми, красными и съ чернымъ пятнышкомъ, на одномъ концѣ. Твердое, глянцеовитое это сѣмя, употребляется Индѣйцами для выдѣлки четокъ, ожерелій и т. п., а равно аптека-

рами въ качествѣ разновѣса. Изъ корня этого растенія получается сокъ, замѣняющій лакрицу.

7. Abutilon. *Абутильонъ. Цвѣтущій кленъ.* Оранжевейное растеніе, изъ семейства **Malvaceae**. Имѣетъ листья, у большей части видовъ, похожіе на кленовые и висячіе цвѣты. Абутильонъ цвѣтетъ по нѣскольку разъ въ годъ, а нѣкоторые виды его цвѣтутъ даже зимою, если ихъ держать въ теплицѣ съ Ноября. Зимою растеніе это сохраняютъ въ сухомъ и свѣтломъ мѣстѣ оранжевей, въ температурѣ отъ 5—10° Р., но оно очень хорошо растетъ и въ комнатѣ если его ставятъ у оконъ, обращенныхъ на юговостокъ или югозападъ. Абутильонъ размножается черенками (*) или сѣменами, на почву не прихотливъ

(*) Черенками—самый легкій и употребительный способъ размноженія растеній въ особенности потому, что растеніе, получаемое отъ черенка, цвѣтетъ гораздо скорѣе и обильнѣе, нежели сѣянцы. Растеніе же съ мохровыми цвѣтами, у которыхъ не бываетъ сѣменъ, или которыя перерождаются при разведеніи сѣменами по необходимости размножаются черенками. На черенки большею частью рѣжутъ вѣтки, причемъ сажая черенокъ, оставляютъ на немъ нѣсколько верхнихъ листьевъ, но нѣкоторые растенія разводятъ посадкою листа или даже части листа. Черенокъ дѣлается преимущественно короткій, но наблюдается чтобы на немъ было отъ 4 до 5 глазковъ. У деревянистыхъ породъ срѣзывается черенокъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ древесина начала вырѣвѣвать, т. е. употребляются на черенки однолѣтніе или двухлѣтніе побѣги. Травянистая порода рѣжется на черенки безразлично, но во всякомъ случаѣ черенокъ должно брать съ здороваго и хорошо выдержаннаго экземпляра. Рѣжется черенокъ острымъ ножомъ, обрѣзъ дѣлается чистый, гладкій. У растеній, черенки которыхъ задаютъ корни отъ срѣза, черенокъ рѣжутъ тотчасъ подъ листомъ, остерегаясь порѣзать послѣдній, при этомъ отрѣзъ дѣлается горизонтальный; у такихъ же породъ, которыя пускаютъ корни по всему черенку, мѣсто отрѣза не имѣетъ значенія. Черенки растеній, испускающихъ млечный сокъ, сажаютъ не прежде, пока сокъ, выходящій изъ отрѣза засохнетъ, причемъ его смываютъ передъ посадкою. У трудно укореняющихся породъ съ черенками срѣзывается и часть древесины ствола или сучка, что способствуетъ скорѣйшему образованію корней. Черенки эти не отрѣзываютъ, а отрываютъ.

но лучше растетъ на землѣ, составленной на половину изъ вересковой и лиственной.

Виды: *A. vexillarium*. Одинъ изъ красивѣйшихъ видовъ и цвѣтетъ чаще другихъ; цвѣтокъ трехцвѣтный, красный съ оранжевымъ и красно-бурымъ.

A. striatum. *A. струйчатый*. Желтый цвѣтокъ испещренъ пурпуровыми полосками.

A. megaroticum. *Мегапотамская грудника*. На лѣто изъ умѣренной теплицы, высаживается въ грунтъ, поливается

У ползучихъ кустарниковъ и деревьевъ съ рыхлою сердцевиною (бузина и. т. п.) срѣзываютъ черенки съ частью вѣтки въ видѣ крючка.

У деревьевъ съ твердою древесиною или многими смолистыми частями (хвойныхъ, лавровыхъ, камелій и пр.), коихъ черенки трудно укореняются, требуютъ предварительнаго приготовленія, такимъ способомъ: по избранію черенковъ на деревѣ, тѣ мѣста гдѣ нужно отдѣлить черенокъ, обвязываютъ тонкою проволокою, такъ чтобы она прошла сквозь кору. На этихъ поврежденныхъ мѣстахъ, въ теченіи трехъ или четырехъ недѣль, образуются наросты или наплывы. Потомъ срѣзываютъ черенки ниже этихъ наростовъ постепенно, въ теченіи около 8 дней. Раны обсыпаютъ сухимъ пескомъ. Если же наростъ великъ, то передъ посадкою черенка дѣлаютъ на немъ крестообразный надрѣзъ. Такъ приготовленный черенокъ можно садить безъ всякаго сомнѣнія въ успѣхѣ: наплывъ замѣняетъ корни, всасывая соки и питая растеніе.

Лучшее время посадки черенковъ конецъ зимы, а растеній, испускающихъ млечный сокъ—зима, т. е. состояніе покоя.

Черенки нѣкоторыхъ растеній, напр. миртовыхъ, иногда сидятъ годъ, не задавая корней, но большая часть растеній прорастаетъ въ теченіи весны. Тѣ черенки, которые успѣютъ дать корни только къ наступленію слѣдующей зимы, тоже пересаживаются въ горшки, но они должны быть оставлены подъ рамами въ разводномъ парничкѣ.

Черенки травянистыхъ растеній сажаются въ самую теплую часть разводнаго парничка, чтобы не подопрѣвали, черенки же деревянистыхъ растеній даютъ корни въ температурѣ нѣсколько низшей. Во всякомъ случаѣ черенки травянистыхъ породъ должно садить отдѣльно отъ деревянистыхъ черенковъ, потому что требуютъ тѣ и

жидкимъ удобреніемъ; растутъ кустомъ, покрывающимся весьма красивыми висячими цвѣтами — пунцовыми съ желтымъ вѣнчикомъ. Въ комнатѣ ставится на солнечное мѣсто и развязывается маленькою шпалерою; цвѣтетъ все лѣто съ Апрѣля.

A. Darwinii. Вывезенъ изъ Южной части Бразиліи знаменитымъ Ч. Дарвиномъ; съ широкими бархатистыми листьями и красно - оранжевыми цвѣтами.

A. venosum, съ цвѣткомъ, похожимъ на цвѣтокъ **A. stri-**

другіе совѣмъ отличнаго ухода. Травянистые черенки нуждаются въ весьма умѣренной поливкѣ и опрыскиваніи, лишь бы не вяли, сгода какъ деревянистые особенно съ крѣпкою древесиною, требуютъ возможно сильнаго увлажненія, въ чемъ и заключается главное условіе успѣшнаго приращенія ихъ. Нижняя часть разводочнаго парничка дѣлается хорошо пропускающею воду и весь парничекъ наполняется крупнымъ кремнистымъ пескомъ, такъ что вода отъ частыхъ поливокъ или опрыскиваній стекаетъ мгновенно, но смываетъ все способное загнить. Послѣ поливки, раму парничка оставляютъ открытою, пока не обсохнутъ листъ на черенкахъ.

Черенки сажаютъ такъ глубоко, чтобъ они держались прямо и не валились при поливкѣ, песокъ у посаженнаго черенка крѣпко уминается, чтобы плотно къ нему прилежъ.

Въ парничкѣ температура должна быть отъ 20 до 24° R.

Каждое утро рама снимается и на-сухо отирается, черенки поливаются, снимаются съ нихъ завялые и опавшіе листья и когда листья обсохнутъ, послѣ поливки, снова покрываются рамою.

Закоренившіеся черенки разсаживаются въ маленькіе горшечки. Закорененіе черенка узнается по наклонности къ росту и особому, такъ сказать, выраженію жизни, которое при этомъ усматривается у черенка. Если окажется что вынутый черенокъ не задалъ еще корней, его сажаютъ на прежнее мѣсто. Пересадкою закоренившихся черенковъ не надо медлить, чтобы растеніе не вытянулось. По пересадкѣ горшечки съ черенками поливаютъ и ставятъ на нѣкоторое время подъ рамы, приучая ихъ затѣмъ къ воздуху постепенно посредствомъ приподыманія рамы, сначала на самое короткое, а потомъ на болѣе и болѣе продолжительное время, преимущественно ночью. Если имѣется теплый воздушный парникъ, то приученныя къ тепличному воздуху молодыя растенія ставятъ въ этотъ парникъ и первое время держать подъ рамами.

tum, но вдвое его крупнѣе. Высаживается въ грунтъ въ тучную землю, когда уже нельзя болѣе ждать морозовъ. Осенью вынимается изъ грунта и вносится въ оранжерею. Размножается черенками въ Іюнѣ или Іюлѣ.

A. insigne. Большіе цвѣты, малиновые съ бѣлымъ.

A. paeoniaeflorum. Тепличный кустарникъ съ овальными, зазубренными по краямъ листьями съ ярко-розовыми цвѣтами похожими на цвѣтъ яблони и съ желтыми тычинками. На лѣто высаживается въ грунтъ. Размножается черенками.

A. avicenum. Грудника. Степной подсолнечникъ. Грудница. Бархатныя просвирки. Дикорастущее.

8. **Acacia.** Акація. Кустарникъ и дерево. Одни виды акаціи растутъ на открытомъ воздухѣ, другіе — собственно въ оранжерей, но какъ тѣ, такъ и другіе плохо идутъ въ комнатѣ. Цвѣты у акаціи большею частью бываютъ желтые, но есть виды съ бѣлыми и розовыми цвѣтами. Акація размножается сѣменами, черенками и дѣленіемъ куста. Земля для оранжерейныхъ видовъ готовится изъ вересковой съ примѣсью четвертой части дерновой и четвертой части лиственной. Для ранней выгонки, Акацію, когда она сдѣлаетъ цвѣточные почки, ставятъ въ теплицу, гдѣ держать влажно, при полномъ доступѣ воздуха и свѣта, часто обрызгиваютъ и такимъ образомъ заставляютъ цвѣсть раньше обыкновеннаго; но при такого рода выгонкѣ, нерѣдко, Акація теряетъ бутоны и не цвѣтетъ вовсе. Гораздо лучше держать это растеніе въ оранжерей, при 8° Р., гдѣ оно зацвѣтетъ позже, но непременно.

Виды Акаціи растущей на открытомъ воздухѣ, въ грунтѣ:

Caragana. Сибирская акація.

Altagana. Arborescens. Chamalaga. Frutescens. Glomerata. — Она же содержится и въ оранжерей.

Grandiflora. Microphylla. Mollis. Glabra. Pygmea. Pygmea pendula. Redowski. Spinosa.

Оранжерейные виды Акаціи: **A. armata.** Остистая Акація. Въ видахъ ранней выгонки берутъ растеніе, у котораго еще съ осени обозначились цвѣточные почки, ставятъ, вскорѣ послѣ Рождества, въ теплицу или свѣтлую комнату и оно почти черезъ шесть недѣль распуснется золотисто-желтыми цвѣтами. Во все время выгонки растеніе достаточно поли-

вается и часто опрыскивается. Растение пересаживается весной или в Июнѣ; размножается сѣменами или черенками; любит вересковую землю.

A. decurrens. Цвѣтетъ очень рано, даже в Февралѣ; даетъ камедь, замѣняющую Аравійскую и извѣстную подъ именемъ австралійской.

A. farnesiana. Американское растение. Пахучіе цвѣты его употребляются какъ чай и для приготовленія духовъ, плоды имѣютъ лекарственное—вяжущее свойство.

A. iulibrissin. Шелковая акація. Душистые цвѣты этого растения прибавляются въ чай.

A. horrida. Даетъ смолу в родѣ Сенегальскаго гумми.

A. Lesbek. Тоже.

A. melanoxydon. Даетъ красивую черную древесину. Отличается особою формою листьевъ: у основанія листь нераздѣльный, такъ называемый ложный листь, а продолженіе представляетъ собою листь обыкновенной акаціи—перистый.

A. acutian. A. acanthocarpa. A. alata. A. albicans. A. argirophylla. A. angustifolia. A. calamistrata. A. capensis. A. cavenia. A. coccinea. A. cultriformis. A. cuneata. A. cyanophylla. A. cyclopis. A. dealbata. A. dodoneifolia. A. decipiens. A. eburnea. A. falciformis. A. filicina. A. glandulosa. A. heterophylla. A. glauca. A. glaucescens. A. ixifolia. A. latifolia. A. leptaphylla. A. leucocephala. A. leiphylla. A. linearis. A. linifolia. A. plumosa. A. pulchella. A. rigens. A. robusta. A. salicina. A. sensitiva. A. speciosa. A. stricta. A. ulcina. A. verticillata. A. vestata.

Нижеслѣдующіе виды Акаціи отличаются весьма раннимъ цвѣтеніемъ: **Lophanta. Neumania. Paradoxa. Pubescens. Undulata** и **A. platyptera**, которая иногда цвѣтетъ всю осень и зиму.

9. Acalypha tricolor. Тепличное растение.

10. Acantholimon glumaceum. Изъ семейства **Plumbagineae**, съ розовыми цвѣтами. Требуется той же культуры, что и **Bryanthus erectus**.

11. Acanthophoenix. Родъ пальмъ, съ весьма колючимъ стволомъ, очень нѣжное растение средняго размѣра.

Виды: *A. rubra* Bory — молодые листья — красноватаго цвѣта.

A. crinita Bory — листья зелено-желтаго цвѣта.

12. *Acanthorhiza*. Родъ пальмъ съ воздушными корнями, твердѣющими и превращающимися въ иглы; не вырастаетъ выше 20 футъ; листь съ изнанки — бѣлый.

Виды: *A. Warscewiczii*. На Панамскомъ перешейкѣ известна подъ именемъ «*Palma de escolo*», т. е. метельчатая пальма, по употребленію ея листьевъ. *A. aculata*.

13. *Acanthus mollis*. Долголѣтнее, грунтовое растеніе, съ большими разрѣзными листьями; на стеблѣ почти аршинной длины расположены въ видѣ большаго колоса, цвѣты бѣлые съ коричневымъ. Землю для этого растенія готовятъ изъ дерновой, навозной и лиственной, поровну съ прибавкою небольшого количества песку. На зиму вносится въ оранжерею, гдѣ поливается очень умеренно. Можетъ содержаться въ комнатѣ, причѣмъ ставится у юговосточныхъ или югозападныхъ оконъ. Размножается сѣменами и дѣленіемъ корней.

Другіе виды: *A. montanus*. Оранжерейное растеніе. *A. spinosus*. Чрезвычайно красивые листья этого грунтоваго растенія, (зиму содержаго въ оранжереѣ), какъ говорятъ, послужили образцомъ изобрѣтателю капитали Коринфскаго ордена.

14. *Accidium*. *Снятъ*. Дикорастущее.

15. *Acer*. *Кленъ*. Дерево, дикорастущее въ нашихъ лѣсахъ, составляетъ семейство *Acerineae*. Разные виды клена разводятся въ садахъ и паркахъ, а нѣкоторые даже въ оранжереяхъ. Обыкновенно размножается сѣменами, но также отводками и даже черенками. Любитъ хорошую почву и тѣнистое мѣсто.

Виды: *A. opalum*. *К. итальянскій*, не выносить нашей зимы и содержится въ оранжереѣ.

A. obtusatum. *К. туполистный*.

A. austriacum. *К. австрійскій*. Кустарникъ.

A. nigrum. *К. черный*.

A. dosycarpum. *К. бѣлый американскій*. Весьма красивое, разводимое въ садахъ, дерево.

A. montanum. *К. горный*. Съ весьма маленькими цвѣтками.

A. Platanoides. *К. Чинаровидный*. Медоносное дерево, цвѣтетъ въ Маѣ.

A. eriocarpum. Два послѣдніе вида—самые красивые.

A. pseudoplatanum. *Яворъ. Бѣлый кленъ.*

A. p. fol. purpurea. Тоже, только пестро-листное, съ темно-пурпуровою изнанкою листьевъ.

A. rubrum. *К. красный.* Съ темно-пурпуровыми цвѣтами.

A. Saccharinum. *К. сахарный, американскій.* Замѣчательнѣйшая порода изъ растущихъ въ Сѣверной Америкѣ; отличается почти бѣлою корою; изъ сока его приготавливаютъ сахаръ. Любитъ плодородную и нѣсколько влажную почву и гористую мѣстность.

A. tartaricum. *Некленъ.* Медоносное дерево, цвѣтетъ въ Маѣ, маленькими красными цвѣтами.

A. tegmentosum. *Мокиафала.*

A. opulifolium. *Гіуръ-Алачъ. К. камнolistный.* Любитъ почву, состоящую изъ чернозема, песку и хряща; переноситъ сильныя морозы.

A. mono. *Булдуха.*

A. campestre. *К. полевой. Пакленокъ. Чернокленина.* Невысокое дерево.

A. ginallum. Японское дерево. Требуется на зиму надежной покрывки.

A. palmatum crispum. Тоже, съ мелкими листьями.

A. p. ornatum. Оттуда же кустарникъ съ ярко-буро-красными листьями.

A. palmatum polymorphum atropurpureum. Оттуда же оранжерейное дерево съ пурпуровыми, почти черными листьями; любитъ не влажное мѣсто и хорошую землю; размножается черенками или прививкою.

A. polymorphum foliis dissectis roseomarginatis. Оттуда же. Мелкій, чрезвычайно красивый листъ съ зеленымъ и розовымъ. Содержится въ оранжереѣ.

A. negundo. *К. бѣлолистный.*

A. n. fol. variegatis. *К. пестролистный.* Два послѣдніе вида требуютъ надежной покрывки на зиму.

A. laciniatum, съ разрывными листьями.

A. monspessulanum. *К. Монпельерскій.*

A. heterophyllum. *К. разнолистный,* съ постоянно зелеными листьями.

A. pensilvanicum. *К. полосатый.* Американское дерево, разводимое въ садахъ, гдѣ переносить морозы.

A. barbatum. *К. бородатый.*

16. **Aceras hircina romana.** *Орхидея,* отличается сильнымъ ростомъ, съ розово-пурпуровою нижнею губою.

17. **Achania malvaviscus.** *Аханія Мамвообразная.* Оранжевейное растеніе и вмѣстѣ комнатное, съ ярко-красными мало-видными цвѣтами; любитъ питательную, рыхлую землю, цвѣтеть почти всю зиму.

Другой видъ. **A. mollis.** *А. низкая.* Тоже.

18. **Achenium bipartibile dispermum.** *Анисъ.* Однолѣтнее, зонтичное растеніе, разводится на поляхъ и огородахъ для сѣменъ, имѣющихъ лекарственное свойство.

19. **Achillea millefolium.** *Гулявица тысячелистникъ.* Дикорастущее, имѣетъ лекарственныя свойства изъ семейства **Synanthreae.**

Другой видъ: **A. umbellata.** *Тысячелистникъ зонтичный.* Очень красивое растеніе, содержится въ оранжереѣ, на лѣто высаживается въ грунтъ; серебристые, мохнатыя листья и свѣтлосѣрые цвѣты. Дикорастущіе виды.

A. setacea. *Рябинка.*

A. nobilis. *Бѣлоглазникъ.*

A. millefolium flore rubro. *Кармозиновая гулявица. Кашка. Тысячелистникъ обыкновенный. Деревій.* Многолѣтнее растеніе, цвѣтеть въ Іюнь; медоносное и употребляется въ медицину какъ противу-геморроидальное и укрѣпляющее средство.

A. ptarmica fl. pleno. *Чихавецъ* произрастаетъ на влажныхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ, употребляется какъ средство противъ водобоязни.

A. alpina. Зимуетъ въ грунтѣ только при надежной покрывкѣ.

A. impatiens. *Ахилея Сибирская.*

A. tomentosa. *А. душистая.* Оба послѣдніе вида многолѣтніе.

A. aurea. *Душистая. Златоцвѣтная греча,* съ золотисто-желтыми цвѣтами, которые распускаются въ Іюль.

A. asplenifolia. *Душистая розовая греча,* съ золотисто-

красными цвѣтами, требуетъ солнечнаго мѣста. Два эти вида разводятся въ садахъ.

20. **Achimenes.** *Ахименесъ.* Американское, корневое, травянистое, многолѣтнее растеніе, съ пушистыми, темнозелеными, иногда впадающими въ коричневый цвѣтъ, иногда пестрыми листьями и цвѣтами разныхъ колеровъ.

Уходъ за этимъ растеніемъ очень простъ. Корешки Ахименесъ червячками, состоятъ каждый изъ множества чешуекъ. Чешуйки эти можно отдѣлить одна отъ другой, посадить ихъ и изъ каждой выйдетъ растеніе; но къ этому способу разведенія Ахименесъ не всегда прибѣгаютъ, обыкновенно же, весною, сажаютъ въ горшекъ нѣсколько корешковъ и когда они дадутъ ростъ, ихъ все лѣто сильно поливаютъ и держатъ въ теплицѣ или комнатѣ, причемъ ставятъ на югъ или юго-востокъ. Землю этому растенію даютъ вересковую пополамъ съ листовенною. Когда, осенью, ахименесъ начнетъ отцвѣтать, ему уменьшаютъ поливку, когда же зелень начнетъ вянуть, поливку вовсе прекращаютъ, совершенно увядшую зелень срѣзываютъ и растеніе ставятъ въ сухое мѣсто, даже въ комнатѣ и не поливаютъ всю зиму. Раннею весною опрокидываютъ горшекъ, вынимаютъ корешки и поступаютъ какъ выше значится, если хотятъ размножить растеніе; либо не вынимая растенія изъ горшка, начинаютъ его понемногу поливать, чтобы возбудить его къ росту. Поздніе сорта Ахименесъ цвѣтутъ иногда до Ноября; но если посадку Ахименесовыхъ корешковъ начать позже обыкновеннаго и послѣ посадки держать ихъ въ довольно холодномъ мѣстѣ, то они зацвѣтутъ позднею осенью и будутъ цвѣсть до Рождества, причемъ ихъ надлежитъ держать въ теплицѣ въ достаточной влажности, къ тому же такъ, чтобы ихъ нагрѣвало снизу.

Ахименесъ имѣетъ множество видовъ, происшедшихъ отъ сѣменъ; назовемъ нѣсколько лучшихъ:

A. argyrostigma. Мелкіе, бѣлые съ розовымъ цвѣты. Замѣчательны необыкновеннымъ изяществомъ листьевъ, испещренныхъ бѣлымъ и розовымъ.

A. Adèle de la Haute. Цвѣты ярко-амарантовые.

A. Ambroise Verschafelt. Цвѣты бѣлые съ лиловымъ.

A. Aurore. Цвѣты сизовые съ желтымъ.

A. Auber, radiata miniata. Цвѣтокъ малиновый съ темными полосами.

A. Alph. de Candole miniata zebra. Цвѣтокъ бѣловатый съ малиновымъ бордюромъ и такими же крапинками.

A. bleu. Цвѣтокъ совершенно синій.

A. Bayeldieu, radiata aureo alba. Цвѣтокъ розовый съ малиновыми жилками.

A. Carl Schule. Цвѣтокъ кармазино-лиловый.

A. Coccinea. Цвѣтокъ пурпуровый.

A. Cupreata. Съ маленькими пунцовыми цвѣтами и красноватымъ оттѣнкомъ весьма красивыхъ листьевъ.

A. Gloxiniflora. Бѣлые, большіе цвѣты, внутри оранжевые.

A. Dazzle. Цвѣтокъ пурпуровый.

A. Dr. Hopf. Цвѣтокъ бѣлый съ фіолетовою середкою.

A. Fimbriata violacea. Цвѣтокъ лиловато-розовый.

A. Humilis. Тоже.

A. Hirsuta. Съ испещренными цвѣтами.

A. Lady Claredon. Цвѣтокъ красновато-темно-фіолетовый.

A. Longiflora. Превосходный голубой цвѣтокъ.

A. Longiflora alba. Цвѣтокъ бѣлый.

A. l. candida — молочнаго цвѣта.

A. l. formosa. Цвѣтокъ свѣтлосиній.

A. l. rosea. Цвѣтокъ розово-лиловый.

A. ignescens. Съ большими ярко-розовыми цвѣтами.

A. Jean le Fevre diademata. Цвѣтокъ пестрый — розовый съ малиновымъ.

A. M-me Brunow. Цвѣтокъ красновато-лиловый.

A. M-me Haynoulle. Цвѣтокъ свѣтло-серизовый.

A. Mauve perfection. Цвѣтокъ синева-лиловый.

A. meteor. Цвѣтокъ пурпурово-серизовый.

A. miniata superba. Цвѣтокъ шарлаховый.

A. multiflora. Съ голубыми цвѣтами.

A. Scarlet—perfection. Тоже.

A. Scarlet picta. Съ желтыми цвѣтами, испещренными красными оттѣнками и полосками, листья на розовыхъ стебеляхъ, чрезвычайно красиво испещренные.

A. patens. Съ малиновыми цвѣтами.

A. ocellata. Цвѣты ярко-малиновые снаружи и желтые съ темными крапинами внутри.

- A. purpurea elegans.* Фиолетово-пурпуровый цвѣтокъ.
- A. pedunculata.* Испещренный цвѣтокъ.
- A. Rex lagello.* Цвѣтокъ колеру Маджента.
- A. rosea magnifica.* Цвѣтокъ серизовый.
- A. rosea superba.* Цвѣтокъ розовый.
- A. Semilasso.* Цвѣтокъ кармино пурпуровый.
- A. Vestalin.* Цвѣтокъ пурпурово-амарантовый.
- A. grandiflora flore pleno.* Съ большими карминными цвѣтами.
- A. Tubiflora.*

21. *Achras Sapota.* Тропическое растеніе. Кора его употребляется вмѣсто хинной подъ именемъ **Cortex Sapota**. Вкусные плоды его похожи на сливу. Съмена употребляются въ лекарство.

22. *Achyranthes Verschaffeltii.* Оранжевое и вмѣстѣ грунтовое растеніе съ кровавыми листьями; оно превосходно растетъ въ теплицѣ и можетъ существовать въ комнатѣ.

Другой видъ: *A. aureo reticulata.* Тоже съ листьями, покрытыми красными и желтыми, какъ бы мраморными разводами.

Два послѣдніе вида на лѣто могутъ быть высажены въ грунтъ, въ почву, богатую перегноемъ. До-сихъ-поръ это растеніе не цвѣло въ Европѣ.

23. *Achyrophorus maculatus.* *Прозанникъ. Молочай.* Дикорастущее.

24. *Acineta Humboldtii.* Тепличная орхидея; испещренные большіе цвѣты, коричневыя съ малиновымъ.

25. *Aconitum.* *Простръль. Лютикъ.* Изъ семейства **Ranunculaceae**. Долголѣтнее растеніе, зимующее въ грунтѣ.

Виды: *A. napellus.* *Голубой Лютикъ. Волній корень. Аконитъ аптечный.* Дикорастущее, многолѣтнее, ядовитое растеніе, съ большими голубыми цвѣтами; разводится какъ имѣющее лекарственныя свойства, но вредно пчеламъ. Любитъ сухое и тѣнистое мѣсто; цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ.

A. anthorum. *Вороній глазъ.*

A. excelsum. *Синеглазка.*

A. Lycoctonum. *Царь-трава.*

- A. Camarum.* Аконитъ алмѣйскій. Борецъ.
A. japonicum—цвѣты синіе съ бѣлымъ.
A. album—съ бѣлыми цвѣтами.
A. neomontanum. Аконитъ горный.
A. variegatum. *A. пестрый.*
A. exaltatum. *A. высокій.*
A. intermedium. *A. горный.*
A. ochroleucum. *A. сибирскій;* съ желтыми цвѣтами.
A. tauricum. *A. таврическій.*
A. delicatissimum. *A. gracile.* *A. Ottonianum.*
A. volubile. *A. vulparium.*

26. *Acorus calamus.* Гавіаръ. Аиръ. Касатикъ. Изъ семейства *Aroideæ*. Дикорастущее въ прудахъ и болотахъ, многолѣтнее растеніе, разводимое за цѣлебныя свойства его корневища, извѣстнаго подъ именемъ Ирнаго корня. Размножается осеннею посадкою кореньевъ.

27. *Acroclinium roseum.* Безсмертникъ. Изъ семейства *Compositae*. Однолѣтнее растеніе фута въ $1\frac{1}{2}$ вышины. Его розовые цвѣтки срѣзываютъ не вполне еще распустившимися, связываютъ въ небольшіе пучки и вѣшаютъ въ тѣни и сухомъ мѣстѣ, головками внизъ. Любитъ смѣсь вересковой земли съ луговою, но безъ примѣси перегноя. Требуется открытаго и солнечнаго мѣста въ цвѣтнікѣ.

Другой видъ: *A. album* — съ бѣлыми цвѣтами.

28. *Acrocomia.* Родъ пальмъ. Стволъ возвышается до 50 футовъ и усаженъ длинными колючками.

Виды: *A. vinnifera.* Винная пальма. Въ Никарагуѣ известна подъ именемъ «*Coyol*», доставляетъ туземцамъ превосходный напитокъ; растетъ на открытой мѣстности.

A. silerocarpa. Очень колючая пальма, употребляется при выдѣлкѣ мыла.

A. lasiospata.

29. *Ascorrepa.* Орхидея низкаго роста съ густыми пучками листьевъ; обыкновенно содержится въ теплицѣ, въ подвѣсной корзинѣ. Лучшій видъ этой Орхидеи — *A. Zoddigesii*.

Примѣчаніе. Въ своемъ отечествѣ Орхидеи живутъ въ теплой

и влажной мѣстности, покрывая стволы большихъ деревьевъ, эпифитами съ основанія до вершины или паразитами корни этихъ деревьевъ.

Условія содержанія этихъ растений въ теплицѣ должны, по возможности, ближе подходить къ условіямъ ихъ жизни на родинѣ. Теплица для орхидей должна быть очень теплая, съ весьма влажнымъ воздухомъ; ее рѣдко провѣтриваютъ; растенія помѣщаются на мхѣ, на глыбахъ торфа, на древесной корѣ или углѣ; въ рѣшетчатыхъ, подвѣсныхъ корзинахъ, которыя лучше всего дѣлать изъ пробковаго дерева. Къ вышеназваннымъ веществамъ Орхидея прикрѣпляется желѣзною проволокою и обвертывается торфянымъ мхомъ, чтобы ее можно было содержать въ надлежащей сырости.

Земныя Орхидеи воспитываются въ горшкахъ, въ смѣси лѣгкой дерновой земли съ листовою торфяною и вересковою, къ которой прибавляется рубленный мохъ.

Даже эпифитные виды могутъ содержаться въ горшкахъ, причемъ наблюдается, чтобы до половины горшка было насыпано битыхъ черепковъ, остальная же половина, до края, наполняется кусками торфа и древеснымъ углемъ, на которые и сажается растеніе, причемъ корни его прикрываются торфяникомъ, придавливаемымъ толстыми черепками.

Для эпифитовъ земля составляется изъ кусковъ торфа, изъ рубленнаго мха, кусочковъ древеснаго угля и изъ горшечныхъ черепковъ.

Въ началѣ развитія осторожно опрыскиваютъ растеніе, но затѣмъ Орхидеи держатъ въ сильной и постоянной влажности до осени, когда опрыскиваніе и поливка постепенно уменьшается и, наконецъ, ко времени покоя растенія—прекращается вовсе. Въ это время растеніе держать только такъ, чтобы оно не засохло и даютъ ему уменьшенную температуру, опуская ее до 12 и 15° тепла по Р.

Многіе виды Орхидей могутъ зимовать даже въ умѣренной теплицѣ, а потомъ еще лучше послѣ этого растутъ и цвѣтутъ.

30. *Actaea, spicata.* *Сорокоприточка. Воронежъ. Черный корень.*
Изъ Сем. *Raeoniaceae*. Дикоростущее, съ бѣлыми цвѣтами.

Другіе виды: *A. racemosa.* *Воронежъ кистеватый.* Красивое долголѣтнее растеніе съ бѣлыми цвѣтами, зимующее въ грунту безъ покрывки. На почву не прихотливо, размножается

дѣленіемъ корневища въ концѣ Сентября, или посѣвомъ.
A. palmata. A. podocarpa major.

31. Actinopteris palmata. Изъ семейства **Filices**. Миниатюрная пальмочка, содержится въ умѣренной теплицѣ.

32. Actinidia Kalomicta. Вьющійся оранжерейный кустарникъ, даетъ плоды, употребляемые въ пищу.

Другой видъ: **A. polygama.** Японское растеніе.

33. Adamia versicolor. Великолѣнное тепличное и вмѣстѣ комнатное растеніе, похоже на Гортензію, съ бѣлыми, переходящими въ фіолетовые и наконецъ въ голубые цвѣтами; распускается въ Октябрѣ и цвѣтетъ до Мая, если не погибнетъ отъ сырости и плѣсени.

Другой видъ: **A. cyanea.** Красивый, многолѣтній кустарникъ.

34. Adamsia scilloides. *Пушкинія.* Луковичное растеніе, съ синими цвѣтами; распускается раннею весною, а потому пригодно для ранней выгонки, въ оранжерей.

35. Adansonia. Изъ семейства **Malvaceae**. Оранжерейное, невысокое дерево съ весьма толстымъ стволомъ, окружность которого иногда превосходитъ высоту. Его длинныя вѣтви часто прикрываютъ собою пространство шаговъ пятьдесятъ въ поперечникѣ, хотя самый стволъ дерева не превышаетъ двухъ сажень. Боковые корни дерева стелются по землѣ и бываютъ аршинъ до 20 длиною. Листья рукообразные, пятерные; цвѣты бѣлые, висячіе на длинныхъ стебляхъ; размножается сѣменами и черенками; землю для Адансоніи составляютъ изъ лиственной пополамъ съ дерновою, прибавляя къ ней такое же количество песку; сосудъ этому дереву даютъ болѣе широкій, чѣмъ глубокій. Можетъ расти въ комнатѣ, гдѣ его ставятъ на югъ или юго-востокъ.

Видъ. **A. digitata.** *Баобабъ.* Съ большимъ, толстымъ стволомъ, покрытымъ свѣтлосѣрою корою, употребляемою на выдѣлку грубыхъ сортовъ бумаги; листья, формою и расположеніемъ напоминаютъ листья дикаго каштана; плодъ, употребляемый въ пищу, имѣетъ видъ большого зеленого яйца, съ множествомъ сѣмянъ.

36. Adelaster albivenis. Тепличное растеніе съ цѣпкимъ стеб-

лемъ, темно-оливковаго цвѣта и листьями, испещренными ярко-бѣлыми жилками.

37. Adenandra. Оранжевейное растеніе, распускается въ Декабрѣ, съ бѣлыми или блѣдно-розовыми цвѣтами.

38. Adenanthera pavonina. *Коралловое дерево.* Американское растеніе; красивыя, дланцевитыя сѣмена его употребляются какъ кораллы, а также идутъ въ пищу, будучи изжарены и приготовлены съ рисомъ.

Другой видъ, *A. fragrans.* Листья содержатъ эфирное масло и употребляются какъ чай.

39. Adenocarpus telonensis. Оранжевейное растеніе.

40. Adenophorus suaveolens. (foliola). Оранжевейное растеніе. Даетъ въ Мартѣ желтенькіе, мотылькообразныя цвѣточки, но если его, по образованіи бутоновъ, поставить въ теплицу, то оно зацвѣтетъ въ началѣ Февраля.

Другой видъ: *A. marsupiflora.* Многолѣтнее растеніе съ синими цвѣтами, зимуетъ въ грунтѣ, на открытомъ воздухѣ.

41. Adhadota cidoniætolia. Изъ семейства *Acanthaceæ.* Тепличное растеніе; цвѣты фіолетовые съ бѣлымъ. Размножается черенками.

42. Adiantum. *Кукушкинъ ленъ. Сухостебельникъ.* Тепличное Американское растеніе, изъ семейства папоротниковъ, получило свое названіе отъ слова *adanthos*—сухой.

Листья этого, очень красиваго растенія, ярко-зеленыя на черныхъ или бурыхъ доснящихся черенкахъ. Размножается дѣленіемъ корней и отростками. Землю для этого растенія составляютъ изъ части лиственной, части торфяной и двухъ частей вересковой. Зимой поливается мало. Хотя *Adiantum* обыкновенно содержится въ теплицѣ, но оно переноситъ комнатную культуру, будучи поставлено къ окнамъ, обращеннымъ на юговостокъ или на западъ; оно также хорошо зимуетъ въ оранжереѣ и весьма пригодно для терраріумовъ, такъ какъ сообразно природѣ своей, лучше всего растетъ въ камняхъ или въ искусственныхъ скалахъ.

Виды: *A. capillus Veneris.* *Венерины волосы.*

A. capillus Veneris admirabile. Вай его ниспадають дугою; листья трапециoidalной формы.

A. trapezeforme—съ такими же листьями.

A. tenerum. *Адиантумъ нижній.*

A. cuneatum—съ клиновидными листьями.

A. pubescens. *А. пушистый.* Растеніемъ этимъ хорошо украшать аквариумы и водоемы.

A. capillis Veneris daphnites. Низкорослая, разновидность, съ большими широкими, вогнутыми листочками.

A. farleyense. Весьма красивое растеніе съ черными, какъ смоля, листовыми черенками.

A. peruvianum. *A. Malhewsianum.* *A. polyphyllum.*
A. pedatum. *A. erectum.* *A. formosum.*

43. *Adonis aestivalis.* *Адонисъ. Горичникъ.* Изъ семейства *Ranunculaceae*. Однолѣтнее растеніе, не выше фута; листья перисторазсѣченные; цвѣтки огненно-красные, съ черною серединою; сѣется прямо въ грунтъ въ Апрѣль или Маѣ, выпускается въ Августѣ.

По мифологiи это растеніе произошло изъ крови Адониса, когда его ранилъ медвѣдь—намекъ на ярко-красные цвѣтки растенія.

Виды: *A. cyranianum.* Очень красивое однолѣтнее растеніе, изъ Сициліи, съ разсѣченными листьями и кроваво-красными цвѣтами.

A. vernalis. *Адонисъ весенній.* Долголѣтнее растеніе, зимующее въ грунтѣ, съ большими желтыми цвѣтами; подвергается ранней выгонкѣ и разцвѣтаетъ въ Февралѣ, если его содержать въ оранжереѣ и за годъ до выгонки высаживаютъ въ горшокъ съ глинистою землею.

A. apenina. *Стародубка,* Дикоростущее.

A. Wolgensis. Дикоростущее по берегамъ Волги.

44. *Adoxa moschatellina.* *Пижмачка. Куросатникъ.* Дикоростущее.

45. *Aechmea.* *Эхмея.* Травянистое, тепличное растеніе, изъ семейства Бромеліевыхъ *) съ ярко-красными цвѣтами; можетъ расти

*) *Примѣчаніе.* Семейство Бромеліевыхъ, большею частію принадлежитъ къ растеніямъ эпифитнымъ, т. е. прозябающимъ на дру-

въ комнатѣ; размножается отростками; требуетъ вересковую землю пополамъ съ листовною; послѣ того какъ отцвѣтетъ срѣзывается до самой земли.

Виды: *A. discolor*. Э. разноцвѣтная.

A. fulgens. Э. блистательная, съ большою кистью ярко-красныхъ цвѣтовъ съ лилово-синюю чашечкою.

A. Mariae Reginae—лучшій видъ, съ листьями, длиною до 18 дюймовъ, расположенными такъ, что представляютъ собою какъ бы вазу; изъ середины растенія подымается цвѣточный колосъ вышиною фута въ два, до половины покрытый большими ладьеобразными прицвѣтниками, превосходнаго ярко-розоваго цвѣта; самые цвѣты голубые, съ возрастомъ дѣлающіеся розовыми.

46. *Aegilops*. Бодлакъ. Дикорастущее.

47. *Aegiphila grandiflora*. Тепличный кустарникъ съ букетомъ желтыхъ цвѣтовъ; требуетъ самой умѣренной поливки и смѣшанной земли изъ лиственной, дерновой и вересково-песчанистой; размножается преимущественно сѣменами.

48. *Aegle seriaria*. Тропическое растеніе; кожица плодовъ его употребляется въ лекарство.

Другой видъ: *A. marmelosa*. Тропическое дерево, дающее вкусные плоды, кору и корни, употребляемые въ лекарство.

49. *Aegorodium podagraria*. Сныть. Купиръ болотный. Дикорастущее изъ семейства *Umbelliferae*.

Другой видъ: *A. p. fol. variegatis*. С. пестролистная.

50. *Aerides*. Воздушникъ. Орхидея эпифитнаго вида, живущая только тѣмъ, что ея листья поглощаютъ изъ атмосферы, по-

гихъ растеніяхъ. Ихъ содержать въ теплицахъ, въ сильномъ теплѣ и во время роста, въ таковой же влажности, прикрѣпляя растеніе желѣзною проволокою, на мхѣ, въ обрубкамъ старыхъ деревьевъ, на которыхъ они также хорошо цвѣтутъ, что и въ горшкахъ. При содержаніи въ горшкахъ этимъ растеніямъ дается легкая дерновая земля, смѣшанная съ значительнымъ количествомъ песку и кусками древеснаго угля; въ горшкѣ долженъ быть сдѣланъ хорошій дренажъ и самое растеніе посажено на нѣкоторое возвышеніе.

этому она может расти и даже цвѣсти, если ее повѣсить въ корзинѣ въ достаточно влажной теплицѣ. Орхидея эта имѣетъ душистые, бѣлые или лиловые цвѣты, часто испещренные малиновыми пятнами; размножается черенками, срѣзанными съ воздушными корнями; требуетъ листовенную землю, съ примѣсью половинной пропорціи вересковой.

Виды: *A. crispum*. *B. курчавый*. Цвѣты розовые съ малиновымъ.

A. odoratum. *B. пахучій*.

A. virens. *Э. зеленоватый*.

A. Wightianum. Желтые цвѣты, съ фіолетовою нижнею губою.

A. nobile. *B. благородный*. Замѣчателенъ красивыми, нѣжными цвѣтами съ сильнымъ запахомъ. Это растеніе сажаютъ въ горшекъ съ продѣланными въ стѣнахъ отверстіями, или въ корзину изъ пробки, въ чистый торфяникъ, съ примѣсью кусковъ угля и бѣлаго песку. Зимой растеніе это держатъ въ температурѣ отъ 12 до 14° Р., умеренно поливая и сберегая отъ капли. Съ февраля температуру повышаютъ до 25° Р., затѣняютъ отъ солнца и дѣлаютъ воздухъ, въ которомъ содержатъ растеніе, влажнымъ, опрыскивая дорожки и самое растеніе теплою водою.

A. brookei. Съ большимъ, весьма ароматичнымъ бѣло-снѣжнымъ цвѣткомъ, губа котораго слегка испещрена пурпуровымъ. Цвѣты имѣютъ свойство весьма долго сохранять свою свѣжесть, даже будучи сорваны. Сажается на кусокъ коры или на связку прутьевъ. Размножается отдѣленіемъ молодыхъ влюбней, когда у нихъ образуются хорошіе корни, причемъ послѣ посадки ихъ поливаютъ очень умеренно. (Вообще Орхидеи надлежитъ только обрызгивать).

51. *Aeschynanthus*. *Эшинантъ*. Изъ семейства *Cyrtandraceae*. Очень красивое, вьющееся, кустовое, тепличное растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ. Размножается черенками. Любитъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и листовенной; впрочемъ, требуетъ такого же ухода, какъ и семейство Бромеліевыхъ, такъ какъ въ своемъ отечествѣ живетъ паразитомъ на деревьяхъ. Хотя растеніе это и

вующееся, но если ему не давать за что цѣпляться, то оно лишается этой способности. Цвѣтетъ Ноябрь и Декабрь.

Виды: *A. grandiflorus*. Э. *крупноцвѣтный*.

A. javanicus. Цвѣты пунцовые, внутри желтые.

A. lobbianus. Цвѣты малиновые, въ темно-фіолетовомъ основаніи.

A. longiflorus. Э. *длинноцвѣтный*, съ большими ярко-пунцовыми цвѣтами.

A. miniatus. Э. *маленькій*. Цвѣты пунцовые съ желтымъ.

A. pulcher. Цвѣты пунцовые, тычинки желтыя. Подвергается нападению Кермеса и кошенили, а потому требуетъ частой очистки.

A. ramosissimus. Э. *отвѣстный*. Цвѣтетъ скорѣе другихъ видовъ.

A. tricolor. Э. *трехцвѣтный*. Цвѣты у основанія пурпуровые, въ серединѣ оранжевые.

A. cordifolius. Съ пунцовыми цвѣтами.

A. speciosus. Цвѣты оранжевые съ краснымъ.

A. acuminatus. *A. albus*. *A. fulgens* Horsfieldi. *A. Boschianus*. *A. parasiticus*.

52. *Aesculus*. *Дикій каштанъ*. *Желудникъ*. Изъ семейства *Hippocastaneae*. Чрезвычайно красивое дерево, какъ находящееся въ дикомъ состояніи, такъ и разводимое въ паркахъ и садахъ умереннаго климата. Размножается, преимущественно, сѣменами, но также отпрысками, черенками и даже отводками. Любитъ питательную, свѣжую и глубоко обработанную почву; не выноситъ болотистаго грунта.

Виды: *A. Hippocastanum*. *Конскій каштанъ*. Медоносное дерево, цвѣтетъ въ Апрѣлѣ и Маѣ; плоды его употребляются для леченія животныхъ, вслѣдствіе чего и получило свое названіе; кора служитъ лекарствомъ въ перемежающейся лихорадкѣ; имѣетъ цвѣты бѣлые или красноватые, испещренные красными пятнышками.

A. H. flore pleno, съ махровыми цвѣтами.

A. H. pumila, тоже; низкорослое дерево.

A. flava. *К. желтый*. Американскій каштанъ съ желтыми цвѣтами; размножается черенками и прививкою.

A. Pavia. К. красный. Тоже—съ красными цвѣтами; дерево красивое, но рѣдко дающее плодъ.

A. Californica, съ большими букетами цвѣтовъ.

A. pavia coccinea. Корень его заключаетъ въ себѣ *Сопонинъ*, употребляемый для стирки шерстяныхъ матерій; листья, вѣтви и плоды содержатъ наркотическій ядъ въ родѣ опиума.

A. rubicunda macrostachia. К. длинноколосный. Кустарникъ съ ароматическими цвѣтами, размножается черенками и дѣленіемъ корня.

A. hippocastanum spectabilis. A. discolor. A. Lyoni.

A. Marilandiae. A. neglecta. A. olioensis. A. pavia lutea.

A. p. nana. A. p. pallida. A. p. rubra. A. p. scarletina.

A. rubicunda. A. r. heterophylla.

53. **Aethusa. Synapium. Залевъ. Омежникъ. Зноиха.** Изъ семейства *Umbelliferae*. Ядовитое растеніе, весьма похожее на обыкновенную травянистую петрушку и часто вмѣстѣ съ нею встрѣчаемое на огородахъ. Узнается по противному запаху и по бѣлымъ цвѣтамъ (у настоящей петрушки цвѣты желтые).

54. **Afzelia. Афцеля.** Красивое, африканское дерево съ большими листьями и прекрасными цвѣтами—кистью. Тепличное растеніе, но можетъ содержаться въ комнатѣ, причемъ ставится на югъ и юго-востокъ. Размножается черенками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой.

Виды: **A. africana. A. discolor.**

55. **Agalmula staminea.** Изъ семейства Геснерій. Многолѣтнее японское растеніе; имѣетъ ползучій стебель и пучки превосходныхъ пунцовыхъ цвѣтовъ. Требуется той же культуры, что и *Aeschynanthus*.

56. **Agapanthus. Агапантъ. Милоцветъ.** Луковичное растеніе, съ длинными, кожеобразными листьями, съ синеваато-лиловыми, а иногда бѣлыми цвѣтами, въ видѣ зонтика, на стеблѣ длиною въ аршинъ. Размножается отдѣленіемъ отростковъ, идущихъ отъ корней. Любитъ смѣсь земли лиственной съ дерновой. Содержится въ оранжереѣ, но можетъ расти и въ комнатѣ, причемъ ставится къ югу или юго-востоку; зимою поливается очень мало.

Виды: *A. umbellatus*, съ зелеными гладкими листьями. Чтобы имѣть въ цвѣту это растеніе ежегодно, его не должно поливать всю зиму. Лѣтомъ его можно держать въ грунтѣ. Въ концѣ Сентября его вынимаютъ изъ горшка, или изъ грунта и ставятъ безъ горшка, стуломъ, въ мѣстѣ, защищенномъ отъ мороза. Въ началѣ Мая его вновь сажаютъ въ грунтъ или въ горшекъ.

A. variegatus. Листья гораздо уже чѣмъ у предыдущаго, съ бѣлыми по нимъ полосами.

A. latifolius. *A. minor*.

57. *Agatea spatulata*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ; фіолетовый цвѣтокъ, распускается въ Іюль.

58. *Agathaea amelloides*. Многолѣтнее, травянистое растеніе, съ синими цвѣтами; употребляется для ранней выгонки, съ этою цѣлью пересаживается въ горшекъ въ Августѣ или Сентябрѣ и ставится въ умѣренную оранжерею, гдѣ до 10° тепла; такимъ образомъ цвѣтетъ всю зиму.

59. *Agave*. *Агава*. *Столѣтникъ*. *Столѣтнее дерево*. *Бабучникъ*. Американское травянистое растеніе, съ большими, сочными, по преимуществу заостренными, листьями, достигающими 10 футъ длины и обсаженными колючими шипами. Цвѣты Агавы имѣютъ видъ пирамиды или зонтика, желтые, зеленоватые или бурые, сидящіе на стеблѣ, достигающемъ нѣсколькихъ аршинъ. Цвѣтокъ имѣетъ сильный непріятный запахъ, распускается въ оранжереѣ, но весьма рѣдко, а именно, разъ въ 20 или 30 лѣтъ, и то, когда растеніе достигнетъ 60—70-ти-лѣтняго возраста. Размножается сѣменами и отростками; земля ему дается пополамъ листовая съ дерновою.

Виды: *A. geminiflora*. (Прежде называлась *Bonapartea juncea*), имѣетъ дугообразные листья, тонкіе какъ тростникъ.

A. Celsiana albida. Весьма красивое, большое растеніе съ толстыми, широкими и сочными листьями, съ иглами на краяхъ.

A. coehleata. Низкорослая.

A. dealbata compacta. Красивое растеніе съ узкими, сизыми листьями, похожими на листья *Юкки*.

A. imbriata, съ продолговатымъ листомъ, имѣющимъ на концѣ крѣпкую, загнутую, бурую иглу, а по краямъ такія же бурыя, мелкія и неравныя иглы.

A. miraderensis, съ сизыми листьями и твердою, конечною иглою на каждомъ.

A. sinesii, съ бурыми, загнутыми крючкомъ, иглами по краямъ.

A. Verschaffeltii variegata, низкорослое, съ золотистою полосою, доходящею до середины каждого листа.

A. bulbosa, орнаментальное растеніе, основаніе его имѣетъ форму луковичы.

A. americana. Изъ сока его сердцевинны приготовляютъ вино; цвѣточные стебли и листья содержатъ волокно, извѣстное подъ именемъ «Манильской пеньки».

Тоже употребленіе имѣютъ: **A. mexicana** и **A. Milleri**.

Декоративныя виды: **A. picta**. **A. Regeli Hort.** **A. densiflora**. **A. pugioniformis**. **A. striata**. **A. dasyliroides**. **A. filamentosa**. **A. xylinacantha**. **A. ixioides**. Тепличное растеніе, неимѣющее стебля; на концахъ зеленыхъ листьевъ имѣетъ коричневыя, мелкія иглы, даетъ цвѣточный стержень, вышиною до 12 футъ, на которомъ вырастаетъ метелка желто-зеленыхъ цвѣтовъ.

A. folia marginata. **A. applanata**. **A. coerulescentia**. **A. coccinea**. **A. filifera**. **A. heteracantha**. **A. schidigera**. **A. xalapensis**. **A. vivipera**.

60. Ageratum conyzoides. Однолѣтнее растеніе въ видѣ куста, футовъ 2½ вышины, съ мелкими, лазуревыми цвѣтками. Высѣвается въ парникъ, потомъ разсаживается въ горшки и снова ставится въ парникъ, затѣмъ, когда совершенно окрѣпнетъ, высаживается въ грунтъ, или оставляется цвѣсти въ горшкахъ. Любитъ открытое, солнечное мѣсто въ цвѣтникахъ и рыхлую, сильную, садовую землю.

A. coelestinum, съ желтовато-пестрыми листьями и синими цвѣтами. Обыкновенно цвѣтетъ осенью, но чтобы оно цвѣло до самаго Рождества, у него вырѣзываютъ являющіяся до Августа почки, вторично пересаживаютъ въ тучную землю и въ Октябрѣ ставятъ въ умѣренную теплицу или комнату.

A. album, съ бѣлыми цвѣтами, содержится въ грунту и въ оранжереѣ.

A. coeruleum, съ синими цвѣтами.

A. nanum. A. nanum album.

61. *Aglaonema commutatum*. Красивая, тепличная Орхидея, любитъ рыхлую, листовную землю или же торфяную съ глинистою. Размножается черенками.

62. *Agnostus integrifolius* и *A. sinuatus*. Оранжерейное растение.

63. *Agonisia pulchella*. Орхидея съ бѣлыми цвѣтами, размножается корневыми отпрысками.

64. *Agrimonia Eupatoria*. Рѣпникъ обыкновенный. Рѣпейникъ. Изъ сем. *Rosaceae*. Многолѣтнее, грунтовое растение, съ желтыми цвѣтами, въ длинныхъ колосьяхъ, имѣетъ лекарственныя свойства.

Другіе виды: *A. repens. A. odorata. A. suaveolens.*

65. *Agrostemma coronia*. Садовая вътреница. Куколь въичная бѣлая. Изъ семейства *sileneae*. Дикорастущее, медоносное, двухлѣтнее растение, съ махровыми или простыми, розовыми или бѣлыми цвѣтами, похожими на гвоздику. Цвететъ прямо въ грунту, цвѣтеть въ Іюнь и Августъ.

Другіе виды: *A. fl. rubro*. Многолѣтнее, грунтовое, садовое растение съ красными цвѣтами.

A. coelirosa. Однолѣтнее, бордюрное садовое растение, съ свѣтло-красными цвѣтами; высѣвается прямо въ грунту, цвѣтеть въ Іюнь.

66. *Agrostis pulchella*. Полевица. Низенькій, однолѣтній злакъ.

67. *Ailanthus glandulosa*. Темноцвѣтникъ Китайскій. Ясень Китайскій. Я. Японскій. Весьма красивое дерево, достигающее 3 сажень вышины, съ многочисленными желтыми цвѣтами. Любитъ легкую почву. Размножается сѣменами и корневыми отпрысками. Зимой побѣги его и даже стволъ вымерзаютъ. Требуется защищеннаго положенія и весьма надежной покрывки на зиму, причемъ корни его обкладываются толстымъ слоемъ сухаго листа. Листья Темноцвѣтника употребляются на кормъ особаго рода шелкоичнаго червя.

68. *Aira pulchella*. Однолѣтній, маленькій, низкорослый злакъ. Послѣ всхода его высаживаютъ по 5 по 10 растеньицъ въ одномъ пучкѣ, въ рыхлую песчанистую землю.

Другіе виды: *A. capillaris*. Южно-американское растеніе:

A. Suraniana. Растетъ въ Сициліи. Два послѣднія растенія требуютъ той же культуры, что и предыдущее, ихъ, когда разро-стутся въ горшкѣ, сажаютъ бордюромъ вокругъ клумбъ или оста-вляютъ въ горшкахъ.

A. coerulea fol. variegata. Употребляется для бордюра, монгольтнее растеніе, зимующее въ грунтѣ; листья полосатые; зеленые съ бѣлымъ.

69. *Ajuga reptans*. *Залсъ*. Изъ сем. *Labiatae*. Долголѣтнее садовое растеніе, зимующее въ грунтѣ. *A. reptans* *foe va-riegatis*. Тоже.

Другіе виды; *A. chamaeptytis*. *Шакунца*. *Богородичное зелье*. Дикорастущее. *A. reptans*. *Вологодка*. *Живучая трава*. Дико-ростущее, съ синими цвѣтами.

70. *Akebia quinata*. Изъ семейства *Lardizabale*. Грунтовоe рас-теніе, съ темно-фіолетовыми цвѣтами; зимою содержится въ оран-жереѣ.

71. *Albizzia rosea*. Дерево, зимою теряющее листь, бываетъ покрыто малиновыми цвѣтами.

72. *Albica Ecklonii*. Оранжерейное растеніе.

73. *Alcaea chinensis*. *Рожь*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе разводится посѣвомъ прямо въ грунтъ; цвѣтетъ все лѣто.

74. *Alchemilla montana*. *A. alpina*. *Приворотъ горный*. Изъ семейства *Sanguisarbeeae*. Многолѣтнее, зимующее въ грунтѣ, растеніе съ пестрыми листьями и желтовато-зелеными цвѣтами. Другой видъ. *A. vulgaris*. *Роснька простая*. *Манжетка обы-кновенная*. Дикоростущее, многолѣтнее, медоносное растеніе, съ желтоватыми цвѣточками, открытыми съ Мая по Августъ.

75. *Alectryon excelsum*. Изъ сем. *Sapindaceae* большое дере-во, растущее только въ Новой Зеландіи. Шаровидныя сѣмена этого растенія даютъ масло, употребляемое туземцами въ пи-щу и для натиранія своего тѣла.

76. *Aletris capensis*. (*Veitheimia viridiflora*.) Оранжевое растение.

77. *Alisma plantago*. Шилникъ. Чистуха. Водяной подорожникъ. Изъ семейства *Alismaceae*. Дикоростущее, многолѣтнее, ядовитое для людей и скота растение.

Другой видъ; *A. grandiflorum*. Глубоко растущее, болотное растение съ сердцевидными листьями и бѣлыми цвѣтами. Помѣщается въ акваріѣ, не слишкомъ глубоко подъ водою; размножается сѣменами, которыя высѣваются въ горшечъ, погруженный въ воду, такъ, чтобы онъ былъ ею покрытъ.

78. *Allamanda*. Изъ сем. *Aprocynae*. Вьющееся, чрезвычайно красивое, кустарное тепличное растение, съ крупными, желтыми цвѣтами; распускается зимою. Для полученія хорошихъ экземпляровъ, необходимо часто прищипывать это растение. Требуется питательную землю и если можно, согрѣваемую снизу. Размножается черенками, отводками и корнями.

Виды *A. periiifolia*, съ желтыми цвѣтами *A. chelsoni*—тоже.

A. nobilis съ большими желтыми цвѣтами.

A. Aubletii. Изъ Бразиліи, кора и листья употребляются какъ слабительное.

A. cathartica. *A. grandiflora*.

A. verticillata. *A. salicifolia*.

A. Sechottii.

79. *Allium саера*. Лукъ рынчатый. Изъ семейства *Liliaceae*; однолѣтнее и двухлѣтнее растение, получившее свое названіе отъ Кельтскаго слова „all“ жгучій, имѣетъ много видовъ: бываетъ круглый, плоскій, грушеобразный; по цвѣту раздѣляется на бѣлый, желтый, красный и фіолетовый.

У насъ, въ продажѣ, имѣются сѣмена: голландскаго твердаго желтаго, краснаго, свѣтло-краснаго, бѣлаго, Испанскаго желтаго большаго, тоже краснаго и бѣлаго, Испанскаго Мадерскаго, грушеобразнаго желтаго и желтаго Джемсъ.

Всѣмъ извѣстно употребленіе этого овоща, какъ въ сыромъ, такъ и разнообразными способами приготовленномъ видѣ, преимущественно въ качествѣ приправъ къ другимъ съѣдобнымъ предметамъ.

Лукъ требуетъ сильной сухой почвы, удобренной года за два до его разведенія, теплаго, доступнаго солнцу мѣста. Онъ разводится сѣменами и посадкою сѣянцевъ. При разведеніи посѣвомъ поступають слѣдующимъ образомъ: въ Маѣ, сѣмена, за трое сутокъ передъ посѣвомъ, мочать, обращиваютъ и высѣвають прямо на гряды, землю прилапываютъ, сильно поливаютъ и прикрываютъ тонкимъ слоемъ перегноя, толщиною въ $1\frac{1}{2}$ вершка. Всходы разрѣжаютъ, оставляя ихъ въ разстояніи $\frac{1}{2}$ вершка другъ отъ друга; грядамъ не даютъ заростать сорными травами. Если лѣто стоитъ сырое, въ Іюлѣ, перья лука пригибають къ землѣ. Въ Августѣ лукъ вынимають, оставляють на недѣлю на грядѣ и когда онъ обвянетъ, обрѣзають у него перья, а луковицы мелкимъ слоемъ разсыпають на солнцѣ, чтобы просохли; затѣмъ его кладутъ поближе къ печкѣ или на полати, въ комнату.

Отъ сѣменъ въ первый же годъ получаютъ сѣянцы, которые садятся во 2-й годъ подъ названіемъ саженцевъ. Сажаютъ ихъ въ Маѣ, на четверть другъ отъ друга, чтобы сдѣлать крупнѣе вырастающій изъ этихъ саженцевъ рѣпчатый лукъ, въ началѣ Августа его перья пригибають къ землѣ, чтобы открыть луковицу дѣйствію солнечныхъ лучей и съ тѣмъ вмѣстѣ нѣсколько задержать обращеніе сока въ растеніи. Въ концѣ Августа лукъ убирають, также какъ выше сказано.

Другіе виды: *A. ascalonicum*. *Шарлотъ*. *Ивановъ лукъ*. *Мелкій сѣянецъ*. Многолѣтнее растеніе, любитъ легкую песчанистую, безъ свѣжаго удобренія, землю и солнечное мѣсто. Размножается весеннею посадкою луковокъ, причемъ ихъ только слегка покрываютъ землею, а то они гніють. Поливать шарлотъ почти не нужно. Въ сырое лѣто, спасая его отъ гніенія отгребаютъ землю отъ луковокъ.

Когда перья его начнутъ вянуть, въ концѣ лѣта, то Шарлотъ вынимають и просушиваютъ на воздухѣ. Зимой сохраняется въ сухомъ, но не очень холодномъ мѣстѣ.

A. fistulosum. *Каменный лукъ*. *Стреловидникъ*. *Бутунъ*. *Трубчатый лукъ*. Многолѣтнее, неприхотливое, на почву, растеніе. Можетъ зимовать въ грунтѣ при самыхъ сильныхъ морозахъ. Молодая, зелень его употребляется въ пищу въ сыромъ видѣ, съ цвѣтка его пчелы берутъ обильный взятокъ. Разводится

сѣменами весною и дѣленіемъ корней осенью. Луковицы употребляются въ пищу не ранѣе втораго года.

A. schorodoprasum. *Скорода. Шнитъ-лукъ.* Многолѣтнее растеніе, любитъ легкую, плодородную почву и тѣнистую мѣстность; самое лучшее для его удобренія—сажа. Молодая зелень употребляется въ пищу все лѣто, и чѣмъ чаще срѣзывается, тѣмъ быстрѣе растетъ; но только отнюдь не слѣдуетъ срѣзывать его въ ненастье. Размножается дѣленіемъ луковицъ. Подвергается ранней выгонкѣ, для чего сажаютъ его въ ящики и ставятъ въ тепло. Глубокою осенью или въ концѣ Февраля сажаютъ въ парникъ. Если оставляютъ зимовать въ грунту, то покрываютъ слоемъ перепрѣвшаго овечьего навоза.

A. porrum. *Лукъ порей.* Двухлѣтнее растеніе. Въ Мартѣ Порей сѣется въ парникъ моченымъ и обращеннымъ въ теченіи трехъ сутокъ сѣменемъ; затѣмъ сильно поливается. Рассаду, по прекращеніи морозовъ, когда она достигнетъ толщины гусянаго пера, рассаживаютъ на глубоко обработанной, тучной, свѣжеудобренной, нѣсколько влажной землѣ, рядами въ разстояніи четверти другъ отъ друга, предварительно нѣсколько укоротивъ какъ перья, такъ и корни. Порей тщательно опалывается и сильно поливается. Сѣмена его сохраняютъ свою силу три года. Лѣтній порей или продолговатый собирается съ наступленіемъ морозовъ и на зиму сажается, въ подвалъ, въ песокъ; что же касается до широколиственнаго или зимняго, то его оставляютъ на грядкахъ до весны. Въ продажѣ извѣстны: Порей большой лѣтній и зимній, Порей Исполинскій брабантскій.

A. porrum regenne. *Многолѣтній Лукъ Порей.* Перья и луковицы его употребляются какъ приправа въ кушанье, а маленькія луковицы маринуются. Размножается посадкою луковокъ въ Сентябрѣ.

A. proliferum. *Перловый лукъ.* Разновидность Порей, отъ котораго и образуется, если обрѣзать цвѣточный стебель при его появленіи, причемъ корень принесетъ маленькія луковицы перловаго цвѣта. Луковицы сажаются осенью и употребляются на слѣдующій годъ.

A. sativum. *Чеснокъ.* Любитъ песчанистую сухую почву на тепломъ мѣстѣ. Сажается весною луковицами или зубками (дѣтками). Зубки сажаются въ 3-хъ верхнихъ другъ отъ друга, на глубину пальца, такъ, чтобы зубокъ сидѣлъ пяткою (коре-

печною частью) внизъ, а остріемъ—вверхъ. Чеснокъ тщательно опалывается и земля вокругъ его разрыхляется. При продолжительной сырой погодѣ, землю отъ луковокъ отгребаютъ, предохраняя ихъ отъ гнилости. Чтобы чеснокъ давалъ больше зубковъ, перья его, на вышинѣ 4-хъ вершковъ, обминаются или связываются въ пучки. Осенью вынимаютъ луковицы и сохраняютъ въ сухомъ, прохладномъ мѣстѣ.

A. ursinum. *Медвѣжьій чеснокъ. Черемша.* Луковичное растеніе, съ красивыми, бѣлыми цвѣтами, имѣющими непріятный чесночный запахъ и съ широкими листьями, похожими на листь ландыша. Растетъ въ дикомъ состояніи; подвергается выгонкѣ въ оранжереѣ, при умѣренной теплотѣ, будучи посаженъ штукъ по десяти въ одинъ большой горшокъ.

Другія разновидности Медвѣжьяго чеснока:

A. molle, съ желтыми цвѣтами.

A. azureum, съ синими цвѣтами.

A. fragrans. A. liliiflorum. A. roseum. A. luteum.

Allium scorodoprasum. *Рокамболь. Испанскій чеснокъ.* Многолѣтнее растеніе, разводится какъ чеснокъ; употребляется въ приправу къ кушаньямъ, крупнѣе обыкновеннаго чеснока и лучше его вкусомъ.

Въ Августѣ, когда пожелтѣютъ листья Рокамболя, его вынимаютъ и просушиваютъ на вѣтру, затѣмъ когда онъ обсохнетъ, его сохраняютъ въ пучкахъ, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы онъ не замерзъ.

A. cocculeum. Разводится въ цвѣтникахъ, для его голубаго, крупнаго цвѣтка. Зимуетъ въ грунтѣ при защитѣ отъ излишней сырости. Размножается сѣменами и отдѣленіемъ луковокъ.

A. tenuissimum. A. angulosum. *Мышій чеснокъ.* Дикоростущее.

A. rotundum. *Змѣиный лукъ.* Дикоростущее, медоносное растеніе, цвѣтетъ съ Іюня.

Другіе дикоростущіе виды лука:

A. acutangulum. *Майтръ.*

A. galanthum. *Сарауссакъ.*

A. guttatum. *Стрѣлка.*

A. nutans. *Лизунъ.*

A. paniculatum. *Скорода.*

A. sinescens. Слизунъ.

A. odorum. Степной чеснокъ.

80. *Alloplectus.* Травянистое растеніе, изъ семейства Геснеріе-ныхъ, съ заостренными, пушистыми листьями, нижняя сторона которыхъ бываетъ лиловая или съ красными жилками. Очень красивые цвѣты—желтые съ краснымъ или розовымъ, огненно-красные, желтые или мѣдянистаго цвѣта. Размножается черен-ками. Требуется земля, составленную на половину, изъ листовен-ной съ торфяною; помѣщается во влажной теплицѣ, впрочемъ выдерживаетъ комнатную культуру, будучи поставлено на югъ или юговостокъ.

Виды: *A. Schbimii.* Листья, съ изнанки, пурпуровые; — цвѣты—красные.

A. capitatus. Лучшій видъ. На малиновомъ стеблѣ, огром-ный букетъ малиновыхъ съ желтымъ цвѣтовъ.

A. chrysanthus, съ пестрыми листьями.

A. speciosus—Тоже.

A. dychrous. Крупные цвѣты желтые съ фіолетовымъ, си-дять у самого стебля, нѣсколько похожи на цвѣты бальзамина.

A. repens, съ желтыми цвѣтами.

A. congestus. A. cupreatus. A. vittatus.

81. *Alnus.* Ольха. Изъ семейства *Betulaceæ.* Дерево, растущее въ лѣсу. Разводится для украшенія сырыхъ мѣстъ въ паркахъ и садахъ. Обыкновенно Ольха держится по берегамъ водъ, любитъ сильную почву съ влажною подпочвою. Въ садахъ, на болотистомъ мѣстѣ, ее сажаютъ на искусственномъ возвышеніи. Размножается посѣвомъ, причемъ сѣмена покрываются землею, толщиною линіи въ двѣ.

Виды: *A. glutinosa.* Черная Ольха. Оলেখ. Олешнякъ. Клей-ная ольха. Тупые листья съ обоихъ сторонъ, зеленые. Кора употребляется на дубленіе и крашеніе въ бурый и черный цвѣтъ; съ цвѣтовъ, распускающихся въ Апрѣлѣ, пчелы берутъ взятки.

Разновидности ея: *A. g. laciniata (glutinosa imperialis asplenifolia),* съ распушенными, продолговатыми листьями; *A. g. quercifolia,* съ листьями, нѣсколько похожими на ду-бовые; *A. g. denticulata,* съ зубчатыми листьями, растетъ въ Южной Европѣ.

A. incana. *О. бѣлая. О. каменная. Ерникъ Ольховый*, съ остроконечными листьями; размножается сѣменами, употребленіе тоже, что и черной ольхи; отличается отъ ней гладкою, бѣловато-сѣрою корою.

A. pubescens. *Мяквоволосая Оляха.* Нижніе листья тупые, верхніе—остроконечные. Рѣдко разводится въ садахъ.

A. viridis. *Зеленая Оляха.* Листья овальные, съ обоихъ сторонъ зеленые. Красивый кустарникъ. Разновидность его:

A. Sibirica. (*Alnaster fruticans. A. viridis. A. tristis*). Растетъ преимущественно въ Сибири.

A. Serrulata. (*A. americana. Betula rugosa. A. rugosa*). *Оляха—оршникъ. О. американская. О. зубчатая.* Съ двузубыми, съ обоихъ сторонъ зелеными листьями.

A. Cordifolia. Изъ Южной Европы. Не выносить нашей зимы.

A. maritima. Кустарникъ изъ Японіи. Только небольшіе экземпляры выносятъ нашу зиму и то при тщательной покрывкѣ.

A. undulata. *О. волонистая.* Американское дерево; листья, стебельки и жилки съ исподу покрыты волокнами.

82. Alocasia. Тепличное растеніе, изъ семейства ароидеиныхъ, требуетъ того же ухода, что и другія растенія того же вида, но ихъ должно держать въ весьма сухомъ мѣстѣ и поливать мало во время же роста нуждается во влажной атмосферѣ. Въ Мартѣ высаживается въ легкую землю смѣшанную съ сильнымъ перегноемъ; Виды: **A. metallica**, съ очень красивою зеленою; верхняя сторона листа бронзоваго, металлическаго цвѣта, нижняя—темнопурпуровая, глянцовитая.

A. Lowii—листья бронзоваго цвѣта, съ желтыми жилками, нижняя сторона листьевъ красно-бурая, глянцовитая.

A. macrorhizon.

A. Macrorhiza fol. variegatis, листья пестрые, зеленые съ бѣлымъ.

A. Veitchii, жилки на листьяхъ ярко-бѣлаго цвѣта.

A. Marschallii, съ широкою, сребристою полоскою на каждомъ листѣ.

A. Jeningsii. Листъ большой, великолѣпный, свѣтло-зеленый, въ тѣнь, листъ, съ черными пятнами.

A. zebrina. Стволъ стебли и листья пестрые, — бѣлые съ зеленымъ.

A. cuprea—съ пестрыми листьями; изъ Вестъ-Индіи.

A. albo violacea. **A. Baraquinii.**

- 83. Aloe arborescens.** *Алой.* Изъ семейства **Liliaceae**. Название растенія произошло отъ арабскаго слова **Alloch**. Африканское, травянистое и кустарное растеніе, съ заостренными, согнутыми, толстыми листьями, большею частію имѣющими шипы съ боковъ. Пирамидальные цвѣты этого растенія на тонкихъ стебляхъ бываютъ желтые, красные, оранжевые и бѣлые. Требуется земля, составленную пополамъ изъ дерновой и лиственной, съ прибавкою восьмой части песку. Зимой держится въ теплицѣ, въ тѣни, почти безъ поливки. Въ комнатѣ хорошо выдерживаетъ зиму, будучи поставлено на окно, обращенное на югъ или югозападъ. Размножается отростками и черенками. Имѣетъ множество видовъ. Вообще, зеленый слизистый сокъ этого растенія горекъ, и будучи высушенъ, получаетъ бурый цвѣтъ; имѣетъ врачебныя свойства.

Назовемъ нѣкоторые виды:

A. fruticola. Съ красными цвѣтами вверху растенія.

A. zingva catis. **A. arachnoides.** **A. ciliaris.** **A. brevifolia.** **A. humilis.** **A. margaritifera.** **A. mitraeformis.** **A. paniculata.** **A. perfoliata.** **A. retusa.** **A. spicata.**

Изъ слѣдующихъ видовъ добывается сокъ, извѣстный въ торговлѣ подъ именемъ «Сабура»; **A. arborescens.** **A. sucotrina.** **A. plicatilis.**

Слѣдующіе виды признаются красивѣйшими: **A. caesia.** **A. ferox.** **A. picta.** **A. variegata.** **A. grandidentata.** **A. maculata.** **A. pulchra.** **A. saponaria.** **A. xantacantha.** **A. verrucosa.**

- 84. Alona Caelestis.** Тепличное растеніе съ превосходнымъ голубымъ цвѣткомъ, похожимъ на цвѣтокъ конvolvюлюса или петуніи. Размножается довольно трудно, посредствомъ отдѣленія самыхъ молодыхъ побѣговъ и посадкою ихъ въ бѣлый песокъ, причемъ содержатъ ихъ въ умѣренной влажности, подъ стекляннымъ колпакомъ, который надлежитъ непременно два

раза въ день на-сухо вытирать внутри. Требуешь много воздуха и свѣта, чтобы достигнуть надлежащаго развитія.

85. *Alonzoa Warschewiczii*. Разводится какъ однолѣтнее растеніе, но можетъ существовать нѣсколько лѣтъ. Имѣетъ развѣтвленный стебель въ 1 или 2 фута, причемъ на концѣ каждаго развѣтвленія вырастаетъ кисть большихъ, красныхъ цвѣтовъ. Сѣется въ началѣ Марта въ горшки или парники; на почву не прихотливо; любитъ солнечное мѣсто; цвѣтетъ круглое лѣто и въ грунту, и въ горшкахъ.

Другіе виды: *A. grandiflora*. Однолѣтнее растеніе; если воспитывается въ оранжереѣ, то цвѣтетъ всю зиму.

A. incisifolia, съ ярко-оранжево-шарлаховыми цвѣтами. На зиму помѣщается въ холодной оранжереѣ; въ Январѣ ставятъ въ теплицу и тѣ молодые побѣги, которые при этомъ появятся употребляются для размноженія растенія. Въ этихъ видахъ побѣги сажаютъ въ песокъ и ставятъ въ закрытое мѣсто. Когда растеніе примется, его пересаживаютъ въ слегка унавоженную дерновую землю и потомъ пересаживаютъ въ парникъ, гдѣ прищипываютъ, чтобы кустилось. Въ концѣ Мая высаживаютъ въ грунтъ и умѣренно поливаютъ.

86. *Alopecurus*. *Стальная трава*.

Битлачикъ. Дикоростущее.

Другіе дикоростущіе виды: *A. geniculatus*. *Аржонецъ*.

A. pratensis. *Луговой пырей*.

87. *Aloysia citriodora*. Американское растеніе съ листьями, имѣющими лимонный запахъ; содержится въ оранжереѣ; употребляется въ лекарство.

88. *Alphelandra squarrosa* var. *Citrina*. Изъ семейства *Acanthaceæ*. Тепличное растеніе съ желтыми цвѣтами и листьями, красиво испещренными бѣлымъ. Требуешь влажнаго воздуха; размножается черенками.

89. *Alpinia*. Корневое, травянистое растеніе. Стебель его достигаетъ высоты сажени, съ большими лоснящимися, ароматическими листьями. Цвѣты въ видѣ кисти — бѣлые съ желтымъ, розовымъ или краснымъ. Размножается отростками и раздѣленіемъ корней. Земля для него составляется изъ равныхъ

частей хорошо перепрѣлой лиственной и торфяной. Выращивается на парахъ въ корѣ. Содержится въ теплицѣ, но растетъ и въ комнатахъ, не требуя особенно много свѣту, хотя впрочемъ въ комнатѣ никогда не цвѣтетъ.

Виды: *A. nutans*. *A. rose*. *A. mutica*. *A. calcarata*.

90. *Alsophilla*. Древесные папоротники этого рода, преимущественно принадлежать къ породамъ, содержимымъ въ умеренныхъ теплицахъ, а ниже названные отлично идутъ и въ оранжереѣ.

A. contaminata.

A. australis. Изъ Новой Голландіи.

A. excelsa, съ высокимъ стеблемъ.

A. landsbergii. Изъ Колумбіи.

A. schiedeana. Изъ Мексики.

91. *Alstonia scholaris*. Тропическое растеніе. Кора употребляется какъ желудочное средство.

92. *Alstroemeria aurea*. Изъ семейства *Amaryllideae*. Оранжерейное растеніе, но вслѣдствіе большихъ корней его, лучше растетъ въ грунту, при этомъ требуя самой надежной pokrышки на зиму. Даетъ большіе, красивые цвѣты, бѣлые съ желтымъ, желтые съ оранжевымъ, краснымъ или розовымъ.

Другіе виды: *A. erembaultii*, съ букетомъ розовыхъ, испещренныхъ малиновыми точками цвѣтовъ.

A. argenteo vittata. Листья съ серебристою полоскою.

A. jacquesiana. Большіе розовые цвѣты въ видѣ колокольчиковъ, темно-розовыхъ снаружи, зеленыхъ съ бѣлымъ внутри.

A. plantaginea. Цвѣты желтые съ черными крапинками внутри, оранжевые снаружи.

A. peruviana. Цвѣты зеленые съ бѣлымъ и желтоватымъ, малиновые съ бѣлымъ, оранжевые съ малиновымъ и всѣ испещрены черными точками и крапинками. Все лѣто ихъ держать на открытомъ воздухѣ и солнцепекѣ, не вынимая изъ горшка.

A. chilensis. *A. ligata*. *A. pelegriana*. *A. psitchacina*.

A. tricolor. Цвѣты бѣлые, съ малиновыми и черными точками.

93. *Alternanthera amoena*. Тепличное растеніе.

Другіе виды: *A. amabilis*. *A. a. latifolia*. *A. spatulata*.

94. *Althaea rosea*. *Просвирникъ. Шотландская мальва. Проскурнякъ. Штокъ-роза.* Изъ семейства **Malvaceae**. Многолѣтнее дикоростущее, лекарственное и медоносное растеніе. Цвѣтетъ съ Іюля бѣлыми, розовыми, красными, фіолетовыми и почти черными цвѣтами. Если посѣяно очень рано, иногда цвѣтетъ въ тотъ же годъ. Обыкновенно сѣется въ Маѣ и когда взойдетъ—высаживается въ грунтъ. Осенью, или покрывается листомъ, или высаживается въ горшекъ и зимуетъ въ простѣнѣхъ.

Другіе виды: *A. frutex*. *Рожь.* Цвѣты красные, красно-фіолетовые или бѣлые; простые или махровые; разводится въ грунтъ; цвѣтетъ въ Августѣ и Сентябрѣ.

A. chinensis. Двухлѣтнее растеніе, высѣвается на гряды и зимуетъ на открытомъ воздухѣ; цвѣты бываютъ разныхъ колеровъ.

A. officinalis. *Врачебный проскурнякъ.* Дикоростущее, многолѣтнее, лекарственное растеніе, разводимое на влажныхъ и открытыхъ мѣстахъ.

A. cannabina. *Проскурнякъ коноплянолистный.* Требуется покрывки на зиму.

A. ficifolia. *П. смоковницелистный.* Тоже.

95. *Alyssum maritimum*. *Бурачекъ морской.* Изъ семейства **Cruciferae**. Однолѣтнее, бордюрное, южно-европейское растеніе съ бѣлыми или желтыми цвѣтами—кистью. Высѣвается въ Апрѣлѣ.

Другіе виды: *A. incanum*. (*Berteroa incana*).

A. saxatile. *Золотая корзинка.* Многолѣтнее, грунтовое, бордюрное, садовое растеніе съ желтыми цвѣтами. Употребляется для ранней выгонки (преимущественно низкорослое: *A. saxatile compactum*), причемъ въ холодной оранжереѣ цвѣтетъ въ Мартѣ, а въ болѣе теплой—въ Февралѣ.

A. Bentharii. Однолѣтнее цвѣточное растеніе, высѣваемое прямо въ грунтъ.

96. *Amaraboysa amabilis*. Тепличный кустарникъ съ весьма красивыми цвѣтами.

Другіе виды: *A. princeps* — съ блѣдно-розовыми цвѣтами.

A. splendida. съ большими гладкими, кожистыми листьями и красивыми ярко-карминовыми цвѣтами.

97. **Amaranthus caudatus.** Гребенная трава. Бархатникъ. Пылушій гребешокъ. Изъ семейства **Amaranthaceæ.** Однолѣтнее, травянистое растеніе, достигающее 4-хъ футовъ, съ красивыми бѣлыми, розовыми или красными цвѣтами, въ видѣ хвоста, долго не увядающими, будучи сорваны. Земля для него составляется изъ одной части песку, двухъ частей дерновой и двухъ частей навозной земли. Растеніе грунтовое, но держится и въ комнатѣ, будучи поставлено на югъ или юго-востокъ.

Другіе виды: **A. paniculatus.** Ширецъ. Красная трава. Выпиною болѣе 4-хъ футовъ; цвѣтокъ расположенъ прямо.

Разновидности его: **A. sanguineus.** **A. speciosus** и **A. monstrosus.** **A. tricolor.** Трехцвѣтный амарантъ. Выпиною до 1½ фута, съ пестрыми, свѣтло-зелеными, крово-красными и желтыми листьями; цвѣты зеленые, мало видны изъ за листьевъ. Цвѣтегъ въ грунтъ съ Іюня по Сентябрь.

A. caudatus. Грунтовое растеніе.

A. tricolor giganteus. Оба послѣдніе вида предварительно высѣваются въ горшки или парники и пересаживаются въ грунтъ въ концѣ Мая.

A. melancolicus ruber. Однолѣтнее растеніе съ темно-красными листьями; при частой подрѣзкѣ образуетъ густой кустъ. Сѣется въ Мартѣ въ горшки, ставится въ парники и по всходѣ разсаживается въ небольшіе горшки, приучая его къ воздуху до пересадки въ грунтъ.

A. bicolor. Темно-красный цвѣтокъ, высѣвается предварительно въ парникъ.

A. salicifolius. Прелестный однолѣтній цвѣтокъ, представляющій собою какъ бы оранжево-пунцовый фонтанъ. Распускается осенью.

A. oleraceus. Китайскій шпинатъ. Однолѣтнее растеніе. Листья употребляются въ пищу какъ шпинатъ, ухаживая за нимъ самый обыкновенный.

97. **Amaryllis.** Амариллисъ. Семейство **Amaryllideæ.** Луковичное растеніе съ длинными, заостренными листьями, получило

свое названіе въ память одной изъ нимфъ, воспѣтыхъ Виргиліемъ.

Цвѣточный стебель этого растенія достигаетъ аршина вышины и имѣетъ на верху отъ одного до шести превосходныхъ бѣлыхъ, розовыхъ, алыхъ, малиновыхъ или полосатыхъ цвѣтовъ. Размножается сѣменами и отростками луковицъ; землю требуетъ листовенную, пополамъ съ дерновою; зимою почти вовсе не поливается. При содержаніи на воздухѣ высаживается въ грунтъ весною и пока не укоренился его держать довольно сыро. Когда отцвѣтетъ и листья его пожелтѣютъ, рано осенью, выкапываютъ луковицу и сохраняютъ зимою въ теплой, сухой комнатѣ, при 5—10° тепла.

Виды: *A. belladonna*. Листья вырастаютъ гораздо позже цвѣтовъ, обыкновенно душистыхъ, розовыхъ; можетъ зимовать въ грунтѣ, при надежной крышѣ. Его сокомъ отравляютъ стрѣлы.

A. reginae. *Амариллис пышный, мексиканскій*. Съ пунцовыми цвѣтами.

A. longiflora. Съ темно-красными цвѣтами.

A. belladonna rubra, съ красными цвѣтами.

A. pardina. (*Hippeastrum*). *A. леопардовый*. Цвѣтокъ оранжевый или пунцовый, испещренный темными крапинками. Вывезенъ изъ Перу. Воспитывается въ теплой комнатѣ или въ оранжереѣ. На зиму луковица оставляется въ горшкѣ безъ поливки и ставится въ сухое и темное мѣсто. Пересаживаютъ во время совершеннаго покоя. Поливается тогда только, когда появятся листки на малыхъ луковицахъ и цвѣточные ножки на большихъ.

A. Sprekelia formosissima, съ темно-краснымъ цвѣткомъ.

A. procera. Луковица, имѣетъ форму бутылки; цвѣтокъ блѣдно-пурпуровый.

A. vittata. Тепличное растеніе.

A. reticulata var. striatifolia. Съ большими розовыми цвѣтами, испещренными черными полосками. Тепличное растеніе.

A. cybister. Тепличное растеніе, съ большими малиновыми, съ зелеными кончиками и такими же тычинками и пестиками — цвѣтами.

A. solandraeflora. Большой свѣтло-желтый цвѣтокъ, съ красными полосками.

A. sarniensis, съ малиновыми цвѣтами.

A. hybrida Heddewigii. *A. reddebura*. Колоссальный пурпуровый цвѣтокъ съ бѣлыми полосками въ глубинѣ зѣва. Виды Амариллиса хорошо идущіе въ комнатѣ: *A. alexandrina*. *A. aulica*. *A. Johansonii*. *A. psitaccina*.

Тегерь предлагаетъ слѣдующіе способы ухода за Амариллисами.

A. formosissima. Покупаемыя луковицы безъ корней и листьевъ, кладутъ въ Декабрѣ къ печкѣ или къ борову и держатъ тамъ, пока не появятся съ боковъ луковичной шейки почки въ видѣ красныхъ остроконечій; затѣмъ луковица сажается въ четырехъ-дюймовый горшокъ, въ рыхлую, питательную землю, поливается и ставится въ теплицу, комнату или парникъ, гдѣ и распускается черезъ двѣ недѣли. Во время цвѣтенія Амариллисъ обильно поливается, чтобъ дать листья. Въ концѣ Мая отцвѣтшія луковицы высаживаются на солнечное мѣсто, въ садъ или въ пустой парникъ, такъ, чтобы наружу оставалась только шейка луковицы, тогда какъ во время нахождения луковицы въ горшкѣ, половина ея должна оставаться подъ землею.

Въ комнатѣ этотъ родъ Амариллиса выводится слѣдующимъ образомъ: Когда растеніе отцвѣтетъ, луковицу оставляютъ въ горшкѣ до весны, тогда ее начинаютъ обильно поливать и она цвѣтетъ, но при достаточномъ только количествѣ свѣжаго воздуха. Когда луковица отцвѣтетъ и зелень начнетъ сохнуть, Амариллисъ ставятъ въ сухое и прохладное мѣсто, изрѣдка поливаютъ, до Декабря предохраняютъ отъ мороза, землю въ парникѣ на нѣсколько дюймовъ сверху замѣняютъ свѣжею, питательною землею и переносятъ, наконецъ, въ тепло, гдѣ Амариллисъ и зацвѣтетъ. Такъ поступаютъ съ Амариллисомъ нѣсколько лѣтъ сряду, наконецъ, когда луковица истощится, ее сажаютъ въ грунтъ. Чтобъ *A. formosissima* заставить цвѣсть въ Октябрѣ и Ноябрѣ, отламываютъ только-что показавшіяся весною почки, въ Августѣ горшки наполняютъ свѣжею землею и ставятъ въ теплый парникъ.

A. hippeastrum. Отлично цвѣтетъ зимою. Лѣтомъ луко-

вицу сажаютъ на грядѣ или въ парникъ; держатъ до глубокой осени, даютъ увянуть и пересаживаютъ въ горшки.

Другой способъ: прямо сажаютъ въ горшекъ и не поливаютъ, пока луковица сама собою не пойдетъ въ ростъ, тогда ее ставятъ въ теплицу, градусовъ при 8-ми тепла, или погружаютъ горшекъ въ мохъ, песокъ или кору, гдѣ влажность сохраняется даже безъ поливки, которую тогда только начинаютъ, когда кончики цвѣточныхъ стеблей покажутся съ боку цвѣточной шейки. Амариллисъ распустится въ Январѣ или Февралѣ.

Основное правило: чтобъ луковица образовала хорошіе корни, безъ этого она не зацвѣтетъ.

Вообще когда Амариллисъ отцвѣтетъ, надо стараться, чтобъ онъ далъ хорошіе листья,—это дѣлаетъ его способнымъ цвѣсти въ слѣдующіе годы. Съ этою цѣлью его обильно поливаютъ даже жидкимъ удобреніемъ, и даютъ много свѣта и воздуха. Въ Маѣ горшки съ Амариллисами ставятъ или въ холодную оранжерею, въ комнату или просто — подъ крышу, въ защиту отъ дождя, солнца и сквознаго вѣтра. Сначала растеніе поливаютъ часто, но когда листья его начнутъ желтѣть на кончикахъ, поливку уменьшаютъ и, наконецъ, прекративъ вовсе, держатъ растеніе до высадки въ прохладномъ мѣстѣ.

Надлежитъ принять за правило: при посадкѣ Амариллисовъ, корни ихъ расправляютъ палочкою, отнюдь ихъ не повреждая; страхнуть приставшую къ нимъ землю; отнять испорченные и гнилые корешки; снять верхнія пленки луковицы и зубки, пригодные для размноженія растенія, посредствомъ посадки ихъ въ маленькіе горшки и, не обрѣзая здоровыхъ корней, посадить въ горшки, которые должны быть достаточно глубоки; порѣзы засыпаются угольнымъ порошкомъ; при посадкѣ наблюдается, чтобъ двѣ трети луковицы были подъ землею.

98. *Amberboa odorata*. Однолѣтнее растеніе съ прямыми стеблями, достигающими полутора фута вышины. Бываетъ съ цвѣтами бѣлыми, красными и желтыми. Цвѣтетъ въ Іюлѣ. Высѣвается въ парникъ и потомъ разсаживается въ грунтъ или

въ болѣе умѣренныхъ климатахъ, прямо сѣется въ грунтъ. Любитъ солнцепекъ и рыхлую, садовую, сильную землю.

Другой видъ: *A. moscata* (*Centaurea moscata*). *Блолистникъ*.

99. *Ambrosia*. Однолѣтнее растеніе, не заслуживающее разведенія, хотя названіе его и произошло отъ названія *пищи боговъ*.

100. *Amblyolepis*. Однолѣтнее растеніе, не заслуживающее разведенія.

101. *Amelanchier Botryarum*. Американскій кустарникъ съ съѣдобными ягодами.

102. *Amellus annuus*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

103. *Amethystea*. Однолѣтнее растеніе не заслуживающее разведенія. Цвѣтокъ аметистоваго цвѣта.

104. *Amherstia nobilis*. Изъ семейства *Leguminosæ*. Прекрасное дерево съ большими листьями, похожими на листья ясени и съ весьма большими, висячими кистями алыхъ съ желтымъ цвѣтовъ, требующее весьма большаго ухода даже въ теплицѣ, въ комнатѣ же растетъ съ трудомъ, причѣмъ ставится на юго-востокъ. Размножается черенками и сѣменами, требуетъ очень питательной земли, составленной изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Сосуду, въ которомъ сидитъ растеніе, необходимо дать хорошій дренажъ и предохранять растеніе отъ прямыхъ лучей солнца.

105. *Ammobium alatum*. Однолѣтній, бѣлый сухоцвѣтъ, можетъ расти на совершенно песчаномъ грунтѣ—свойство, отъ котораго растеніе и получило свое названіе. Высѣвается предвѣрительно въ парникъ.

106. *Ammotum*. *Ормузъ*. Многолѣтнее травянистое растеніе съ сочными листьями, растетъ въ Америкѣ.

Виды: *A. cardamomum*. Сѣмена его извѣстны въ торговлѣ подъ именемъ «Круглаго Кардамона», употребляются какъ пряность.

A. granum paradisi. Растетъ въ Гвинее. Изъ сѣменъ его дѣлаютъ перецъ «Малигу Этта», а также употребляются,

какъ и смена предыдущаго вида, для выдѣлки спиртныхъ напитковъ въ Африкѣ.

107. *Amorpha fruticosa*. *Крутикъ кустарный*. Кустарникъ, служащій для украшенія садовъ и парниковъ; на зиму покрывается также какъ и слѣдующіе другіе виды его.

A. glabra. *К. гладкій*. *A. Lewisii*. *К. Левизовъ*. *A. pubescens*. *К. пушистый*. *A. nana*. *К. низкій*. *A. pendula*. съ ниспадающими вѣтвями.

108. *Amorphophallus*. Одно изъ самыхъ странныхъ и оригинальныхъ растений, изъ семейства *Aroideae*. Растетъ съ необычайною быстротою. Въ Маѣ выходитъ изъ земли длинный стволъ, испещренный какъ тигровая кожа и образуетъ на вершинѣ своей цвѣтокъ, похожій на цвѣтокъ Калліи Эфіопики, но только коричневый и испещренный. Когда означенный стволъ и цвѣтокъ увянутъ, изъ земли подымается новый, зеленый но также испещренный стебель, на вершинѣ котораго раскидывается группа огромныхъ листьевъ, въ видѣ пальмы. Недѣли черезъ двѣ листь этотъ совершенно увянетъ. Во время цвѣтенія требуетъ сильной поливки и много свѣта, причемъ содержится въ умѣренной оранжереѣ. Когда образуется листь поливка уменьшается и затѣмъ совершенно прекращается. Въ Октябрѣ корень надо вынуть изъ земли очистить отъ гнилыхъ корешковъ, обмыть, положить въ чистый, сыроватый песокъ и держать въ тепломъ, темномъ мѣстѣ, доступномъ воздуху. Время отъ времени корень осматривается и кладется въ новый песокъ, тоже сыроватый. Въ Январѣ или Февралѣ, корень сажается въ тучную землю съ пескомъ, на толстый слой битыхъ черенковъ. Размножается отдѣленіемъ молодыхъ отростковъ.

Виды: *A. leonensis*. Цвѣтокъ имѣетъ видъ яйца, до половины обернутаго салфеткою.

A. Rivieri. Цвѣтокъ весьма похожъ на цвѣтокъ Калліи Эфіопики, внутри пестрый, коричневый, снаружи пестрый, зеленноватый, стержень также коричневый, образуя листь, высоко подымается надъ цвѣткомъ.

A. campanulatus. Изъ корня выходитъ розово-пестрый стержень, который развертывается въ видѣ двухъ большихъ розовыхъ листовъ, а изъ середины ихъ подымается толстый,

испещренный малиновыми жилками, цвѣточный стебель съ цвѣткомъ на немъ въ видѣ темно-малиновой яйцеобразной головы.

109. *Ampelopsis quinquefolia*. (*A. hederacea*). *Дикій виноградъ*. Изъ семейства *Sarmentaceæ*—Лозовыя. Вьющійся кустарникъ, употребляемый для украшенія садовъ и парковъ; на зиму требуетъ надежной покрывки.

110. *Ampherephis*. Однолѣтнее растеніе, незаслуживающее разведенія.

111. *Amphicome emodi*. Изъ семейства *Bignoniaceæ*. Оранжевое растеніе, съ розовыми цвѣтами, похожими на цвѣтокъ Ипомеи. На лѣто высаживается въ грунтъ.

112. *Amsinckia Spectabilis*. Однолѣтнее растеніе, привезенное къ намъ изъ Калифорніи. Некрасивые, золотисто-желтые цвѣты.

113. *Amsonia latifolia*. Многолѣтнее садовое растеніе, зимующее въ грунтѣ, при надежной покрывкѣ.

Другой видъ: *A. agustifolia*, съ свѣтло-синими цвѣтами.

114. *Amygdallus*. *Миндаль*. Изъ семейства *Rosaceæ*.

Виды его: *A. Communis*. *Обыкновенный миндальникъ*. Дерево съ цвѣтами бѣлыми съ розовымъ оттѣнкомъ; растетъ въ тепломъ климатѣ на сухой почвѣ, размножается сѣменами. Плоды употребляются въ пищу въ сыромъ видѣ и для выдѣлки эфирнаго масла и водокъ.

Виды: *A. alba*. Кустарникъ съ бѣлыми цвѣтами.

A. nana. Кустарникъ съ красными или розовыми цвѣтами и ягодами, называемыми Сибирскимъ миндалемъ.

A. pumila plena. *Калмыцкій орешникъ*. Дикоростущее въ теплыхъ мѣстностяхъ.

A. pumila alba pleno. Тоже, съ бѣлыми махровыми цвѣтами. Два эти вида на зиму покрываются сухимъ листомъ, соломой и рогожами.

A. persica flore pleno. *Персиковое дерево*. Оранжевое дерево, превосходные плоды его употребляются въ пищу какъ десертный фруктъ.

A. pedunculata. *Бобовникъ*. Съ розовыми цвѣтами, кустарникъ дикоростущій въ степяхъ.

A. Sibirica. *A. Georgica*. *A. campestris*.

115. *Amygdalopsis Lindleyi*. Садовый кустарникъ или деревцо, съ большими полумахровыми, ярко-розовыми цвѣтами. Употребляется для ранней выгонки. Съ этою цѣлю, съ образовавшимися уже почками, ставится въ Декабрѣ въ теплицу, при чемъ разцвѣтеть въ Январѣ; немедленно послѣ того какъ распускаются первые цвѣты, растеніе опять ставится въ оранжерею. Размножается прививкою къ штамбу сливы или терна, выведеннаго изъ сѣменъ.
116. *Amyris balsamifera*. *Розовое дерево*. Индійское растеніе, употребляется для куреній, изъ него добывается пахучее масло, а изъ смолы его—бальзамъ.
117. *Anacardium*. *Птицесердъ*. Дерево, свойственное южной Америкѣ и Восточной Индіи, вышиною до 15 футовъ, съ бѣлыми цвѣтами; ядро растущихъ на немъ орѣховъ употребляется въ пищу.
118. *Anacharis alsinastrum*. (*Elodea canadensis*). Замѣчательное водяное растеніе, съ длинными, сильно развѣвленными стеблями, вырастающими необыкновенно быстро и достигающими сажени на поверхности почвы. Быстрый ростъ этого растенія и то, что оно остается зеленымъ весь годъ, причемъ его стебли образуютъ на днѣ воднаго вмѣстилища, въ которое оно будетъ посажено, густой дернъ, дѣлаетъ его весьма пригоднымъ для акварія, (въ который оно сажается въ грунтъ), тѣмъ болѣе что оно не требуетъ никакого ухода.
119. *Anaectochilus*. Тепличная Орхидея, при тщательномъ уходѣ можетъ расти въ комнатѣ, причемъ лѣтомъ ставится на востокъ или западъ, а зимою на юговостокъ. Маленькое, очень красивое, весьма нѣжное растеніе, съ овальными, заостренными листьями,—бархатистыми, съ радужнымъ отливомъ, испещренными бѣлыми и желтыми жилками. Цвѣты бѣлые или розовые. Уходъ за этимъ растеніемъ очень затруднителенъ. Оно любитъ тѣнь и влажность. Горшокъ съ Анактохилосомъ ставятъ въ другой, болѣе просторный, наполненный мхомъ и покрываютъ стекляннымъ колпакомъ, который ежедневно, на-сухо, вытирается внутри. Землю требуетъ, составленную пополамъ изъ торфяной и вересковой съ примѣсью $\frac{1}{4}$ мелкоизрѣзаннаго мха.

Виды: *A. Setaceus*. (щетиnistый). *A. Lobbianus*. *A. inornatus*. *A. pubescens*—(пушистый).

120. *Anacyclus*. Однолѣтнее растеніе, высѣваемое прямо въ грунтъ, съ цвѣтами желтыми съ бѣлымъ—не заслуживаетъ разведенія.

121. *Anagallis*. *Очный цвѣтъ*. *Куросльпъ*. *Воробьиное просо*. Изъ семейства *Primulaceae*. Нѣкоторые виды этого растенія однолѣтніе, другіе многолѣтніе; нѣкоторые виды грунтовые, другіе—оранжерейные. Имѣетъ мелкіе листья и алые и голубые цвѣты—звѣздой. Сѣется въ Мартѣ и Апрѣлѣ, на землѣ, составленной пополамъ изъ дерновой и навозной, съ примѣсью четвертой части песку. Можетъ расти въ комнатѣ будучи поставлено на югъ или юговостокъ.

Неизвѣстно: на какомъ основаніи этому растенію приписываютъ свойство уничтожать грустное настроеніе духа, вслѣдствіе чего оно и получило свое названіе, происходящее отъ слова: *anagelao*—смѣяться. Виды однолѣтняго Анагаллиса:

A. latifolia. Съ синими цвѣтами. Предварительно высѣвается въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ.

A. collina. Съ лежащими вѣтвями, съ синими, красными или темно-голубыми цвѣтами. Высѣвается въ началѣ Марта, въ умѣренной теплицѣ, въ плоски, въ глинистую землѣ; будучи заблаговременно пересажено и выставлено на воздухъ—цвѣтетъ все лѣто.

A. philopsii—съ темно-голубыми цвѣтами.

A. arvensis. *Курычьи очи*. *Куриная слѣпота*. Дикоростущее, медоносное растеніе, цвѣтетъ съ Іюня по Сентябрь, свѣтло-синими цвѣтами.

A. annuus. *A. grandiflora*.

A. g. carnea. *A. g. lilacina*. Многолѣтній видъ: *A. fruticosa*. Съ красными цвѣтами. Будучи посажено весной въ грунтъ—цвѣтетъ превосходно.

Оранжерейные виды: *A. collina grandiflora*. *A. coerulesa grandiflora*. *A. Queen Victoria*.

122. *Anagallis foetida*. Оранжерейное растеніе.

123. *Anastatica Hierochuntica*. *Иерихонскій розанъ*. Растетъ въ пустыняхъ Палестины, Египта и Аравіи. Чрезвычайно оригинальное, однолѣтнее растеніе: его изсушаетъ знойное солнце,

вѣтеръ уноситъ въ морѣ, и тамъ, въ соприкосновеніи съ водою, оно умягчается, распускается, сѣмена въ немъ заключающіеся выпадаютъ, море ихъ выбрасываетъ на берегъ и вѣтеръ ихъ опять уноситъ въ пустыню, гдѣ отъ нихъ и идутъ новыя растенія. Розаномъ это растеніе названо по сходству всего его съ названнымъ цвѣткомъ: его расходящіяся во всѣ стороны вѣтви, засыхая, свертываются въ клубокъ, похожій на розанъ. Уходъ за этимъ растеніемъ очень затруднителенъ; оно высѣвается въ песчанистую землю, въ оранжереѣ и съ самаго начала развитія требуетъ солнечнаго освѣщенія и теплаго воздуха.

124. *Anchusa officinalis*. *Воловикъ аптечный. Вологладка. Вологій языкъ*. Изъ семейства *Asperifolieæ*. Дикоростущее, медоносное, однолѣтнее растеніе, зацвѣтаетъ въ Маѣ. Цвѣты сначала лилово-фіолетовые, потомъ дѣлаются синими.

Другіе виды: *A. Agardhii*. *Вологій языкъ. Агардовъ*.

A. latifolia. *В. я. широколистный*. Оба вида — многолѣтнія, садовыя грунтова растенія.

125. *Anda Gomezi*. Большое тропическое дерево, съ млечнымъ сокомъ. Сѣмена его и добываемое изъ него масло — идутъ въ лекарство.

126. *Andromeda*. *Тундрица. Безплодный кустъ*. Дикоростущій кустарникъ или полукустарникъ. Содержится въ оранжереѣ, гдѣ цвѣтетъ зимою. Любитъ торфяную землю. Растенія этого существуетъ до 35 видовъ, вотъ нѣкоторые:

A. polifolia. *Болотникъ гладколистный. Пьяная трава*. Съ алыми цвѣтами, употребляемыми для окраски шелковыхъ матерій въ черную краску.

A. colyculata. A. buxifolia.

127. *Andropogon Ischæum*. *Бородачъ*. Дикоростущее, съ пучкомъ волосковъ на цвѣткѣ, похожимъ на человѣческую бороду, отчего и получило названіе (*aner* — человѣкъ; *podon* — борода).

Другіе виды: *A. formosum*. Декоративное растеніе, съ большими изогнутыми листьями; зимуетъ въ теплицѣ; размножается сѣменами, черенками и дѣленіемъ корней.

A. Sorghum. *Проссо*.

A. Saccharatus. *Сорго сахарное*.

A. citratus. Тепличное, лекарственное растеніе.

128. Androsace septentrionalis. *Рызуха. Проломникъ.* Изъ семейства **Primulaceae.** Дикоростущее.

Другой видъ: **A. carnea eximia.** Низенькое, многолѣтнее растеніе съ розово-пурпуровыми цвѣтами.

129. Andryala varia. (A. cheirantifolia). Однолѣтнее растеніе съ желтыми цвѣтами; стебли и листья его красиво покрыты бѣлымъ пушкомъ; сѣется въ горшки въ парникъ и потомъ высаживается въ грунтъ.

130. Anemone. Анемонъ. Изъ семейства **Ranunculaceae.** Многолѣтнее садовое растеніе, съ шишкообразными корнями, подвергается ранней выгонкѣ въ оранжереѣ или комнатѣ. Съ этою цѣлю, въ Августѣ, крѣпкія здоровыя шишки этого растенія, мочутъ въ водѣ, въ теченіи нѣсколькихъ часовъ и потомъ сажаютъ, по 3 и 4 штуки, въ 6-ти-дюймовой горшечкѣ, въ смѣсь равныхъ частей листовой, вересковой земли и глины или въ смѣсь таковой же пропорціи вересковой, дерновой земли, съ пескомъ. Шишки покрываются землею на полдюдма. Пока не разовьются листья, производится умѣренная поливка; въ теплую погоду горшки покрываютъ мхомъ, для поддержанія въ нихъ влажности; съ приближеніемъ морозовъ растеніе сберегается въ парникѣ и съ началомъ морозовъ вносится въ оранжерею или комнату. Анемонъ зацвѣтаетъ въ Декабрѣ или Январѣ и держится въ тѣни, чтобы лучше цвѣлъ.

Чтобы имѣть Анемоны въ грунтѣ цвѣтника: раннею весною, на приготовленную грядку изъ означенной выше земли, въ Ноябрь или Октябрѣ, сажаютъ Анемоны и покрываютъ парниковыми ящиками, а съ наступленіемъ морозовъ, растеніе хорошо покрываютъ рогожами, сухимъ листомъ, соломой и навозомъ; весною покрышку эту снимаютъ и кладутъ надъ растеніями парниковыя рамы. Анемоны распускаются въ Мартѣ или Апрѣлѣ. Впрочемъ нѣкоторые виды Анемоновъ зимуютъ въ грунтѣ, разумѣется при хорошей покрывкѣ, но безъ искусственной выгонки цвѣтутъ гораздо позднѣе.

Анемоны имѣютъ много видовъ и разностей, исчислимъ нѣкоторые:

A. hortensis. Цвѣтетъ почти круглый годъ, съ большими шарлаховыми, махровыми цвѣтами.

A. coronaria. *A. вѣнечный или садовый.*

A. coronaria chinensis semperflores.

A. pavonia. *Внутренница.* Съ большими махровыми, карминовыми цвѣтами. Названные виды могутъ цвѣсти въ горшкахъ почти безпрестанно, даже если и не пересаживаютъ ихъ въ свѣжую землю каждый годъ, но если только подбавляется въ горшки вересковая земля.

A. Jormosa.

A. Japonica. Съ пурпуровыми цвѣтами. Послѣдніе два вида выводятся въ оранжереѣ и подвергаются ранней выгонкѣ, могутъ зимовать въ грунту, при покрывѣ.

Слѣдующіе виды хорошо растутъ въ грунту.

A. sylvestris. *Овечье рунишко.* Растетъ у насъ и въ дикомъ состояніи.

A. alba. *Анемонъ Сибирскій* — тоже.

A. hepatica. *Печеночный балзамъ. Печеночница. A. Трехпластный.* Также цвѣтетъ рано весною. Медоносное растеніе.

A. Hudsoniana. *Внутренница Гудзонова.*

A. narcissiflora. *В Нарцисолистная.*

A. pulsatilla. *Прострѣлъ. Внутренница Лѣсная.* Растетъ у насъ и въ дикомъ состояніи, въ лѣсистыхъ мѣстахъ. Цвѣты темно-фіолетовые, почти синіе; ядовитое и лекарственное растеніе.

A. nemorosa. *Куропатъ. Веснуха. Анемонъ тѣнистый.* Многолѣтнее, медоносное растеніе цвѣтетъ въ Маѣ. Дико растетъ въ тѣнистыхъ рощахъ, близъ кустарниковъ.

A. n. alba plena. Съ бѣлыми, красноватыми, махровыми цвѣтами.

A. n. rosea.

A. Heroine Joubert.

A. Ranunculoides. *Козелецъ. Лютикъ.* Многолѣтнее, дикорастущее растеніе, съ золотисто-желтыми цвѣтами. Пять послѣднихъ видовъ растутъ въ дикомъ состояніи, разводятся въ грунту и подвергаются ранней выгонкѣ въ землѣ, состоящей изъ листовнаго перегноя съ примѣсью перегнившей древесной земли; послѣ отцвѣта, въ Февралѣ растеніе зарываютъ

въ землю въ тѣнистомъ мѣстѣ и употребляютъ на слѣдующій годъ, подбавивъ свѣжей вересковой земли.

A. hepatica angulosa. Съ ярко-сине-фіолетовыми цвѣтами; высаживается въ грунтъ по окончаніи морозовъ. Любитъ тѣнистое мѣсто, землю вересковую или дерновую, съ листовою; размножается дѣленіемъ корневища весною и осенью.

131. Anethum graveolens. *Укропъ.* Изъ семейства **Umbellifereae.**

Однолѣтнее, ароматное растеніе, на почву не прихотливо, лучше растетъ на рыхлой и хорошо удобренной; сѣется въ грунтъ лишь оттепѣ земля, но его можно сѣять и осенью, большею частію въ разбросъ, по всему огороду, причемъ онъ разъ вырастая, впоследствии засѣвается самъ собою. Въ засуху требуетъ поливки. Употребляется въ пищу: зелень въ сыромъ и сухомъ видѣ, какъ приправа къ кушаньямъ и къ подвергаемымъ солкѣ овощамъ; сѣмена укропа употребляются какъ ароматическая посыпка на хлѣбъ, при его печеніи и въ капусту, когда ее солятъ; также употребляется какъ лекарственное вещество.

132. Angelica. Archangelica. *Дьямль аптечный.* Изъ семейства **Umbellifereae.** Дикоростущее, многолѣтнее, лекарственное растеніе, любитъ влажную мѣстность. Употребляется преимущественно при леченіи скота.

Другіе виды: **A. montana.** *Почка полевая. Купырь.* Дикоростущее.

A. sylvestris. *Корбеникъ.* Растетъ въ лѣсанѣ.

133. Angelonia. Salicariaefolia. (floribunda). Травянистое растеніе съ синеватыми цвѣтами, распускающимися осенью, если поставить растеніе въ теплицу.

Другой видъ: **A. Gardneri.** *Крупноцвѣтная ангелонія.* Полукустарное, тепличное, травянистое растеніе, съ крупными цвѣтами—сине-лиловыми, съ бѣлымъ глазкомъ. Лѣтомъ выносятся въ оранжерею или холодный парникъ; любитъ питательную, дерновую землю, съ примѣсью небольшого количества песку; зимою поливается умеренно; размножается посадкою черенковъ въ песокъ.

134. Angrecum Sesquipedale. Тепличная орхидея съ большими, желтовато-бѣлыми цвѣтами.

135. Anguria makojana. Вьющееся тепличное растение, съ весьма красивыми, большими листьями и прелестными, крупными пунцовыми съ желтымъ цвѣтами—кистью. Требуется много тепла и влаги; разводится тѣмъ же способомъ, что и дыня; любитъ тучную землю; часто очищается отъ нападающихъ на него насѣкомыхъ, но опрыскивается очень рѣдко, размножается сѣменами и черенками.

136. Anigosanthus pulcherimus. Австралийское растение съ большимъ букетомъ желтыхъ цвѣтовъ. Во время роста содержится въ теплицѣ и умѣренно, но достаточно поливается. Когда начнутъ у него образовываться сѣмена, растение переносятъ въ оранжерею, гдѣ слегка затѣняется отъ солнца, причемъ уменьшается и поливка, совершенно прекращаемая къ зимѣ. Сажается въ вересковую землю, насыпаемую на толстый слой черенковъ. Размножается сѣменами.

137. Anoda dilleniana. Некрасивое однолѣтнее растение съ темносиними цвѣтами, распускающимися въ Іюль. Высѣвается прямо въ грунтъ.

138. Anætochilus setaceus. Тепличная Орхидея. Зеленые листья испещрены золотистыми черточками. Сажается въ торфяную землю, на толстый слой черепковъ и грубаго гравія. Горшекъ съ этимъ растеніемъ ставится на поддонъ съ водою; содержится подъ колпакомъ, защищеннымъ отъ солнечныхъ лучей. Зимой вода на поддонъ не наливается.

Другіе виды: **A. lobbianus.** Необыкновенно красиво испещренные листья, по зеленому фону розовыми и желтыми полосками, съ большею свѣтлою лентою въ длину всего листа. Цвѣты бѣлые.

A. Dawsonianus, съ голубыми цвѣтами, длинный листъ испещренъ оранжевыми жилками.

139. Anomathesa. Маленькое луковичное растение, съ узкими, заостренными листьями и красивыми алыми цвѣтами. Размножается сѣменами и отростками луковокъ; требуетъ землю, составленную изъ части лиственной, части песку и двухъ частей вересковой. Зимой содержится сухо. Въ комнатѣ ставится на югъ или юго-востокъ.

Другіе виды: *A. cruenta*, съ красными цвѣтами; будучи посажено въ Апрѣль, цвѣтетъ въ новому году.

A. juncea.

140. *Antemaria dioica*. *Горлянка. Золотушникъ. Грызкая трава.* Дикоростущее въ Сибири. Многолѣтнее растеніе, любитъ песчанистую землю, разводится въ цвѣтникахъ за пестрые листья; имѣетъ бѣлые или красноватые цвѣты.

141. *Anthadenia sesamoides*. Однолѣтнее растеніе съ розово-фіолетовыми цвѣтами, (похожими на цвѣтокъ Ахиминеса), внутри желтыми, отороченными розовою полосою. Высѣвается весною. Когда растеніе пойдетъ въ ростъ, его приучаютъ къ воздуху и потомъ пересаживаютъ въ грунтъ; на зиму нѣсколько растений вынимаютъ изъ грунта и держать въ теплицѣ.

142. *Anthecercis littorea*. Оранжевое растеніе.

143. *Anthemis nobilis*. *Римская ромашка.* Изъ семейства *Synnonthereae*. Дикоростущее, лекарственное растеніе, разводимое на сухомъ и открытомъ мѣстѣ.

Другіе виды. *A. arabica*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

A. purpurescens, съ пурпуровыми цвѣтами, однолѣтнее растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ.

A. tinctoria. *Пушкорта.* Дикоростущее.

A. tomentosa. Многолѣтнее цвѣточное растеніе.

A. catula. Дикоростущее съ вредными для пчелъ цвѣтами.

A. pyretrum. *Смоногонка.* Дикоростущее на сухихъ и открытыхъ мѣстахъ. Листья его, будучи высушены и истолчены, употребляются для уничтоженія насѣкомыхъ.

144. *Anthericum*. *Вѣнчикъ.* Дикоростущее.

Другой видъ: *A. liliastrum*. *Лилиевый мѣлъ. Звѣздчатая лилія.* Красивое, долговѣчное, садовое растеніе, съ шишковатыми корнями, цвѣтетъ въ Февралѣ или Мартѣ.

145. *Anthriscus*. *Баумчикъ. Кервель.* Однолѣтнее ароматическое растеніе употребляется въ лекарство, а собственно листья—въ пищу, какъ приправа къ супу. Сѣютъ кервель каждыя двѣ недѣли, съ Марта по Октябръ; на почву не прихотливо; сѣмена его берутъ, когда сдѣлаются коричневыми.

Кервель луковичный. Посѣянный поздно осенью зимуетъ

на грядкахъ. Когда въ Юнѣ, листья его опадутъ, его выкапываютъ, сохраняютъ въ погребѣ, въ сухомъ пескѣ; въ Сентябрѣ опять сажаютъ на гряды, гдѣ онъ, прозимовавъ, образуетъ полные корни, употребляемые въ пищу, какъ рѣпа, причемъ корень обвариваютъ кипяткомъ, чтобы легко сходила кожа.

A. nemorosa. Морковные пучки. Дикоростущее.

146. **Anthyllis vulneraria.** Зольникъ. Изъ семейства Papilionaceae. Дикоростущее, съ пушистымъ цвѣткомъ.

Другой видъ: **A. barba jovis.** Оранжевое растение.

147. **Anthurium.** Тепличная Орхидея, требуетъ той же культуры, что и прочія Орхидеи, но только въ землю для этого растенія приготовляемую, кладутъ половину глины и половину дерновой земли и при пересадкѣ, растеніе, каждый разъ сажается глубже, чѣмъ сидѣло прежде, отъ этого короткій стебель растенія даетъ новые корни.

Виды: **A. leucopogon**, съ бѣлыми жилками.

A. magnificum; листья съ бархатистыми разводами.

A. regale — комнатнаго воздуха не выдерживаетъ.

A. scherzerianum, съ ярко-красными цвѣтами, не теряющими своей красоты, впродолженіи даже 3-хъ мѣсяцевъ. Можетъ содержаться и въ комнатѣ. Размножается съ большимъ трудомъ, любитъ рыхлую, торфянистую землю, смѣшанную съ небольшимъ количествомъ глинистой.

A. pedato radiatum и **A. radophyllum**. Оба эти вида имѣютъ дланевидные листья, раздѣленные, какъ бы пальцы на рукѣ. Эти растенія могутъ содержаться въ комнатѣ.

A. lanceolatum, съ ланцетовидными листьями, длиною въ футъ. Желто-зеленый цвѣтокъ.

A. Roezli. Цвѣты съ чисто-бѣлыми чехлами.

A. nymphaeifolium. Цвѣточные чехлы бѣлые, съ розовымъ оттѣнкомъ.

148. **Antidesma Bunias.** Тепличное растеніе; плоды употребляются въ пищу; листья въ лекарство; кора на приготовленіе веревокъ.

149. **Antirrhinum majus.** Львиный звъз. Изъ семейства Scrophularineae. Двухлѣтнее растеніе съ цвѣтами пурпуровыми, желтыми — разныхъ оттѣнковъ, бѣлыми и весьма разнообразными, пестрыми. Лучшимъ считается — съ бѣлыми цвѣтами, испещрен-

ными красными полосками. Сѣется въ концѣ Марта въ оранжереѣ или парникѣ, въ Маѣ высаживается въ грунтъ и зацвѣтаетъ въ Іюлѣ. Осенью вновь высаженное въ горшки долго еще цвѣтетъ въ оранжереѣ, гдѣ и зимуетъ. Весною его высаживаютъ въ грунтъ, причемъ даетъ множество цвѣтовъ. Выростаетъ до двухъ футъ высоты, требуетъ рыхлой, но не свѣже унавоженной земли; въ цвѣтникѣ помѣщается на открытомъ для солнца мѣстѣ. Цвѣты, для усиленія цвѣтенія всего куста, срѣзываютъ немедленно послѣ того, какъ отцвѣтутъ.

Существующіе въ продажѣ виды Львиного зѣва *A. album*—

Бѣлый. A. caryophyllum album. A. c. a. luteum. A. Константинъ Третьяковъ. A. delum. A. Фейрфлей. A. Galathea. A. Glestia. A. Henri IV. A. nec peus ultra. A. nigrescens. A. papilionaceum. A. nanum album. Л. З.

Низкій бѣлый. A. n. aureum Striatum. A. aurora nanum. A. n. brilliant. A. n. Delila. A. n. Фейрфлей. A. n. Galathea. A. n. Henri IV. A. n. kermes. Splend. A. n. luteum. A. n. papilionaceum A. n. purpureum

A. pumilum Tom Thum. A. p. album. A. p. album. rubrum. A. p. cinabarinum. A. p. Delila. A. p. Henri IV. A. p. luteo rubro str. Пестрый. A. p. Sulphureum.

Многолѣтніе виды Львиного зѣва:

A. angustifolium. Жарбей.

A. calycinum. Л. З. Чашечный.

A. majus bicolor. A. З. двухцвѣтный, большой.

A. m. foliis argenteo marginatis, съ пестрыми, бѣлыми съ зеленымъ листьями.

A. majus Louis Bergman. A. m. coccineum A. m. fulgidum. Л. З. ярко-красный; A. montevidense. A. m. flore rubro.

A. thortuosum. A. variegatum. A. majus youngianum.

Цвѣты малиновые съ розовымъ. Лѣтомъ держится въ грунтѣ на открытомъ воздухѣ, зимою содержится въ оранжереѣ.

150. Antrospermum Kraussii. Однолѣтнее, низенькое растеніе, пригодное для каменистаго грунта. Цвѣты красные или желтые; содержится сухо; требуетъ вересковую землю, смѣшанную съ глинистою; высаживается въ грунтъ группами на солнеч-

ное мѣсто; употребляется для ранней выгонки, причемъ цвѣтеть около Рождества.

151. *Aphanostephanus ramosissimus*. Однолѣтнее растеніе въ видѣ дерна, вышиною до 4-хъ дюймовъ, съ фіолетовыми цвѣтами.

152. *Aphelandra*. Изъ семейства *Acanthaceæ*. Красивый американскій кустарникъ, съ лоснящимися листьями, по которымъ тянутся бѣлыя полосы. Цвѣты колосомъ; алые, оранжевые, желтые. Размножается черенками въ Іюнѣ или въ Іюлѣ, причемъ молодое растеніе зацвѣтетъ на будущій годъ. Тепличное растеніе, но идетъ въ комнатѣ, причемъ ставится на югъ или юго-востокъ. Требуешь смѣсь земли изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Любитъ поливку въ теплое время года, но зимою содержится сухо. Цвѣтеть, когда еще очень молодое.

Виды: *A. acutifolia*. Одинъ изъ красивѣйшихъ видовъ, съ широкими, овальными листьями. Колосы крупныхъ, темно-киноварныхъ цвѣтовъ.

A. Leopoldii. Съ желтыми цвѣтами. Листья превосходно расписаны бѣлыми полосами.

A. aurantiaca. Съ огненно-красными цвѣтами.

A. porteana. Цвѣтокъ оранжевый съ желтымъ, листья пестрые.

A. variegata. Съ оранжевымъ цвѣточнымъ колосомъ, изъ котораго выходятъ желтые цвѣты. Требуешь сыраго и влажнаго мѣста въ теплицѣ.

A. squarrosa и *A. citrina*, съ пестрыми листьями.

A. elegans. *A. longiracemosa*. *A. micans*. *A. pulcherima*. *A. grandis*. *A. tetragona*. *A. Roezli*. *A. fulgens*.

153. *Apios tuberosa*. Корнеплодное растеніе, употребляемое въ пищу. Корень имѣетъ грушевидную форму, отчего и получило названіе (*Apios*—груша).

154. *Apium graveolens*. *Селдереи*. Изъ семейства *Umbellifereæ*. Двулѣтнее растеніе. Листья употребляются въ пищу какъ зелень, а корни какъ салатъ и въ приправу къ другимъ кушаньямъ. Требуешь сильной, плодородной, свѣжеудобренной и нѣсколько влажной почвы. Передъ посѣвомъ сѣ-

мена мочутъ трое сутокъ и обрачиваютъ 11 сутокъ. Сѣютъ въ Мартѣ, въ парникѣ, сильно и постоянно поливая до восхода. Сѣянцы постепенно приучаютъ къ воздуху и когда они сдѣлаютъ 3—4 листка, высаживаютъ на гряды, на четверть другъ отъ друга, поливая рассаду, часто пропалывая и разрыхляя вокругъ нее землю. Вынувъ сажанцы изъ парника, держать до момента посадки въ жидкомъ удобреніи, а сажая, отщипываютъ нѣкоторую часть слишкомъ длиннаго корня.

Сельдерей бываетъ *корневой* (*A. racemum*), съ плотнымъ, мясистымъ корнемъ (лучшими сортами его считаются: Голландскій, Эрфуртскій и Лейпцигскій),—и *кудрявый* (*A. graveolendulce*), разводимый собственно для зелени.

Въ видахъ увеличенія корня Сельдерея, когда растение пойдетъ въ ростъ, боковые стебли его постоянно обламываютъ, чтобъ корню дать больше солнца и отъ корня въ серединѣ лѣта нѣсколько откапываютъ землю. Травянистый Сельдерей требуетъ другаго ухода: чтобъ листовые черешки его были нѣжнѣе и сильнѣе, растение рассаживаютъ въ канавки и прикапываютъ къ нему землю, обильно поливаютъ иногда жидкимъ удобреніемъ, а листья связываютъ.

Сѣмена Сельдерея сохраняютъ, всхожесть—три года.

Въ сѣменной торговлѣ извѣстны: Сельдерей лиственный; С. кудрявый; С. широкій бѣлый; С. широкій фіолетовый; С. бѣлый хрустальный; С. красный исполинскій.

Другой видъ: *A. petroselinum*. *Петрушка огородная*, Двухлѣтнее растение. Цвѣты, распускающіеся въ Іюнѣ и Іюлѣ, любятъ пчелы. Корень и зелень употребляютъ въ пищу какъ приправа къ кушаньямъ. Извѣстны двѣ главныя разновидности петрушки: травяная и корневая. Первая раздѣляется на гладкую и кудрявую, вторая на сахарную и бордовскую.

Травяную петрушку сѣютъ осенью и весною, лишь оттаетъ земля, а также нѣсколько разъ въ лѣто, чтобы имѣть все лѣто молодую зелень; на почву это растение не прихотливо—земля можетъ быть даже свѣже-унавоженная. Корневую петрушку сѣютъ рано осенью или очень рано весною и послѣ восхода прорѣживаютъ такъ, чтобъ одно растение отъ другаго находилось не ближе 6 дюймовъ.

Чтобъ имѣть зелень петрушки зимою, густо сажаютъ ея корни осенью подъ террасами оранжереи; также сажаютъ

петрушку въ старый парникъ, обкладываютъ его навозомъ и закрываютъ рамами и щитами, снимая послѣдніе только при солнечной теплотѣ; съ тою же цѣлью не выкапываютъ часть петрушки съ огорода осенью, покрываютъ растеніе парниковыми ящиками, дѣлаютъ къ нимъ шинельку, а въ послѣдствіи, когда морозы увеличатся, накладываютъ рамы и щиты.

155. *Aplotaxis gossypina*. Изъ семейства *Compositae*. Оранжевое растеніе, имѣетъ весьма оригинальный видъ: на короткомъ стеблѣ, изъ группы листьевъ, выходитъ большой клубъ, какъ бы сдѣланный изъ хлопчатой бумаги.

156. *Arosynum venetum*. *Пуховникъ*. Дикоростущее.
Другой видъ: *A. androsaemifolium*. *Кутра канадская*. Многолѣтнее, садовое, грунтовое растеніе.

157. *Aponogeton distachyon*. Семейство *Aponogetaceae*. Оранжевое, водяное растеніе отчего и получило свое названіе (*apou* по Кельтски—вода; *getion*, по гречески—близъ). Душистый бѣлый цвѣтокъ. Содержится очень влажно, въ глубокомъ горшкѣ или въ резервуарѣ съ водою. Размножается сѣменами.

158. *Aquilegia*. *Колоколчикъ*. Изъ семейства *Ranunculaceae*. Долголѣтнее садовое растеніе, размножается сѣменами и дѣленіемъ корней.

Виды: *A. atropurpurea*. *Голубки*. Съ пунцовыми цвѣтами.

A. formosa plena. Съ прелестнымъ цвѣткомъ—пунцовымъ съ желтымъ вѣнчикомъ.

A. pyrenaica, съ голубыми цвѣтами.

A. Skinneri. На зиму требуетъ хорошей покрывки.

A. Skinneri hybrida flore pleno, съ буро-шарлахово-красными цвѣтами, съ желтою каймою по краямъ цвѣточныхъ лепестковъ. Любитъ землю вересковую, въ смѣси съ хорошою садовою,—затѣненное, но вполне доступное воздуху мѣсто и боится влажной почвы. Размножается дѣленіемъ корней раннею весною, но преимущественно осенью, а также посѣвомъ раннею весною.

A. fragrans. Съ свѣтло-желтыми цвѣтами, также какъ и *A. glauca*.

A. macrantha. Большіе, бѣлые съ розовымъ цвѣты.

A. leptoceras. Цвѣты лиловые снаружи и желтые внутри.

A. eximia. Огненно-красные цвѣты съ желтою середкою.

Виды съ голубыми цвѣтами: *A. viscosa*. *A. sibirica*.

A. alpina. *A. parviflora*. *A. canadensis*. *Орлики*. *Водосборъ*. Съ кирпично-красными цвѣтами, подвергается ранней выгонкѣ въ оранжереѣ, причемъ цвѣтетъ въ Мартѣ. Также способны къ ранней выгонкѣ всѣ разновидности этого вида: *A. vulgaris*. *A. glandulosa*. *Тростевъ*, съ голубыми цвѣтами и *A. jucunda plena*, съ махровыми цвѣтами, темно-синими снаружи и бѣлыми внутри.

Виды съ пурпуровыми цвѣтами:

A. dahurica. *A. Fischeriana*.

A. vulgaris fol. variegatis, съ голубыми цвѣтами и желто-зурчатыми листьями.

A. stellata plena. *A. striata nigra*. *A. S. rubra*. *A. vulgaris alba plena*. *A. v. azurea plena*. *A. v. azurea striata*. *A. v. cœlestina plena*. *A. v. lilacina plena*. *A. v. nigra plena*. *A. v. rubra plena*.

159. *Arabis albida*. Дикорастущее на Кавказѣ, многолѣтнее, зимующее въ грунту растеніе, разводится въ цвѣтникахъ за его пестрые листья, имѣетъ бѣлые цвѣты.

Виды: *A. alpinafol. variegatis*. *Пестролистная постышка*. Съ весьма красивыми листьями и цвѣтами, также какъ и *A. lida fol. var.* и *A. bellidifolia fol. variegatis*.

A. rosea. Оранжерейное растеніе.

160. *Arachis hypogoea*. *Завилегъ*. Однолѣтнее растеніе, плодъ котораго, въ южныхъ странахъ употребляется въ пищу, подъ именемъ *подземнаго орѣха* или *подземнаго гороха*.

161. *Aralia*. *Канадскій дягильникъ*. Семейство *Araliaceæ*. Очень красивое дерево съ листьями рукообразной формы. Растеніе собственно оранжерейное, но очень хорошо растетъ и въ комнатахъ, будучи поставлено на юговостокъ или югозападъ, нѣкоторые же виды содержатся въ теплицѣ. Цвѣты желтоватые или зеленоватые, размножается черенками и отрезками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой и перегноя.

Оранжерейные виды *Араліи*:

A. integrifolia, съ очень длинными и узкими, какъ бы съ повисшими листьями.

A. reticulata съ длинными листьями.

A. schefflerii и **A. quinquefolia**, съ пятираздѣльнымъ листомъ.

A. pulchra, съ рукообразнымъ листомъ.

A. Siboldtii folia variegata, превосходное растеніе, съ пестрымъ, семиконечнымъ листомъ.

A. farinosa или **farinifera**, съ семиконечнымъ листомъ, покрытымъ мучнистою пылью.

A. racemosa v. Sachaliensis, съ острова Сахалина, что заставляетъ предполагать въ этомъ растеніи способность переносить наши зимы въ грунту, безъ крыши.

A. spinosa. Можетъ зимовать въ грунтъ при надежной крыше; размножается сѣменами и корнями, которые разбиваются на вершковыя куски, сажаютъ въ легкую, песчаную землю и держать въ умѣренномъ теплѣ и влажности.

A. Scandollei. A. Spathulata. A. capitata. A. elliptica. A. palmata. A. leptophylla. A. umbraculifera.

Тепличный видъ: **A. papyrifera**, съ сердцевидными листьями; можетъ быть высажено въ грунтъ. Китайцы, изъ мякоти, находящейся въ стволѣ этого растенія, готовятъ, такъ называемую „рисовую бумагу“.

Въ комнатѣ лучше другихъ идутъ слѣдующіе виды:

A. trifoliata, съ тройчатыми листьями.

A. Sieboldii, съ превосходнымъ, огромнымъ, семиконечнымъ листомъ.

A. umbraculifera.

162. **Araucaria. Араукарія.** Мѣстное, Чилийское, названіе, американскаго хвойнаго дерева изъ семейства **Coniferæ**, достигающаго большаго роста и имѣющаго весьма необыкновенный наружный видъ. Размножается только сѣменами, потому что черенки, отрѣзанные отъ вѣтвей Араукаріи, хотя и даютъ корни, но растеніе идетъ не въ верхъ, а какъ вѣтвь въ бокъ, не образуя ствола. Впрочемъ Араукарія можетъ размножаться посадкою отрѣзанныхъ верхушечныхъ побѣговъ; черенки выводятся въ тепличномъ ящикѣ, съ чистымъ пескомъ и содержится влажно при 18° Р. Сѣмена сажаются по оди-

ночкѣ въ горшечки съ пескомъ или мелко изрубленнымъ бѣлымъ мхомъ, причемъ сѣмя втыкается только на треть его длины, остриемъ внизъ. Когда сѣянцы взойдутъ, ихъ пересаживаютъ въ песчанистую землю и содержатъ тепло и влажно. Оболочку сѣмени, долго висящую на всходѣ, отнюдь не слѣдуетъ снимать, иначе растеніе вянетъ. До четырехъ лѣтъ Араукарія содержится въ нѣсколько возвышенной температурѣ, пока не окрѣпнетъ.

Араукарія растеніе оранжерейное, но можетъ содержаться и въ комнатѣ, гдѣ ставится на югъ или востокъ; земля ему дается вересковая, съ примѣсью $\frac{1}{4}$ листовенной и $\frac{1}{4}$ дерновой.

Виды Араукаріи:

A. Бразильская, съ опущенными вѣтвями и колючими листьями.

A. excelsa—одинъ изъ красивѣйшихъ видовъ, хвоя какъ у ели.

A. gracilis—вѣтви растутъ книзу, съ длинными и узкими иглами.

A. Bidwilliana—такое же расположеніе вѣтвей, листья заострены.

A. imbricata—вѣтви извиваются, какъ змѣи; листья жесткіе.

A. columnaris—вѣтви растутъ вверхъ; листья игольчатые.

A. Cunninghami, приземистое дерево съ шилообразными иглами.

A. Cooki—съ мягкими иглами.

A. glauca, съ сѣро-зелеными иглами.

A. Lesana, ярлаго, свѣтло-зеленаго цвѣта.

A. Rulei, съ острыми, но не колючими вѣтвями, одинъ изъ красивѣйшихъ видовъ, съ темно-зелеными, блестящими листьями.

163. *Arbutus andrachae*. Неспячекъ. Оранжерейное, постоянно зеленое растеніе, съ бѣлыми цвѣтами, распускающимися только зимою и то, когда растеніе достигнетъ полнаго возраста; ежегодно теряетъ кору.

Другіе виды: *A. unedo*. Ежовка. Земляничное дерево. *Арбутусъ обыкновенный*. Дико растетъ въ жаркихъ странахъ; ягоды его, похожія на клубнику—ѣдятъ.

A. uva ursi. Толокнянка, стелющаяся медвѣжья ягода. Низенькій, дикоростущій въ лѣсахъ кустарникъ. Медвѣди очень любятъ его красныя, вязющаго вкуса ягоды.

A. alpina. Т. альпійская. Небольшой, всегда зеленый ку-

старникъ, дико растетъ въ горахъ, размножается сѣменами и отпрысками; любитъ вересковую землю.

164. *Archangelica officinale*. *Вонючій дягиль.* Изъ семейства *Umbelliferae*. Дикоростущее въ сырыхъ, лѣсныхъ пространствахъ многолѣтнее растеніе. Пахучій корень Дягиля имѣетъ лекарственныя свойства. Размножается посѣвомъ въ Сентябрѣ или Мартѣ, прямо въ грунтъ.

165. *Arctium Bardana, Lappa et majus*. *Репейникъ.* Дикоростущее, двухлѣтнее растеніе, отваръ его корня употребляется какъ кровочистительное средство. Цвѣтетъ съ Іюля до Сентября доставляя взяткоу пчеламъ.

166. *Arctocalyx endlicherianus*. Тепличное растеніе изъ семейства Геснерій. Большіе цвѣты снаружи желтые, внутри коричневыя съ малиновымъ. Растеніе сажается въ большой горшокъ, на дно котораго кладутся куски шлаку, (окалины), глыбы земли и черенки, все это покрывается слоемъ зеленого мха; растеніе поливается часто и сильно и по мѣрѣ развитія поливка растенія усиливается. Въ теплицѣ растеніе притѣняется, но отнюдь не вовсе лишается свѣту. Размножается черенками. Тщательно очищается отъ нападающихъ на него насѣкомыхъ.

167. *Arctostaphylos officinalis*. *Медвѣжья ягода.* Дикоростущій въ нашихъ лѣсахъ карличковый кустарникъ. Листья имѣютъ лекарственныя свойства и идутъ на выдѣлку кожи и сафьяна.

168. *Arctotis acaulis*. (*A. breviscopa*). Изъ семейства *Compositae*. Однолѣтнее растеніе, почти не имѣющее стебля, покрытое бѣлыми, душистыми волосками; цвѣтокъ огненно-красный съ черною серединою; высѣвается въ парникъ; держится сухо; высаживается въ грунтъ небольшими группами, въ легкую песчанистую землю, на солнечную сторону цвѣтника; особенно пригодно для каменистыхъ участковъ.

Другой видъ: *A. acaulis* var. *speciosa*. Оранжевый цвѣтокъ съ коричневою полоскою, кругомъ чернаго центра.

169. *Агеса*. *Пальма арека* *). Американское растеніе съ деревянистымъ стеблемъ, достигающимъ въ своемъ отечествѣ огром-

*) Всѣ почти пальмы требуютъ одинаковаго ухода. Земля имѣ

ныхъ размѣровъ, — перистые листья Ареки бываютъ въ нѣсколько аршинъ длины.

Къ роду Арекъ причисляются только тѣ пальмы, у которыхъ рубчатый билокъ и стебель гладкіе, неимѣющіе придатковъ.

Арека, растеніе тепличное, но хорошо идетъ въ комнатѣ, гдѣ ставится къ окнамъ, обращеннымъ на югъ; размножается съменами и требуетъ вересковую землю въ смѣси съ половиною пропорціею дерновой, четвертою частію листовенной и четвертою частію песку.

Виды: *A. alba* Bory. Орѣхи ея жуютъ съ бетелемъ.

A. glandiformis и *A. triandra*, употребляются какъ пальмовая капуста.

A. montana. *A. alba*. *A. Boneri*. (*Schafortia robusta*). *A. furfuracea*. *A. speciosa*. *A. Verschaffelti*. (*Hyophorbe*).

Въ комнатахъ слѣдующіе виды идутъ лучше другихъ: *A. catechu*. Арека Индійская, съ прямымъ и тонкимъ стволомъ,

должна даваться питательная, дерновая, смѣшанная съ нѣкоторымъ количествомъ хорошо перепрѣвшаго коровьяго и конскаго навоза. Молодымъ растеніямъ дается болѣе легкая, дерновая земля и онѣ содержатся на корѣ или въ парникѣ. Пальмы требуютъ притѣненія и провѣтриванія, обильной поливки и опрыскиванія при ростѣ. На томъ основаніи что пальмы пускаютъ корни отвѣсно, отнюдь не слѣдуетъ давать молодымъ растеніямъ высокихъ и узкихъ горшковъ, а надлежитъ держать ихъ въ обыкновенныхъ горшкахъ, но нужно своевременно пересаживать растеніе, лишь только корни его оплетутъ комъ. При пересадкѣ породъ имѣющихъ большіе, отвѣсные корни, — завившіеся и переплетшіеся корешки надлежитъ осторожно распутать, отрѣзавъ загнившіе и поврежденные, но отнюдь не поранивъ главныхъ, отвѣсныхъ корней и затѣмъ дать растенію хорошій водостокъ въ новой посудѣ. Многія пальмы, напр. *Latania*, *Phoenix*, *Chamaerops* и др. весьма неприхотливы и выдерживаютъ даже довольно сильную обрѣзку корней.

Взрослыя пальмы не нуждаются въ почвенномъ теплѣ и ихъ лучше ставить на подставкахъ.

достигающимъ на свободѣ 80 футъ. Эта пальма образуетъ крону темно-зеленыхъ листьевъ, подъ которыми сидятъ кисти оранжевыхъ плодовъ, употребляемыхъ въ пищу. Ядро этого плода смѣшанное съ известью и листьями *бетеля* (*Piper Betle*), извѣстно въ торговлѣ подъ именемъ *бетеля*. Въ Индіи эту смѣсь жуютъ, отчего слюна ее жующихъ получаетъ кровавый цвѣтъ.

A. Oleracea. *Пальма капустная. П. Американская.* Очень красивая пальма съ весьма высокимъ стволомъ, на вершинѣ котораго образуется почка, состоящая изъ молодыхъ листьевъ. Почка эта употребляется въ пищу подъ именемъ *Пальмовой капусты*. Замѣчательно что послѣ того, какъ отрѣжутъ эту почку, все дерево погибаетъ.

A. sapida. Превосходная пальма съ большими колосьями розовыхъ цвѣтовъ. **A. madagascariensis.** **A. cutescens.** **A. rubra.**

170. **Arenaria sepillifolia.** *Песочница.* Изъ семейства *Alsineae*—Торицевыя. Однолѣтняя некрасивая, сорная трава, не заслуживающая разведенія, встрѣчается на песчаномъ грунтѣ, отчего и получила свое названіе, (*arena*—песокъ).

Другіе виды: **K. juncea.** *Адуизгаръ.* Дикоростущее въ Даурии.

A. balearica. Красивое, маленькое, растеніе съ большими цвѣтами, лѣтомъ содержится въ тѣни и требуетъ сильной поливки; употребляется для ранней выгонки въ оранжереѣ, причемъ цвѣтетъ въ Декабрѣ.

171. **Arenga.** Пальма Аренга. (Относительно культуры, см. *Ареса*).

Виды: **A. saccharifera.** *Аренга Сахарифера.* Въ Ост-Индіи называется: *анао сагара*, *Гомути*. Азіатское растеніе съ высокимъ стеблемъ, покрытымъ длинными, черными нитями; имѣетъ перистый листъ, достигающій нѣсколькихъ аршинъ. Цвѣты желтоватые, кистями. Изъ сока этой пальмы добываютъ вино (Тодди) и сахаръ. Размножается сѣменами. Содержится въ теплицѣ, но хорошо идетъ и въ комнатѣ, поставленное на южную или восточную сторону.

A. Bonetti, **A. Species nova.** **A. Obtusifolia.** **A. Grifithii.** **A. Westerhoutii.**

172. *Ardisia*. *Ардизия*. Такъ названо отъ слова «*Ardis*» — Наконечникъ копья, по остроконечнымъ сегментамъ цвѣточнаго вѣнчика. Очень красивое деревцо, съ темнозелеными цвѣтами и заостренными листьями. Даетъ осенью, до Декабря, бѣлые и розовые цвѣты—пучками. Ягоды у него бываютъ красныя, лиловыя или бѣлыя. Размножается черенками и сѣменами; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной; растеніе тепличное, можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: *A. crenulata*. Лучшій видъ съ красными ягодами и какъ бы выгрызенными листьями.

A. villosa mollis. — Кустарникъ съ бархатистыми листьями и ярко-красными ягодами.

A. Solanacea. *A. paniculata*. *A. colorata*. *A. punctata*.

173. *Arduina bispinosa*. Оранжевое растеніе.

174. *Argania sideroxylon*. Африканское растеніе. Изъ сѣменъ его добывается масло, замѣняющее прованское, а дерево извѣстно въ торговлѣ подъ именемъ *жельзнаго*.

175. *Argemone ochroleuca*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе, всѣвается предварительно въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ.

Другіе виды: *A. mexicana*. Тоже, съ желтыми цвѣтами.

A. grandiflora, съ бѣлыми цвѣтами. Многолѣтнее растеніе, зимою сохраняется въ оранжереѣ.

176. *Aria*. *Крушина*. Дикоростущій кустарникъ, служащій для украшенія парковъ.

Виды: *A. acerifolia*. *A. alpestris*. *A. carpinifolia*. *A. corymbiflora*. *A. cretica*. *A. glabrata*. *A. laciniata*. *A. lanata*. *A. latifolia*. *A. latifolia atroviridis*. *A. longifolia*. *A. nikea*. *A. rotundifolia*. *A. vulgaris*.

177. *Arisema*. Тепличное растеніе изъ семейства Арониковыхъ. Зимой содержится въ весьма сухомъ мѣстѣ и очень мало поливается, способно прозимовать даже въ сухомъ пескѣ. Въ Мартѣ пересаживается въ легкую, перегнойную землю и съ того времени во все время роста нуждается въ весьма влажной атмосферѣ и въ затѣненіи.

Другіе виды: *A. aphyllum*. Безлистная аристема. Съ шишковатымъ корнемъ и безлистнымъ, цилиндрическимъ, зеленымъ съ бурыми пятнами, гладкимъ стеблемъ, достигающимъ 1½ фута вышины.

Оранжевейные виды: *A. ringens*, листья съ выемкою. *A. filiforme*. *A. concinnum* и *A. curvatum*. Многолѣтнія оранжевейныя растенія, съ круглыми клубнями.

178. Aristolochia. Кирказонъ крупнолистный. Семейства *Aristolochiae*. Очень красивый, многолѣтній, вьющійся кустарникъ, употребляемый для украшенія садовъ и парковъ, съ зеленоватыми цвѣтами, въ крапинкахъ.

Виды: *A. clematitis*. Кокорникъ. Филосникъ. Растетъ на открытомъ воздухѣ; имѣетъ лекарственныя свойства, также какъ и *A. rotunda*. Ростъ.

A. siphon—съ желтобурыми цвѣтами; требуетъ очень питательной почвы.

Ежегодно, поздно осенью, всѣ высокозвившіеся стебли, обрѣзываютъ до невызрѣвшей части; стебли связываютъ, пригибаютъ и зарываютъ землею, а при наступленіи морозовъ, сверху того покрываютъ листомъ. Весною растеніе постепенно раскрывается и развязывается. Размножается отводками и сѣменами.

A. anguicida. Желтые, испещренные цвѣты.

A. tomentosa—стебли и нижнія стороны листьевъ покрыты пушистыми волосами. Зимуетъ на открытомъ воздухѣ, если надежно закрыть.

A. picta. *A. gigas*. *A. saccata*. *A. tricaudata*. *A. clupeata*, съ сердцевидными листьями и дурно пахнущимъ цвѣткомъ, испещреннымъ темно-пурпуровыми крапинками.

A. cordiflora. Съ пурпуровымъ цвѣткомъ.

A. cymbifera. Растетъ въ Бразиліи; корень и стебель употребляются какъ спасительное средство противъ укушенія змѣи.

Оранжевейные виды: *A. glauca*. *A. Kaempferi*. *A. altissima*. *A. grandiflora*.

179. Argemone ochroleuca. Однолѣтнее, цвѣточное растеніе, высѣвается предварительно въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ.

Другіе виды: *A. mexicana*. Тоже съ желтыми цвѣтами.

A. grandiflora, съ бѣлыми цвѣтами. Многолѣтнее растеніе, зимуетъ въ оранжереѣ.

180. Armeria vulgaris. Долголѣтнее растеніе, зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

Другіе виды: **A. v. alba** и **A. v. coccinea**.

181. Armoracea rusticana. Хрѣнъ. Многолѣтнее корневое растеніе; родится съ здоровыми, крѣпкими корнями на рыхлой, нѣсколько влажной землѣ. Чтобы хрѣнъ не засорялъ огорода своими сильно разрастающимися корнями и всегда давалъ хорошій продуктъ, его надлежитъ разводить слѣдующимъ образомъ.

Отрѣзавъ верхушку корня, сажаютъ ее на хорошо приготовленную гряду. Отрѣзокъ пустить въ теченіи лѣта нѣсколько корешковъ, толщиною въ мизинецъ. Слѣдующею весною эти корешки надо отдѣлить и посадить въ трехъ вершкахъ другъ отъ друга. Передъ посадкою корешковъ обрѣзаютъ въ длину на вершокъ и боковыя мочки съ этой части стираютъ шерстяною варежкой или суконкою. Надъ посаженнымъ корешкомъ земли не должно быть больше, какъ на два пальца. Затѣмъ всходъ опалывается и окучивается, а въ Августѣ верхушки корней откапываютъ, но конца корня не тревожатъ; съ откопанной части счищаютъ боковыя мочки и снова заваливаютъ землею корень, отъ этого онъ, получая питаніе только снизу, дѣлается толще.

При наступленіи морозовъ корни хрѣна вынимаются для употребленія въ пищу и какъ весьма дѣйствительное въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ лечебное средство.

182 Arnebia eschinoides. Воздушное растеніе съ желтыми цвѣтами, изъ семейства **Borragineae**. Размножается сѣменами.

183. Arnica montana. Баранья трава. Арника горная. Изъ семейства **Synanthhereae**. Дикорастущее многолѣтнее растеніе, разводимое въ виду его лечебныхъ свойствъ.

184. Artanthe elongata. Тропическое растеніе; листья его подъ названіемъ «**Matico**», употребляются въ лекарство какъ «Ку-беба».

185. Artemisia abrotanum. Божье дерево. Изъ семейства **Sy-**

panthereae. Дикорастущій кустарникъ; у насъ на зиму требуетъ сохраненія въ подвалѣ. Листья имѣютъ ароматный запахъ и употребляются противъ моли и какъ лекарство. Размножается дѣленіемъ корней.

Другіе виды: **A. inodora.** *Бѣлокорка.*

A. dracunculus. *Эстрагонъ.* Дикоростущее многолѣтнее растеніе, разводимое въ грунту, на огородахъ. На почву не прихотливо. Размножается весною дѣленіемъ корней. Черезъ каждые три года должно вынимать и вновь рассаживать корни. Зимуетъ въ грунту безъ покрывки. Отпрыски его употребляются при солкѣ огурцовъ и для выдѣлки уксуса. Въ Іюлѣ зелень его связывается пучками и сушится въ тѣни.

A. contra. *Цытваръ. Цытварное сѣмя.*

A. annua. *Чаланъ.* Однолѣтнее растеніе, достигающее до 5 футовъ, имѣетъ пирамидальный, похожій на кипарисъ, видъ. Красивое декорационное растеніе, которое можно сажать одиночно на газонъ. Сѣется въ Мартѣ въ горшки, пересаживается въ песчанистую, но питательную землю, на солнечную сторону цвѣтника. Название **Artemisia** получило въ честь одного изъ именъ Діаны, которой и посвящено это растеніе; древніе утверждали, что оно имѣетъ свойство ускорять совершеннѣе (??).

A. absinthium. *Полынь. Глистовникъ.* Дикорастущее, многолѣтнее растеніе, любитъ сухое мѣстоположеніе; на почву не разборчиво; употребляется для настоекъ и какъ лекарственное средство; размножается посадкою боковыхъ побѣговъ отъ корня; цвѣты его вредны пчеламъ.

A. maritima. *Черная нехворощъ.*

A. pontica. *Бѣлая нехворощъ.* Оба дикорастущіе вида.

A. stelleriana. *Камчатскій чернобильникъ.* Пестролистное растеніе, зимующее въ грунту безъ покрывки. Размножается черенками, дѣленіемъ корней и отводками укоренившихся побѣговъ. Стебли его пригибаются къ землѣ.

A. argentea. Пестролистное растеніе, красивѣе предыдущаго; требуетъ того же ухода.

A. vulgaris. *Чернобильникъ.* Дикорастущее на сухихъ и открытыхъ мѣстахъ растеніе, корни котораго употребляются противъ падучей болѣзни.

A. vulgaris fol. variegatis. Дикорастущее, многолѣтнее ра-

стение; разводится въ цвѣтникахъ за его пестрые желто-узорчатые листья. Образуетъ густой дернъ, если постоянно подрѣзывать его стебли.

- 186. Arthocarpus.** *Хлѣбное дерево.* Семейство **Arthocarpeae.** Съ большими, вырѣзанными или овально заостренными листьями, даетъ зеленаго цвѣта плодъ, величиною въ человѣческую голову, съ мучнистою внутренностію, изъ которой въ Индіи дѣлаютъ хлѣбъ. Размножается сѣменами и отростками; требуетъ плотную, песчанистую землю, составленную изъ дерновой и лиственной, съ примѣсью четвертой части песку; нуждается въ обильной поливкѣ лѣтомъ. Это тепличное растение выдерживаетъ комнатную культуру, если его держать на южной или юго-восточной сторонѣ.

Виды: **A. incisa.** *Артокarpусъ разрывно-лиственный.* Дерево, достигающее до 50 футъ высоты. Плоды его употребляются печеными, замѣняя хлѣбъ.

A. integrifolia. Съ цѣльными листьями.

A. rigida. Плодъ употребляется въ пищу жареный.

A. imperialis.

- 187. Arthropodium cirratum.** Прекрасное, комнатное, декоративное растение, съ широкими листьями и бѣлыми цвѣтами, распускающимися въ теплицѣ — зимою, а въ оранжереѣ — весною.

- 188. Arthrostemma (Centradenia).** Очень красивый, американскій кустарникъ съ мелкими листками и небольшими розовыми или фіолетовыми цвѣтами и зелено-пурпуровыми листьями. Размножается черенками. Требуется вересковую землю съ примѣсью половины дерновой и половины лиственной. Въ теплицѣ распускается въ Декабрѣ или Январѣ. Его надлежитъ держать у окна, но оно не любитъ влажнаго воздуха. Въ комнатѣ ставится на юго-востокъ.

Виды: **A. parartieia.** **A. Centradenia rosea.** **A. floribunda.** **A. nitida.** **A. grandiflora.**

- 189. Arum.** *Аронникъ. Аройникъ.* Изъ семейства **Aroideae.** Оранжерейное растение, но нѣкоторые виды содержатся въ теплицѣ, а нѣкоторые хорошо переносятъ зиму въ комнатахъ.

Оранжерейные виды: **A. maculatum.** *Аронъ.* Имѣетъ ле-

карстенныя свойства. Листья стрѣловидныя съ темными пятнами; красныя ягоды.

A. bulbiferum. **A. macrorhizum.** **A. nymphaeifolium.**
A. trilobatum.

A. odorum. Содержится въ теплицѣ но можетъ содержаться въ комнатѣ: **A. arborescens.** **A. pinnatifidum.**

A. orientale. Дикоростущее.

A. dracunculus. Съ шишковатыми корнями. Темнобурныя цвѣты его имѣютъ непріятный запахъ. Многолѣтнее растеніе, зимуетъ въ грунту безъ покрывки.

A. italicum. Многолѣтнее растеніе съ желтыми цвѣтами; любить смѣсь дерновой земли съ листовною; при посадкѣ, корневище его углубляется почти на футъ въ землю.

190. Arundo phragmites. *Трость.* Изъ семейства **Gramineae.**

Другіе виды: **A. calamagrostis variegatis.** Долголѣтнее садовое растеніе.

A. donax fol. variegatis. *Пестролистный тростникъ.* Высокое оранжерейное растеніе, но можетъ расти и въ грунту. Сажается вокругъ водоемовъ, по берегу рѣчекъ, озеръ и пр. гдѣ хорошо выносить зиму. Сажается весною. Размножается дѣленіемъ корня или черенками, на которые рѣжутъ кусками стебель.

A. donax versicolor. Листья полосатыя — бѣлыя съ зеленымъ.

191. Asarum europaeum. *Подорышникъ. Земляной ладанъ.* Изъ семейства **Asarineae.** Дикоростущее. Разводится въ цвѣтникахъ за его темно-зеленыя листья, сидящіе на верху стебля. Любитъ рыхлую землю. Въ дикомъ состояніи растетъ въ тѣнистыхъ лѣсахъ и кустахъ, преимущественно подъ Орѣшникомъ. Темно-бурныя цвѣты открыты всю весну, до Іюня, запахъ ихъ напоминаетъ ладанъ и камфору. Растеніе имѣетъ ядовитыя свойства.

Другой видъ: **A. albivenium.** Красивое, многолѣтнее растеніе, въ южныхъ мѣстностяхъ Россіи растетъ на открытомъ воздухѣ, а въ сѣверныхъ содержится въ оранжереѣ. Цвѣтетъ въ Февралѣ и Мартѣ. Любитъ глинисто-дерновую почву и размножается дѣленіемъ корней.

192. *Asclepia*. (Греческое имя Эскулапа). *Ласточникъ*. Изъ семейства *Asclepiadaceae*. Американское, травянистое, многолѣтнее растеніе, съ продолговатыми листьями и зонтикообразными алыми, розовыми, бѣлыми или оранжевыми душистыми цвѣтами; размножается черенками, отростками и посѣвомъ въ Мартѣ. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Выносить комнатную культуру, причемъ ставится на югъ или юго-западъ.

Виды: *A. incarnata*. *Листовень американскій*.

A. curassavica. Оранжевое растеніе съ желто-фіолетовыми цвѣтами; высѣвается въ Февралѣ и Мартѣ.

A. cornutii. *Листовень Сирійскій*. Изъ его стеблей добывается волокнистое вещество, изъ котораго дѣлается вата.

A. vincetoxicum. *Лускачъ противуядный Ласточникъ*. *Чертова борода*. Цвѣтетъ съ Мая до Іюля.

Два послѣдніе вида признаются одними изъ лучшихъ въ числѣ медоносныхъ.

A. Douglasi. Съ розовыми цвѣтами. Растетъ на открытомъ воздухѣ. Осенью защищается отъ дождей, для чего у корня дѣлается земляная горка. Размножается дѣленіемъ корневища весною или осенью.

A. amoena.

193. *Asparagus officinalis*. *Спаржа*. Изъ семейства *Liliaceae*. Многолѣтнее растеніе, побѣги котораго употребляются въ пищу вареными, просто съ солью, или съ различными приправами. Растетъ и въ дикомъ состояніи. Для разведенія этого растенія устраиваются такъ называемыя спаржевыя гряды, различными способами. Укажемъ нѣкоторые.

Выкапываютъ гряду глубиною фута въ три и наполняютъ ее навозомъ и опилками на 2 фута, а потомъ насыпаютъ землю, въ которую и сажаютъ спаржу.

Другой способъ. Спаржу сажаютъ, въ Маѣ, рядами на грядѣ и таковыхъ грядъ дѣлаютъ нѣсколько въ различныхъ пунктахъ огорода. Для этого съ осени землю глубоко перекапываютъ и удабриваютъ. Гряду выкапываютъ на футъ глубины и оставляютъ въ этомъ видѣ до весны. Весною землю вновь перекапываютъ, перемѣшиваютъ съ компостомъ и насыпаютъ ее валами, вышиною четверти въ три. На гребень этихъ ва-

ловъ сажаютъ спаржу, аршина въ полутора другъ отъ друга. Спаржа засыпается землею, смѣшанною съ компостомъ, въ уровень съ почвою огорода. Весною опять вынимается столько земли, чтобы растеніе было на полфута подъ почвою. На третью осень, на гряды, снова насыпается на полфута земли и навоза; въ слѣдующіе затѣмъ годы, каждую осень, наваливается мелкій навозъ, четверти на три, и весною перемѣшивается съ землею, мотыгою.

Третій способъ. Спаржу сажаютъ на одномъ уровнѣ съ почвою огорода. Кругомъ посадки дѣлаютъ канаву, изъ которой землю бросаютъ на спаржевую гряду, а канаву ежегодно наполняютъ компостомъ, сухимъ листомъ и растительными остатками; на слѣдующій годъ повторяютъ тоже, и спаржевая гряда такимъ образомъ, сама собою, возвышается.

Въ Бельгіи сѣмена спаржи высѣваютъ прямо на мѣста; по всходѣ молодыя растенія прорѣживаютъ, насыпаютъ на нихъ ежегодно слой песчаной земли и покрываютъ на зиму, коровинымъ навозомъ. При такомъ уходѣ спаржа срѣзывается на третій годъ.

Спаржу, но не раньше какъ трехлѣтнюю, подвергаютъ ранней выгонкѣ, при которой она дѣлается способною къ рѣзкѣ уже около Рождества. Для этого кругомъ спаржевой гряды, вырываютъ канаву, въ 2 фута глубины и такой же ширины; обкладываютъ эти гряды досками и на нихъ кладутъ парниковыя рамы. Въ канаву, въ Декабрѣ, плотно натаптываютъ свѣжій конскій навозъ, до верхняго края обкладки. Землю въ парникѣ разрыхляютъ и покрываютъ легкимъ слоемъ солоمیстаго лошадинаго навоза или древесными опилками съ угольнымъ порошкомъ. Парникъ хорошо покрывается рогожами и тому подобнымъ. Навозъ, составляющій наружную покрывку, каждыя 2 недѣли замѣняется свѣжимъ, а въ парникѣ лишь станетъ сырѣть, замѣняется сухимъ. Спаржа должна показаться черезъ три недѣли отъ начала выгонки.

Разсаду спаржи воспитываютъ слѣдующимъ образомъ: осенью или рано весною, сѣмена спаржи сѣютъ въ грунтъ, хорошо прибываютъ, покрываютъ слоемъ земли и посыпаютъ всю гряду перепрѣвшимъ навозомъ. Слишкомъ частые всходы прорѣживаютъ. Осенью срѣзаютъ ботву, до самой земли, и опять посыпаютъ гряду перепрѣвшимъ навозомъ, что дѣлаютъ и въ

слѣдующую весну. Для разсадки наиболѣе пригодны двухлѣтнія растенія, причѣмъ для разсадки на мѣста выбираются только тѣ корешки, у которыхъ имѣются круглыя, толстыя головки. Срѣзывать спаржу для употребленія начинаютъ на третій годъ послѣ посадки; при срѣзываніи остерегаются повреждать корневища; должно срѣзать всѣ какъ толстыя, такъ и тонкіе побѣги до конца Мая, а въ первые годы послѣ посадки, рѣзку надлежитъ прекращать раньше.

Существуютъ два главныхъ вида спаржи: *бѣлая* и *зеленая* или *Умская* — менѣе нѣжная.

Другой видъ: *A. Scandens*. Вьющееся, оранжерейное, многолѣтнее растеніе. Годичные побѣги производятъ многочисленные листья, пучками, по три листа вмѣстѣ. Бѣлые пониклые, цвѣтки, изъ которыхъ образуются красныя ягоды.

194. *Asperula odorata*. *Марена благоухающая*. *Ландышъ*. *Шерошница душистая* *Пахучка*. Изъ семейства *Stellateae*. Многолѣтнее, грунтовое, бордюрное растеніе, съ бѣлыми душистыми цвѣтами. Имѣетъ лекарственныя свойства; дико растетъ въ лѣсахъ; употребляется для ранней выгонки; съ этою цѣлію выкапывается въ лѣсу, сажается въ горшки, въ черноземъ, смѣшанный съ листовною землею и содержится въ тѣни. Послѣ первой посадки въ горшки *Шерошница* цвѣтетъ только черезъ годъ; за то послѣ цвѣтетъ ежегодно, если содержится въ теплѣ въ продолженіи Января.

Другіе виды. *A. Setosa azurea*. Дернистый, однолѣтній кусть, достигающій 6-ти вершковъ, весьма вѣтвистый съ многочисленными голубыми цвѣтами; любитъ рыхловатую почву, сѣется прямо на мѣсто осенью или раннею весною.

A. azurea. Прекрасное, однолѣтнее растеніе, которое, будучи пересажено въ грунтъ, на какую угодно почву, зацвѣтетъ въ Маѣ и будетъ цвѣсть до сильныхъ морозовъ, прямо посѣянное въ грунтъ, зацвѣтетъ въ Іюнѣ. Требуется помѣщенія на солнечной сторонѣ.

195. *Asphodelus ramosus*. *Воловій хвостъ*. Дикоростущее, многолѣтнее растеніе, съ бѣлыми цвѣтами.

Виды *A. fistulosus*. *Чалма дудчатая*. Многолѣтнее садовое растеніе, требуетъ покрывки на зиму.

A. racemosus. *Чалма вѣтвистая*. Тоже.

A. cerasiferus. Многолѣтнее растеніе, дико произрастаетъ во Франціи, у насъ разводится въ горшкахъ.

A. acaulis. Царскія кудри безстебельныя.

A. luteus. Асфадилъ желтый; разводится въ садахъ. Съ золото-желтыми цвѣтами.

196. **Aspidistra.** Тепличное растеніе, изъ семейства Сальсепарельныхъ, очень пригодно для комнатной культуры. Цвѣты появляются на самомъ корневищѣ, и если корень находится въ землѣ, то подобно грибамъ, вылезаютъ изъ земли или даже сидятъ въ землѣ. Такое странное положеніе цвѣтка происходитъ отъ того, что его ножка очень коротка. Сходство названныхъ цвѣтовъ съ грибами происходитъ отъ мясистаго ихъ строенія и тѣлеснаго цвѣта. Внутри цвѣтокъ, обыкновенно, блѣдный, фіолетово-голубой. Растеніе любитъ легкую, питательную землю, составленную изъ вересковой и листовой; требуетъ отбненія въ противномъ случаѣ его листья страдаютъ; размножается дѣленіемъ корневища, причемъ остерегаются повредить мясистые корни.

Виды: **A. variegata**, съ расписными листьями. *Plectoginia*

A. elatior и **A. larida**—оранжерейныя растенія.

197. **Aspidium.** Тепличное растеніе, изъ семейства Папоротниковъ. Этотъ родъ растений принадлежитъ къ тайнобрачнымъ: они не производятъ цвѣтовъ и сѣменъ, вмѣсто которыхъ образуютъ на нижней сторонѣ листьевъ, такъ называемыя споры, въ видѣ крупинокъ.

Относительно культуры вообще Папоротниковъ, должно сказать что они хорошо растутъ въ одномъ помѣщеніи съ орхидеями и почти при тѣхъ же условіяхъ. Папоротники любятъ влажность и теплоту, при достаточномъ затѣненіи лѣтомъ и зимою температуру отъ 10 до 12° R.; землю требуютъ легкую: листовую или торфяную съ пескомъ и легкою дерновою землею. Древесные папоротники нуждаются въ болѣе плотной землѣ, т. е. въ означенной смѣси, чтобы было больше дерновой. Хотя папоротники и любятъ влажный воздухъ, но поливка ихъ не должна быть слишкомъ сильна, и ее лучше замѣнять частымъ опрыскиваніемъ листьевъ, исключая тѣхъ видовъ, листья которыхъ покрыты серебристымъ и золотистымъ нал-

томъ, и которыхъ не слѣдуетъ опрыскивать, а надлежитъ ставить ближе къ свѣту.

Виды: *A. filix mas.* Мужской папоротникъ. Корневище употребляется какъ лекарство противъ Солитера и глистовъ.

A. proliferum Принадлежитъ къ живородящимъ растеніямъ, образуя на поверхности листьевъ молодыя растенія.

A. cordifolium. *A. macrophyllum.*

198. *Asplenium.* Тепличное растеніе, изъ семейства Папоротниковъ, требуетъ той же культуры что и *Aspidium.*

Виды: *A. marinum* Tompsoneae. Образуетъ густой снопъ темнозеленыхъ, кожистыхъ вай.

A. schizodon. Оранжевый папоротникъ, имѣетъ гладкія, кожистыя, широко-овальныя, сверху зубчатая вай.

A. ruta muraria. Каменная рута. Имѣетъ лекарственныя свойства. Къ числу живородящихъ, образующихъ на поверхности листьевъ молодыя растенія, принадлежатъ: *A. bulbiferum,* *A. fucoidum.* *A. viviparum.*

Въ нашихъ лѣсахъ дико произрастаютъ: *A. Septentrional.* Костянецъ *A. trichomanes.* Росока каменная.

A. filix femina. Папороть боровой. Дикорастущее съ удивительно красивымъ разбѣгомъ листьевъ.

199. *Asolepias incarnata.* Многолѣтнее растеніе съ красными цвѣтами; зимуетъ въ грунтѣ безъ покрывки.

200. *Assa foetida.* (*Narthex assa-foetida*). Лекарственное растеніе съ красивыми, желтыми цвѣтами, достигаетъ 3 аршинъ вышины, боится мороза, а потому зимою содержитсяъ въ оранжереѣ, а на лѣто высаживается въ грунтъ.

Размножается посѣвомъ осенью.

201. *Astelia Bancsii.* Оранжевое растеніе.

202. *Aster.* Астра. (*Collistephus chinensis.* *Aster chinensis*). Изъ семейства *Synanthereae.* *Compositae.*

Бываетъ многолѣтнее и однолѣтнее растеніе. Цвѣты всѣмъ извѣстныя, простые или махровыя; разныхъ цвѣтовъ; даютъ взятокъ пчеламъ. Получили названіе отъ слова «aster» — звезда, по сходству съ нею цвѣтка.

Астра, вывезенная во Францію изъ Китая, въ 1728 году, имѣла бѣлый цвѣтокъ съ желтою серединою и по сходству

съ Маргариткою, была названа Царскою Маргариткою—**Reines Margerites**. Культурой астръ, развившейся особенно съ 1830 года, во Франціи, достигнуто, что растеніе это, по разнообразію и красотѣ, сдѣлалось не только украшеніемъ нашихъ садовъ, особенно осенью, но и комнатъ, такъ какъ оно, будучи передъ наступленіемъ морозовъ высажено изъ грунта въ горшки, еще долго цвѣтетъ въ комнатахъ. Астры выводятъ въ парникахъ и въ Маѣ высаживаютъ въ грунтъ, въ хорошую садовую землю, гдѣ-нибудь въ незамѣтномъ мѣстѣ сада. Въ Августѣ, когда лѣтники отцвѣтутъ, обнажая клумбы, Астры осторожно, съ комомъ пересаживаютъ на мѣсто отцвѣтшихъ лѣтниковъ и сильно поливаютъ, затѣмъ онѣ сильно разовьются и процвѣтутъ до морозовъ.

Вообще Астра любитъ сильную землю и во время самаго сильнаго развитія своего — поливки нѣсколько разъ жидкимъ удобреніемъ.

По рисунку цвѣтковъ Астры раздѣляются на:

1) *Трубчатая* или *перистая*. У этихъ Астръ цвѣтъ середины одинаковъ съ лучевыми цвѣтами. При болѣе или менѣе шарообразной формѣ всего цвѣтка, Астры называются *шаровидными*, а при болѣе плоской формѣ — *бархатистыми* или *анемоновидными*; но если окраска середины отлична отъ окраски лучевыхъ цвѣтковъ, то ихъ называютъ *Коммовыми* Астрами, *вѣнечными*, *кокардовыми* и *вѣнечными* *Анемоновыми*.

Часто середина Астры имѣетъ одинъ цвѣтъ и другой—ближе къ окраинѣ; при этомъ если окружность Астры имѣетъ особый цвѣтъ, то вся Астра представляется трехцвѣтною.

2) *Ленточная* Астры или *турецкія* и *кудрявая*, имѣютъ середину цвѣтка лентообразную, похожую на лучевую. Оба эти отдѣла Астръ произвели множество разнообразныхъ и красивыхъ сортовъ, трудами Версальскаго садовника Трюффо, въ честь котораго лучшіе сорта Астръ и названы — *Астрами Трюффо*.

Особенно замѣчательныя формы *Ленточныхъ* Астръ слѣдующія:

а) *Ленточная кудрявая* Астра, у которой самая середина имѣетъ нѣсколько желтыхъ, трубчатыхъ цвѣтковъ.

б) *Пеоновидная* или *Трюффо*, съ большими цвѣточными головками, съ цвѣтками, сидящими рыхло и оканчивающимися двойнымъ, двузубчатымъ язычковымъ лепесткомъ.

в) *Хризантемовидныя*, похожи на предыдущія, но имѣющія цвѣточныя головки меньше и цвѣтки длиннѣе, вслѣдствіе чего онѣ болѣе шарообразны.

г) *Ранункулевидныя* или *черепитчатая*, съ малыми цвѣточными головками, имѣющими едва $1\frac{1}{4}$ дюйма въ поперечникѣ, съ цвѣточными листиками, расположенными похоже на черепичную кровлю; эти Астры мало эффектны въ группахъ, но красивы будучи посажены въ одиночку и весьма пригодны для букетовъ.

По росту Астры раздѣляются: на *высокія* и *низкія* или *карликовыя*. Кромѣ того, тѣ сорта, у которыхъ всѣ цвѣточныя головки вырастаютъ на одной вышинѣ, называются *букетными*, тѣ же, у которыхъ цвѣточныя головки расположены пирамидально — *пирамидальными*.

Растеніе это, раздѣленное на группы, по формѣ и развитію цвѣтковъ, а также по росту, заключаетъ въ себѣ сорта, которые имѣютъ особыя названія, а именно:

а) ВЫСОКОРОСЛЫЯ.

1) *Шаровидныя, пирамидальныя Астры*, имѣютъ трубчатые цвѣтки, шаровидную головку и пирамидальное расположеніе всѣхъ цвѣточныхъ головокъ.

2) *Анемоновидныя, шаровидныя Астры*, отличаются отъ предыдущихъ только плоскими головками.

3) *Пеоновидныя, пирамидальныя Астры Трюффо*, представляютъ пеоновидныя цвѣтки и пирамидальный ростъ.

4) *Усовершенствованная, пирамидальная Астра Трюффо*, цвѣтки, какъ у Хризантемы, ростъ пирамидальный.

5) *Помпонъ Трюффо*. Цвѣтки какъ у Ранункула, расположеніе букетное.

6) *Великанская, Императорская Астра*. Имѣетъ очень большія цвѣточныя головки, пеоновидное строеніе, букетное расположеніе.

7) *Ранункулевидная, пирамидальная Астра*, отличается отъ предыдущей пирамидальнымъ ростомъ.

б) НИЗКОРОСЛЫЯ.

I. *Анемоновидныя, пирамидальныя, Карликовыя Астры.* Маленькія цвѣточныя головки, строеніемъ похожи на анемоны, но расположены пирамидой.

II. *Букетная, Карликовая, пирамидальная Астра.* Строение напоминаетъ пѣонъ; низкая, букетная.

Къ нимъ принадлежать: *Астра Гумбольдта, Астра Шекспира* и *Астра Болле.*

III. *Низкая Хризантемовидная Астра Трюффо.* Похожа на обыкновенную Карликовую Астру; имѣетъ большія цвѣточныя головки, цвѣты расположены какъ у Хризантемы.

Другіе виды: *Aster tenellus.* Однолѣтнее, цвѣточное, пригодное для бордюровъ растение, высѣвается прямо въ грунтъ. Цвѣтокъ свѣтло-синій, распускается въ Іюнѣ.

A. sikkimensis, съ сѣро-голубыми цвѣтами.

A. tonocetifolia. Однолѣтнее растение съ голубыми цвѣтами, вышиною въ футъ. Въ цвѣтникъ сажается на солнечную сторону, въ рыхлую, песчаную, но не свѣже унавоженную почву.

A. amella. *Волыны очи.* *Вирлиева Астра.* Многолѣтнее садовое растение.

Разновидности его: *A. alpina.* *A. альпійская.* *A. altissimus.* *A. высочайшая.*

A. amygdalina. *A. миндалелистная.*

A. multiflora. *A. болотная.*

A. novae Angliae. *A. ново-англійская.*

A. umbellata. *A. вѣнечная.*

A. argophylla. Оранжевое растение, изъ Новой Голландіи, съ душистыми цвѣтами.

203. *Astilbe rivularis.* Изъ семейства *Saxifragaceae.* Многолѣтнее садовое растение, вынимается на зиму и содержится въ оранжереѣ или подвалѣ.

Другой видъ: *A. rubra,* розовый цвѣтокъ—султаномъ.

204. *Astragalus.* *Астрагалъ.* *Кошачій горохъ.* *Мышій горохъ.* Изъ семейства *papilionaceae.* Дикоростущее травянистое растение. Виды: *A. boëticus.* *Шведскій кобе.* *A. cicer.* *Хлопуницы.*

A. tragacantha, употребляется на лекарство и даетъ камедь, также какъ и *A. verus*. *A. diffusus* Villd. *Мышій чай*. *A. fruticosus*. *Розга*.

A. glycyphyllos. *Петровъ крестъ*.

A. physocarpus. *Чилимашная трава*.

A. alopecuroides и *A. galegiformis*. Оба—многолѣтнія, садовыя, грунтовыя растенія.

A. excarpus. *A. безствольный*. Корень употребляется вмѣсто салсапарилля.

205. *Astrantia major*. *Царскій корень*. Многолѣтнее растеніе, съ красными, похожими на звѣзду, цвѣтами; зимуетъ въ грунтѣ безъ покрывки. Другой видъ: *A. minor*, съ бѣлыми цвѣтами.

206. *Astrapoea*. *Астрапея*. Африканское дерево, съ большими, пушистыми, сердцевидными листьями и бѣлыми или красно-розовыми, красивыми цвѣтами, расположенными букетомъ. Зимой Астрапея роняетъ листь, тогда ее надлежитъ держать сухо. Размножается черенками и отводками. Воспитывается въ теплицѣ, но ее можно держать и въ комнатѣ, гдѣ ставится на юго-востокъ и юго-западъ. Требуешь землю, составленную изъ смѣси дерновой съ листовною, къ которой примѣшивается четвертая часть песку.

Виды: *A. Wallichii*. Съ карминовыми цвѣтами, распускается въ Январѣ и цвѣтетъ до Марта. *A. mollis*.

207. *Astrocaryum*. Родъ пальмъ. Американское растеніе, любитъ влажныя, болотистыя мѣста; покрыто черными, длинными колючками. Нѣкоторые виды вовсе не имѣютъ ствола, а стволъ другихъ видовъ, достигаетъ 60 футъ. Желтоватыя цвѣты имѣютъ видъ кисти. Размножается сѣменами. Растеніе тепличное, но можетъ содержаться въ комнатѣ, причемъ ставится на югъ и юго-западъ. Уходъ за этимъ растеніемъ тотъ же, что и за пальмою Арека.

Виды: *A. auri*. Бразильская пальма; изъ ея колючихъ плодовъ добывается масло.

A. vulgare. Изъ ней выдѣлываются превосходныя, упругія и крѣпкія веревки.

A. murmurum. *A. mexicanum*. *A. rostratum*. *A. aculeatum*. *A. acaule*—безъ ствола.

208. *Astrocoma splendens*. Изъ семейства *Epracrideae*. Оранжевое растение, съ красными цвѣтами. Требуется земля, составленную изъ $\frac{2}{3}$ вересковой и $\frac{1}{3}$ песку, лиственной земли и чернозему. Въ горшкѣ долженъ быть сдѣланъ хорошій водостокъ; зимою поливается умеренно; лѣтомъ, будучи выставлено на воздухъ, предохраняется отъ дождя. Размножается сѣменами.

209. *Asystasia violacea*. Тепличное растение; даетъ фіолетовые цвѣты, съ бѣлыми полосами. Любитъ тучную землю и сильную поливку, лѣтомъ. Размножается черенками, которые держатъ подъ стекляннымъ колпакомъ. Лѣтомъ растение это можно выставлять на воздухъ, въ мѣсто, защищенное съ сѣвера.

Другіе виды: *A. chelonioides*. Низенькій тепличный кустарникъ, съ четырехграннымъ стеблемъ, съ метелкою красно-пурпуровыхъ цвѣтовъ, окаймленныхъ бѣлымъ. *A. caramandeliana*. Цвѣты темно-лиловые.

210. *Attacia cristata*. Тепличное растение требуетъ такой же культуры, какъ и *Arisaema*. Цвѣты его представляютъ пониклые зонтики, съ пурпуровыми краями и длинными нитями.

211. *Athanasia annua*. Однолѣтнее цвѣточное растение, высѣвается прямо въ грунтъ. Желтый цвѣтокъ его распускается въ Августѣ и держится весьма долго.

212. *Athyrium goringianum*. Изъ семейства папоротниковъ, содержится въ оранжереѣ.

213. *Atragene alpina*. Княжскъ. Дикій хмѣль. Сибирскій ломоносъ. Имѣетъ стебель, слегка вьющійся, достигающій въ грунтъ одного фута.

Многолѣтнее садовое растение, съ синеватыми цвѣтами; любитъ глинисто-дерновую землю; на зиму прикрывается листомъ или мхомъ.

Другіе виды: *A. alpina ochotensis*. Охотскій княжскъ, съ желтыми цвѣтами.

A. alpina sibirica. Сибирскій княжскъ. Съ желтоватыми и бѣлыми цвѣтами.

A. alpina lilacina. Лиловый Княжскъ, съ лиловыми цвѣтами.

A. alpina albida. *К. белый.* Цвѣты бѣлые, съ лиловымъ низомъ.

A. platysepale. *Кукушкины нитки.* Дико растетъ на Амурѣ.

214. Atriplex. *Лебеда.* Изъ семейства *Chenopadiaceae*. Дикорастущая сорная трава.

Виды: **A. hortensis.** *Лебеда.* Однолѣтнее растеніе, разводимое какъ, овощъ замѣняющая шпинатъ; сѣется или осенью— для весенняго употребленія, или весною— для лѣтняго.

A. purpurea. Разновидность предыдущаго растенія, съ красными стеблями и листьями; представляетъ собою декоративное растеніе, вышиною отъ 4 до 5 футовъ, требующее хорошей земли. Названіе растенія произошло отъ темнаго цвѣта его листьевъ (*ater*—*черный*).

A. rosea. *Катунь.* Однолѣтнее цвѣточное растеніе, высѣваемое прямо въ грунтъ; розовый цвѣтокъ его распускается въ Іюнь.

215. Atropa belladona. *Одурихъ ядовитый. Сонная трава.* Дикорастущее, ядовитое растеніе, разводимое на сухихъ и открытыхъ мѣстахъ, какъ имѣющее лекарственное свойство. Получило названіе отъ имени одной изъ трехъ парей, обрѣзывавшей нить жизни—намекъ на ядовитость растенія.

Другой видъ: **A. urens.** Оранжевое растеніе.

216. Attacia integrifolia. Изъ семейства *Taccaceae*. Тепличное растеніе, имѣетъ красиво расписанный листъ и необыкновеннаго вида цвѣты. Любитъ влажный воздухъ и достаточную поливку. Размножается отдѣленіемъ отпрысковъ.

217. Attalea. Родъ Пальмъ. Весьма красивое, можно сказать, великолѣпнѣйшее американское растеніе съ перистыми листьями, имѣющими не горизонтальное, какъ у другихъ, а вертикальное направленіе; стебель нѣсколько отдѣляющійся отъ поверхности земли множествомъ тонкихъ корней. Размножается сѣменами. Растеніе тепличное, но растетъ и въ комнатѣ, причѣмъ ставится на югъ и юго-западъ. (Уходъ тотже, что и за Пальмой Арекой). Имѣетъ болѣе 20 видовъ; изъ нихъ особенно замѣчательны: **A. excelsa.** Изъ плодовъ его добывается масло.

A. funifera даетъ волокно, извѣстное подъ именемъ, «*Пиассаба*».

A. cohune даетъ масло, также какъ и **A. compta**.

- 218. Aubrietia deltoidea fol. varieg.** Очень красивое, зимующее въ грунтѣ растеніе, съ пурпурово-фіолетовыми цвѣтами. Во влажной землѣ и на затѣненномъ мѣстѣ, цвѣтетъ съ Апрѣля по Іюль.

Другой видъ: **A. deltoidea graeca**. *Греческая дельтовидная обриетія*. Многолѣтнее растеніе, съ колосьями фіолетовыхъ цвѣтовъ; растетъ въ грунтѣ, но на зиму плотно укрывается, впрочемъ, несмотря на эту мѣру, въ безснѣжныя зимы, очень страдаетъ отъ морозовъ, по этому ее зимою лучше держать въ горшкѣ, въ оранжереѣ. Любитъ глинистую, рыхлую, смѣшанную съ хорошо перепрѣвшимъ перегноемъ, землю; размножается сѣменами и дѣленіемъ корней.

- 219. Aucuba. Акуба.** (Японское названіе). *Золотое дерево*. Изъ семейства **Coryaceae**. Красивое, кустовое растеніе, съ заостренными, зубчатыми листьями, испещренными, желтыми узорами. Даетъ маленькіе, бурные цвѣты. Размножается черенками. Требуется почва, составленную изъ трехъ равныхъ частей земли: вересковой, лиственной и дерновой. Авкуба, растеніе оранжерейное, но можетъ содержаться въ комнатѣ, гдѣ идетъ лучше, если поставлено къ окну, на юго-востокъ.

Виды: *Акуба японская*, съ маленькими, темно-каштановыми цвѣтами, большими, испятнанными листьями и гроздіями пунцовыхъ ягодъ.

A. гималайская, съ красными цвѣтами и ярко-краснымъ плодомъ.

A. angustifolia. A. aurea. A. dentata. A. hermaphrodita. A. longifolia maculata. A. variegata. A. sulphurea. A. maculata mas. Но лучший видъ Авкубы, это **A. bicolor elegans**, съ листьями, покрытыми желто-красными пятнами.

- 220. Avena Sativa. Овесъ.** Однолѣтнее растеніе, высѣваемое весною, для полученія зерна, употребляемаго въ пищу для людей и скота.

Виды: **A. pubescens. Овесъ заячій.** Дикорастущее.

A. fatua. Висюгъ. Живой овесъ. Тоже.

221. Averhoa bilimbe. Оранжевое растение; разводится и въ парникахъ для плодовъ, употребляемыхъ въ пищу, и имѣющихъ кисловатый вкусъ.

222. Azalea indica. *Индійская азалея.* Изъ семейства **Ericaceae**. Кустовое растение, съ маленькими листиками, покрытыми тонкими волосками. Цвѣты бѣлые, розовые, малиновые, красноватые, желтые, оранжевые и съ разноцвѣтными полосками. Цвѣты бываютъ простые и махровые. Въ Мартѣ и Апрѣлѣ кусты покрываются множествомъ цвѣтовъ. Размножается сѣменами, прививкою и черенками въ Іюнѣ, когда еще растение не остановило роста; на черенки употребляютъ концы вѣтокъ, еще не одревѣвшихъ, которыя держатъ подъ колпакомъ. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересково-песчанистой. Землю часто перемѣняютъ, но большаго горшка растение не требуетъ, только его необходимо мѣнять, когда корни оплетутъ дно. Растение оранжевое, въ комнатѣ ставится на юго-востокъ, но все-таки идетъ тамъ очень трудно! Въ Іюнѣ выставляется на воздухъ, въ нѣсколько затѣненное мѣсто, но доступное солнечнымъ лучамъ, (въ противномъ случаѣ, Азалея сильно идетъ въ листъ и не дѣлаетъ бутоновъ), и вкапывается съ горшкомъ въ землю. Лѣтомъ достаточно поливается подъ корень и опрыскивается сверху, вечеромъ, особенно въ жары и во все время роста. Когда же усмотрятъ, что ростъ прекращается, поливку Азелей уменьшаютъ и во все время покоя, землю держать въ самой умеренной влажности, и даже, на нѣкоторое время передъ пристановкою, вовсе прекращаютъ поливку. Въ Сентябрѣ Азалею вынимаютъ изъ земли, обмываютъ и очищаютъ горшокъ и вносятъ въ оранжерею, гдѣ держатъ при большемъ доступѣ воздуха (при всякой возможности, открывая форточки), въ температурѣ, не выше 6° Р. Пересаживаютъ Азалею и обрѣзываютъ ее, чтобы дать ей хорошую форму, тотчасъ послѣ того, какъ она отцвѣтетъ.

Въ продажѣ имѣется множество разновидностей Азалеи, введенныхъ посредствомъ посѣва сѣменъ, напримѣръ:

а) ЦВѢТЫ ОДИНОКІЕ:

- Adelina**—мѣдно-красная.
Admiration, бѣлая, съ малиновыми полосами.
Alba и **Armida**—бѣлая.
Александръ II—бѣлая, съ розовыми полосками.
Andreas Hofer—шарлаховая.
Баронесса Пикъ—розовая, съ бѣлыми полосками.
Belle de Mayence—розовая, съ большимъ цвѣткомъ.
Caryophylloides—бѣлая, испещренная.
A. indica exquisita—съ розовыми цвѣтами.
Etenbart de Flandre—испещренная, красная.
Gloire de Belgique—тоже.
Cedo nulli—розово-фіолетовая.
Duc Adolph de Nassau—тоже.
Criterion—розовая, съ бѣлою каймою.
Coccinea—красная.
Dieu donné Spaie—розово-мѣдно-красная съ бѣлымъ.
Distinction—грязновато-розовая, съ блѣдными краями.
Duchesse Adelaide de Nassau—кирпично-красно-лиловая.
Friedrich von Schiller—кармозинная.
Gloire de Riga, огромный бѣлый цвѣтокъ, слегка разрисованный краснымъ.
Irène—бѣлая, слегка разрисованная краснымъ.
Jag. Van. Artevelde—розовая, струйчатая, съ бѣлыми краями.
Juno—бѣлая, съ розовыми струйками.
Liebig's superba, большой, кармозинно-амарантовый цвѣтокъ.
Loreley—бѣлая, съ кармозинными струйками.
M-me Camille van Langenhove—бѣлая, испещренная карминовымъ.
M-me Verschaffelt—розовая и по бѣлому фону красныя струйки.
President Amb. Verschaffelt—оранжевая.
President Clalyes—розовая съ бѣлымъ.
President van der Hecke—бѣлая, съ ярко-красными жилками.

Princesse Alice—бѣлая.

Queen of whites—тоже.

Reines des blanches—тоже.

Punctulata—бѣлая, испещренная пунцовымъ.

P. variegata—розовая, испещренная пурпуровымъ, съ бѣлыми краями.

P. omnicolor—бѣлая, испещренная розовымъ и шарлаховымъ.

Rachel v. Varnhagen—блестяще-розовая.

Recurvata—кармино-мѣдно-розовая.

Reine de beautés—розовая, отороченная бѣлымъ.

Reine des panachées—бѣлая, испещренная краснымъ.

Roi Leopold—большой, кирпично-шарлаховый цвѣтокъ.

Rosea elegans—розовая.

Souvenir de Mieliez—пунцово-оранжевая.

Teutonia—большой, ярко-красный цвѣтокъ.

Triomphe de Ledeborg—красно-оранжевая.

Vicomte Vigier—кирпично-ярко-красная.

ПОЛУМАХРОВЫЯ.

Comte Haynaut—розово-кирпичная.

Cristalina—тоже.

Comtesse de Haynaut—бѣлая съ розовымъ.

Dante—карминовая.

Генералъ Тотлебенъ—шарлахово-кирпично-красная.

Hermann Seidel—блестящая, карминовая.

Leopold I—ярко-мѣдно-розовая.

Lion de Flandre—свѣтло-кирпично-розовая.

M-me Wagner—свѣтло-вишневая.

M-lle-Marie van Houtt—бѣлая испещренная розовымъ.

Rhenaniana—большой, розово-вишневый цвѣтокъ.

W. Bull—красно-кармино-лиловая.

МАХРОВЫЯ.

Адолфъ—лиловая съ пятнами.

August Borsig—бѣлая.

Bernhard Andreae—ярко-розовая.

Elfriede—кармазино-лиловая.

Empereur de Russie—пурпурная.

Francois de Vas—тоже.

Erbprinz Ludwig—красно-лиловая.

В. Князь Михаилъ—прекраснаго, ярко-розоваго цвѣта.

Вел. Герцогъ Баденскій—кирпично-красная.

Leonora—лилово-розовая.

Pauline Mardener—нѣжно-розовая.

Pulcheria—розово-лиловая.

Quentin Durward—блестяще-розовая.

Reine des doubles—свѣтло-розовая.

Roi des doubles—ярко-красная.

Souvenir de prins Albert—вишневая съ бѣлымъ.

Азалеи употребляются для ранней выгонки. Изъ сбрасывающихъ листья, особенно для этого пригодны **Azalea pontica**. *Одурь. Понтійская азалея*. Съ душистыми, желтыми или оранжевыми цвѣтами (изъ цвѣтовъ ея пчелы добываютъ ядовитый медъ). **A. nudiflora**, **A. caleendulacea**, а для болѣе поздней выгонки **A. glauca** и **A. viscosa**, съ красными, розовыми или бѣлыми, душистыми цвѣтами.

Азалеи требуютъ частаго опрыскиванія, чтобы свободнѣе отдѣлялось клейкое вещество, покрывающее ихъ цвѣточные почки. Чтобы заставить вѣчно зеленныя Индѣйскія азалеи цвѣсти ранѣе обыкновеннаго, ранніе сорта ихъ, на которыхъ уже обнаружались цвѣточные почки, въ Октябрѣ ставятся въ теплицу, гдѣ держится тепла до 15° Р. Если таковая Азалея станетъ давать побѣги, то ихъ срѣзываютъ. Растеніе, которое такимъ образомъ будетъ вынуждено нѣсколько лѣтъ сряду цвѣсть ранѣе обыкновеннаго, привыкаетъ къ этому и потомъ уже цвѣтетъ рано, безъ всякой искусственной гонки. Изъ этого рода Азелей, наиболѣе пригодны для ранней выгонки: **A. narcissiflora plena**, съ бѣлыми, махровыми цвѣтами; **A. vitala punctata**, съ большими, бѣлыми, испещренными красными цвѣтами; **Latour d'Auvergne**—бѣлая; **multiflora**, съ маленькими, свѣтло-пурпуровыми цвѣтами; **Baron Hugel**—махровая, ярко-карминовая; **A. Grenvillii**—съ кармазиновыми цвѣтами; **Loise Margottin**—бѣлая, съ красными полосками; **Pauline Mardner**—розовая, махровая; **President Humann**—

розовая, съ коричневыми полосками; **Romeo** — съ большими коричнево-карминовыми цвѣтами.

Вообще Азалеямъ вредить насѣкомое **Thrips**, отъ котораго ихъ тщательно надлежитъ очищать, обмывая растеніе; оно гибнетъ также отъ загниванія или пересушки корней. Въ первомъ случаѣ растеніе надлежитъ перестать поливать, пересадить его и на нѣкоторое время поставить въ тѣнь, во второмъ случаѣ, отнюдь не поливають, или оно погибнетъ, но его пересаживаютъ въ свѣжую землю и нѣсколько обрѣзываютъ. Въ случаѣ если Азалею содержатъ очень тепло, на нее нападаетъ красный паучекъ (**Acarus**), отъ котораго спасаютъ растеніе обмываніемъ.

223. Basekea virgata. Оранжевое растеніе.

224. Bactris. Родъ Пальмъ. Тепличное, Южно Американское, колючее растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ. Стебель и черешки листьевъ усажены длинными, черными, блестящими колючками; корень даетъ нѣсколько стволовъ, которые и употребляются на трости или палки, (отчего растеніе и получило свое названіе: **abktron**—палка). Цвѣты имѣютъ пріятный запахъ. Размножается сѣменами. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей, листовенной, дерновой и песку. Вообще очень нѣжное растеніе и для полного развитія требуетъ высокой температуры.

Виды: **B. acanthocarpa.** **B. caracasana.** **B. major.** **B. caryotoefolia.** **B. culsa.** **B. gracilis.** **B. baculifera.** **B. setosa.** **B. latifolia.**

225. Baebotrya trichotoma. Тепличное растеніе.

226. Balantium antarcticum. Древковатый піонъ, изъ Новой Голландіи.

227. Ballota nigra. Чернокудрешникъ. Глухая крапива. Дикорастущее, издаетъ противный запахъ, отчего и получило свое названіе: (**ballo**—отталкивать).

Другой видъ: **B. nigra fol. variegatis.** Дикорастущее, многолѣтнее, выносящее въ грунтъ зиму растеніе, съ лиловыми цвѣтами, разводится въ цвѣтникахъ за бѣло-узорчатые листья.

228. Bambusa. *Бамбука*. Оранжерейное, азіатское, травянистое растеніе, съ деревянистымъ стеблемъ. Размножается отростками; зимою часто сбрасываетъ листья. Требуется земля; составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой; можетъ расти и въ комнатѣ. Въ отечествѣ своемъ употребляется на выдѣлку тростей, на постройку и тому подобное.

Виды: **V. Metane.** *Бамбука Японскій*. Невысокое растеніе требуетъ большой влажности **V. fortunea fol. variegatis.** *Китайскій пестролистный бамбука*. Достигаетъ фута вышины; служить для бордюра вокругъ болѣе высокихъ листовыхъ растений. Позднею осенью стебли его идутъ въ букеты. При надежной покрывкѣ можетъ зимовать въ грунтѣ. **V. reticulata.** Можетъ содержаться и въ теплицѣ.

V. nigra. **V. microphylla.** **V. glaucescens.** **V. arundinacea.**

229. Banisteria. Комнатное, вьющееся, очень красивое кустовое растеніе, съ маленькими цвѣтами; размножается черенками и отводками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей вересковой, дерновой и лиственной.

Виды: **V. splendens.** **V. tomentosa.** **V. chrysophylla.**

230. Banksia. Изъ семейства **Proteaceae.** Красивое деревцо, можетъ выносить комнатную культуру, хотя вообще выводится съ большимъ трудомъ. Листья имѣютъ пилообразную форму. Цвѣты бываютъ алые, малиновые, желтоватые или темные. Размножается преимущественно сѣменами. Зимою требуетъ умеренной поливки, но также можетъ погибнуть и отъ излишней сухости. Требуется земля преимущественно вересковую, съ прибавкою незначительной части лиственной и дерновой. Можетъ быть подвергнуто ранней выгонкѣ, въ оранжереѣ, причемъ цвѣтеть, съ Февраля, почти всю зиму.

Виды: **V. aemula,** **V. speciosa.** **V. serrata.** **V. prostrata.** и **V. occidentalis.** Оранжерейное растеніе съ большимъ малиновымъ цвѣткомъ.

231. Baptisa leucophoea. Многолѣтнее грунтовое растеніе изъ С. Америки, съ большими, бѣлыми, красивыми цвѣтами.

232. Barbacenia. Изъ семейства **Vellocicae.** Очень красивое, американское, корневое, травянистое, тепличное растеніе, мо-

жетъ существовать и въ комнатѣ съ красными, малиновыми или розовыми цвѣтами въ видѣ лиліи. Листья похожи на листья Агавы или Юкки, но только въ уменьшенномъ видѣ.

Барбаценія разводится сѣменами, отростками и черенками; зимою поливается весьма умѣренно; требуетъ землю листовенную пополамъ съ вересковою.

Виды: *B. purpurea*. Съ темно-фіолетовыми цвѣтами.

B. squammata. Цвѣты искрасна-оранжевые. Содержится въ теплицѣ съ Ноября до Апрѣля. Растеніе это помѣщается въ сосудѣ, какъ Орхидея, такъ, чтобы его сухіе и волосистые корни, могли свободно распространяться въ смѣси легкой земли, древесныхъ гнилушекъ и кусковъ кирпича; не терпитъ сырости, а потому требуетъ умѣренной и осторожной поливки. Размножается отдѣленіемъ молодыхъ побѣговъ, которые выдерживаютъ подъ стекляннымъ колпакомъ, въ теплѣ. Также размножается сѣменами, которые высѣваются въ сосудъ съ бѣлымъ пескомъ, насыпаннымъ на грубый гравій, чтобы почва имѣла хорошій дренажъ, покрывается стекломъ и содержится погруженнымъ въ песокъ жаркой теплички. Когда растеніе взойдетъ и дастъ шестой листокъ, его тотчасъ высаживаютъ въ отдѣльный горшокъ.

B. Coccinea.

233. *Barbarea vulgaris*. Сурѣница. Дикорастущее.

Виды: *B. stricta*. Нарыжная. Тоже *B. vulgaris fol. variegatis*. Зимующее въ грунту, многолѣтнее растеніе, съ золотисто-желтыми цвѣтами, разводится въ цвѣтникахъ за желто-узорчатые листья.

234. *Barleria prionitis*. Тепличное растеніе изъ Индіи, имѣетъ лекарственныя свойства.

235. *Barkeria*. Очень красивая, долго цвѣтущая, тепличная Орхидея, съ розовыми или бѣлыми съ лиловымъ цвѣтами, можетъ выносить комнатную культуру. Размножается дѣленіемъ стеблей; требуетъ листовенную землю съ примѣсью части вересковой; сажается на кускѣ древеснаго угля.

Виды: *B. elegans*. Цвѣты розовые, нижняя губа бѣлая въ оранжевыхъ крапинахъ, съ малиновымъ пятномъ.

B. Skinnerii. Цвѣтокъ розовый; нижняя часть губы испещ-

рена по блѣдно-желтой полосѣ, черными точками. Не требуетъ никакой отличной культуры отъ культуры другихъ Орхидей, кромѣ сильнаго тепла въ періодъ роста и преимущественно цвѣтенія, причемъ затѣняется отъ солнечныхъ лучей. Опрыскивается по нѣскольку разъ въ день, во время же покоя содержится почти сухо.

B. Spectabilis. B. Lindleyana.

236. Barkhausia lucida. Оранжевое растение.

237. Barringtonia speciosa. Изъ семейства **Myrtaceae**. Тепличное растение. Культура тропическихъ миртъ. Даетъ весьма большой розовый цвѣтокъ стоячею кистью.

Другой видъ: **B. racemosa**. Цвѣты малиновые съ желтыми тычинками.

238. Bartonia aurea. Однолѣтнее, вьющееся, садовое и вмѣстѣ комнатное растение съ темно-золотистыми цвѣтами. Требуется песчанистой, удобренной земли и сухаго содержанія на солнечной сторонѣ. Въ Мартѣ высѣвается въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ.

239. Basella Brubra и asella alba. *Малабарскій шпинатъ*. Однолѣтнее тепличное растение, съ вьющимся стеблемъ и сочными листьями, употребляемыми въ пищу, какъ шпинатъ. Любитъ свѣжеудобренную, тучную землю; высѣвается въ Мартѣ, на теплыя гряды и разсаживается въ Маѣ. Для полученія сѣменъ нѣсколько кустовъ выращиваютъ въ парникѣ, гдѣ и оставляютъ до осени.

240. Beaucarmea recurvata. Тепличное растение.

241. Beaufortia decussata. Оранжевое растение съ пунцовыми цвѣтами, открытыми, преимущественно, въ Январѣ и Февралѣ.

Другой видъ: **B. splendens**.

242. Begonia. *Бегонія. Дикій Шавель. Косолистъ*. Семейство **Begoniaceae**. Тепличное, корневое, травянистое растение, съ успехомъ содержится и въ комнатѣ. Бегонія бываетъ со стеблемъ и безъ стебля; имѣетъ цвѣты оранжевые, бѣлые, розовые или

красные; листья у Бегонии бывают то лоснящиеся, то пушистые, зеленые, пестрые или темно-малиновые, съ бѣлыми или серебристыми коймами, крапинами, полосами, то бархатистые ярко-зеленые, съ темными разводами. Нижняя сторона листа бываетъ малиновая или съ красными разводами и жилками.

Размножается отростками, сѣменами въ тѣхъ случаяхъ, когда желаютъ получить новыя разновидности вслѣдствіе искусственнаго опыленія и черенками. На черенки употребляются листья: ихъ сажаютъ или цѣльные, или разрѣзанные на части, причемъ каждую сажаютъ особо. Также разстилаютъ листъ Бегонии по землѣ тепличнаго парничка и, укрѣпивъ его въ лежащемъ положеніи маленькими колышками, перерѣзываютъ въ мѣстахъ соединенія самыя крупныя жилки листа, отчего у каждаго разрѣза, образуется новое растеніице.

Бегонія требуетъ вересковую землю пополамъ съ листовеной или состоящую изъ сильнаго, хорошо перепрѣвшаго перегноя. Горшокъ, въ который сажается растеніе долженъ быть хорошо дренированъ.

Лѣтомъ Бегоніи надлежитъ держать на открытомъ воздухѣ и каждый Августъ пересаживать независимо отъ весенней пересадки.

Вообще Бегоніи любятъ теплое, затѣненное мѣсто и влажность во все время роста. Когда замѣчаютъ что растеніе перестаетъ расти, его поливку постепенно уменьшаютъ, особенно у безстебельныхъ породъ, которыя во все время покоя надо держать почти безъ воды.

Виды: *A. теряющія листъ на зиму и неимѣющія стебля Уегоніи или теряющія его:*

B. discolor. Размножается дѣленіемъ корней или посадкою угловыхъ почекъ. Идетъ въ ростъ весьма быстро. Листья этой Бегоніи очень красивы, представляя собою сѣтъ красныхъ жилокъ по зеленому полю. Корни этого растенія, какъ вообще всѣхъ видовъ, теряющихъ на зиму стебель, надо держать зимою почти сухо. Даетъ розовые цвѣты.

B. Mathei. Зимою содержится почти сухо.

B. Cinnabarina, съ огненно-красными цвѣтами, на такихъ же цвѣточныхъ стебелькахъ.

B. boliviensis. Съ превосходными, длинными, ярко-пунцовыми, похожими на фуксію, цвѣтами. На зиму теряетъ сте-

бель и тогда его содержать сухо, при 10—15° Р. Весною клубни растенія разсаживаются въ горшки и ставятъ или въ теплицу, на полку, или въ комнатѣ, къ окну. Съ наступленіемъ теплыхъ дней растеніе переносятъ въ оранжерею или вкапываютъ въ грунтъ на открытой, но защищенной мѣстности. Если растеніе оставить въ теплицѣ или комнатѣ, то оно тянется и даетъ мелкіе цвѣты.

B. Martiana. Съ розовыми цвѣтами.

B. dipetala. Съ красноватыми корнями.

B. Xanthina. Съ оранжевымъ цвѣткомъ на малиновомъ стеблѣ; листь съ малиновыми нервами.

B. Xanthina marmorea. **B. Xanthina pictifolia.**

B. Imperialis. **B. Imperialis Smaragdina.**

B. I. Im. venulosa, съ изумрудно-зелеными листьями, съ мелкою сѣтью буро-розовыхъ жилокъ.

B. Verschaffeltiana, съ красными цвѣтами.

B. octopetala. **B. rex.** **B. rex leopardinus,** съ огромными, весьма красивыми листьями съ сребристыми разводами.

B. Castaneafolia. **B. Sanguinea.**

B. Белонии, не теряющія листа.

B. manicala. Съ красными листьями и свѣтло-розовыми цвѣтами.

B. fuchsioides. Съ ярко-красными цвѣтами, опущенными въ видѣ цвѣтовъ фуксіи.

B. prestoniensis. Тоже съ большими листьями; не любитъ частой пересадки.

B. miniata. Съ красными цвѣтами.

B. pearcei. Съ желтыми цвѣтами.

B. sauntersii semperflorens. Со множествомъ ярко-красныхъ цвѣтовъ; хороша въ молодомъ возрастѣ.

B. Laperousii. Низенькая, розовая, съ бѣлыми листьями.

B. ingramii—пушистая.

B. billetteri. Съ ярко-красными цвѣтами.

B. hybrida floribunda. Сильно цвѣтущая, пушистая съ маленькими листьями. **B. Digswelliana**—Тоже. **B. incarnata.** Съ свѣтло-розовыми цвѣтами. Лѣтомъ сажается въ грунтъ.

B. coccinea—шарлаховая.

B. albo coccinea. Цвѣты на красивыхъ стебляхъ, покрытыхъ волосками, имѣетъ оригинальное расположеніе, а

именно: мужскіе цвѣтки состоятъ изъ четырехъ отдѣльныхъ частей, изъ которыхъ внѣшнія широкія, почти круглыя, пурпуровыя снаружи; бѣло-розовыя внутри, а двѣ внутреннія узкія—бѣлыя или розовыя. Женскіе цвѣточки также сформированы, но иногда имѣютъ одною частию больше. Тычинки и пестики золотисто-желтые.

B. Sedeni. Стебли красноватые; ростъ прямой, листья темно-зеленые, съ красными волосками; цвѣты яркіе, красно-коричневые.

B. muricata. Бѣлая съ красными, рукообразными листьями.

B. Semperflorens. *Бразильскій шпинатъ.* Бѣлоцвѣтная Бегонія, съ зелеными, мясистыми листьями; размножается побочными побѣгами; если разводится въ горшкахъ, то ея зелень употребляется какъ шпинатъ.

B. diversifolia. Съ ярко-красными цвѣтами. Размножается посредствомъ почко-луковицъ, появляющихся въ большемъ количествѣ осенью въ листовыхъ пазухахъ. Растеніе, исподволь приученное къ воздуху, въ Маѣ высаживается въ грунтъ.

B. bulbilifera. Съ цвѣтами тѣлеснаго цвѣта.

B. monoptera. Съ бѣлыми цвѣтами.

B. criniata. Съ нѣжно розовыми цвѣтами. Замѣчательно многочисленными волосками, покрывающими ее какъ бы щетиною.

B. aenea. Многолѣтнее растеніе. Стебель темно-пурпуровый съ красными крапинами. Большіе, бронзово-красные листья, снизу фіолетово-пурпуровые края ихъ, жилки и черешки покрыты длинными, сребристыми волосками.

B. carminata. Цвѣты блѣдно-розовые, листья покрыты красно-бурыми пятнышками.

Оранжевые виды: **B. chelsoni.** Съ ярко-оранжевыми, крупными, пониклыми цвѣтами.

B. Richardsiana. Съ бѣлыми цвѣтами и глубоко разрѣзанными листьями. **B. intermedia.**

Кромѣ называемыхъ Бегоній, въ торговлѣ извѣстно множество прекрасныхъ разновидностей, полученныхъ путемъ перекрестнаго опыленія.

243. Bejaria (befaria) ledifolia. Оранжевый кустарникъ, съ малиновыми листьями и пурпуровыми цвѣтами. Любитъ верес-

ковую землю. Лѣтомъ держать на воздухѣ. Размножается черенками въ Іюнѣ или Іюлѣ.

244. *Bellis perennis*. *Маргаритка*. Изъ семейства *Synanthreae*. Многолѣтнее, корневое, травянистое растеніе. Разводится въ грунтѣ, но можетъ содержаться и въ комнатѣ. Размножается сѣменами и дѣленіемъ корней. Даетъ бѣлые, розовые, малиновые и пестрые цвѣты, простые или махровые. Зимой корни Маргаритки растущей въ горшкѣ, содержатся почти сухо, но всетаки въ комнатахъ сохраняются съ большимъ трудомъ. Растеніе это любитъ землю составленную изъ равныхъ частей дерновой лиственной и песку, съ примѣсю незначительнаго количества навозной земли.

Виды: *B. hortensis*. *Маргаритка садовая*. *B. prolifera*. *M. махровая*.

Въ послѣднее время появилось множество новыхъ махровыхъ, весьма крупныхъ Маргаритокъ, бѣлыхъ въ серединѣ и лиловыхъ, розовыхъ или коричневыхъ кругомъ. Между ними замѣчательны:

Reines marguerites couronnées. *R. m. élevées* и *R. m. pyramidales*.

245. *Beloperone ciliata*. Однолѣтнее, травянистое, тепличное растеніе; распускается зимою фіолетовымъ цвѣткомъ, бѣлымъ въ серединѣ.

246. *Benthamia fragifera*. Изъ семейства *Corneae*. Оранжевый кустарникъ, на лѣто высаживается на воздухѣ.

247. *Bentinckia*. Родъ Пальмъ. Тростниковая пальма футовъ двадцати вышины.

Виды: *B. Condapanna*. *B. Renda*.

248. *Berberis*. *Барбарисъ*. Семейство *Berberideae*. Кустарникъ, разводимый въ садахъ, какъ живая изгородь и для ягодъ кислаго и нѣсколько вяжущаго вкуса, употребляемыхъ въ пищу, приготовленными въ различныхъ видахъ. На почву не прихотливо, но не любитъ болотистой. Размножается посѣвомъ осенью, отводками, дѣленіемъ корней весною и черенками.

Виды: *B. Canadensis*. *B. Канадскій*.

B. Sibirica. *B. Сибирскій*. *Кислица*.

B. Nepalensis. *Б. Непальскій.*

B. vulgaris. *Б. обыкновенный.* Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ. Медоносное растеніе. Ягоды употребляются въ пищу, а корни на окраску тканей въ желтый цвѣтъ.

B. v. fol. glaudis. **B. v. fol. purpureis.** **B. v. fol. variegatis.** **Д. v. fructu albo**—съ бѣлыми ягодами. **B. v. fructu luteo**—съ желтыми ягодами. **B. v. fructu dulce**—съ сладкими ягодами. **B. v. fructu violaceo**—съ фіолетовыми ягодами. **B. apurena**—съ ягодами безъ косточекъ.

B. Sinensis. *Б. Китайскій.*

B. Neuberti, B. Knightii и **B. monosperma**, на зиму покрываются листомъ, соломой и рогожами.

B. Maximowiczii и **B. Thunbergi**—Японскія растенія.

B. Darwini. Оранжерейное и вмѣстѣ комнатное растеніе, съ желтыми цвѣтами; при выгонкѣ въ оранжереѣ, распускается черезъ два мѣсяца послѣ пристановки.

B. aurahuacensis. На зиму вносится въ оранжерею и будетъ цвѣсть раннею весною, съ желто-оранжевыми ягодами. Размножается посѣвомъ.

B. trifoliata. Красивѣйшій видъ, вслѣдствіе особеннаго изящества его листьевъ, состоящихъ изъ трехъ частей, слегка оттѣненныхъ бѣлымъ по темно-зеленому фону и размѣра болѣе крупныхъ цвѣтовъ, чѣмъ у другихъ видовъ. Родина его Мексика. Зимой содержится въ оранжереѣ. Требуется вересковую землю и умѣренную влажность. Лѣтомъ держится въ грунту въ затѣненномъ мѣстѣ и на хорошо дренированной почвѣ, Размножается лучше всего сѣменами, но такъ какъ этотъ способъ сопряженъ съ весьма малымъ успѣхомъ, то преимущественно размножается прививкою къ другимъ породамъ.

B. nervosa. (Mahonia glumacea). Съ желтыми, душистыми цвѣтами и синими ягодами. Можетъ зимовать въ грунту, но требуетъ покрывки. Любитъ вересковую землю и хорошій дренажъ. Размножается черенками, на которые рѣжутся побѣги съ молодыхъ растений, а также разводится сѣменами, причемъ посѣвъ сохраняется въ холодѣ и темнотѣ. На другой годъ молодое растеніе высаживается въ грунтъ.

B. ilicifolia. Съ оранжевыми цвѣтами и иззубренными листьями.

B. caroliniana. B. spathulata. B. amurensis.

249. Bertoletia eselsa. Изъ семейства *Lecynthineae*. Огромное американское дерево, плоды котораго извѣстны у насъ въ торговлѣ подъ именемъ американскихъ или бразильскихъ орѣховъ. Можетъ содержаться въ комнатѣ. Размножается сѣменами и черенками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

250. Bertolonia maculata var. marmorata. Изъ семейства *Melastomaceae*. Тепличное растение, съ необыкновенно красиво-расписаннымъ листомъ и розовыми цвѣтами. Размножается сѣменами. Требуется хорошаго водостока въ горшкѣ и осторожной поливки.

Другіе виды: *B. guttata*. Розовый цвѣтокъ. Листъ съ изнанки темно-фіолетовый, а снаружи покрытъ нѣсколькими рядами розовыхъ точекъ. *B. margaritacea*. Темно-зеленый листъ, съ бѣлыми точками въ нѣсколько рядовъ.

251. Besserra. Такъ названа въ честь русскаго ботаника Бессера. Маленькое, американское, луковичное растение, изъ семейства *Liliaceae*, съ красивыми, красными цвѣтами. Можетъ содержаться и въ комнатѣ. Зимой не требуетъ поливки. Размножается отростками луковокъ; требуетъ вересковую землю, съ прибавкою половинной пропорціи лиственной и половинной песку.

Виды: *B. miniata*. Цвѣты оранжево-красные, съ синими тычинками. *B. elegans*.

252. Beta vulgaris. *Свекловица*. Корневое растение изъ семейства *Chenopodiaceae*.

Другіе виды: *Beta vulgaris rapacea*. *Свекла*. Двухлѣтнее растение, употребляемое въ пищу, въ приготовленномъ видѣ. Разводится въ грунтѣ, на открытомъ воздухѣ, но можетъ подвергаться и ранней выгонкѣ. Требуется глубоко обработанную съ осени, плодородную, нѣсколько низменную почву; не любитъ свѣжаго удобренія; сѣется мочеными въ теченіи семи дней сѣменами и обращенными въ продолженіи 6 сутокъ. Сажается на глубину $\frac{1}{2}$ вершка, другъ отъ друга вершка на 4, сѣмячка по 3 и 4 въ одну лунку, либо сѣется въ разбросъ. Въ обоихъ случаяхъ, когда свекла взойдетъ, ее продергиваютъ, оставляя на мѣстѣ по одному растеньицу; выдернутыя растеньица сажаютъ на пустыя мѣста, хотя пересаженные бываютъ хуже сѣянныхъ.

На грядѣ въ 10 сажень длины и въ 1½ аршина ширины, высѣвается въ разбросъ 4 лота сухаго сѣмени. Весь дальнѣйшій уходъ за свеклою, заключается въ тщательной поливкѣ грядъ, въ разрыхленіи земли и въ сильной поливкѣ, собственно во время засухи; что же касается до пересаженной свеклы, то она требуетъ частой поливки. Чтобы свекла была крупнѣе, то когда она уже порядочно выростетъ, обрѣзываютъ у ней нижніе листья; таковую подрѣзку можно повторять нѣсколько разъ въ лѣто. Сѣмена свеклы выводятся также какъ и рѣпныя; обыкновенно выбираютъ на сѣмена тѣ растенія, у которыхъ листья темнѣе, такъ какъ отъ этихъ сѣменъ и корни будутъ темно-красные.

Внимая изъ грунта самую мелкую свеклу, осенью сажаютъ ее въ ящики и ставятъ въ оранжерею, гдѣ листъ ея продолжаетъ расти, доставляя такъ называемый *свеколникъ*, употребляемый для приготовления ботвиньи и борща.

Въ продажѣ существуютъ сѣмена различныхъ разновидностей, лучшія:

Темно-красная, голландская.

Черно-красная, круглая.

Сладкая Бассано.

Ранняя, малая, кроваво-красная.

Мелкая, желтая, сахарная.

Beta vulgaris orientalis. Многолѣтнее, садовое растеніе, разводится отъ сѣменъ, подобно обыкновенной свеклѣ. Имѣетъ красные, желтые или зеленые листья. Осенью сажается въ горшки, а зимою берегается въ оранжерей.

B. brasiliensis. Двухлѣтнее растеніе, съ листьями, имѣющими бѣлые, красные и желтые ребра. Высѣвается въ Мартѣ; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

253. *Betonica officinalis.* Буковица красная.

Буковица аптечная. Многолѣтнее дикорастущее, медоносное растеніе; цвѣтетъ съ конца Іюня до Сентября.

Виды: *B. hirsuta.* *Б. шерстистая.*

B. Orientalis. *Б. восточная.*

B. grandiflora.

B. rosea. *Б. розовая.*

254. *Betula.* Береза. Семейство *Betulaceae.* (По кельтски *дерево*

называется—*betu*). Дикорастущее дерево, разводится для украшения парковъ и садовъ. Любитъ почву рыхлую, песчанистую; размножается сѣменами, высѣваемыми немедленно по созрѣваніи, въ борозды, засыпая сѣмена на полторы линіи пескомъ. Если сѣмена получены зимою, то ихъ надлежитъ держать въ горшкѣ, въ прослойкѣ съ пескомъ; зимою проморозить и сѣять весною.

Виды: *B. alba*. Бѣлая, обыкновенная береза. Цвѣтетъ въ Маѣ, принадлежитъ къ числу медоносныхъ растений.

B. populifolia. *B. тополелистная*. Сѣверо-американская порода, чувствительна къ нашему климату.

B. Daurica. Черная береза.

B. ermani. *B. каменная*.

B. fruticosa. (*B. Gmelini*). *Ерникъ березовый*. Кустарникъ вышиною до 10 футъ, растетъ въ Манджуріи и Восточной Сибири, сажается въ нашихъ садахъ, посреди древесныхъ клумбъ.

B. nana. *Березовый ерникъ-сланецъ*. Низкій кустарникъ, не бывающій выше 2-хъ футовъ; растетъ по болотамъ сѣверныхъ мѣстностей и на Европейскихъ Альпахъ, его сажаютъ въ садахъ на каменистыхъ участкахъ и около водоемовъ. Требуешь рыхлую землю, съ примѣсью торфяной.

B. ovalifolia. *Хоктоза*. Растетъ въ Амурскомъ краѣ.

B. excelsa. *B. высокая*. Ея кора употребляется на дубленіе кожъ.

B. centa. *B. тугая*. *B. клейкая*. *B. грабино-листная*, имѣетъ листь съ сильно выдающимися на оборотной сторонѣ жилками, отчего дѣлается похожъ на листь вяза или граба.

B. papyracea. *B. сѣверо-американская*. *B. бумажная*, хорошо растетъ и въ нашемъ климатѣ.

B. resinifera. *B. Сибирская*—низкорослая.

B. pubescens. *B. пушистая* или *душистая*. Составляетъ почти исключительно лѣса Лапландіи и береговъ Бѣлаго моря.

B. urticifolia. *B. крапиволистная*. Дико растетъ въ Швейцаріи, но выдерживаетъ и нашу зиму.

B. Middendorffii. *B. Мидендорфа*. Кустарникъ, достигающій 6 футовъ, растетъ въ Восточной Сибири и по Амуру.

B. humilis. *Низкорослая береза*. Кустарникъ, вышиною до 5 футовъ; растетъ на болотахъ сѣверной Европы, Сибири и Америки.

B. Alpestris. *Б. альпійская.* Кустарникъ вышиною до 5 фута; растетъ въ Сѣверной Европѣ.

B. pumila. *Б. верболистная.* Американская карликовая береза. Кустарникъ вышиною до 5 фута; вѣтви покрыты почками.

B. rubra. *Б. черная.*

B. lutea. *Б. желтая. Б. канадская.*

255. Bidens. Двухзубецъ. Изъ семейства **Synanthereae**. Этого растенія болѣе 75 видовъ, назовемъ нѣкоторые.

Bidens atrosanguinea. *Черда. Кошки.* Многолѣтнее растеніе, могущее зимовать въ оранжереѣ; сбѣтся въ парникъ. Когда пойдетъ въ ростъ, пересаживается въ горшки и держится въ парникѣ до прекращенія утренниковъ, затѣмъ сажается въ грунтъ, въ сильную, питательную землю, на солнечную сторону, гдѣ будетъ цвѣсть до осени, темно-пурпуровымъ цвѣтомъ.

B. Schimpieri. Абиссинское растеніе. Цвѣты съ желтыми язычками, вышиною около 2 фута. Не заслуживаетъ разведенія.

B. tripartita. *Черда.* Дикорастущее по болотамъ, цвѣтетъ Іюнь и Іюль.

B. minima. Съ пахучимъ корнемъ.

B. cernesa. Растетъ по болотамъ.

B. grandiflora. Однолѣтнее, цвѣточное растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ. Желтый цвѣтокъ распускается въ Іюль.

256. Bifrenaria hadwenii. Орхидея. Цвѣты зеленовато-желтые, испещренные коричневымъ; нижняя губа бѣлая съ темно-малиновыми крапинками. Таже культура что и прочихъ эпифитныхъ орхидей. Цвѣтетъ въ Іюнь и Іюль.

Другой видъ: **B. thyrianthina.** Съ большими темно-пурпуровыми цвѣтами. Та же культура и время цвѣтенія.

257. Bignonia. Трубоцвѣтъ. Семейство **Bignoniaceae**. Многолѣтній, вьющійся кустарникъ, съ желтыми, лиловыми, оранжевыми, розовыми или красными, трубчатой формы, цвѣтами. Растетъ въ грунтѣ, но можетъ содержаться и въ комнатѣ. Размножается черенками. Землю требуетъ, составленную изъ дерновой и лиственной, съ нѣкоторою примѣсью песку. Нѣкоторые

виды этого растенія содержатся въ оранжереѣ, а нѣкоторые требуютъ тепличной культуры.

Виды: *B. Chamberlainii*, съ большими, желтыми цвѣтами. Надлежитъ содержать въ оранжереѣ, посаженнымъ въ грунтъ, причемъ растеніе роскошно раскинется по стѣнамъ и будетъ превосходно цвѣсть. Въ горшкѣ оно требуетъ просторнаго помѣщенія и тучной, время отъ времени, возобновляемой земли. Размножается черенками, на которые употребляются полуодревѣнѣлые побѣги.

B. Carolinea. Оранжерейное, вьющееся растеніе, съ бѣлыми цвѣтами.

Другіе оранжерейные виды: *B. Capensis*. *Остѣ-индскій трубоцвѣтъ*. Съ пунцовыми цвѣтами.

B. diversifolia.

Виды, содержимыя въ теплицѣ:

B. grandiflora. Съ весьма большими, желтыми снаружи и темно-оранжевыми цвѣтами внутри, похожими на цвѣтокъ Ипомеи.

B. Roezliana. Вьющееся растеніе съ толстымъ корневищемъ, молодые листья ярко-фіолетоваго цвѣта.

B. ornata. *B. macrophylla*. *B. picta*.

Виды, растущіе въ грунтѣ:

B. venusta. Съ большимъ букетомъ оранжевыхъ цвѣтовъ.

B. speciosa. Съ розово-фіолетовыми цвѣтами.

B. radicans. *B. radicans praesox*. Особенно пригодное растеніе для комнатной культуры.

B. Kerere.

258. *Billbergia*. Изъ семейства Бромелій. Тепличное, травянистое растеніе; выдерживаетъ комнатную культуру; растетъ подобно эпифитнымъ орхидеямъ на стволахъ другихъ деревьевъ. Жесткіе листья этого растенія, по краямъ обсажены колючками. Цвѣтокъ выходитъ изъ середины листьевъ, желтоватый съ синимъ и красный съ синимъ. Землю требуетъ на половину вересковую съ листовенною. Уходъ какъ за орхидеями, но сажается прямо въ землю. При поливкѣ наблюдаютъ, чтобы вода не попадала въ средину листьевъ, а то цвѣточный стебель загниваетъ. Также нельзя этого растенія долго держать на солнцѣ, въ противномъ случаѣ листья ра-

стенія свертываются въ трубку, и засыхаютъ. Размножается отпрысками, которые даетъ когда отцвѣтеть. Отнявъ такіе отпрыски, ихъ дня три просушиваютъ, а потомъ сажаютъ въ горшки и ставятъ въ теплый парникъ, гдѣ они вскорѣ даютъ корни.

Виды: *B. Liboniana*. Цвѣтокъ пунцовый у основанія, затѣмъ бѣлый и синій или фіолетовый.

B. amoena. Съ красными цвѣтами. Цвѣтеть зимою, также какъ и *B. nudicaulis* и *B. pyramidalis*.

B. rhodocyanea. Листья полосатые. Большой цвѣтокъ розовый съ синимъ.

B. viridiflora. Цвѣтокъ фіолетовый съ зеленымъ.

B. chlorosticta. Листья бронзоваго или красновато-пурпуроваго цвѣта.

B. marmorata. *B. moreliana*. *B. Baraquina*. *B. Leopoldii*. *B. zebrina*. Оранжевейное растеніе.

259. *Biota orientalis*. *Жизненное дерево*. Изъ семейства Кипарисовыхъ. Красивое декоративное, оранжевейное растеніе.

Другой видъ: *B. pendula*. Это дерево Японцы сажаютъ на могилахъ.

260. *Biscutella didyma*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе, имѣетъ сѣмена, похожія на двойное блюдечко, отчего и получило (*bis*—вдвойнѣ, *scutella*—блюдечко).

261. *Vixa*. Деревцо съ розовыми цвѣтами и красными плодами; можетъ содержаться въ комнатѣ, но будучи очень нѣжно, требуетъ тщательнаго ухода. Размножается сѣменами и черенками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей лиственной, вересковой и дерновой.

Виды: *B. orellana*. Оранжевейное растеніе. Сѣмена употребляются какъ пряность; мякоть плода содержитъ сильное вещество оранжеваго цвѣта.

262. *Blakea trinervia*. Ямайское, кустарное растеніе, съ очень красивыми, розовыми цвѣтами, имѣетъ ту особенность, что на его листьяхъ рѣзко обрисованы три нерва, отчего и получило свое названіе. Можетъ содержаться въ комнатѣ; разводится черенками; требуетъ вересковую землю, съ прибавкою половины дерновой и половины лиственной.

263. Blandfordia flammea. Изъ семейства *Liliaceae*. Оранже-
рейнное растеніе, съ большими, повислыми, желтыми внутри и
малиново-оранжевыми цвѣтами снаружи. Требуется очень хо-
рошаго водостока въ горшѣѣ, въ которомъ сидитъ; зимою по-
ливается на столько, чтобы только корень совершенно не за-
сохъ. Размножается дѣленіемъ корней.

Другіе виды: *B. Cunninghamii*. Красивые цвѣты съ жел-
тыми краями—колокольчикомъ.

264. Blechnum Brasiliense. Древовидный папоротникъ. Содер-
жится въ оранжереѣ.

265. Bletia. Тепличное растеніе, содержится какъ орхидея.

Виды: *B. Tankervilleae*.

B. verecunda. Оранжевейное растеніе.

266. Blitum capitatum. Жминда. Боровикъ. Многолѣтнее расте-
ніе, съ желтовато-зеленымъ цвѣткомъ, высѣвается прямо въ
грунтъ.

Другіе виды: *B. virgatum*. Сорочки ягоды. Однолѣтнее са-
довое растеніе.

B. bonus Henricus. Маралки. Дикорастущее.

267. Bocconia frutescens. Оранжевейное растеніе.

Другіе виды: *B. cordata*. Китайское растеніе съ листовою
особой окраски.

B. cordata japonica. Японское растеніе. Оба послѣдніе
вида любятъ рыхлую, питательную, песчанистую почву, смѣ-
шанную съ нѣкоторымъ количествомъ глинистой земли. Не
терпятъ излишней влажности; размножается посѣвомъ весною
и дѣленіемъ корней. Зимою содержится въ оранжереѣ или
подвалѣ.

268. Boehmeria utilis. Китайская крапива. Тепличное расте-
ніе; изъ его волоконъ Китайцы приготавливаютъ полотно.

Другой видъ: *B. argentea*.

269. Bolbophyllum chloroglossum. Маленькая тепличная ор-
хидея, съ кистями мелкихъ, бѣловатыхъ или розовыхъ цвѣ-
товъ, часто испещренныхъ пурпуровыми пятнами и имѣющихъ
зеленую нижнюю губу.

Другой видъ: *B. nasutum*. Тоже, съ грушевидными бульбами и блѣдно-желтыми цвѣтами, у которыхъ нижняя губа пурпуровая съ темно-оранжевымъ.

270. *Bomarea chontalensis*. Вьющееся, тепличное растеніе, съ краснобурнымъ стеблемъ, большими, очень красивыми, какъ бы восковыми цвѣтами, въ видѣ колокольчиковъ. Цвѣты въ середкѣ розовые и снаружи зеленоватые.

271. *Bombax ceiba*. *Сырное дерево*. Изъ семейства *Malvaceae*. Тепличное дерево; выносить комнانتную культуру, съ бѣлыми цвѣтами и большими рукообразными листьями; стволъ его усаженъ шипами. Разводится черенками. Землю требуетъ, составленную изъ дерновой, вересковой и лиственной. Листья и сѣмена употребляются въ пищу. Въ стручкахъ его находится хлопчатое вещество, отчего и получило свое названіе. (*Bombax*—хлопокъ).

272. *Bonapartea juncea*. Тепличное растеніе съ желто-зелеными цвѣтами. Любитъ рыхлую, питательную, песчаную почву съ хорошимъ дренажемъ. Зимой предпочитаетъ сухое помѣщеніе; переноситъ комнатную культуру. Размножается сѣменами. Ихъ высѣваютъ въ песчанисто-лиственную землю, слегка прикрываютъ землею и ставятъ въ теплое мѣсто. Четырехнедѣльное растеніице разсаживаютъ въ плошки и потомъ, когда начнутъ разрастаться—въ горшки. Лѣтомъ, для ускоренія роста его, держать въ теплѣ и ближе къ свѣту. Растеніе это имѣетъ узенькіе, съ острыми по краямъ зазубринами, длинные листья поднимающіеся какъ бы фонтаномъ отъ основанія низенькаго ствола и подобно фонтану же ниспадающіе во всѣ стороны. Листья очень слабы, а потому требуютъ нѣкоторой поддержки, со всѣхъ сторонъ, чтобы растеніе имѣло надлежащую форму.

Другіе виды: *B. gracilis*. *B. gracilis glauca*. *B. hystrix*. *B. filamentosa*. *B. robusta*.

273. *Borago*. *Бурачникъ*. Изъ семейства *Asperifoliaeae*. Дикорастущее.

Видъ: *B. officinalis*. *Огуречная трава*. Съ голубыми цвѣтами; медоносное растеніе. Листья пахнутъ свѣжими огурцами, а потому употребляется въ приправу къ кушаньямъ и раз-

водится посѣвомъ на огородахъ въ Апрѣлѣ, любитъ питательную почву и сильную поливку.

- 274. Borassus.** Родъ пальмъ. Растеніе чрезвычайно полезное для обитателей тѣхъ странъ, въ которыхъ оно родится; ни одна часть этого растенія не остается безъ употребленія. Высчитываютъ, что это дерево имѣетъ 801 примѣненіе. Гладкій стволъ его вырастаетъ до 70 футовъ вышины и даетъ весьма крупныя плоды.

Виды: *B. flabelliformis* и *B. aethiopium*.

- 275. Boronia.** Изъ семейства *Diosmeae*. Оранжевое растеніе, съ красными цвѣтами. Если содержится въ свѣтлой и умеренной оранжерей, то цвѣтетъ всю зиму. Любитъ вересковую землю въ смѣси съ пескомъ. Пересаживается ежегодно въ Августѣ. Требуется своевременной и постоянной поливки—зимою весьма умеренной. Не терпитъ продолжительныхъ дождей, когда бываетъ выставлено на воздухъ. Размножается черенками.

Виды: *B. Drummondii*—съ розовыми цвѣтами.

B. alata. B. anethifolia. B. crenata.

B. cordata. B. pinnata. B. serrulata.

- 276. Bosea vervmora.** Оранжевое растеніе.

- 277. Bossiaca macrophylla.** Оранжевое растеніе.

Другіе виды: *B. prostrata. B. ruha.*

- 278. Bougainvillea.** Тепличное и вмѣстѣ комнатное, цѣпкое, кустовое растеніе, на которомъ весною вырастаютъ прицвѣтники, имѣющіе въ началѣ зеленый цвѣтъ, съ лиловымъ оттѣнкомъ, а потомъ розовый или фіолетовый. Требуютъ землю, составленную изъ дерновой, съ примѣсью четвертой части песку и такой же части лиственной. Размножается черенками. Употребляется для закрытія стѣнъ. Чтобы хорошо цвѣло, надо, нѣсколько разъ ежегодно обрѣзать верхушки вѣтвей.

Виды: *B. fastuosa. B. spectabilis.*

- 279. Boussingaultia baselloides.** Оранжевое растеніе изъ тропической Америки. Клубни его употребляются въ пищу туземцами.

280. Brachycthon Bidwillii. Изъ семейства Steruliaceae. Тепличное растеніе съ малиновыми цвѣтами.

281. Brachysome iberidifolia. Однолѣтнее, садовое, травянистое растеніе, съ голубыми или бѣлыми цвѣтами; употребляется для посадки маленькими группами и бордюромъ; можетъ воспитываться и въ горшкахъ; требуетъ вересковую землю, съ примѣсю глинистой. Растеніе это выводятъ въ умѣренномъ парникѣ, въ Апрѣлѣ, потомъ высаживаютъ въ горшки или въ грунтъ.

Виды: *B. alba*. *B. azurea*. *B. lilacina*. *B. oculata*.

282. Brachyglotis repanda. Австралійское деревцо, съ жетыми цвѣтами и листьями, съ изнанки покрытыми какъ бы пухомъ. Разводится черенками и отводками; можетъ расти и въ комнатѣ; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

283. Brachysema aphyllum. Оранжевое растеніе изъ семейства Leguminosae. Оригинальное Австралійское растеніе, неимѣющее листьевъ, съ красными цвѣтами, выходящими прямо изъ стебля. Требуетъ вересковую землю въ смѣси съ пескомъ и постоянного затѣненія.

284. Brachystelma tuberosum. Оранжевое, лазящее растеніе, съ лиловыми, душистыми цвѣтами. Сажается въ обыкновенный черноземъ, въ горшокъ съ хорошимъ дренажемъ; все лѣто содержится въ нѣкоторой влажности; зимою же, когда теряетъ часть своихъ стеблей — требуетъ весьма умѣренной поливки. Размножается черенками, на которые рѣжутъ на сочлененіяхъ, уже одревѣнѣлыя вѣточки.

285. Brassaiopsis. speciosa. Красивое Американское растеніе, со стволомъ, покрытымъ колючими шипами; размножается черенками; можетъ расти въ комнатѣ; зимою поливается весьма умѣренно; требуетъ землю, составленную на половину изъ лиственной и вересковой.

286. Brassavola. Тепличное растеніе изъ семейства орхидей. Можетъ содержаться въ комнатѣ; даетъ большіе, душистые, бѣлые, зеленоватые цвѣты. Размножается дѣленіемъ луковокъ.

Требуетъ листовенную землю съ прибавкою половиннаго количества вересковой. Сажается на кусокъ древеснаго угля, впрочемъ культура ея та же, что и другихъ эпифитныхъ орхидей.

Виды: *B. digeyana*. Весьма большой и крайне оригинальнаго вида, блѣло-зеленоватый цвѣтокъ, по краямъ опущенный какъ-бы волосками.

B. glauca. *B. fragrans*. *B. nodosa*. *B. odoratissima*. *B. acaulis*.

287. *Brassia*. Тепличная орхидея, требуетъ такого же ухода, какъ и *Brassavola*.

Виды: *B. brachiata*. *B. macrostachya*. *B. maculata*. *B. verrucosa*.

288. *Brassica oleracea fruticosa*. Изъ семейства *Cruciferae*. *Кустовая капуста*. Многолѣтнее растеніе, составляющее, какъ полагаютъ, первообразъ нашихъ капустныхъ породъ. Растетъ почти повсемѣстно и любитъ сильную известковую почву. Молодые листья весною употребляются какъ шпинатъ. Разводится осеннею посадкою боковыхъ вѣтокъ растенія; къ зимѣ приваливается немного земли къ кустамъ.

Виды: *B. rapa*. *Рѣпа*. Корнеплодная овощъ, употребляемая въ пищу, въ сыромъ и приготовленныхъ видахъ. Любитъ почву рыхлую, питательную, не свѣже-удобренную; мѣсто солнечное, открытое. Рѣпа сѣется сухимъ сѣменемъ; причемъ на грядѣ въ 10 саж. длины и 1¼ аршина ширины высѣвается одинъ лоть; предъ посѣвомъ сѣмя смѣшивается съ крупнымъ пескомъ. Майская рѣпа сѣется въ началѣ Мая, прочіе сорта въ началѣ Іюня. Гряды постоянно опалываются. Отъ нападающихъ на всходы насѣкомыхъ предохраняютъ растеніе, посыпая его известью и опрыскивая дегтярною водою, либо полыннымъ настоемъ. Если растеніе взойдетъ очень густо, то всходы прорѣживаютъ. Въ сухую погоду рѣпа поливается. Корни, берегаемые въ прокъ, надлежитъ совершенно очистить отъ листьевъ, кромѣ корней, предназначенныхъ на сѣмена, у которыхъ оставляется корневая шейка. Эти корни зимою берегаютъ въ подвалѣ, а весною высаживаютъ въ грунтъ.

Рѣпа бываетъ: *ранняя*, *осенняя* и *зимняя*.

Лучшіе сорта *ранней* рѣпы: *желтая Майская*, *желтая Маль-*

тійская, бѣлая Майская, красная Американская, самая ранняя и очень сладкая, бѣлая булденежъ.

Лучшіе осенніе сорта: плоская желтая, Выборгская или Финляндская, бѣлая Выборгская, плоская желтая, круглая черная Ранненбургская, твердая, золотисто-желтая. Мальтійская, длинная Шотландская, бѣлая красно-головая.

Лучшіе зимніе сорта: Вильгельмбургская, Бартфельдская, Ульмская красно-головая.

Другіе виды рѣпы: *B. asperifolia*. Яровой рапсъ. Кильза. *B. asperifolia*, var. *esculenta*.

Турнепсъ. Рутабага.

B. napus oleifera. Рапсъ. Сурьница. Изъ сѣменъ этого растенія добывается масло.

B. napus. Лиственная, рѣпная капуста. Шнитколь. Двухлѣтнее растеніе, отличается отъ рапса большими и нѣжными листьями. Существуетъ нѣсколько сортовъ, лучший съ листьями цвѣтной капусты. Изъ сѣмени добывается масло, листъ употребляется въ пищу, какъ ранняя весенняя овощъ; любитъ плодородную почву. Сѣютъ рано весною, прямо на гряды, а для осенняго и зимняго употребленія сѣютъ въ Августѣ; особеннаго ухода не требуетъ, только поливается въ сухое время.

B. chinensis. Китайская капуста. (Pe-tsai). Двухлѣтнее растеніе, разводимое съ большимъ трудомъ, вслѣдствіе нападеній на нее, истребляющей ее земляной блохи. Любитъ влажное и прохладное мѣсто. Сѣтся въ Августѣ, потомъ рассаживается и въ Ноябрь даетъ плотные, небольшіе кочни, которые выдерживаютъ небольшіе морозы.

B. nigra. Черная горчица.

B. oleracea acephala. *B. o. laciniata*. Плюмажная капуста. Браунколь. Кудрявая капуста. Зимняя капуста. Двухлѣтняя огородная овощъ. Употребляется для квашенія; листья срѣзаются для употребленія послѣ первыхъ морозовъ. Существуетъ нѣсколько сортовъ этой капусты: Высокая, Низкая; Бордовинская—съ зелеными, синеватыми листьями, можетъ зимовать подъ снѣгомъ, послѣ чего вкусъ ея очень улучшается; Единбургская пестрая федерколь, съ пестрыми листьями; Кудрявая съ красными листьями.

Вообще Браунколь высѣвается въ Маѣ или Іюнѣ на открытомъ воздухѣ; въ Іюлѣ или Августѣ рассаживается на плодо-

родной почвѣ; тщательно поливается; растение окучивается; убираютъ по наступленіи морозовъ и на зиму сажаютъ въ подвалъ.

B. oleracea bullata palmaformis. *Палмовая капуста.* Двухлѣтнее огородное растение съ длинными, узкими пузыристыми листьями, необразующими кочня, служитъ болѣе для украшенія, чѣмъ какъ овощъ; уходъ тотъ же, что и за обыкновенною кочанною капустою.

B. oleracea gemmifera. *Розовая Брюссельская капуста. Шпроссенколь.* Двухлѣтнее огородное растение, на стебелькахъ котораго образуется множество листовыхъ весьма нѣжныхъ и вкусныхъ почечекъ, употребляемыхъ въ пищу. Въ Апрѣлѣ сѣмена высѣваются на холодныя гряды; далѣе съ розсадою поступаютъ также, какъ и съ кочанною капустою, а на зиму высаживаютъ растение въ опорожненные парники, подвалы или погреба.

B. oleracea sabauda bullatas. *Зеленая капуста. Вирзингъ. Кудрявая капуста Сафой.* Двухлѣтнее кочанное растение; требуетъ такого же ухода, какъ и кочанная капуста. Успѣшно разводится на открытомъ воздухѣ. Бываетъ *кругло-головая* и *длинно-головая* подраздѣляющаяся на многіе сорта изъ которыхъ лучшіе: Эрфуртскій желтый, крупный и мелкій.

Вѣнскій парниковый, самый ранній и мелкій; Ульмскій.

B. oleracea botrytis. *Цвѣтная капуста.* Двухлѣтнее растение, дающее всѣмъ извѣстную овощъ. Требуется лучшей плодородной и непременно сырой почвы и низменнаго мѣстоположенія; лучшее для ней удобрение — навозъ рогатаго скота и поливка навозною жижею. Цвѣтная капуста вполне удается только при дождливой погодѣ. Для приданія бѣлизны и нѣжности цвѣтнымъ головкамъ, тотчасъ послѣ ихъ появленія, надъ ними слегка сгибаютъ и связываютъ мочалою верхніе листья, но не иначе какъ въ сухую погоду, а то цвѣточные головки сгниютъ. Цвѣтная капуста бываетъ ранняя и поздняя, поспѣвающая 6-ю недѣлями позже первой. Капусту эту выводятъ на огородахъ, въ грядкахъ и подвергаютъ въ парникахъ ранней выгонкѣ.

Цвѣтную капусту сѣютъ въ разное время. Такъ ее сѣютъ въ Мартѣ, въ рассадникѣ, и высаживаютъ въ грунтъ, въ Апрѣлѣ; второй посѣвъ дѣлаютъ 4—6 недѣлями позже; въ

Юнѣ дѣлается третій посѣвъ, безразлично ранней и поздней капусты, чтобы имѣть непрерывный сборъ капусты до Октября.

Для высадки въ грунтъ, выбираютъ такія розсадки, которыя имѣютъ хорошіе сердцевинные листья, здоровые, бѣлые корни и гладкіе стебли.

Капуста требуетъ тщательнаго опалыванія, разрыхленія земли, сильной поливки и окучиванія ростковъ.

Ранняя выгонка производится въ парникѣ. Для посадки предварительно готовится зимою капустная розсада въ ящикѣ, или горшкѣ, содержащая при температурѣ 0° или 1—2° Р. ниже 0°. Перезимовавшую такимъ образомъ цвѣтную капусту, сажаютъ въ парникъ, въ глинистую почву, поливаютъ и тщательно провѣтриваютъ. Капуста поспѣваетъ въ Маю.

На зиму сберегаютъ цвѣтную капусту, снимая ее въ Ноябрь, для чего выбираютъ только что зацвѣтшую и пересаживаютъ въ погребъ.

Сѣмена цвѣтной капусты добываются съ большимъ трудомъ: для этого перезимовавшую капусту сажаютъ въ Мартѣ или Апрѣлѣ въ грунтъ, на солнечное мѣсто, и когда образуются сѣменные стебли, то всѣ слабые стебли обрѣзываются, а остаются только лучшіе.

V. oleracea asparagoides. V. botrytis igmosa. *Брокколи или Спаржевая капуста.* Двухлѣтнее огородное растение, разводится также, какъ и поздній сортъ цвѣтной капусты, на которую она очень похожа. Въ одно лѣто вполне не развивается а требуетъ перезимовки. Разведеніе этой капусты очень трудно. Самый благородный сортъ и вмѣстѣ самый ранній, это пурпуровый Брокколи. Боковыя цвѣточныя вѣточки этой капусты, употребляются какъ салатъ; видомъ и вкусомъ эти вѣточки похожи на Спаржу, отчего капуста и получила свое названіе.

Брокколи бываетъ: фіолетовый, пурпуровый, бѣлый и зеленый.
V. oleracea capitata. *Кочанная капуста.* Двухлѣтнее кочанное растение—извѣстная овощъ. Разводится точно такимъ же способомъ, какъ брюква. Любитъ песчано-глинистую почву, сильное удобреніе и достаточную поливку. Розсада высаживается, около половины Мая на гряды, въ сильно удобренную, нѣсколько влажную почву. Вынимая изъ земли розсадку, предварительно ее надлежитъ сильно полить, съ тѣмъ, чтобы зем-

ля не отставала отъ корешковъ, приче́мъ берется для посадки только та розсада, у которой надъ сѣменными листиками выросло не менѣе трехъ стеблевыхъ. Послѣ посадки растеніе поливается немедленно, а также и на слѣдующіе дни утромъ и вечеромъ, пока укоренится. Когда розсада дѣлаетъ шесть листовъ—ее окучиваютъ. Нѣкоторые сорта капусты сѣютъ прямо на гряды, но этотъ способъ разведенія капусты неудобенъ. Когда капуста вырастаетъ до половины, ее поливаютъ навозною жижею. Когда срѣзываютъ кочанъ капусты, корень ея должно выдернуть и бросить, чтобы не истощалась почва.

Для ранней выгонки сѣютъ *Горскую* кочанную капусту, въ Августѣ или Сентябрѣ, въ открытый грунтъ и пересаживаютъ розсаду на защищенныя гряды, въ бороздки, гдѣ она перезимовываетъ, хорошо прикрытая хворостомъ и соломой. Этою розсадою, въ Февралѣ или Мартѣ засаживаютъ парникъ. Также готовятъ для ранняго посѣва розсаду посѣвомъ капусты въ Январѣ, въ горшки. Парники, въ которыхъ производится выгонка ранней капусты, должно хорошо провѣтривать и тепла не держать въ нихъ болѣе 24°. Въ Апрѣлѣ капуста можетъ взрѣть.

На сѣмена выводятъ капусту слѣдующимъ образомъ: осенью самыя лучшіе и крѣпкіе корни, высаживаютъ съ землею и складываютъ на открытомъ воздухѣ, на сухое мѣсто до морозовъ, затѣмъ ее переносятъ въ погребъ или подвалъ, и сохраняютъ зиму, очищая отъ гнилыхъ листьевъ. Весною растеніе сажаютъ на солнечномъ мѣстѣ. Лучшій и самый ранній сортъ капусты, изъ множества существующихъ сортовъ ея это — *Англійская* кочанная.

Затѣмъ очень хороши слѣдующіе сорта:

Самая ранняя Ивановская

Самая ранняя Горская.

Non parel krayt.

Сахарная голова. Послѣдніе три сорта съ острыми кочнями.

Чернокрасная ранняя.

Ульмская крово-красная; ранняя, мелкая, тоже поздняя, весьма крѣпкая и нѣжная. *Коломенская*, съ плоскими кочнями, лучшая для заготовленія въ проѣзъ.

Ранняя Эрфуртская, съ весьма твердыми кочнями.

Низкая ревельская, для лѣтнаго употребленія.

Голландская.

Брауншвейкская, съ зеленовато-бѣлыми листьями.

Ульмская

Греческая пудовая круглая, съ синеватой верхушкой.

Императорская круглая, средней величины, съ очень крѣпкими кочнями.

Арнитетская ранняя круглая, мелкая, съ короткими кочерыгами.

В. oleracea caulogara. *Колраби.* Двухлѣтная огородная овощь. Клубни, образующіеся на стволѣ и молодые, нѣжные, сердцевидные листья употребляются въ пищу. Лучшій сортъ для открытаго воздуха: *стеклянный Колраби*. Растеніе это любить плодородную почву и солнечное мѣсто; требуетъ сильной поливки, а то сдѣлается деревянистою. Въ Мартѣ Колраби сѣютъ въ разсадникѣ, а въ Апрѣлѣ его разсаживаютъ; въ Іюнѣ и Іюлѣ его сѣютъ вторично; въ Іюлѣ и Августѣ высѣвають ранній, стеклянный Колраби.

Раннюю выгонку этого растенія производятъ слѣдующимъ образомъ: въ Январѣ сѣютъ въ ящикѣ ранній сортъ; въ Мартѣ розсаду высаживаютъ въ парникѣ. Парниковый Колраби несравненно нѣжнѣе гряднаго.

В. parus. *Лиственная рѣпная капуста.* Бываетъ съ красными и зелеными листьями. Осенью высѣвается прямо на гряды; употребляется съ ранней весны; листья срѣзываютъ до трехъ разъ съ растенія, сидящаго въ грядѣ, и употребляютъ въ пищу.

В. parus rapifera. *Брюква. Калика. Рѣпная капуста. Колраби подѣ землю.* Двухлѣтная, огородная овощь, употребляемая въ пищу, приготовленная различными способами.

Сажается въ грунтъ розсадою, въ глубоко разрыхленную и хорошо унавоженную, нѣсколько влажную землю, на открытое мѣсто. Брюква хорошо удается даже въ гористыхъ мѣстахъ, такъ какъ не очень боится морозовъ. Годная для посадки розсада выводится слѣдующимъ образомъ: Сѣмя брюквы мочатъ часовъ шесть въ водѣ, въ тепломъ мѣстѣ, потомъ раскладываютъ на мокрую тряпку, покрываютъ такою же, кладутъ на сырой мохъ или на сырую землю и прикрываютъ мхомъ или землею же, толщиною пальца на два, ставятъ въ теплое мѣсто и поливаютъ, чтобы не просыхало. Когда сѣмя дастъ ростки, величиною въ половину овсянаго зерна, его сѣ-

ютъ въ разбросъ, въ парникъ или разсадникъ, пересѣкая землю заступомъ. Парникъ держать закрытымъ рамами, а разсадникъ рогожами, пока не взойдетъ посѣвъ, съ этого же времени, ежедневно, несмотря на погоду, открываютъ посѣвъ, сперва на полчаса, потомъ больше, наконецъ оставляютъ открытымъ съ 10 часовъ утра до часу пополудни, а затѣмъ на весь день, но на ночь, все-таки, закрываютъ. Изрѣдка всходы поливаютъ, по утрамъ, лѣтнею водою. Недѣли черезъ три или четыре, когда прекратятся утренники и всходы достаточно подрастутъ и приучатся къ воздуху, ихъ разсаживаютъ на гряды, подъ вечеръ или въ сырую погоду, на поларшина другъ отъ друга. При посадкѣ розсады, кончикъ корешка отщипывается и растеньице сильно поливается; на другой день его вновь поливаютъ. Затѣмъ гряду очищаютъ отъ сорныхъ травъ, взрыхляютъ и растеніе окучиваютъ, чтобы клубень не твердѣлъ; въ засуху растеніе, по временамъ, поливаютъ жидкимъ удобрениемъ. Брюкву также можно сѣять, въ половинѣ Мая, прямо на гряды, разсѣвая сѣмя весьма рѣдко.

При разведеніи брюквы на сѣмена, вынимаютъ изъ земли корень, не повреждая его, зимою сохраняютъ въ подвалѣ или погребѣ, а весною высаживаютъ въ грунтъ.

Брюква, особенно ея *исполнская* порода, разводится въ поляхъ, на кормъ скоту.

Брюква бываетъ: *бѣлая желтая и красная*.

Особенно хороши сорта: *Круиная желтая Laings; желтая красно-головая; Шмерфельдская новая желтая Schmalzkohl-rübe. Бѣлая Голландская.*

B. armoralioides. *Капуста хрѣновидная.* Дикорастущее медоносное растеніе.

289. Bravoa geminiflora. *Оранжевое растеніе.* Изъ семейства **Amarillideae**, съ ярко-пунцовыми цвѣтами. Любитъ лѣсную землю и умѣренную поливку, прекращаемую во время покоя растенія.

290. Brexia. Декоративное, тепличное растеніе; не требуетъ особеннаго ухода; любитъ сильную, дерновую землю, размножается черенками.

Виды: **B. chrysophylla. B. madagascariensis. B. serrata.**

291. *Brillantaisia ovariensis*. Изъ семейства *Acanthaceae*. Тепличное растеніе. Цвѣты синіе съ фіолетовымъ, требуютъ той же культуры что *Salvia*. Легко размножается черенками.

292. *Briza media*. Змѣйка. Змѣиная трава. Дикорастущее.

Другой видъ: *B. maxima*. Однолѣтній злакъ, съ сердцевидными, дрожащими колосками, высѣвается прямо въ грунтъ. Употребляется для букетовъ.

293. *Brodlaea coccinea*. Калифорнійское растеніе; у насъ выращивается въ оранжереѣ; имѣетъ ярко-пунцовые, зеленоватые въ концахъ цвѣты, висящіе въ видѣ группы колокольчиковъ на концѣ стебля.

294. *Bromelia*. Тепличное растеніе, нѣкоторые виды котораго съ успѣхомъ разводятся и въ комнатѣ. Заостренные листья обсажены, по краямъ колючками. Нижняя сторона листьевъ иногда покрыта бѣлою, мучнистою пылью; цвѣточный стебель выходитъ изъ середины листьевъ. Растеніе размножается отростками *); требуетъ вересковую землю, пополамъ съ листовною. Зимой поливается умеренно, причемъ надлежитъ остерегаться налить воды въ середину листьевъ, отчего загниваютъ цвѣточные стебли.

Виды: *B. Ananasa*. Ананасъ. Теплица для него должна быть выстроена по возможности низкая и всѣ проходы въ ней должны быть какъ можно уже. Ананасъ не прихотливъ на землю, но всетаки лучшею для него почвою считается верхній, черноземный слой лѣсной земли или не вполне перепрѣвшая листовая, съ прибавкою десятой доли перепрѣваго коровьяго навоза, безъ соломы. Отпрыски здоровыхъ и крѣпкихъ растений отнимаются и сажаются въ четырехъ дюймовые горшки. Эти горшки зарываютъ до краевъ, въ теплый парникъ и держатъ въ спертomъ и влажномъ воздухѣ, подъ рамами, затѣняя отъ солнца. Когда розсада выростетъ, такъ что корни ея достигнутъ дна горшка, тогда растеніе затѣняютъ только въ полдень, провѣтриваютъ и опрыскиваютъ его, но такъ, чтобы

*) Совершенно также какъ выше сказано относительно размноженія *Billbergii*.

вода не попадала въ середину растенія и земля въ горшкѣ, была только влажною. Въ концѣ Августа растеніице переносится въ теплицу, пересаживается въ болѣе просторные горшки, и ставится въ согрѣваемый снизу ящикъ съ опилками или корьемъ, куда и вкапываютъ горшки по самымъ края. Затѣмъ надлежитъ всю осень и зиму держать растеніе въ постоянномъ ростѣ, для чего температура воздуха, въ теплицѣ должна быть не менѣе 28° Р., а почвы 18° , притомъ воздухъ долженъ быть постоянно влаженъ. Въ Январѣ Ананасы пересаживаютъ вновь, въ болѣе просторные горшки. Послѣ каждой пересадки, опрыскиваніе Ананасовъ не производится до тѣхъ поръ, пока растенія не пустятъ новыхъ корней, иначе онѣ питались бы водою, но не укрѣплялись.

Въ началѣ Марта, Ананасы вынимаютъ изъ ящиковъ, очищаютъ отъ опилокъ и ставятъ на толстый слой сухихъ прутьевъ, чтобы горшки могли исподоволь освободиться отъ воды затѣмъ въ ящикъ кладутъ вышепоказанную землю на 1 футъ толщины и когда она согрѣется, въ нее высаживаютъ растенія, причѣмъ обрѣзываютъ ихъ нижніе листья. Растеніе сажаютъ въ землю, до самыхъ нижнихъ листьевъ; держать въ температурѣ до 25° Р. и только когда растеніе начнетъ сильно расти, исподволь, возвышаютъ температуру; когда же ростъ сдѣлается достаточно великъ, возвышаютъ температуру до 35° Р., воздухъ держать еще сырѣе прежняго, а растеніе поливаютъ чаще. При такомъ уходѣ растенія скоро заплетутъ корнями весь ящикъ; если это будетъ въ Іюнѣ, то надлежитъ опять срѣзать нижніе листья и подсыпать свѣжей земли, чтобы выросли новые корни. Съ половины Августа до половины Сентября, Ананасы пересаживаютъ изъ ящиковъ на плодovou гряду, чтобы растенія къ зимѣ успѣли укорениться. Къ началу Декабря Ананасы перестаютъ опрыскивать, но топка нѣкоторое время продолжается и только уменьшается, когда излишняя влага выгонится, какъ изъ растенія, такъ и изъ теплицы и затѣмъ температура на столько понижается, чтобы остановился ростъ Ананаса, а съ тѣмъ вмѣстѣ, чтобы растеніе предохранилось отъ прѣли. Чтобы корень Ананаса былъ здоровый, температура воздуха теплицы должна постоянно соответствовать температурѣ земли. Лучшіе предѣлы для теплоты той и другой: для земли до 18° Р. и для воздуха до 13° Р.

Отдыхъ растенія продолжается недѣль пять; послѣ этого отдыха, каждый экземпляръ растенія пойдетъ сильнѣе.

Выгонкою Ананасовъ въ плодъ можно заняться съ половины Января, начавъ сильно топить теплицу. Съ возвышеніемъ температуры, воздухъ надо держать сырѣе, но обрызгивать растенія крайне умѣренно, а именно разъ въ день, по появленіи же плодовой завязи, т. е. недѣли черезъ четыре послѣ начала гонки, гряду опять держать сыро и даже полить навозною жижею.

До цвѣтенія Ананасы надлежитъ держать влажно и тепло, во время же цвѣта температуру понизить и не опрыскивать, пока цвѣтъ не опалъ, послѣ же того опять опрыскивать и держать въ прежней теплотѣ. Всѣ появляющіеся отпрыски, за исключеніемъ двухъ или трехъ, обрѣзывать. Если верхняя крона растетъ очень быстро ввинчивать палку въ сердцевину растенія, до основанія его. Когда растеніе начнетъ созрѣвать, уменьшать его поливку, не затѣнять и сильно провѣтривать.

При появленіи на Ананасахъ, клопа, сильно пораженные имъ растенія надлежитъ или выбрасывать или погружать, минутъ на 5—10 въ воду, нагрѣтую до 35° R., такъ, чтобы вода совершенно покрывала растеніе, отъ этого клопы издыхаютъ.

Лучшіе сорта Ананаса: *Gerippte*—*Чешуйчатый*. *Старая Королева*. *Providence*. *Сахаратч*. *Пирамидальный*. *Гавана*—съ зеленымъ плодомъ. *Зеленый*, *черный*—съ черными верхушками листьевъ. *Красный*, съ полосатыми листьями и свѣтло-краснымъ плодомъ.

B. bracteata, съ ярко-красными цвѣтами.

B. vitata, съ полосатыми листьями.

B. chrysantha. *B. fastuosa*. *B. longifolia*.

295. Brosimum. Изъ семейства *Artocarpeae*. Американское дерево съ маленькими цвѣтами и плодомъ въ родѣ каштана, употребляемымъ въ пищу. Выносить комнатную культуру. Размножается отводками и черенками. Требуется земля, составленную изъ дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: *B. galactodendron*. *Молочное дерево*. Густой, бѣлый сокъ вѣтвей этого растенія, а также и листьевъ, похожъ на коровье молоко и употребляется въ пищу. Можетъ содержаться только въ теплицѣ.

B. spurium. Изъ сока его выдѣлывается *каучукъ*.

B. alicastrum.

296. Broussonetia papyrifera. *Шелковица бумажная*. Красивый Японскій кустарникъ. Любитъ сухую и тучную почву. Зимой легко вымерзаетъ, а потому листья съ него обираются рано осенью и на зиму растение хорошо укутывается соломой.

297. Browalia elata. Изъ семейства *Scrophulariaceae* — *Salpiglossideae*. Красивое, многолѣтнее растение съ голубыми цвѣтами; требуетъ сильнаго тепла; сѣется въ парникъ; пересаживаемое, по всходѣ, въ горшокъ держится въ парникѣ и высаживается въ грунтъ, только когда совершенно уже нельзя ждать холодныхъ дней. Можетъ разводиться и черенками. Выдерживаетъ комнатную культуру.

Другіе виды: *B. Jamesoni*. Тепличный кустарникъ, съ оранжево-красными цвѣтами внутри, свѣтло-желтыми наружи. Зимой содержится въ сыромъ мѣстѣ и ежедневно опрыскивается. Если постоянно держится въ горшкѣ, то лѣтомъ два раза пересаживается въ глинистую землю. Осенью же содержится почти сухо.

B. alata. *B. demissa*. *B. czerwiakowskyana*, съ красивыми темно-синими цвѣтами, хорошо растетъ въ грунту, на солнечномъ мѣстѣ *B. Speciosa*.

Слѣдующіе виды Бровалии — растение однолѣтнее и разводится только сѣменами.

B. Coerulea. *B. Viscosa*. *B. abbreviata (pulchella)*, съ красными цвѣтами, разведение ея очень затруднительно.

298. Brownea Изъ семейства *Leguminosae*. — Бобовыхъ. Прекрасное Американское, тепличное деревцо, съ красивыми, лоснящимися листьями и букетами большихъ цвѣтовъ. Уходъ за этимъ растеніемъ очень труденъ и оно рѣдко зацвѣтаетъ. Размножается сѣменами и черенками подъ стекляннымъ колпакомъ. Землю требуетъ чисто дерновую. Любитъ возвышенную температуру и влажную атмосферу. Можетъ содержаться и въ комнатѣ, будучи поставлено на югъ. Должно наблюдать, чтобы горшокъ растенію не былъ данъ слишкомъ просторный.

Виды: *B. grandiceps*, цвѣтокъ розовый, съ темными отѣнками и желтыми пыльниками.

B. erecta. B. princeps. B. Ariza. B. coccinea. B. speciosa.

299. Brugmansia arborea. Оранжевое растение. См. *Datura arborea.*

Слѣдующіе виды суть тепличныя растенія: *B. floribunda. B. candida. B. coccinea. B. Knightii. B. sanguinea.*

300. Bryanthus erectus. Изъ семейства *Ericaceae*, съ мелкими похожими на хвой листьями и розовыми цвѣтами. Требуется вересковую землю, затѣненное положеніе, свѣжую, сыроватую почву и хорошій водостокъ въ горшкѣ. Размножается черенками.

301. Bryonia alba. *Бѣлая Бріонія. Переступень бѣлый.* Изъ семейства *Cucurbitaceae*. Вьющееся, садовое, многолѣтнее, корневое растеніе, очень пригодно для устройства шпалеръ и бесѣдокъ.

Другіе виды: *B. diosea. Переступень съ красными ягодами* Многолѣтнее, лекарственное, грунтовое, садовое растеніе, не требующее покрывки на зиму, размножается осеннимъ посѣвомъ прямо на мѣсто. Сильно вьющееся растеніе. *B. africana.* Клубни употребляются какъ рвотное и слабительное.

B. laciniosa. Высѣвается очень рано въ теплый парникъ. Любитъ сильную поливку, будучи высажено въ грунтъ.

302. Bryonopsis erythocarpa (Bryonia laciniata). Однолѣнее, вьющееся садовое растеніе. Воспитывается въ парникѣ и потомъ содержится подъ стекломъ до пересадки въ грунтъ. Имѣетъ красные цвѣты. Другой видъ: *B. laciniosa.* Красивое, однолѣтнее растеніе, съ плодами, (величиною въ вишню), ярѣ-красными, съ бѣлыми полосками. Размножается сѣменами и черенками, которые сажаютъ осенью, а зимою, выдерживаютъ въ оранжереѣ.

303. Bryophyllum calycinum. Тепличное растеніе. Другой видъ: *B. pinnatum. Листоростникъ.* Декоративное растеніе; его высаживаютъ въ горшки, причемъ цвѣтеть въ теплицѣ до новаго года. Листья его, падая на влажную землю, даютъ корни, образующіе самостоятельныя растенія, таковое свойство Листоростника было причиною его названія (*bryo* проростать и *phyllon*—листъ).

304. *Brunsfelsia Americana*. Оранжевейное и вмѣстѣ комнатное растеніе. Деревцо съ бѣлыми, душистыми цвѣтами. Когда зимою теряетъ листья, поливается очень мало. Размножается сѣменами и черенками. Требуешь вересковую землю, съ прибавкою половины дерновой, четвертой части лиственной и четвертой части песку.

Другой видъ: *B. undulata*.

305. *Brunsvigia*. Изъ семейства Амариллисовъ. Красивое, оранжевейное, луковичное растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ. Цвѣточный стебель имѣетъ на верхушкѣ до 60 цвѣтковъ: розовыхъ, малиновыхъ или другихъ. Размножается отростками луковичи. Зимою луковича содержится совершенно сухо, требуетъ лиственную землю, съ примѣсю половинной части дерновой. Если нѣкоторыя луковичи начнутъ сами собою расти зимою, ихъ не надо тревожить, а предоставить себѣ самимъ.

Виды: *B. Josephine*. Цвѣты внутри малиновые, снаружи желтые.

B. Ciliaris. Широкий, мечеобразный листъ растенія отороченъ коричневыми волосками; лиловые, съ желтыми тычинками, цвѣты, на длинныхъ зеленыхъ ножкахъ, сгруппированы на одномъ стеблѣ, подобно цвѣтку Агапантуса.

B. toxicaria. Большой розовый цвѣтокъ съ желтыми тычинками.

B. grandiflora. *B. striata*.

306. *Buddleia diversifolia*. Изъ семейства *Scrophulariaceae*. Оранжевейное растеніе. Все лѣто держится въ открытомъ грунтѣ, въ тощей и даже каменистой почвѣ. Растеніе прищипываютъ, чтобы не сильно развивалось и лучше цвѣло. На зиму вносятъ въ оранжерею. Размножается черенками.

Другіе виды: *B. crispa*, съ лиловыми цвѣтами. *B. globosa*.

B. salicifolia. *B. Lindleyana*,—съ колосомъ фіолетовыхъ цвѣтовъ.

307. *Bugenvillea*. Красивое, оранжевейное, кустовое растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ, съ лиловыми или желтоватыми цвѣтами; размножается черенками; требуетъ дерновую землю съ примѣсю половинной пропорціи лиственной и по-

ловинной песку. Чтобъ заставить цвѣсть растеніе—ежегодно нѣсколько обрѣзываютъ верхушки его вѣтвей.

Виды: *B. spectabilis*. *B. fastuosa*. *B. speciosa variegata*, съ желто-пестрыми листьями и ярко-фіолетовыми цвѣтами.

308. *Bulbine frutescens*. Оранжевое растеніе.

309. *Bulbocodium ruthenicum*. *Брундышка*. Дико-растущее. Луковица его покрыта шерстью, отчего растеніе и получило свое названіе, (*bulbos*—луковица и *kodion*—шерсть). Изъ семейства *Colcicaceae*.

Другіе виды: *B. vernum*. Маленькое луковичное растеніе, безъ стебля, съ розовымъ въ началѣ и потомъ свѣтло-фіолетовымъ цвѣткомъ, распускающимся въ Мартѣ или, если выведено на солнечномъ мѣстѣ оранжереи, въ Февралѣ. Растеніе высаживается въ горшокъ по 3—4 луковицы въ Августѣ. Можетъ зимовать въ грунту, подъ надежною покрывкою. Размножается отдѣленіемъ луковокъ во время отдыха растенія, въ Іюнѣ—Іюль.

310. *Bulliarda prostrata*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

311. *Buphtalmum cordifolium*. *Воловьё око сердцелистное*. Грунтовое, долголѣтнее растеніе. Получило названіе отъ слова *bous*—быкъ и *ophthalmos*—глазъ, въ намекъ на форму цвѣтка.

Другіе виды: *B. helianthoides*. *Воловьё око подсолнечно-видное*. *B. maritimum*. *В. о. Приморское*.

312. *Bupleurum aureum*. *Капуста заячья*. Дикорастущее.

Другой видъ: *B. fruticosum*. Оранжевое растеніе.

313. *Burchellia*. Низенькое, африканское, кустовое растеніе, съ жесткими листьями и красивыми, алыми или малиновыми цвѣтами. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается черенками. Зимой мало поливается. Требуется вересковую землю съ примѣсью половинной пропорціи дерновой и половинной лиственной.

Виды: *B. capensis*. *B. parviflora*.

314. *Burlingtonia rigida*. Орхидея. Бѣло-розоватыя цвѣты, похо-

жіе на голову летучей мыши. Въ дикомъ состояніи цвѣтокъ пахнетъ фіалкою. Землю требуетъ иловатую, смѣшанную съ битыми черепками и съ кусками источеннаго червями дерева. Растеніе помѣщается въ плетеной корзинѣ или прикрѣпляется проволокою, къ куску дерева. Въ теплицѣ цвѣтетъ всякую весну.

Другой видъ: **B. decora**. Цвѣты розовые, испещрены темно-малиновыми крапинками; нижняя губа бѣлая.

315. *Burtonia pulchella*. Изъ семейства **Papilionaceae**. Австралійское растеніе. Содержится въ оранжереѣ; на лѣто высаживается въ грунтъ. Листья похожи на листья Ерики. Цвѣты ярко-красные, большимъ букетомъ. Любитъ вересковую землю. Поливается въ хорошую погоду умѣренно, но часто; на воздухѣ помѣщается въ полутѣнистое мѣсто. Легко размножается сѣменами и черенками, на которые идутъ очень ранніе побѣги.

316. *Butomus umbellatus*. *Сусака. Воляга трава.* Дикорастущее. Получило названіе отъ словъ **bous**—быкъ и **tenino**—рѣзать, потому что, какъ говорить, рогатый скотъ, срывая это растеніе, рѣжетъ себѣ губы и щеки.

317. *Buvardia*. (*Bouvardia*). Изъ семейства **Kubiaceae**. Очень красивое, маленькое, комнатное кустовое растеніе, съ оранжевыми или ярко-алыми цвѣтами; весьма нѣжное, требующее внимательнаго ухода. Зимой вѣтви его засыхаютъ, но весною стебли его даютъ новые побѣги. Размножается черенками, требуетъ вересковую землю пополамъ съ дерновою. Растеніе это способно для ранней выгонки и цвѣтетъ зимою до самаго Мая. Приготовляя Бувардію къ ранней выгонкѣ, въ Маѣ ее совершенно срѣзываютъ и корень сажаютъ въ грунтъ, на солнечное мѣсто или оставивъ ее въ горшкѣ, пересаживаютъ въ Іюнь, и если затѣмъ оно станетъ сильно расти, вторично пересаживаютъ въ Августѣ, въ легкую, питательную землю. Бувардія, содержащаяся въ горшкѣ, цвѣтетъ въ Ноябрь, а высаженная изъ грунта распускается послѣ новаго года. Вообще это растеніе требуетъ много свѣту.

Виды: **B. angustifolia**, съ ярко-красными цвѣтами.

B. Jackquini. Низкорастущій кустарникъ съ ярко крас-

ными цвѣтами, размножается раннею весною посредствомъ черенковъ, посаженныхъ въ песокъ, и содержащихся въ теплѣ и влажности. Когда черенки укоренятся, ихъ пересаживаютъ въ парникъ. Растеніе это также размножается дѣленіемъ корней весною. Переживавшее растеніе высаживается въ грунтъ, на зиму пересаживается въ горшки и содержится въ холодной оранжереѣ.

B. flava. Желтые цвѣты въ видѣ повислыхъ колокольчиковъ.

B. hutteana. Съ малиновыми цвѣтами.

B. oriana. Съ букетомъ ярко-малиновыхъ цвѣтовъ. Оранжевое растеніе

B. leiantha. Цвѣтетъ пышнѣе всѣхъ другихъ сортовъ, ярко-красными цвѣтами.

B. Covanillesii. Цвѣты ярко-красные съ желтымъ.

B. longiflora. Тепличное растеніе съ бѣлыми, очень душистыми цвѣтами. Во все время роста держится влажно посредствомъ частой поливки и опрыскиванія, но наблюдается чтобы корни не загнили и для того горшекъ долженъ быть хорошо дренированъ. Размножается травянистыми черенками.

B. splendens. Съ суриково-красными цвѣтами.

B. versicolor. Съ ярко-красными цвѣтами.

B. Davisoni. Красивое растеніе съ большими цвѣтами.

B. Vraelandii. Тепличный кустарникъ цвѣтетъ зимою; имѣетъ чисто-бѣлые цвѣты трубкою.

B. loevis. Цвѣты желтые съ зеленымъ.

B. mollis. B. hybrida.

318. Вухусъ. *Бухусъ. Самшитъ.* Изъ семейства *Euphorbiaceae*. Дерево или кустарникъ, составлявшій одно изъ любимѣйшихъ растений садоводовъ древности. Любитъ плодородную почву и отѣненное мѣстоположеніе. Растетъ весьма медленно. Размножается посѣвомъ сѣменъ осенью, черенками и отводками.

Виды: **B. sempervirens.** *Самшитъ. Бухусъ вѣчно-зеленый.* Пальма, растущая въ Европѣ на открытомъ воздухѣ. На югѣ Европы достигаетъ 80 футъ вышины, а сѣвернѣе, какъ напр. въ Германіи, является небольшимъ кустарникомъ.

B. balearica. *Б. великорослый.*

B. balearica fol. variegatis. Два послѣдніе вида содержатся у насъ въ оранжереяхъ; стволъ и листья прямые, голые.

- *B. arborescens*. *Б. древесоватый*.
- B. fruticosus*. *Б. кустарный*, съ овальными листьями.
- B. heterophylla*. *Б. рознолистный*, съ листьями будто разщепленными.
- B. myrtifolia*. Полукустарникъ
- B. nana*. *Б. низменный*.
- B. fortunea*. Густой кустарникъ.
- B. longifolia*. Красивый кустарникъ, пригоденъ для содержанія въ комнатѣ.
- B. barbarica*. Тропическое дерево, даетъ древесный матеріаль, извѣстный въ торговлѣ подъ именемъ «пальмоваго дерева», употребляется въ токарномъ мастерствѣ и для вырѣзки полиптикажей.

319. *Casalia hastata*. *Недостѣлка*. Дикорастущее. Получило названіе отъ словъ: *kakos*—вредный и *lian*—чрезвычайно.

Другіе виды: *C. suaveolens fol. variegatis*. Долголѣтнее садовое растеніе, на зиму требуетъ надежной покрывки листомъ.

C. cylindrica. Оранжевое растеніе.

C. aurantiaca. Однолѣтнее садовое растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ

C. sonchifolia. Тоже съ пурпуровыми цвѣтами.

C. repens. Оранжевое растеніе.

320. *Cachrys crispa*. *Пережатиполе*. Дикорастущее.

321. *Cactaeae*. *Кактусъ*. Изъ семейства *Nepaleae*. Тепличное растеніе, родомъ изъ Америки, имѣетъ совершенно особую отъ всѣхъ другихъ растеній наружность. Стебли и вѣтви кактуса, сочные и мясистые въ молодости, съ годами дѣлаются деревянатыми; вмѣсто листьевъ у нихъ вырастаютъ пучки иглъ, между которыми иногда развиваются длинныя, бѣлыя волоски, дающіе необыкновенный видъ растенію; кактусы не требуютъ особеннаго ухода; могутъ содержаться въ теплицѣ и въ комнатѣ; имъ только нужно сухое и свѣтлое помѣщеніе, но вмѣстѣ съ листовыми растеніями ихъ затѣняющими, они плохо уживаются. Земля кактусамъ нужна рыхлая, смѣшанная глинисто-дерновая, съ крупнымъ пескомъ и старою штукатуркою. Зимой эти растенія поливаются такъ, чтобы только не засохли

и держатся въ умѣренной температурѣ, которую весною постепенно возвышаютъ до 28° Р., а также усиливаютъ поливку и увлажненіе воздуха. Съ Августа готовятъ растеніе къ отдыху и въ этихъ видахъ постепенно понижаютъ температуру, въ которой его содержатъ. Въ теплые годы полезно выставять кактусы на лѣто на воздухъ, охраняя ихъ отъ дождя, для этого помѣщая ихъ въ порожній парникъ, который надлежитъ совершенно открывать только въ глухое время.

Кактусы размножаются сѣменами, побѣгами, черенками и прививкою.

Кактусовъ очень много породъ, но вообще они раздѣляются на семь отдѣльныхъ группъ, а именно:

1) **Melocactideae**. Типомъ этой породы служить **Melocactus**. Растеніе это бываетъ шаровидной или конической формы, съ многочисленными ребрами, усаженными пучками иглъ; весьма нѣжное растеніе. Изъ этого вида замѣчательны:

M. Communis или *Турецкая чалма*. Такъ названное растеніе по сходству съ чалмою (см. статью **Melocactus**).

Mamillaria Clava, булавистой или цилиндрической формы, даетъ большой цвѣтокъ, соломеннаго цвѣта. (См. статью **Mamillaria**).

2) **Echinocactideae** имѣютъ форму или шаровидную, нѣсколько сплюснутую сверху, либо удлиненную, въ видѣ столба или цилиндрическую. Цвѣты у этого кактуса выходятъ на верхушкѣ стебля бѣлые, желтые, розовые или малиновые. Представителями этой природы служатъ **Echinocactus**. Изъ нихъ замѣчательны:

E. visnaga. На растеніи этомъ имѣется до 50 острыхъ реберъ, усаженныхъ пучками желтыхъ иглъ. Число такихъ пучковъ у взрослого растенія доходитъ до 50000. Имѣетъ ярко-желтые цвѣты.

E. Monvillei—шаровидный, съ бѣлыми цвѣтами.

E. Ottonis, лицевидный, съ желто-лимонными цвѣтами, свертывающимися на ночь.

E. Concinnus. **E. Ehrenbergii**. **E. scopa**. **E. multiplex**, **E. platyacanthus**.

E. campylacantha. Нѣкоторыя иглы весьма длинныя цвѣт-

ки розовато-бѣлые съ желтыми пятнышками, на краяхъ лепестковъ.

3) *Ceridee*. Стебли имѣютъ довольно высокіе, съ бороздами, цилиндрическіе, круглые или четверогранные, растущіе прямо или ползущіе. Представителями этого вида служатъ: *Echinopsis*, *Pilocereus*, *Cerus*. Изъ нихъ болѣе замѣчательны:

Cereus giganteus, — достигаетъ двухъ сажень; растетъ столбомъ; изрѣзанъ бороздами, по ребрамъ которыхъ сидятъ бородавки, съ пучками иголъ. Имѣетъ бѣлые цвѣтки, образующіе плодъ, мякоть котораго Индейцами употребляется въ пищу.

Cereus grandiflorus. Ночевѣтное растеніе. Душистый, большой, желтый съ бѣлымъ цвѣтокъ его начинаетъ распускаться лѣтомъ между 7 и 8 часами вечера, къ 11 часамъ, находится въ полномъ цвѣту, а къ 3—4 часамъ утра — увядаетъ. Цвѣтокъ сильно пахнетъ ванилью. Чтобы вообще *Cereus* заставить цвѣсти ежегодно, при посадкѣ его на дно горшка, кладутъ толстый слой черепковъ.

Cereus senelisi — покрытъ длинными волосистыми, сѣрыми щетинами, висящими какъ волосы на головѣ, отчего и получили названіе Старческой головы.

C. peruviana. Толстые стебли съ 9-ю глубокими бороздами; цвѣты бѣлые, съ розовыми краями; цвѣтетъ только нѣсколько часовъ днемъ; вырастаетъ до 3 и болѣе сажень, можетъ выносить до 4 градусовъ Р., одинъ изъ самыхъ старинныхъ видовъ, разводимыхъ въ Европѣ.

C. serpentina. Змѣиная трава. Цилиндрическіе борозчатые стебли толщиною въ руку дитяти, покрыты иглами, лезущіе, вырастающіе до 3 сажень; даетъ душистые цвѣты бѣлые или ярко-розовые, сидящіе по нѣсколько вмѣстѣ.

C. livida. Стебли 5 и 6 гранные съ перехватами. Изъ этихъ перехватовъ, при вершинѣ стебля, вырастаютъ по одному или по два крупныхъ, бѣлыхъ цвѣтка, до 10 дюймовъ въ поперечникѣ.

C. Mac. Donaldii. Огромный желтый съ бѣлымъ цвѣтокъ.

C. grandiflora speciosissima Moynardii. Съ огромнымъ пунцовымъ, желтыми тычинками и пестиками, цвѣткомъ. Любитъ тучную землю и горшекъ хорошо дренированный. Молодые побѣги прищипываются, чтобы растеніе заставить скорѣе и сильнѣе цвѣсти. Лѣтомъ выставляется на открытый воз-

духъ, на припекъ и сильно поливается. На зиму вносится въ оранжерею, и оставляется почти безъ поливки. Размножается черенками, которымъ, отрѣзавъ ихъ, даютъ прежде посадки вянуть 3—4 дни и затѣмъ сажаютъ или въ тепличку или просто въ горшекъ, накрывъ стекляннымъ колпакомъ.

C. flageliformis. *C. speciosissimus*. *C. Napoleonis* и многіе другіе.

Ехинопсисы съ длинными, душистыми цвѣтами бѣлыми, розовыми или пестрыми, размножаются отростками вырастающими на граняхъ стебля.

4) *Phyllantidae*, со сплюснутыми стеблями. Типомъ этого вида служатъ:

Phyllocactus, *Epiphyllum*, *Disocactus*.

Phyllocactus имѣетъ то круглые, то трехъ или четырехъ угольные стебли, покрытые колючками, даетъ крупныя, розовыя, алыя или оранжевыя цвѣты; требуетъ землю дерновую пополамъ съ листовною; размножается черенками. Разнообразности этого растенія болѣе замѣчательныя:

P. phyllanthoides. *P. Ackermanii*. *P. Russelianus* и другіе.

Epiphylli truncati—любятъ черноземъ; чтобы заставить его цвѣсти зимою, его держать на воздухѣ весь Іюль и Августъ, при самой умѣренной поливкѣ; затѣмъ вносятъ въ теплицу; въ Ноябрь онъ зацвѣтаетъ въ теплицѣ или даже комнатѣ и цвѣтетъ до Февраля великолѣпными малиновыми или розовыми цвѣтами.

5) *Rhipsalidae* — съ колесо-образнымъ цвѣткомъ, почти неимѣющимъ трубки, съ безлистными, суставчатыми, различныхъ формъ стеблями, обыкновенно вырастающими на другихъ деревьяхъ. Типами этого вида служатъ: *Rhipsalis* и *Lepismium*. Особенно замѣчательна *Rhipsalis Cassytha*—она свѣшивается съ деревьевъ и достигаетъ 6 футъ. Такъ же достойны вниманія *R. grandiflora* и *R. salicornoides*.

6) *Opuntidae*, съ мясистыми стеблями, покрытыми иглами; даетъ бѣлыя и желто-оранжевыя цвѣты; разводится черенками, на которые употребляются вѣтви и сѣмена. Къ нимъ принадлежитъ одинъ только родъ *Opuntia*, имѣющій до 150 разновидностей. Изъ нихъ болѣе выдаются:

O. tuna, прямой, древесный стебель, достигающій

20 футъ. Цвѣтокъ темно-оранжевый; въ Мексикѣ разводится для воспитанія кошенили; изъ плодовъ его можно добывать сахаръ; въ Мексикѣ изъ его сока приготавливаютъ особый напитокъ; въ Алжирѣ изъ волоконъ его старыхъ стеблей дѣлаютъ корзины и т. п.

O. vulgaris—употребляется на живыя изгороди, а плодъ въ пищу.

O. salmiana въ свѣтло-желтыми цвѣтами; бутоны пунцовые съ желтыми полосками.

O. cochiniifera—разводится для сбора кошенили.

O. ovata. *O. crassa*. *O. curassavica*. *G. Ficus indica*. *O. Italica* и другіе.

и 7) *Pereskidae*, съ широкими, плоскими листьями; нѣкоторые имѣютъ видъ дерева, но больше кустарный видъ. Къ этому виду принадлежитъ только *Periskia*. Изъ этого рода замѣчательны:

Raculeata. *Барбадосскій крыжовникъ*. Выростаетъ до 2 сажень, даетъ бѣлые цвѣты и вкусный плодъ похожій на крыжовникъ. *P. bleo*.

P. grandiflora.

322. *Caenopteris vivipara*. Тепличный папоротникъ. Получилъ названіе отъ словъ: *kainos*—новый и *pteris*—папоротникъ.

323. *Caesalpinia echinata*. Семейства *Caesalpinieae*. Тепличное дерево, употребляется для выдѣлки красной краски, также, какъ и другой видъ: *C. Sappan*.

324. *Caiphora lateritia*. (*Loasa lateritia*). Однолѣтнее, вьющееся растеніе; стѣбель и листья усажены жгучими волосками, (отчего и получило свое названіе: *kaio*—жечь, *phoros*—носитель); даетъ коричневыя или желтыя цвѣты. Высѣвается въ Мартѣ, въ умѣренной теплицѣ или парникѣ, причемъ сѣмена слегка засыпаются землею или пескомъ; немедленно послѣ всхода, растеніица рассаживаются, штуки по три въ горшечки, ставятся въ парникъ и когда совершенно минуютъ утренники, высаживаются въ грунтъ, въ обыкновенную садовую землю, въ стѣнѣ, обращенной на солнечную сторону. Развившись по стѣнѣ, это растеніе образуетъ красивыя фестоны и будетъ цвѣсти все лѣто.

325. Caladium. Изъ семейства **Aroideae**—клещевидныхъ. Тепличное, корневое, травянистое растеніе, выдерживающее содержаніе и въ комнатѣ, съ сердцеобразными, зелеными или пестрыми, съ бѣлыми или розовыми и красными разводами и пятнами—листьями—увядающими осенью. Зиму, до Февраля, растеніе содержится въ одномъ пескѣ, потомъ его пересаживаютъ въ хорошую, дерновую землю, смѣшанную съ совершенно перепрѣвшимъ перегноемъ, причемъ молодые побѣги отдѣляются съ корнемъ и на дно горшка кладется толстый слой черепковъ. Вообще каладіумъ размножается отпрысками вырастающими отъ корня или дѣленіемъ клубней въ періодъ покоя растенія. Въ послѣднемъ случаѣ порѣзанныя мѣста засыпаются угольнымъ порошкомъ, что способствуетъ скорому заживленію раны и въ первое затѣмъ время держать растеніе совершенно сухо. **Caladium** любитъ влажную атмосферу и полутѣнь. Для приданія полного развитія и сильнаго роста, горшекъ съ каладіумомъ держать закопаннымъ въ дубильное корье.

Виды: **C. bicolor.** Съ свѣтло-зелеными стеблями.

C. argyrites. Листъ испещренъ бѣлыми, будто серебряными, правильно расположенными пятнами.

C. argyrosphilum. Большой листъ съ мелкими, бѣлыми пятнами.

C. Baraquinii. Стебель почти черный; листъ къ краямъ только темно-зеленый, а въ срединѣ темно-малиновый.

C. Beleyumii. Листъ испещренъ бѣлыми, какъ бы мраморными разводами.

C. Brongniartii. Большой листъ съ ярко-малиновыми нервами и свѣтлою тѣнью по срединѣ.

C. Chautini. Съ бѣлыми пятнами на листьяхъ и малиновыми нервами.

C. mirabile. Листья съ бѣлыми пятнами.

C. Lerrierii. Ярко-зеленый листъ, а стебель и нервы темные, почти черные.

C. Houletii. Нервы листа бѣло-розовые. Листъ въ бѣлыхъ пятнахъ.

C. Neumanii. Листъ съ многочисленными розовыми пятнами и бѣлыми каемками.

C. Picturatum Trubetzkoyi. У срединнаго нерва и двухъ

его развѣтвленій, во всю длину листа, идетъ свѣтло-розовая, мраморовидная полоса. Остальная часть листа испещрена бѣлыми пятнами.

C. bicolor splendens. C. Alfred Bleu. C. Aug. Rivière. C. Cannartii. C. Cupreum. C. Devosianum. C. macrophyllum. C. marmoratum. C. regale. C. Schmitzii. C. Splendens. C. violaceum. C. Duc. de Nassau. C. Duc de Ratibor. C. Wightii. C. Wagneri. C. triomphe de l'exposition. C. Thelemanni. C. Sieboldii. C. Halevy. C. Lamartini. C. Lucy. C. Mercadante. C. metallicum. C. Rossini.

326. *Calamagrostis Sylvatica. Востреузъ. Дикоростущее.*

Другіе виды: *C. lanceola. Пырей* и *C. epigeoіs. Метлика.*

327. *Calamintha. Пахучка. Изъ семейства Labiateae. Дикоростущее.*

328. *Calamus. Родъ Пальмъ. (Kalam—по арабски тростникъ). Лазящее, тепличное растеніе, тонкіе стебли котораго, вырастаютъ въ своемъ отечествѣ, болѣе чѣмъ въ 20 сажень вышины, а нѣкоторые виды достигаютъ 500 футъ длины. Растеніе покрыто красивыми, перистыми листьями до 2 аршинъ длины, обсаженными шипами. Требуется высокую температуру и влажную атмосферу. Размножается сѣменами; любитъ дерновую землю, съ примѣсью лиственной, торфяной и песку. Стволы нѣкоторыхъ видовъ употребляются на трости. Имѣется до ста видовъ этого растенія. Особенно замѣчательны:*

C. asperimus. C. Rotons. C. nitidus. C. viminalis. C. draco. C. equestris. C. micranthus. C. crinitus. C. flagellus. C. ciliaris. Низкорослый видъ, наиболѣе пригодный для теплицъ.

329. *Calandrinia. Однолѣтнее, садовое растеніе, изъ семейства Портулаковъ, съ лиловыми или малиновыми цвѣтами; сѣется въ парникъ, въ Мартѣ, по всходѣ пересаживается въ грунтъ.*

Виды: *C. discolor. C. Menziesii. C. micrantha. C. pilosiuscula (Ciliaris). C. procumbens. C. speciosa. C. grandiflora—растеніе, скорѣе другихъ видовъ, удающееся въ нашемъ климатѣ.*

B. umbellata. Оранжевое растение. Цветы лилово-пурпуровые с темным отливом, тычинки желтые. На лето высаживается на солнечное место, в цветник, причем сильно поливается. На зиму вносится в оранжерею. Размножается черенками и сменами. Черенки держать под стеклянным колпаком и тщательно предохраняют от сырости, вытирая колпак внутри, по несколько раз в день насухо.

330. Calanthe. Тепличная Орхидея, подвергается одной культурѣ с прочими земляными Орхидеями. Получило название от словъ: *kalos*—прекрасный и *anthos*—цветокъ.

Виды: *C. vestita*. Белые цветы с желтою полоскою на нижней губѣ.

C. densiflora. C. Masuca. C. veratrifolia. C. pleiochroma. Оранжевое растение производит белые цветы с розовым отливом, желтою губою и красновато-оранжевыми сосочками, у основанія.

331. Calarhoe pinnata. (см. *Bryophyllum pinnata*).

332. Calathea rotundifolia. Изъ семейства *Cannaceae*. Тепличное растение с длинными листьями. Любит рыхлую, питательную почву. Цвететъ в Маѣ.

Другіе виды: *C. undulata*. Похожа на Маранту, но с короткими листьями и светлою полосою по срединѣ; любит затѣненное место в теплицѣ, не близко отъ оконныхъ стеколъ; требуетъ смѣсь вересковой земли с рѣчнымъ пескомъ и несколькими кусками древеснаго угля.

C. pardina. С желтыми цветами, листья испещрены темными пятнами.

C. Veitchiana. Широкий, весьма красивый листъ, с изнанки фиолетовый, с темными разводами, с лицевой стороны расписанъ яркими, темными и светло-зелеными пятнами.

333. Calceolaria, Камцеоларія. Изъ семейства *Scrophulariaceae*. Получило название отъ слова: *Calceol* — башмачекъ, по формѣ цветочнаго вѣнчика. Превосходное, многолѣтнее, травянистое растение, с цветами формы калача, самыхъ разнообразныхъ колеровъ, большею частью испещренными. Уходъ за этимъ растеніемъ, хотя и не трудный, но довольно сложный. Есть

нѣсколько способовъ разводить кальцеоларіи отъ сѣменъ, хотя ихъ разводятъ и посадкою черенковъ.

А. Въ Февралѣ или Мартѣ, кальцеоларію высѣвають въ плошки съ листовною землею, смѣшанною съ рѣчнымъ пескомъ, причемъ предварительно нѣсколько обминаютъ землю и сѣютъ какъ можно рѣже, потому что сѣмена очень мелки; затѣмъ, слегка присыпавъ посѣвъ крупнымъ пескомъ, покрываютъ плошку стеклами и, взбрызнувъ водою, ставятъ въ теплицу, къ свѣту. Черезъ 15 дней сѣмена взойдутъ, но только въ томъ случаѣ, если посѣвъ аккуратно, всякій день, будетъ взбрызгиваться водою, но еще лучше, чѣмъ взбрызгивать посѣвъ водою, отчего сѣмена скучиваются и часто загниваютъ, ставить плошку на поддонъ съ водою. Когда сѣмена взойдутъ, плошку надо поставить въ оранжерею, поближе къ свѣту; когда же растеньица сдѣлаютъ по 4 листа, ихъ надлежитъ осторожно разсадить въ ящикъ или плошку, на палецъ разстояніемъ другъ отъ друга. Розсаду втеченіи двухъ, трехъ дней держать въ затѣненномъ мѣстѣ и когда оно пойдетъ въ ростъ, ее приставляютъ въ оранжереѣ, ближе къ окнамъ. Когда растеньица начнутъ тѣсниться, ихъ пересаживаютъ, по нѣскольку штукъ въ трехвершковыя горшки или по одному въ вершковыя горшки; затѣмъ такъ какъ кальцеоларіи въ этотъ періодъ роста, бываютъ очень чувствительны и боятся солнца, то ихъ притѣняютъ и мало-по-малу приучаютъ къ вольному воздуху. Для этого лучше всего выдерживать эти растенія въ полутепломъ парникѣ, въ концѣ же Мая, когда уже больше нельзя ждать морозовъ, кальцеоларіи пересаживаютъ въ грунтъ, хорошую черноземную землю, гдѣ они будутъ цвѣсти до морозовъ, а передъ ихъ наступленіемъ, растеніе пересаживается въ горшки и зимуетъ въ оранжереѣ.

Б. Точно такъ, какъ сказано въ предыдущей статьѣ, выводятъ кальцеоларіи до момента ихъ пересадки въ грунтъ. По настоящему способу, растенія пересаживаютъ въ Іюнь, въ трехвершковыя горшки, ставятъ въ холодный парникъ и во время сильнаго солнца—притѣняютъ. Когда кальцеоларіи зацвѣтутъ, ихъ ставятъ на террасы и балконы или въ комнаты; съ наступленіемъ же морозовъ ихъ вносятъ въ оранжерею и ставятъ какъ можно ближе къ свѣту, причемъ содержать въ довольно холодной температурѣ, весьма умеренно поливая.

Прозимовавшія растенія очень обильно будутъ цвѣсть въ Апрѣлѣ если послѣ того, какъ онѣ тронутся въ ростъ—выщипываютъ ихъ головки.

В. Кальцеоларіи высѣваются въ Августѣ или въ первыхъ числахъ Сентября, вышеозначеннымъ способомъ въ плошки; по всходѣ растеніица рассаживаются въ ящики; въ началѣ Октября, кальцеоларіи вновь пересаживаютъ по одному растенію въ вершковый горшекъ, ставятъ въ оранжерею, какъ можно ближе къ свѣту и держатъ сухо. Когда въ половинѣ Января растеніе образуетъ до 6 листковъ, его пересаживаютъ въ двухвершковый горшекъ; въ концѣ Февраля кальцеоларіи вновь пересаживаютъ стуломъ, въ трехвершковый горшекъ. Выдержанное такимъ образомъ растеніе, будетъ цвѣсть въ Апрѣлѣ, но въ такомъ только случаѣ, если зимою оно не будетъ подвергнуто сырости, отъ которой оно погибаетъ.

Г. Для разведенія отводками, стебли кальцеоларіи обрѣзываютъ, послѣ того какъ она отцвѣтетъ; отъ этой обрѣзки, корень даетъ побѣги, ихъ отдѣляютъ, сажаютъ въ горшки и воспитываютъ въ оранжерей какъ и сѣменные растенія.

Вообще кальцеоларіи, какъ сидя въ грунтѣ, такъ и выращенныя въ горшкахъ, не любятъ дождей и вѣтра.

Виды: *C. crenata corymbosa et hybrida* — высѣяныя въ Іюлѣ, цвѣтутъ съ Марта до Мая.

C. rugosa. Производитъ маленькіе, но весьма обильные желтые цвѣты. Даетъ прекрасный видъ цвѣтнику, можетъ употребляться какъ бордюрное растеніе. Размножается въ началѣ весны посредствомъ молодыхъ побѣговъ, которые сажаютъ въ песокъ и безъ всякой покрывки ставятъ въ холодную оранжерею или умѣренную теплицу, гдѣ защищаютъ отъ сильнаго солнца. Когда растенія укоренятся, ихъ рассаживаютъ въ горшки, въ смѣсь лиственной съ дерновою землею.

C. violacea. Съ фіолетовыми цвѣтами. *C. rugosa grand sultan*. Съ бархатистыми, темно-коричневыми цвѣтами.

C. rugosa kentisch hero. Цвѣты желтые, съ красновато-коричневымъ. *C. alba*. Съ бѣлыми цвѣтами, размножается черенками.

334. *Calendrina grandiflora*. Многолѣтнее растеніе съ пурпуровыми цвѣтами. Осенью, передъ наступленіемъ морозовъ,

вынимается изъ грунта, и будучи посажено въ горшки, содержится въ оранжереѣ.

335. *Calendula officinalis*. Ноготки. Изъ семейства **Synanthereae**.

Однолѣтнее, садовое, медоносное и вмѣстѣ лекарственное растение. Цвѣтетъ каждый мѣсяцъ, отчего и получило свое названіе; (**Calendae**—первый день мѣсяца). Высѣвается прямо на гряды весною или позднею осенью, причѣмъ довольствуется всякою землею.

Другіе виды: **C. Pongli plena**. **C. ranunculoides flore pleno**. **C. speciosa imbricata**. **C. arvensis**. Собственно эти только четыре разновидности и заслуживаютъ разведенія, по своимъ махровымъ, ярко-оранжевымъ цвѣтамъ.

C. pluvialis. Даетъ темно-бурныя, съ бѣлыми лучами и снаружи сѣрыя цвѣты, раскрывающіеся только въ ясную погоду.

336. *Calla aethiopica*. Семейства **Aroideae**. Смотри **Richardia**.

337. *Calliandra brevipes*. Изъ семейства **Leguminosae**. Оранжерейное растение съ листьями, похожими на листъ акаціи и цвѣтами въ видѣ большого пучка, пунцовыхъ длинныхъ тычинокъ, сидящими на самомъ стеблѣ. Требуется той же культуры, что **Inga pulcherrima**.

338. *Callicarpa sana*. Изъ семейства **Verbenaceae**. Оранжерейное растение, даетъ красивый плодъ, отчего и получило свое названіе. (**Kalos**—прекрасный, **karpos**—плодъ).

Другой видъ: **C. purpurea**. Тоже даетъ темно-фіолетовыя ягоды, гроздіями, которыя сохраняются всю зиму. Размножается черенками.

339. *Callichroa platyglossa*. Однолѣтнее садовое растение, пригодное для бордюровъ, съ золотисто-желтыми цвѣтами; высѣвается прямо въ грунтъ, въ легкую, песчанистую, но не свѣже-унавоженную землю.

340. *Calliglossa Douglasii*. (*Oxyura Chrysantemoides*). Низкорослое, однолѣтнее, садовое растение, пригодное для бордюровъ, съ золотисто-желтыми цвѣтами; высѣвается прямо въ грунтъ, въ легкую, песчанистую, но не свѣже-унавоженную землю.

341. Calliopsis tinctoria. (Отъ слова *kallistos* — прекрасный). Однолѣтнее садовое растеніе съ золотисто-желтыми, а у другихъ видовъ съ темно-бурыми, коричневыми съ краснымъ отѣнкомъ или съ желтыми разводами цвѣтами. Высѣвается въ парникъ, потомъ будучи разсажено въ горшки, снова ставится въ парникъ и когда хорошо укоренится, высаживается въ цвѣтникъ, въ рыхлую, но сильную землю, на солнцепекъ, цвѣтеть съ Іюля до глубокой осени.

Другіе виды: *C. t. nana*. Карличковое растеніе.

C. Drummondii (*Coreopsis basalis*). Клопообразъ съ большими желтыми цвѣтами.

C. bicolor nana. Цвѣты желтые съ коричневымъ.

Два послѣдніе вида цвѣтутъ въ грунтъ, но ихъ содержатъ и въ оранжереѣ, гдѣ заставляють цвѣсть зимою. Для этого растеніе сбѣютъ въ Сентябрѣ въ парникъ, затѣмъ когда оно подрастетъ, пересаживають въ горшки, въ обыкновенную садовую землю, смѣшанную съ роговыми опилками и оставляють на воздухѣ, пока не наступятъ морозы, затѣмъ ихъ переносятъ въ оранжерею, теплицу или комнату.

C. purpurea nana. Съ коричневыми цвѣтами.

342. Callipteris prolifera. Папоротникъ, содержится въ теплицѣ.

343. Callirhoe pedata. Однолѣтнее садовое растеніе, съ красными цвѣтами; сбѣтся въ парникъ, или въ Апрѣлѣ въ горшки и потомъ пересаживается въ цвѣтникъ, въ рыхлую, глинистую землю, на солнечную сторону. Вообще уходъ за этимъ растеніемъ очень затруднителенъ.

Другіе виды: *C. pedata nana*. Низкорослая, съ нѣжно-фіолетово-красными цвѣтами. Высѣвается въ Мартѣ.

C. verticulata.

344. Callistachys lanceolata. Оранжерейное растеніе съ красивымъ цвѣткомъ — колосомъ, отчего и получило названіе. (*kalos* — красивый, *stachys* — колось).

Другой видъ: *C. retusa*.

345. Callistemon metrosideron. *Метросидеросъ*. Оранжерейное деревцо, можетъ расти и въ комнатѣ. Производитъ бѣлые или пунцовые цвѣты — султаномъ. Размножается черенками. Зимою поливается крайне умѣренно; требуетъ вересковую землю, съ

примѣсъю половинной пропорціи дерновой и четвертой части лиственной.

Виды: *C. lineare*. *C. speciosum*. *C. lanceolatum*. *C. albidum*. *C. huxifolium*. *C. californicum*. *C. floribundum*. *C. robustum*. *C. semperflorens*. *C. fulgens*.

346. *Callitris*. Хвойное растеніе, размножается черенками, на которые употребляются боковыя вѣтви.

Видъ его: *C. quadrivalvis*. Небольшое, широко развѣтвленное деревцо, съ хвоеобразными листьями; даетъ смолу извѣстную подъ именемъ: Сандарака.

347. *Calmia*. Кустовое растеніе, изъ семейства вересковыхъ, съ бѣлыми или розовыми цвѣтами, можетъ расти и въ комнатѣ; размножается черенками; требуетъ вересковую землю, пополамъ съ дерною, съ примѣсъю одной шестой части лиственной.

Виды: *C. glauca*. *C. latifolia* и *C. hirsuta*.

348. *Calochortus splendens*. Оранжевое растеніе. Во время покоя содержится совершенно сухо, во время роста сильно поливается. На лѣто высаживаютъ въ грунтъ. Пересаживается передъ началомъ роста, т. е. въ Февралѣ или Мартѣ. Любитъ преимущественно вересковую землю.

Производитъ лиловый цвѣтокъ.

Другіе виды: *C. luteus*, съ желтымъ цвѣткомъ. *C. Venustus*. Цвѣтокъ бѣлый съ красивыми желтыми полосами въ серединѣ.

349. *Calodendron capense*. Тропическое дерево, съ алыми цвѣтами; можетъ расти и въ комнатѣ; размножается черенками и сѣменами; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей вересковой, лиственной и дерновой.

350. *Calodracon nobile*. Красивое кустовое растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ; листья малиновые или зеленые съ малиновыми полосами; требуютъ лиственную землю, пополамъ съ вересковою и съ прибавкою нѣкоторой части дерновой.

351. *Caloniction diversifolium sulfureum*. Изъ семейства *Convolvulaceae*. Оранжевое, вьющееся растеніе, съ желтыми, внутри фіолетовыми, похожими на Ипомею цвѣтами.

352. Calophyllum. Дерево изъ Бразиліи, могущее расти и въ комнатѣ, съ душистыми бѣлыми цвѣтами; размножается черенками, требуетъ землю, составленную изъ дерновой и лиственной, съ примѣсью небольшого количества вересковой и песку. Даетъ пахучую смолу, употребляемую для выдѣлки бальзама.

Виды: *C. Calabo. C. spectabile. C. inophyllum.*

353. Calostemma purpureum. Изъ семейства Амариллисовъ. Оранжевое растение съ розовыми цвѣтами.

Другой видъ: *C. luteum.* Съ желтыми цвѣтами.

354. Caltha palustris. *Калужница болотная. Куросмыль. Куриная слепота.* Дико растущее, получило названіе отъ слова *Calathos* — кубокъ, потому, что въичникъ цвѣтка, будто-бы, похожъ на золотую чашу. Изъ семейства *Ranunculaceae*.

Другіе виды: *C. palustris flore pleno.* *Калужница махровая.* Многолѣтнее растение, съ золотисто-желтыми цвѣтами; распускается въ Мартѣ, любитъ частую поливку.

C. gigantea. Долголѣтнее, грунтовое растение.

355. Calycanthus praecox. Семейства *Calycantheae.* (*Chimonanthus fragrans*). *Каликантъ. Чашенцятъ.* Кустарникъ, разводимый въ грунту и въ оранжереѣ; достигаетъ 6 футъ. Въ оранжереѣ цвѣтетъ достигнувъ 2 футъ. Даетъ душистые цвѣты; размножается дѣленіемъ корней. Если содержится въ холодной оранжереѣ, то цвѣтетъ въ Январѣ или Февралѣ, а будучи внесенъ въ теплицу, зацвѣтаетъ въ Ноябрь.

Другой видъ: *C. occidentalis.* Съ большими, малиновыми цвѣтами.

356. Calyptraria haemantha. Изъ семейства *Melastomeae.* Оранжевое растение съ темно-лиловыми цвѣтами.

357. Calyptrocalyx spicatus. Родъ Пальмъ. Имѣетъ оранжевыя ягоды. Достигаетъ 40 футъ вышины.

358. Calyptrogyne. Родъ Пальмъ. Легко отличается отъ другихъ, по двумъ чехламъ, изъ которыхъ одинъ отваливается, при томъ какъ цвѣтокъ распускается.

Виды: *C. Spicigera. (Gonoma Spicigera). C. Ghiesbreghtiana. C. elata.*

359. *Calyptronomia Scharzii*. Родъ Пальмъ.

360. *Calyptrostigma Middendorffiana*. Кустарникъ съ красивыми оранжевыми цвѣтами. Растетъ въ грунту безъ покрывки.

361. *Calystegia*. Изъ семейства *Convolvulaceae*. Долголѣтнее, вьющееся садовое растеніе, требующее на зиму надежной покрывки.

Виды: *C. pubescens flore pleno*. *Махровый, розовый повиличникъ*. Зимуетъ въ грунту, безъ покрывки; съ махровыми, розовыми цвѣтами. Если зимою содержится въ оранжереѣ, то оставляется совершенно безъ полива. Размножается очень легко, во всякое время отводками и весною дѣленіемъ корней.

C. daurica, съ блѣдно-розовыми цвѣтами.

C. sepium. *Вьюнокъ*. Дикорастущее, въ поляхъ растеніе; цвѣтокъ колокольчикомъ, розовый съ бѣлымъ, пахнетъ миндалемъ.

C. alcea. *C. oculata*. Вообще всѣ калистегіи размножаются дѣленіемъ корней.

362. *Camassia esculenta*. Изъ семейства *Liliaceae*. Луковичное растеніе, съ прекрасными лиловыми цвѣтами. Можетъ выносить зиму въ грунту, если хорошо защищено отъ сырости и холода, но лучше на зиму вносить его въ оранжерею.

363. *Camelina sativa*. *Рыжикъ полевой*. Изъ семейства *Cruciferae*. Дикорастущее, двухлѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ. Изъ его сѣменъ выжимается масло.

364. *Camellia*. *Камелія*. Семейство *Camelliaceae*. Такъ названа въ честь путешественника, по Азіи, Камеля. Одно изъ роскошнѣйшихъ и любимыхъ оранжерейныхъ растеній, происходитъ изъ Японіи; можетъ содержаться въ комнатѣ, хотя цвѣтеть въ ней гораздо хуже, чѣмъ въ холодномъ воздухѣ оранжереи. Даетъ бѣлые, розовые (всѣхъ оттѣнковъ) махровые, красные, пестрые или полосатые цвѣты — простые или махровые. Разновидностей Камеліи считается до 1000. Размножается черенками, сѣменами и прививкою. Требуется земля песчанисто-дерновую, безъ всякой примѣси, а гдѣ нѣтъ такой земли, то торфяную, но въ послѣднемъ случаѣ растеніе надлежитъ поливать, раза два въ недѣлю, слабымъ растворомъ

гуано. Зимой Камелія требуетъ какъ можно больше свѣта, температуру не выше 8 градусовъ; не терпитъ, особенно зимой, внезапныхъ переходовъ отъ одной температуры къ другой и если подвергается такимъ переѣмамъ, то сбрасываетъ бутонны. Камелія боится капли; нуждается въ чистомъ содержаніи; земля вокругъ ствола обкладывается снѣгомъ; растение пересаживается тотчасъ послѣ цвѣтенія. На лѣто, а именно на время отъ Іюля до Сентября, Камеліи держатся на чистомъ воздухѣ, въ полутѣнистомъ мѣстѣ (но отнюдь не тогда, когда оно имѣетъ почки) и часто поливается; если же растеніе оставляется въ оранжереѣ, то оно притѣняется, ежедневно обрызгивается и полъ вокругъ его всякій день поливается. Камеліи сильно страдаютъ тѣмъ, что у нихъ сваливаются цвѣточные почки. Извѣстный англійскій садоводъ *Пирсонъ* приписываетъ это явленіе слѣдующимъ причинамъ:

Первое. Растеніе недостаточно поливается, а именно нижняя часть кома остается сухою, какъ пыль, тогда какъ при поливкѣ, которая должна производиться, только тогда, когда растеніе дѣйствительно въ ней нуждается, весь комъ долженъ быть совершенно промоченъ.

Второе. Растенію дается не надлежащая земля, или немѣющая достаточнаго количества питательныхъ веществъ.

Такъ какъ Камелія зацвѣтаетъ ровно черезъ годъ послѣ пересадки, то таковую дѣлаютъ съ такимъ расчетомъ чтобы растеніе имѣлось въ цвѣту возможно большее время. Въ этихъ видахъ, чтобы имѣть ранніе цвѣты, Камелію ранней пересадкою и возвышенною температурою, заставляютъ цвѣсти раньше. Для этого растеніе, несмотря на степень развитія его почекъ, ставятъ въ Декабрѣ или Январѣ въ теплицу, на самое прохладное ея мѣсто, къ свѣту, а впослѣдствіи даютъ ей все больше и больше тепла, причемъ ее ежедневно поливаютъ опрыскиваютъ чистою водою, температура теплицы можетъ быть днемъ до 15. При совершенномъ развитіи окончныхъ почекъ, растеніе держать нѣсколько суше, чтобы способствовать образованію новыхъ почекъ.

Виды: *C. Japonica*, наиболѣе распространенная.

C. reticulata, съ большими малиновыми цвѣтами и матовыми листьями.

C. Sasanqua, съ блѣдно-розовыми цвѣтами и маленькими листьями.

Наиболѣе пригодны для ранней выгонки, какъ ранѣ другихъ зацвѣтающіе, слѣдующіе сорта Камелій.

C. japonica variegata. Темно-розовая.

C. alba plena. Бѣлая.

C. fimbriata. Бѣлая съ вырѣзными краями.

C. Chandleri. Огненно-красная.

C. Corallina. Темно-красная.

C. paeoniflora. Розовая.

C. anemoniflora alba. Бѣлая.

C. pomponia, бѣлая съ розовымъ отливомъ внутри.

C. altceaeflora. Темно-малиновая.

C. atrorubens. Темно-красная.

C. imbricata. Ярко-малиновая.

C. Knightii. Темно-малиновая.

C. punctata. Розовая, съ темными пятнами и полосами.

C. Alexinia, съ большимъ бѣлымъ цвѣткомъ, испещреннымъ розовыми полосками.

C. Princesse Baciocchi. Малиновый цвѣтокъ съ бѣлымъ оттѣнкомъ.

C. myrtiflora Темно-красная.

C. expansa. Свѣтло-розовая.

C. incarnata. Красно-розовая.

C. Eclipse, бѣлая съ розовыми полосами.

C. Dorsetti. Свѣтло-малиновая, въ тѣнь, махровая.

C. Rosa sinensis. Розовая—бѣлая.

C. Derbyana. Ярко-красная.

Въ каталогѣ Вагнера значатся, имѣющіяся, по его словамъ, у него въ продажѣ слѣдующія разности махровыхъ Камелій.

Бѣлыя: **alba plena**, **alba illustrata**, **alba ornatissima**.

Cssa. Calini, **Fimbriata**, **planipetala**. **Pss. de Prusse**, **Virgine di Colle Beato**.

Бѣлая, съ желтоватою серединою: **Centifolia alba**.

Бѣлая съ пунцовыми жилками: **Angello Cocchi**.

Бѣлая съ розовымъ оттѣнкомъ: **Constantin Tretiakow**.

Бѣлая съ розовыми полосами: **Cora Barton**, **Emilia Gawazzi**, **Teutonia**, **Contess of Derby**, **Frostri alba**, **Theresa Thargioni**, **Dante Malvina**.

Бѣлая съ нѣжно-розовыми жилками: **Cup of Beauty. Fanny Bollis.**

Бѣлая съ кармозиновыми полосами: **Distinction.**

Бѣлая съ свѣтло-розовыми полосами: **Giuseppe Biasi.**

Бѣлая пеоновидная: **П Cygno.**

Бѣлая съ розовыми пятнами и жилками: **Jenny Lind.**

Бѣлая съ розовыми и красными струйками: **Tricolor imbricata.**

Розовыя: **Adriana. Archiduc Etienne. Aspasia. Baron de Vrière. De la reine rosea. Dinotto. Marchisa Natta. Mr. d'Offay. Prince de Canino. Rosea spectabilis. Stella d'Italia. Valtavareda. Fanny Sauchiol.**

Розовая впадающая въ красный цвѣтъ: **Leopold I.**

Розовая съ бѣлыми полосами: **P-sse Aldobrandini. Teutonia amabilis. Clodii. Dawid Boschi. General Lafayette. La constitutione. Lucrezia Gazzarini. M-me de Strelkow.**

Розовыя съ бѣлыми разводами: **Triomphe de Philadelphia. Triomphe de Wandelghem.**

Розово-фіолетовая съ бѣлыми струйками: **Vicont de Nieulant.**

Розовая отороченная бѣлымъ: **Clementina Magnani. Professore Zonetti.**

Розовая съ кармозиновыми струйками: **Bella Romana. Dionisia Poniatowskii.**

Розовая съ блѣдною серединою: **Duc de Treviso.**

Розовая испещренная кармозиннымъ: **Comte gomere.**

Розовая оторочена бѣлымъ: **Mr. Dombrain. Grand Duc Constantin.**

Розовая оторочена палевымъ: **Gr. Dusse Helene.**

Розовая съ карминовыми полосами: **Roma risorta.**

Розово-лиловая: **Libri.**

Розовая съ бѣлою серединою: **Reine des beautés.**

Розовая съ ярко-розовыми разводами: **Virginia Franco.**

Розоватая съ карминовыми полосами: **Vittorio Emanuelle II.**

Розовая темная, къ краямъ свѣтлѣе: **William Niglo.**

Розовая яркая, въ срединѣ бѣлая полоса: **Bella di Livorno.**

Розовая яркая, въ срединѣ свѣтло-розовая: **Cssa. Marianna.**

Розовая яркая, къ краю свѣтлѣе: **Cssa. Tozzoni.**

Розовая нѣжная съ пурпуровыми струйками: **Catharina Rossi.**

Розовая нѣжная съ бѣлыми полосами: **Comte de Toll.**

Розовая свѣтлая съ темно-розовыми полосами: **Cssa. Rosolini.**

Тоже съ кармозиновыми полосами: **La Pace.**

Тоже съ темно-розовыми жилками: **La vinia Maggi.**

Тоже съ темно-розовыми жилками и пятнами: **Verschaffeltii.**

Розовая темная съ свѣтло-розовыми полосами: **Glardino Petraja.**

Тоже съ бѣлыми полосами: **Palla Rucelay.**

Кирпично-розовая съ бѣлою оторочкою: **General Dufour.**

Кирпично-красная съ бѣлыми линиями: **П 22 Marza.**

Серизовая отороченная бѣлымъ: **Matteo Malfino. Petozzi. Montezumo.**

Серизовая съ бѣлымъ: **Andreas Doria.**

Серизовая съ бѣлыми полосами: **Maria Nicolai.**

Серизовая съ бѣлыми жилками: **Marietha Mossini.**

Серизовая съ свѣтло-розовыми полосами: **Binda. Octave Burnier.**

Серизовая съ бѣлыми широкими полосами: **maculosa.**

Серизовая съ блѣдною серединою: **Camillo Brozzoni.**

Карминовая отороченная бѣлымъ: **Stella polare.**

Карминовая съ бѣлыми полосами: **Jeffersoni. Maria Talenti. Miniata. Violacea. Carlotta Peloso.**

Красно-фіолетовая съ бѣлыми полосами: **Archiduchesse Augusta.**

Красно-коралловая съ бѣлыми полосами: **Auguste Delfosse.**

Красно-коралловая темная: **Lecana Superba.**

Красная: **Imbricata**—превосходной формы. **Lemichezzii. Reine des fleurs. Rising sun.**

Красная съ бѣлыми полосами: **Symmetry. Triomphe de Bergamo. Enrichetta Ulrich. Grandis. Souvenir d'Emile Defresne.**

Красная съ бѣлыми полосами и розовымъ въ серединѣ: **Francesco Sforza.**

Красная въ серединѣ съ бѣлыми жилками: **Michel Angelo.**

Тѣлеснаго цвѣта съ розовыми полосами: **Bella Carlota.**
Cima Rosa. Jubilé. Prince Albert.

Тоже съ серизовыми струйками: **Caryophyloides.**

Тоже съ карминовыми полосками: **Comte Paris.**

Тоже съ карминовыми жилками: **Comtesse of Orney.**

Лиловато-тѣлеснаго цвѣта: **Giardino Schmitz.**

Лиловато-серизовая: **Mrs. Buchanan.**

Молочнаго цвѣта отбѣненная свѣтло-розовымъ: **De la Reine.**

Mrs. Abby Wilder.

Молочнаго цвѣта въ серединѣ свѣтло-розовая: **Eliza Centuriani.**

Ярко-вишневаго цвѣта, съ бѣлою продольною полосою, одна изъ красивѣйшихъ: **Camelia ninfa del Tebro.**

Свѣтло-мѣдно-красная съ бѣлыми полосами: **Beauty of Hornsey.**

365. Campanula. Колокольчикъ. Семейство **Campanulaceae.** Многолѣтнее и однолѣтнее садовое растеніе.

Однолѣтній колокольчикъ цвѣтетъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ, если его высѣютъ въ парникъ въ Сентябрѣ. Когда онъ окрѣпнетъ его разсаживаютъ въ горшки и ставятъ на воздухъ, а съ наступленіемъ заморозковъ вносятъ въ оранжерею. Для грунта Колокольчикъ сѣтся въ Апрѣлѣ, въ полутеплый парникъ, и по всходѣ высаживается въ цвѣтникъ, въ рыхлую, песчанистую замлю, на солнце.

Виды: **C. Lorei**, съ бѣлыми и синими цвѣтами.

C. Loefflingii, съ темно-голубыми цвѣтами.

C. Speculum. К. *синій.*

C. Speculum album. К. *бѣлый.*

C. S. roseum. К. *розовый.*

C. S. grandiflorum. **C. s. g. album.** Колокольчикъ многолѣтній, разводится сѣменами и дѣленіемъ корней; зимою поливается весьма умѣренно; требуетъ землю, составленную изъ разныхъ частей лиственной, дерновой и песку.

Виды: многолѣтняго колокольчика:

C. pyramidalis. Требуется покрывки на зиму.

C. nobilis. Оранжерейное растеніе, съ большими фіолетовыми цвѣтами, въ центру болѣе блѣдными и вообще испещренными.

C. nobilis alba. Тоже, съ бѣлыми цвѣтами.

C. n. albiflora. Большой бѣлый цвѣтокъ, испещренный темно-коричневыми точками и черточками.

C. Vidalii, съ бѣлыми цвѣтами.

C. colorata. Маленькіе, темно-фіолетовые цвѣты. Растеніе воздушное.

C. Carpatica. К. Карпатскій.

C. c. alba. К. бѣлый.

C. lactiflora. К. млечный.

O. Medium. Съ большими цвѣтами; требуетъ покрывки на зиму, или зимуетъ въ подвалѣ, либо въ оранжереѣ.

C. medium alba. *C. m. a. plena*. *C. m. coerulea plena*.

C. rosea plena. *C. mucronata*, съ темно-синими цвѣтами, зимуетъ въ грунту безъ покрывки.

C. speciosa. Оранжерейное растеніе.

C. Traheliana. Примочная трава.

C. persicifolia alba plena. Котельчикъ. Садовый колокольчикъ съ продолговатыми листьями, какъ бы у Персиковаго дерева.

C. persicifolia coerulea. Съ бѣлыми цвѣтами и бѣловатыми листьями.

C. glomerata. Примочникъ. Дикарастущее, многолѣтнее, медоносное и лекарственное растеніе; цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

C. Raineri. Низкорослое растеніе съ береговъ Оз. Кото, съ многочисленными цвѣтами.

C. soldanellaeflora plena. Низенькое, многолѣтнее растеніе, съ многочисленными, весьма красивыми, фіолетовыми цвѣтами; своимъ рисункомъ вовсе не походитъ на обыкновенный колокольчикъ.

Виды дикарастущаго Колокольчика: *C. sibirica*. Мясная трава.

C. patula. Звонецъ болотный.

C. cervicaria. Бѣшалъ. Синій зябробой.

C. bononiensis. Рядникъ.

Виды низкорослаго Колокольчика, цвѣтущаго въ теплицѣ, въ Апрѣлѣ.

C. trahelium alba plena. К. Европейскій.

C. t. coerulea plena. *C. t. lilacina plena*. *C. pulla*.

C. pusilla.

- 366. Campanula lanceolata.** Изъ семейства **Campanulaceae.** Оранжерейное растеніе, вьющееся, съ красивыми, бѣлыми снаружи цвѣтами, въ видѣ колокольчиковъ, внутри пестрыми, какъ цвѣтокъ *fritillaria*. Осенью теряетъ стебель и тогда держится сухо въ умѣренной оранжерей. Весною пересаживается въ легкую землю, размножается сѣменами и черенками. Другой видъ: *C. javanica*. Цвѣты бѣлые съ малиновымъ.

- 367. Camphora. Laurus camphora.** *Камфарное дерево.* Тропическое дерево съ маленькими, бѣловатыми цвѣтами. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается сѣменами и черенками. Требуется земля составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Изъ этого дерева добывается лекарственное вещество, извѣстное подъ именемъ «Камфоры».

Виды: *C. officinarum. C. chinensis. C. glandulifera.*

- 368. Camptobotrys.** Изъ семейства **Rubiaceae.** Весьма красивое, тепличное растеніе. Требуется легкой дерновой земли, съ примѣсью хорошо перепрѣвшаго навоза. Во время развитія растеніе требуетъ повторенной пересадки. Врывается съ горшкомъ въ дубильную кору; часто опрыскивается лѣтомъ, хорошо провѣтривается и отбѣляется. Размножается черенками; производитъ маленькіе, зеленоватые цвѣтки, на красныхъ почкахъ.

Виды: *C. discolor*, съ красными цвѣтами. *C. argyroleuca. C. regalis. C. ghiesbreghtii. C. pyrophylla.*

- 369. Canarina laevidata. C. campanula.** *Колокольчикъ Канарійскій.* Изъ семейства **Campanulaceae.** Оранжерейное растеніе, съ желтыми, испятнанными коричневымъ цвѣтами, въ видѣ колокольчиковъ. Клубневые корни этого растенія лѣтомъ содержатся совершенно сухо, въ холодной оранжерей. Въ Августѣ ихъ сажаютъ въ легкую, песчанистую землю, въ глубокіе горшки и ставятъ въ парникъ или къ окнамъ оранжерей. Цвѣтетъ въ Ноябрь, во время цвѣтенія сильно поливается, а когда отцвѣтетъ содержится сухо, пока весною, не вынуть изъ земли для просушки, какъ выше сказано.

- 370. Canna.** Семейство **Cannaceae.** Тепличное, декоративное, корневое, травянистое растеніе, съ большими листьями и стеблемъ, достигающимъ до 3-хъ аршинъ, — съ алыми, желтыми, оранжевыми или лиловыми цвѣтами. Размножается сѣменами

и отростками корней. Требуется земля, составленную из равных частей: листовой, дерновой, с примѣсью незначительнаго количества песка. На зиму стебли можно срѣзывать и корни держать почти сухо, начавъ поливку горшковъ въ концѣ зимы, приступая къ выгонѣ растенія. Въ концѣ Мая нѣкоторые виды, а именно: *Coccinea*, *discolor*, *Warszewischy*, могутъ быть высажены въ грунтъ. Сѣмена Канны, прежде чѣмъ ихъ посадить, надлежитъ облить кипяткомъ и держать въ водѣ этой, пока она не остынетъ. Безъ этой мѣры сѣмена очень долго или вовсе не всходятъ.

Виды: *C. Coccinea*. Достигаетъ 3-хъ футовъ высоты, съ ярко-красными цвѣтами и свѣтло-зелеными листьями.

C. discolor. Съ темно-зелеными, переходящими въ красно-коричневый цвѣтъ листьями.

C. Annei. Висаживается на лѣто въ грунтъ, гдѣ сильно и красиво разрастается.

C. gigantea. Достигаетъ сажени высоты, съ ярко-зелеными листьями.

C. liliiflora. Съ желтыми цвѣтами.

C. Warszewischii. Съ красно-коричневымъ стеблемъ и листьями и темно-красными цвѣтами.

C. indica. *C. indica foliis variegatis*. Листья зеленые съ бѣлымъ.

C. Iridiflora. Самый красивый сортъ, съ большими пониклыми, малиново-красными цвѣтами. Распускается въ Декабрѣ; любитъ теплое помѣщеніе зимою, а лѣтомъ теплый парникъ.

C. orientalis. *C. floribunda*. *C. bicolor*. *C. Annei auriata*. *C. Bonnetti*. *C. compacta*. *C. grandis*. *C. karsteniana*. *C. musaeifolia*. *C. m. maxima*. *C. nepalensis*. *C. rubricaulis*. *C. Sanguinea*. *C. Sellowi*. *C. Spectabilis*. *C. Variabilis*. *C. Zebrina*. *C. angustifolia*. *C. flaccida*. *C. aurea*. *C. brasiliensis*. *C. Crocea*. *C. limbata*.

371. *Cannabis sativa*. Конопля. Изъ семейства *Urticeae*. Однолѣтнее, разводимое на поляхъ и огородахъ растеніе. Изъ стебля его добывается извѣстное волокно-пенька; со цвѣтовъ — пчелы берутъ взятки; изъ цвѣточной пыли добывается наркотъ.

тическое вещество — хашишъ; изъ сѣмянъ выдѣлывается масло. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Другіе виды: *C. Chinesis.* Китайская конопля. *C. gigantea.* К. исполинская. К. пирамидальная. Однолѣтнее, грунтовое растеніе, похоже на обыкновенную коноплю, но при благопріятныхъ условіяхъ вырастающее до двухъ сажень въ высоту; высѣвается въ Мартѣ, въ парникъ или въ горшки и потомъ высаживается въ цвѣтникъ, въ сильно удобренную землю, по одиночкѣ, какъ декоративное растеніе.

372. *Cantua.* Изъ семейства *Polemoniaceae*. Оранжерейный кустарникъ съ желтыми, красными или розовыми цвѣтами. Можетъ расти и въ комнатѣ. Размножается черенками. Требуется земля, составленную изъ трехъ четвертей вересковой, $\frac{1}{8}$ части лиственной и $\frac{1}{8}$ дерновой земли. Лѣтомъ сажается на солнечное мѣсто въ грунтъ; съ наступленіемъ морозовъ высаживается въ горшки; содержится въ оранжереѣ довольно сухо и въ Декабрѣ или Январѣ, вносится въ теплицу, гдѣ и зацвѣтаетъ въ Январѣ. Размножается сѣменами и черенками.

Виды: *C. Buxifolia.* Большіе цвѣты, внутри ярко-розовые, снаружи желтые.

C. pyrifolia. Большой букетъ, бѣлыхъ съ желтымъ цвѣтовъ, въ красномъ основаніи.

C. dependens. Продолговатые цвѣты съ махровыми вѣнчиками; наружная сторона цвѣточныхъ трубочекъ, малиновая съ оранжевымъ.

373. *Saranea grandiflora.* Тепличное растеніе изъ семейства Геснерій, съ большими бѣлыми цвѣтами, внутри испещренными розовыми черточками. Любитъ затѣненное мѣсто, землю, составленную изъ лиственной и глинистой. Размножается черенками.

374. *Capnorchis chrytantha.* Изъ семейства *papaveraceae*. Воздушное растеніе съ букетомъ желтыхъ цвѣтовъ. Размножается посѣвомъ и дѣленіемъ корня. Любитъ много свѣту и воздуха.

375. *Capraria lanceolata.* Оранжерейное растеніе.

376. *Caprifolium.* Каприфолій. Козья лоза. Вьющійся кустарникъ,

съ ароматическими цвѣтами; разводится въ паркахъ и садахъ; на зиму хорошо прикрывается.

Виды: *C. italicum album*. Съ бѣлыми, особенно ароматическими цвѣтами.

C. periclimen rubrum. Съ пурпуровыми цвѣтами.

C. quercifolium variegata. Съ пестрыми листьями.

C. branchypodium. *C. dioicum*. *C. etruscum*. *C. flexuosum*. *C. Frazeri*. *C. hybridum superbum*. *C. latifolium*. *C. Magnevillii*. *C. odoratissimum*. *C. pallidum*. *C. proliferum*. *C. sempervirens*.

377. *Sapparis*. *Каперсы*. Семейство *Sapparideae*. Растетъ деревцомъ или кустарникомъ и въ нашихъ степяхъ въ дикомъ состояніи, можетъ расти и въ комнатѣ. Размножается сѣменами, отводками и черенками. Требуется смѣсь половины лиственной земли, съ четвертою частію дерновой и четвертою частью песку. Зимой поливается весьма умеренно. Нераспустившіеся, цвѣточные бутоны этого растенія приготовляются въ проѣъ особымъ способомъ и употребляются въ приправу къ кушаньямъ, подъ именемъ *каперсовъ*.

Виды: *C. spinosa*. Небольшой кустарникъ, съ крупными бѣлыми или розовыми цвѣтами.

C. ferruginea. Корни его имѣютъ лекарственныя свойства.

C. herbacea. Растетъ дико на Кавказѣ, въ Крыму и даже въ Самарской губерніи. Цвѣточные почки его маринуются въ уксусъ и употребляются въ приправу къ кушаньямъ.

C. cynopholophora. Дико произрастаетъ въ Вестъ-Индіи и Бразиліи; достигаетъ вышины 6 футовъ; имѣетъ продолговатые плоды въ видѣ стручковъ, употребляемые какъ лекарство. *C. Leilanica*. *C. verrucosa*.

378. *Capsicum annuum*. *Испанскій* или *красный стручковый перецъ*. Изъ семейства *Solanaceae*. Однолѣтнее, овощное растеніе, дающее стручки краснаго или желтаго цвѣта, имѣющее всѣмъ извѣстное употребленіе какъ приправа въ пищу, въ естественномъ видѣ или будучи растерто въ порошокъ подъ именемъ *испанскаго перца*, наконецъ какъ лекарство. Сѣется сперва въ горшки или парникъ и пересаживается въ грунтъ, когда уже нельзя ожидать морозовъ. Любитъ сильную, свѣжеудобренную навозомъ, рыхлую землю.

Виды: *C. baccatum* и *C. pendulum*. Многолѣтнее растение, размножается посѣвомъ въ Мартѣ, — черенками и отростками. Требуется земля, составленную изъ лиственной пополамъ съ дерновою и съ нѣкоторою примѣсью песку.

C. frutescens. Оранжевое растение. *C. angulosum*. *C. longum*. *C. annuum*. *C. sinense*. *C. microphyllum*. *C. testaceum*.

379. *Caragana*. *Сибирская акація*. Кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ и парковъ.

Виды. *C. arborescens*. *Акація*. *Горловникъ древесный*.

C. frutescens. *Желтыйякъ*. *Чепыжникъ*.

C. pigmaea. *Золотарникъ*.

C. jubata. *Верблюжий хвостъ*. Получило названіе отъ совершенно особаго наружнаго вида: стебельчатые листья покрываютъ свислые побѣги.

C. ferox. *Горловникъ колючій*.

C. Altagana. *C. Chamalaga*. *C. glomerata*. *C. grandiflora*. *C. microphylla*. *C. mollis glabra*. *C. pigmaea pendula*. *C. Redowski*. *C. spinosa*.

380. *Caraguata*. Тепличное растение, изъ семейства Бромелій, требуетъ одинаковаго съ ними ухода.

Виды: *C. lingulata*. *C. splendens*, съ красными цвѣтами.

381. *Carapa guianensis*. Тепличное растение; изъ сѣменъ его, величиною въ куриное яйцо приготавливаютъ противуглистное лекарство.

382. *Cardamine amara*. *Дикая рѣдика*. Дикорастущее.

Другой видъ. *C. pratensis*. *Крессъ махровый*. *Сердечникъ*. Дикорастущее, двухлѣтнее, медоносное и садовое грунтовое растение; цвѣтетъ въ Апрѣлѣ. Молодые листья употребляются вмѣсто крессъ-салата, въ пищу и какъ противоглистное средство.

383. *Cardiospermum pubescens*. Оранжевое растение.

384. *Cardopatum corymbosum*. Многолѣтнее растение, съ кожистыми листьями и сине-лазуревыми цвѣтами. Лѣтомъ высаживается въ грунтъ. Растетъ въ дикомъ состояніи близъ большихъ дорогъ.

385. Carduus acanthoides. *Чертополохъ колючій. Волчецъ. Бу-
дякъ.* Изъ семейства **Synanthereae**. Дикорастущее, двухлѣт-
нее, медоносное растеніе, составляющее сорную траву; цвѣ-
теть въ Іюлѣ и Августѣ. Растеніе покрыто колючками, отчего
и получило названіе. (По-кельтски **ard**, значить *остріе*).

Другіе виды: **C. Verdii**. Однолѣтнее, орнаментальное расте-
ніе, разводимое въ цвѣтникахъ; имѣетъ иглистые листья, по-
крытые бѣлымъ пушкомъ. Производитъ красные цвѣты въ ко-
лючихъ головкахъ.

C. crispus. *Осоцъ красный.* Дикорастущее.

C. nutans. *Ръпей колкій. Волчецъ. Чертополохъ поник-
лый.* Дикорастущее, однолѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтеть
въ концѣ Іюня.

C. macrocephalus. *Ч. большоголовый.* Дикорастущее,
двухлѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтеть среди лѣта.

386. Careopsis grandiflora и **C. Drummondii**. Многолѣтнее
растеніе съ желтыми цвѣтами; высѣвается прямо въ грунтъ;
зимуетъ при надежной покрывкѣ, на открытомъ воздухѣ или
содержится зимою въ подвалѣ, либо въ оранжереѣ, посажен-
ное въ горшокъ.

387. Carica. Тропическое дерево, съ бѣлыми цвѣтами и большими
плодами, похожими на дыню. Размножается сѣменами и че-
ренками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей
дерновой, лиственной и вересковой. Содержится въ оранжереѣ.

Виды: **C. erythrocarpa.** Тепличное, кустарное растеніе съ
мясистымъ стеблемъ, бѣлыми цвѣтами и ярко-красными пло-
дами, величиною съ куриное яйцо.

C. rapaia. *Арбузное дерево. Дынное дерево.* Имѣетъ бѣ-
лые, ароматическіе цвѣты, лопатообразные листья и тонкій
вытянутый стволъ, дѣлающій растеніе похожимъ на пальму.
Плоды величиною со средній арбузъ, похожіе и вкусомъ на
арбузъ, а видомъ напоминающіе тыкву. Содержится въ теплицѣ.

388. Carludovica. Тропическое растеніе, съ толстыми корневи-
щами, иногда пускающими подземные отростки. Воздушные
корни, выходящіе изъ стебля этого растенія, прирастаютъ къ
другимъ деревьямъ. Имѣетъ желтоватые цвѣты. Размножается
сѣменами и отнятіемъ боковыхъ и подземныхъ побѣговъ. Тре-

буетъ вересковую землю, съ прибавкою одной части дерновой небольшого количества лиственной и песку. Растенію необходима тепличная культура при 14° R. и при влажной атмосферѣ.

Виды: *C. latifolia*. *C. macropoda*. *C. humilis*. *C. artovirens*.

Слѣдующіе виды хорошо растутъ и въ комнатѣ: *C. flabelata*. *C. plicata*. *C. macrocephala*. *C. Sartorii*. *C. Moritziana*. *C. palmifolia*. Достигаетъ 10 футовъ высоты.

C. palmata R. et Pav. Изъ листьевъ этого растенія дѣлаются извѣстные *панамскія шляпы*. (Папама).

389. *Carolinea*. Весьма красивое, тепличное растеніе, съ орнаментальными листьями. Требуешь землю, изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и перепрѣвшаго перегноя. Размножается черенками.

Виды. *C. alba*. *C. fastuosa*.

Оранжевые виды: *C. insignis*.

C. princeps. Плоды употребляются въ пищу, какъ каштаны.

390. *Carpinus*. *Грабъ*. Изъ семейства *Cupuliferæ*. Дерево, разводимое для украшенія садовъ и парковъ.

Виды: *C. betulus*. *Грабъ обыкновенный*. *Грабина березообразная*. Дерево на почву не прихотливое, растетъ весьма быстро; употребляется для живыхъ изгородей; размножается сѣменами, рассадою, отводками, отдѣленіемъ отпрысковъ и прививкою. Любитъ глинистую почву, смѣшанную съ черноземомъ и крупнымъ пескомъ, также любитъ свѣжій и извѣстковый грунтъ.

C. Ostria. *Г. хмѣлевидный*. Американское дерево, съ очень гладкою корою и очень бѣлою древесиною.

C. virginiana. *C. americana*. *Г. Виргинскій*. *C. orientalis*. *Г. Восточный*, размножается прививкою къ другимъ породамъ; вымерзаетъ.

391. *Carthamus tinctorius*. *Сафлоръ*. *Шифлоръ*. *Желтяница*. Многолѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ въ Іюнѣ и Августѣ; изъ его цвѣтовъ добываютъ красную краску.

392. *Carum bulbocastanum*. Мышки. Земляные орехи. Дикорастущее, клубни его употребляются въ пищу.

393. *Carum carvi*. Тминъ. Изъ семейства *Umbellifereae*. Дикорастущее, двухлѣтнее, ароматное, медоносное растение, разводимое въ огородахъ; сѣмена его употребляются въ приправу къ кушаньямъ, для выдѣлки водокъ и какъ лекарство; корни его употребляются нѣкоторыми въ пищу, какъ зелень. Требуется рыхлой, хорошо удобренной земли; даетъ сѣмена только на второй годъ, но корни могутъ употребляться въ первый же годъ; сѣется въ началѣ Мая, прямо на гряды или въ парникъ; всходы тщательно опалываются и разсаживаются на поларшина другъ отъ друга; во время роста, землю около тмина мотыжатъ и его нѣсколько разъ въ лѣто окучиваютъ.

394. *Caryocar nuciferum*. Тепличное деревцо. Даетъ орѣхъ величиною съ человѣческую голову и огромный пурпуровый цвѣтокъ съ желтыми тычинками, числомъ болѣе четырехъ тысячъ, въ каждомъ. Содержится въ горшкѣ съ хорошимъ дренажемъ, съ тучною и влажною землею. Часто прищипывается для образованія кроны. Безъ затрудненія размножается черенками.

395. *Caryophyllus aromaticus*. Гвоздичное дерево. Изъ семейства миртовыхъ. *Myrtaceae*. Высокое, всегда зеленое дерево. Даетъ бѣлые цвѣты съ малиною чашечкою и сильнымъ запахомъ, эти-то чашечки, будучи высушены, извѣстны какъ пряность, подъ именемъ *гвоздики*. Размножается сѣменами и черенками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной, съ небольшою примѣсью песку.

396. *Caryota*. Родъ Пальмъ. Тепличное растение, хорошо содержится и въ комнатѣ; имѣетъ листья до семи аршинъ длиною, весьма похожіе на плавательныя рыбы перья: цвѣтетъ только разъ во все свое существованіе; даетъ желтые цвѣты; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной; разводится сѣменами и отводками; зимою содержится сухо.

Виды: *C. urens* — даетъ сахаръ, крахмалъ и волокно на пряжу.

C. sobolifera. *C. mitis*. *C. Rumphiana*. *C. Cumingii*.

C. elegans. C. majestica. C. purpurea. C. propinqua. C. maxima. C. furfuracea и *C. densiflora*. Особенно пригодна для разведенія въ небольшихъ теплицахъ, потому, что не такъ сильно растетъ, какъ другіе виды.

397. *Casselia integrifolia*. Маленькій тепличный кустарникъ съ лиловыми цвѣтами; любить атмосферу, нѣсколько влажную; землю, составленную изъ дерновой, лиственной и вересковой частое опрыскиваніе и очищеніе отъ насѣкомыхъ; размножается черенками.

398. *Cassia* Кассія. Изъ семейства *cesalpineae*. Тропическое дерево, съ желтыми или розовыми цвѣтами; можетъ расти въ комнатѣ; уходъ за этимъ растеніемъ очень трудный; зимою требуетъ непремѣннаго поддержанія въ его почвѣ равномерной влажности; размножается сѣменами и черенками; требуетъ землю, составленную изъ дерновой и лиственной, съ незначительною примѣсью песку. Содержится въ теплицѣ.

Виды: *C. Brasiliana. C. corymbosa. C. florida. C. laevigata*. Изъ Бразиліи. *C. marylandica. C. speciosa. C. mimosoides Telfaireana*. Тропическое однолѣтнее растеніе значительной величины, съ желтыми цвѣтами.

C. Senna. *Александрійскій листъ*. Небольшой африканскій кустарникъ, изъ листьевъ котораго изготовляютъ слабительное.

399. *Cassine maurociana*. Тропическое дерево идетъ на изготовленіе музыкальных инструментовъ.

400. *Castanea*. Каштанъ. Изъ семейства *Cupuliferæ*. Дерево достигающее удивительной толщины, напримѣръ 30 футъ въ объемѣ, даетъ сѣдобный плодъ. Можетъ расти въ нашихъ южныхъ мѣстностяхъ на открытомъ воздухѣ.

Виды: *C. vesca. К. обыкновенный*. Любитъ питательную, свѣжую, песчанисто-суглинистую почву, размножается посѣвомъ сѣменъ осенью или весною, безразлично, посадкою отростковъ и прививкою.

C. pumila. К. малорослый. Рѣдко достигаетъ вышины 30 футъ, съ плодами, не крупнѣ лѣснаго орѣха, хорошо растетъ на сухой, бесплодной почвѣ.

C. Chrysophilla. Оранжевое дерево, размножается черенками.

401. *Castanospermum australe*. Содержится въ теплицѣ. Даетъ плоды извѣстные подъ именемъ *новоголландскихъ каштановъ* и употребляемые въ пищу.

402. *Castilva elastica*. Мексиканское дерево, даетъ каучукъ.

403. *Castilleja lithospermoides*. Оранжерейное растеніе съ пунцовыми цвѣтами въ видѣ султана, размножается въ началѣ весны сѣменами; разсаживается въ плошки и пересаживается въ грунтъ въ тучную землю или содержится въ горшкѣ въ оранжереѣ.

404. *Casuarina*. Хвойное, оранжерейное растеніе, съ мелкими, коричневыми или буро-красноватыми цвѣтами, во множествѣ покрывающими растеніе въ Январѣ. Размножается черенками, на которые употребляются боковые побѣги, но еще лучше размножается сѣменами.

405. *Catalpa*. *Волторошникъ*. Дикорастущее.

Виды: *C. Syringaefolia*. *Катальпа сиренелистная*. Дерево, употребляемое для украшенія садовъ и парковъ, на зиму обвертывается соломой, а корень покрывается сухимъ листомъ.

C. bignonioides. *Адамово дерево*. Изъ семейства Бигоній, разводится въ садахъ южной Европы; цвѣтеть въ Іюль и Августъ.

C. cordifolia. Оранжерейное растеніе.

406. *Catanauche coerulea*. *Голубой тресучникъ*. Многолѣтнее растеніе съ синими цвѣтами; лѣтомъ содержится въ грунту, а на зиму вынимается и сохраняется въ Оранжереѣ или подвалѣ.

407. *Catasetum*. Орхидея съ зеленоватыми, темными и бѣлыми цвѣтами; размножается дѣленіемъ корней; можетъ расти въ комнатѣ; сажается на кускѣ угля; требуетъ листовенную землю, пополамъ съ вересковою.

Виды: *C. atratum*. *C. Naso*. *C. tridentatum*. *C. longifolium*.

408. *Catesbaca spinosa*. Лекарственное растеніе съ Багамскихъ острововъ.

409. *Cathcartia villosa*. Изъ семейства *papaveraceæ*, съ желтыми цвѣтами; разводится какъ однолѣтнее растеніе сѣменами; на лѣто сажается на мѣсто нѣсколько затѣненное.

410. *Catoblastus*. Родъ Пальмъ.

Виды: *C. praemorsus* и *C. pubescens*.

411. *Cattleya*. Тропическая Орхидея. Воспитывается въ сквозныхъ, подвѣсныхъ горшкахъ или на чуркахъ; требуетъ одного ухода съ прочими орхидеями. Весьма красивое растеніе, съ бѣлыми, лиловыми или пестрыми цвѣтами. Имѣетъ бульбы въ видѣ стеблей и жесткіе, продолговатые листья; размножается дѣленіемъ корней; можетъ содержаться и въ комнатѣ, причемъ ставится на южную сторону.

Виды: *C. citrina*. Цвѣтокъ лимоннаго цвѣта.

C. labiata v. *picta*. Большой лиловый цвѣтокъ, съ оранжевымъ пятномъ въ верхней части нижней губы.

C. labiata var. *candida*. Большой молочно-бѣлый цвѣтокъ, нижняя губа малиновая, испещренная темными полосками.

C. Superba, большой, розовистый цвѣтокъ.

C. eldorado. Большой бѣлый цвѣтокъ. Нижняя губа оторочена лиловымъ, зѣвъ внутри оранжевый.

C. acklandiæ. Цвѣтокъ зелено-желтый, испещренный коричневыми пятнами; нижняя губа малиновая съ бѣлымъ.

C. granulosa. Цвѣты зеленоватые, испещренные малиновымъ; нижняя губа малиновая съ бѣлымъ, испещрена темно-малиновымъ.

C. Downiana. Съ большими, желтыми цвѣтами и лиловою нижнею губою.

C. maxima. Съ блѣдно-розовыми цвѣтами, у которыхъ на нижней губѣ проходятъ темно-карминовые жилки, а края отстрочены бѣлыми каймами. Дискъ золотисто-желтый.

C. crispa. *C. Forbesii*. *C. Mossiæ*. *C. Skinneri*. *C. Leopoldii*. *C. picta*. *C. elegans*.

412. *Daucus carota*. *Морковь*. Овощъ, употребляемая въ пищу, сырая и приготовленная различными способами. Требуется глубоко обработанной почвы, особенно бываетъ вкусна, растущая на песчанистой землѣ. Морковь размножается посѣвомъ. Сѣмя всѣваются или сухое, или пророщенное. Посѣвъ сухаго сѣмени

дѣлается въ первыхъ числахъ Мая, причемъ сѣмя предварительно перетирается съ крупнымъ, сырымъ пескомъ. Рощеное сѣмя моркови высѣвается позже. Для пророщенія сѣмя, насыпавъ въ мѣшечекъ, кладутъ на сутки въ воду, вынувъ хорошо перетираютъ руками, раскладываютъ на сито и закрываютъ мокрую тряпкою, затѣмъ раза три въ день перемѣшиваютъ руками. Когда сѣмя дастъ ростки, высѣваютъ на углаженную гряду, присыпая слегка землею. Вообще морковь сѣютъ рѣдко, если же и затѣмъ она взойдетъ густо, то надлежитъ всходы продергать; гряду содержать чисто отъ сорныхъ травъ и во время засухи, нѣсколько разъ сильно полить. На гряду ширины въ $1\frac{1}{4}$ аршина и длины въ 10 сажень, высѣваютъ сухаго сѣмени до 3-хъ лотъ.

Морковь раздѣляется по виду на длинную и короткую или коротель;—по цвѣту на бѣлую, желтую, красную и фіолетовую; наконецъ—на грядовую и парниковую. Для ранней выгонки употребляются только различные сорта *коротели*. Въ Февралѣ или началѣ Марта, коротель сѣется въ теплый парникъ, въ землю не слишкомъ тучную, которая должна быть какъ можно ближе къ рамамъ; въ парникѣ съ такимъ посѣвомъ воздухъ освѣщается какъ можно чаще и держится умѣренная теплота, при умѣренной же поливкѣ. Также можно сѣять коротель въ ящикѣ, держать сначала въ теплицѣ, потомъ въ парникѣ и наконецъ, когда станетъ тепло, просто на воздухѣ. Въ продажѣ у насъ существуютъ сѣмена слѣдующихъ сортовъ моркови.

Морковь *длинная*: *франкфуртская темно-красная*, *брауншвейгская красная*, *Эрфуртская красновато-желтая*. Эти три сорта лучше всѣхъ прочихъ. *Красная голландская*, *Амтрингамская*, *нѣжно-бѣлая*. *Большая бѣлая*. *Воробьевская*, одинъ изъ лучшихъ сортовъ. *Исполинская бѣлая*, *зеленоголовка*, не такъ сладка и скорѣе идетъ на кормъ скоту. *Красная зеленоголовка*—тоже *фіолетовая*. *Коротель парниковый голландскій* лучший сортъ. Тоже *французскій коротель*, *длинная англійская*. *Коротель Франкфуртская*—самая мелкая и самая ранняя.

413. *Ceanothus americanus*. *Американскій чай*. *Американскій пузырникъ*. Изъ семейства *Rhamneae*. Кустарникъ съ бѣ-

лыми, превосходными цвѣтами, разводимый для украшенія садовъ и парковъ. Содержится и въ оранжереѣ, размножается сѣменами, черенками и корневыми отпрысками. Требуется тучную землю и хороший дренажъ въ горшкѣ.

Другіе виды: *C. floribundus*. Съ голубыми цвѣтами.

C. Weitchianus. Съ синими цвѣтами и желтыми тычинками и пестиками, окружающими цвѣтокъ будто волосами.

Оранжерейные виды: *C. thyrsiflorus*. Съ прекрасными голубыми цвѣтами.

C. azureus. Голубой цеанотъ. Кустарникъ вышиною до 6 футовъ, съ синими цвѣтами, распускающимися въ Февралѣ или Мартѣ.

C. lobbianus. Съ синими цвѣтами.

414. *Cedrela febrifuga*. Тепличное растеніе съ о-ва Явы. Горькая кора его употребляется противъ лихорадки. Стебель имѣетъ запахъ кедровой смолы, отчего и получило названіе (*Cedrus*—Кедръ).

Другой видъ: *C. odorata*. Южно-Американское дерево, изъ котораго, подъ именемъ «Кедроваго» обыкновенно выдѣлываютъ сигарные ящики.

415. *Cedrus*. Кедръ. Огромное, хвойное дерево, растетъ на открытомъ воздухѣ, въ холодныхъ странахъ. Воспитывается въ оранжереѣ и можетъ жить въ комнатѣ. Размножается сѣменами. Зимой поливается умеренно; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей лиственной, дерновой и вересковой. Получило названіе отъ рѣки Кедрона, по берегамъ которой, въ древности, встрѣчалось въ изобиліи.

Виды: *C. Libanii*. Кедръ Ливанскій. *C. deodora* и *C. Atlantica*.

416. *Celastrus*. Африканское, кустовое растеніе съ бѣлымъ, въ видѣ звѣзды, цвѣткомъ; сохраняетъ плоды всю зиму. Размножается черенками. Можетъ расти въ комнатѣ, но зимою требуетъ самой умеренной поливки. Любитъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: *C. scandens*. Вьющійся кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ и парковъ.

C. edulis. Съ красивыми, темно-пурпуровыми листьями,

изъ которыхъ добывается, такъ называемый, „*Китэ*“, употребляемый Арабами, какъ чай.

417. *Celosia cristata*. *Пятуюшій гребешекъ*. Изъ семейства *Amaranthaceae*. Однолѣтнее грунтовое растеніе, съ цвѣткомъ въ видѣ пѣтушьяго гребешка. Высѣвается въ Апрѣлѣ, теплый парникъ или теплицу. Всходы рано пересаживаются въ горшки и ставятся близко къ рамамъ, (иначе стебельки загниютъ). Въ Маѣ растеніе разсаживается въ горшки, въ тучную землю и нѣсколько разъ поливается навозною жижею. Чтобы имѣть пышный цвѣтокъ, боковыя вѣтви растенія надлежитъ выламывать, по мѣрѣ появленія ихъ. Когда растеніе совершенно укоренится, въ концѣ Мая, его высаживаютъ въ грунтъ. Растеніе это можно держать въ комнатѣ.

Виды съ цвѣткомъ, похожимъ на пѣтушій гребень:

C. cristata aurantiaca. *C. c. chamois*. *C. c. coccinea*. *C. c. gigantea*—самый красивый видъ. *C. c. splendens*. *r. c. comosa*. *C. c. castrensis*. *C. c. purpurea*. *C. c. Cosea*. *C. rubra*. *C. c. nana aurea*. *C. c. n. atropurpurea*. *C. c. n. purpurea*. *C. c. n. rosea*. *C. c. n. rubra*. Виды, у которыхъ цвѣтокъ имѣетъ пирамидальное расположение: *Celosia pyramidalis alba*. *C. p. atrovioleacea*. *C. p. aurea*. *C. p. coccinea*. *C. macrocephala gigantea*.

418. *Celsia lanata*. Оранжевое растеніе.

Другіе виды: *C. lanceolata*. *C. Aretus*.

419. *Celtis*. *Каркасъ*. Дерево, достигающее 50 футъ съ жесткими листьями; размножается посѣвомъ сѣменъ осенью; на почву не прихотливо; въ молодости требуетъ, въ нашемъ климатѣ, покрывки на зиму.

Виды: *C. lima*. *К. мирообразный*. Дикорастущее, американское дерево, съ мохнатыми листьями, весьма трудно разводимое.

C. orientalis. *К. восточный*. Выносить зиму безъ покрывки.

C. coriacea. *К. кожистый*.

C. glabrata. Кукучь Агачъ.—Дикорастущее.

C. australis. *К. южный*. *Обрастница*. Кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ и парковъ.

C. cordata. *К. сердцелистный*. Размножается прививкою.

C. occidentalis. *К. западный.* Кустарникъ съ бѣловатыми цвѣтами; плоды его похожи на вишню; любитъ полутѣнистую мѣстность, тучную и влажную почву и хорошую защиту на зиму. Размножается сѣменами и отводками.

C. Tournefortii. *К. Турнефорта.*

420. Ceneraria. *Ценерарія.* Многолѣтнее, травянистое растеніе, съ весьма красивыми цвѣтами, различныхъ колеровъ. Размножается сѣменами; ихъ высѣваютъ, осенью, въ плошки и покрываютъ стекломъ, чтобы удобнѣе сохранилась равномерная влага и тепло. Когда растеніе взойдетъ, его рассаживаютъ въ плошки же или ящики, на четверть вершка другъ отъ друга; когда же эти растеньица, будучи приставлены къ свѣту, пойдутъ въ ходъ и начнутъ касаться другъ друга, ихъ опять рассаживаютъ. Наконецъ, въ концѣ Мая, ихъ рассаживаютъ, по одиночкѣ, въ вершковыя горшки и ставятъ въ прохладный парникъ, гдѣ ихъ только оберегаютъ отъ мороза. Черезъ три недѣли Ценераріи пересаживаются въ горшки, вдвое большіе, и ставятъ въ такой же парникъ; наконецъ еще черезъ три недѣли, ихъ пересаживаютъ въ горшки, имѣющіе въ верхней части, футъ въ діаметрѣ. При всякой возможности, растеніямъ дается больше свѣжаго воздуха и наблюдается чтобы они находились во влажной атмосферѣ. Когда, въ началѣ лѣта, у Ценерарій стануть выростать цвѣточные стебли, растеніе можно пересадить въ грунтъ, или, если они предназначаются для горшечной культуры—то въ горшки, нѣсколько большей величины. Тутъ Ценераріи будутъ цвѣсть очень сильно и долго, а когда отцвѣтутъ, ихъ вносятъ въ оранжерею, гдѣ они и зимуютъ, вновь зацвѣтая весною.

Ценерарія требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой или лиственной, песку или коровьяго перегноя.

На Ценерарій нападаетъ вошь. Въ отвращеніе этого, растеніе какъ можно больше надо освѣжать и очищать отъ вшей кисточкою, но отнюдь не окуривая табакомъ, такъ какъ, при этомъ, вмѣстѣ со вшами, погибаетъ и растеніе.

421. Senia geminaa. Однолѣтнее, грунтовое растеніе—не заслуживаетъ разведенія въ саду.

Виды: **C. formosa**, съ желтыми цвѣтами.

C. pruinosa, съ бѣлыми цвѣтами.

C. turbinata, съ желтоватыми цвѣтами, предварительно высѣвается въ парникъ.

422. *Centaurea*. Василекъ. Пылушникъ. Изъ семейства *Synanthereae*. Однолѣтнее и многолѣтнее, грунтовое растеніе, сѣется прямо въ грунтъ, раннею весною или осенью. Даетъ голубые, синіе, красные или фіолетовые цвѣты. Растеніе медоносное. По мифологіи, этимъ растеніемъ Центавръ Хиронъ лечилъ рану въ ногѣ отъ стрѣлы Геркулеса, а потому названо въ честь центавра.

Виды однолѣтняго Василька:

C. Cyanus. Полевой Василекъ. Синецвѣтка. Съ синими цвѣтами. Дико растетъ во ржи; цвѣтеть съ Іюля по Сентябрь.

C. diluta. В. блѣдный.

C. moschata alba. Съ бѣлыми цвѣтами; распускается въ Іюлѣ.

C. atropurpurea. Цвѣтокъ темно-красный.

C. rubra. Цвѣтокъ красный.

C. suaveolens. Цвѣтокъ фіолетовый.

C. americana. Достигаетъ 3 футовъ, съ большими, лиловыми цвѣтами, распускающимися въ Августѣ; сѣется въ горшки раннею весною, пересаживается въ рыхлую, песчанистую землю, на солнцепекъ.

C. benedicta. Чертополохъ. Дикорастущее, имѣетъ лекарственное свойство и употребляется въ медицинѣ, между прочимъ, какъ противуглистное средство. Сѣется прямо на гряды; любить хорошо удобренную землю.

Многолѣтніе виды Василька требуютъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, песчаной и лиственной; размножается также какъ и однолѣтній; зимою сберегается при самой умѣренной поливкѣ, можетъ содержаться и въ комнатѣ.

Виды: *C. clementii*. Съ блѣдно-желтыми цвѣтами, зимуетъ въ грунтъ.

C. ragusina. *C. candidissima*. Съ сребристо-бѣлыми корневыми листьями.

C. Glastifolia. Медоносное растеніе, цвѣтеть среди лѣта.

C. dealbata. Съ свѣтло-красными цвѣтами. Зимуетъ въ грунтъ безъ покрывки.

C. Africana. *C. alata*. *C. alba*. *C. Jacea*. *C. Caucasica*.

Дикорастущіе виды многолѣтнаго Василька.

C. montana. Лѣсной тѣтушекъ.

C. macrocephala. В. длинноголовый.

C. austriaca. Язычекъ.

C. calcitrapa. Приворотъ.

C. Sacea. Сердечная трава.

C. Marchaliana. Бѣлая трава.

C. nigra. Лоскутный цвѣтъ.

C. orientalis. Гирчакъ.

C. Phrygia. Шалоболникъ.

C. Pulchella. Трясушка.

C. Cocuglomerata. Репейникъ.

423. Centauridium Drummondi. Однолѣтнее, грунтовое растеніе, похожее на Василекъ, съ золотисто-желтыми цвѣтами, требуетъ такого же ухода что и означенное растеніе.

424. Centradenia. Тепличное растеніе. (см. *Artrostema*).

Другой видъ: *C. flaubunda.* Оранжевое растеніе, съ розовыми цвѣтами, на красныхъ стебелькахъ. Любитъ легкую землю, составленную изъ части лиственной земли и двухъ частей песку. Достаточно поливають и обрѣзываютъ верхушки первыхъ побѣговъ, чтобы придать растенію красивый видъ. Размножаются черенками.

425. Centranthus. Однолѣтнее, грунтовое растеніе, съ розовыми, бѣлыми или тѣлеснаго цвѣта—цвѣтами. Высѣвается въ Апрѣль, въ парникъ и потомъ разсаживается бордюромъ; либо въ Маѣ, высѣвается прямо въ грунтъ.

Виды: *C. Macrosiphon*, съ розовыми цвѣтами. *C. m. album.* *C. m. bicolor.* *C. m. Carneum.* *C. dosycarpum.* *C. d. flore albo.* *C. nanum.* *C. n. carneum.*

Существуютъ многолѣтніе виды этого растенія, требующіе землю, составленную изъ дерновой, пополамъ съ лиственною, съ небольшою примѣсью песку и навозной земли. Если на зиму вынимаютъ корни изъ грунта, то сохраняютъ ихъ почти сухо.

Виды многолѣтнаго Центрантуса: *C. ruber.* *Valeriana rubra.* Съ красными цвѣтами. *C. calcitrata.*

426. *Centropogon cordifolium*. Тепличное растеніе, съ ярко-красными цвѣтами. Зимой держится почти сухо; размножается сѣменами или черенками.

427. *Centrosolenia glabra*. Тепличное растеніе, изъ семейства Гесперій, съ желтыми цвѣтами. Требуется той же культуры, что и *Collummea pillosa*.

Другой видъ: *C. picta*. Цвѣты внутри бѣлые, снаружи розовые.

428. *Sephaëlis ipescacuanha*. Американское растеніе, содержится въ теплицѣ, корень его составляетъ извѣстное рвотное средство.

429. *Cephalanthus occidentalis*. *Пуговичникъ западный*. Кустарникъ, любитъ легкую и влажную почву. Размножается сѣменами, черенками и отводками.

430. *Cephalotaxus*. Хвойное, оранжерейное дерево, изъ семейства *Conifereæ*, легко размножается черенками, для которыхъ употребляютъ небольшіе, короткіе побѣги, часто развивающіеся на стволахъ или болѣе сильныхъ сучьяхъ растенія. Листья состоятъ изъ большихъ хвой, сидящихъ съ двухъ сторонъ стебля, другъ противъ друга.

Виды: *C. fortunei*. Красивое японское дерево.

C. drupacea. На задней сторонѣ листьевъ имѣются двѣ бѣловатыя, продольныя полосы.

C. tardiva. Низенькое дерево, съ темно-зелеными листьями.

C. coriacea. *C. drupacea*. *C. Fortunei femina*. *C. f. masculina*. *C. Harringtonii*.

431. *Cephalotus follicularis*. Тепличное, австраійское, травянистое растеніе съ бѣлыми цвѣтами и весьма своеобразной формы листьями, состоящими, каждый изъ четырехъ отдѣльных мѣшечковъ, сверху соединенныхъ кольцомъ, покрытымъ овальною крышкою; можетъ расти въ комнатѣ, но требуетъ особаго ухода, а именно: землю любитъ торфяную, пополамъ съ листовенною. Земля покрывается мхомъ и горшокъ ставится на поддонъ, въ которомъ всю весну и лѣто держутъ воду; съ Сентября поливку растенія уменьшаютъ, но земля должна всю зиму сохранять нѣкоторую влажность; растеніе это при-тѣняютъ.

432. *Cerastium vulgatum*. Ясколка. Бесплодная трава. Изъ семейства *Alsineae*. Дикорастущее. Другіе виды *C. Semidecandrum*. Курелепъ. Тоже.

C. Biebersteinii. Многолѣтнее, зимующее растеніе, густое и дернистое, имѣетъ бѣлыя цвѣты, разводится въ цвѣтникахъ за цвѣтъ его пестрыхъ листьевъ.

433. *Cerasus*. Вишня. Названо по имени Понтійскаго города *Cerasus* въ Азіи. Дерево, частью дикорастущее, частью разводимое въ садахъ. Размножается, по преимуществу, сѣмянами, отдѣленіемъ отпрысковъ и прививкою. Перечтемъ нѣкоторыя, изъ многочисленныхъ породъ вишни.

C. padua. Вишня черная. Черешня. Дикорастетъ въ лѣсахъ и разводится въ садахъ; любитъ хорошій черноземъ и влажное мѣсто.

C. virginiana. В. Виргинская. Американское большое дерево, съ черными плодами, величиною съ горошину, сидящими въ видѣ гроздей; разводится для его красной древесины, употребляемой въ столярствѣ.

C. serotina. Поздняя вишня.

C. canadensis. В. Канадскія.

C. elliptica, съ эллиптическими листьями.

C. occidentalis. В. Западная.

C. sphaerocarpa, съ шаровидными листьями.

C. Lusitania. В. Португальская.

C. caroliniana. В. Каролинская.

C. Lauro-cerasus. В. Лавролистная.

C. chamae-cerasus. В. Сибирская.

C. intermedia. В. посредственная.

C. pumila. В. дикая.

C. pygmaea. В. Низкорослая.

C. semperflorens, вѣчноцвѣтущая.

C. Mahaleb. В. душистая. Дикорастущая съ душистыми цвѣтами и чернымъ, величиною съ горошину, горькимъ плодомъ въ пищу не употребляется, разводится для древесины, употребляемой въ столярствѣ и какъ растеніе, удобряющее землю своими корнями.

C. paniculata. В. пучковатая.

C. pensilvanica. В. пенсильванская.

C. persicifolia. В. персиколлистная.

C. avium. В. лѣсная. В. птичья. Дикорастущая, съ мелкими, темно-красными плодами, сладкими когда созрѣютъ, употребляется преимущественно для добыванія водки, извѣстной подъ именемъ „Киршвассера“; любить известковую, даже песчанистую почву.

C. vulgaris. В. обыкновенная, съ красными, круглыми, кисловатыми плодами, употребляемыми въ пищу.

C. vulgaris flore pleno, съ махровыми цвѣтами.

C. nigra. В. черная.

C. borealis. В. сѣверная.

C. aspera. В. жестколистная.

C. japonica. В. Японская.

C. glandulosa. В. железистая.

C. incisa, съ разнѣнными листьями.

C. tomentosa. В. пушистая.

C. pendula rosea. Кустарникъ съ тонкими, опущенными вѣтвями и нѣжно-розовыми цвѣтами.

C. Sieboldii rosea plena, тоже съ розовыми, махровыми цвѣтами.

434. *Ceratolobus.* Родъ пальмъ, съ лазающимъ и колючимъ стволомъ и съ перистыми листьями.

Виды: *C. glaucescens,* вьющаяся, колючая пальма съ Острова Явы, очень рѣдкое растеніе.

C. concolor.

435. *Ceratonia siliqua.* Изъ семейства *Cesalpinieae.* *Рожки Цареградскіе стручки.* Оранжевое дерево, можетъ расти въ комнатѣ; даетъ сладкіе стручки, употребляемые въ пищу, какъ лакомство. Размножается сѣменами и черенками; зимою весьма умеренно поливается; требуетъ вересковую землю съ примѣсью половинной пропорціи лиственной и немного дерновой.

436. *Ceratostema grandiflorum.* Изъ семейства *vaccinieae.* Оранжевый кустарникъ съ красными цвѣтами. Любитъ вересковую землю.

437. *Ceratozamia.* Тепличное растеніе изъ семейства Цикадовыхъ. Требуется почти того же ухода, что и пальмы; размножается

сѣменами и отростками; зимою поливается умеренно; можетъ расти и въ комнатѣ; одна часть приготовленной для него земли должна состоять изъ лиственной, другая изъ дерновой и песку.

Виды: *C. Ghiesbreghtii*. *C. mexicana*. *C. Küsteriana*.

- 438. *Cerbera Ahovai*.** Оранжерейное ядовитое растеніе; сѣмена его имѣютъ ядовитое и снотворное свойство, а дерево брошенное въ воду усыпляетъ рыбъ. Названо по имени мифологическаго пса Цербера, укушеніе котораго было смертельно.

- 439. *Cercis*. Багрянникъ.** Изъ семейства *leguminosae*. Дерево служащее для украшенія садовъ.

Виды: *C. siliquastrum*. *Любовное дерево*. *Багрянникъ стручковатый*. *Иудино дерево*. Воспитывается въ оранжереѣ, но растетъ на открытомъ воздухѣ, съ пурпуровыми, а иногда бѣлыми цвѣтами и смолистымъ запахомъ листьевъ; сѣрая древесина его испещрена черными и зелеными полосками и желтыми крапинками. Отъ стрижки не страдаетъ, а потому ему можетъ быть дана произвольная форма. Размножается сѣменами, высѣваемыми весною; на почву не прихотливо; если стволъ замерзнетъ, то корень даетъ новые побѣги.

C. japonica съ розовыми цвѣтами.

C. canadensis съ остроконечными листьями и блѣдными цвѣтами.

- 440. *Cercodia erecta*.** Оранжерейное растеніе.

- 441. *Cereut* Змѣйки.** Тепличное растеніе изъ породы кактусовъ. Смотри *Cactaeae*.

Разновидности его *C. grandiflora speciosissima Maynardii*. Съ огромнымъ пунцовымъ цвѣткомъ.

C. Tweediei. Цвѣты желтые съ оранжевымъ.

- 442. *Cerinthe gymnandra*.** Однолѣтнее, грунтовое, медоносное растеніе, отчего и получило свое названіе: *keros* — воскъ и *anthos* — цвѣтокъ.

Другіе виды: *C. major* *Тельникъ*. Дикорастущее, съ синевато-бурнымъ цвѣтомъ, высѣвается прямо въ грунтъ, распускается въ Іюлѣ.

C. aspera.

443. *Ceronilla varia*. *Горохъ полевой. Вязель разноцвѣтный.* Мышья струщья. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растение, цвѣтетъ въ Маѣ и Юнѣ.

444. *Ceropegia*, Тепличное, ползучее растение. Требуется легкой, дерновой земли, много свѣту и влажности; размножается черенками въ Юнѣ и Юлѣ; обыкновенно для этого растенія устраивается трельяжъ, по которому онъ могъ бы взбираться.

Виды: *C. Cumingiana*. Пунцовые цвѣты съ зеленоватою полоскою, вокругъ цвѣтка.

C. elegans. Оранжевое растение.

C. stapeliaeformis. Съ вѣсьма большими цвѣтами самой необыкновенной формы, въ бутонѣ имѣющемъ видъ копья, когда же цвѣтокъ распустится, бываетъ внутри бѣлый и снаружи темно-пунцовый.

C. candelabrum. C. oculata.

445. *Ceroxylon*. Родъ Пальмъ. Тепличное растение, могущее существовать и въ комнатахъ. Достигаетъ значительной высоты, но имѣетъ ту особенность, что стеблемъ не касается земли, будучи поднято выдающимися надъ землею корнями, какъ подпорками. Листья этого растенія до 9 аршинъ длиною, бѣлыя съ изнанки. Размножается сѣменами. Культура этого растенія таже, что и другихъ пальмъ.

Виды: *C. andicola*. *Восковая пальма*. Имѣетъ стебель, покрытый бѣлымъ веществомъ, похожимъ на смолистый воскъ. Для добычи этого вещества срубаютъ дерево; изъ этого воска дѣлаютъ свѣчи, предварительно смѣшивая его съ саломъ, чтобы свѣчи горѣли медленнѣе.

C. niveum Даетъ растительный воскъ, также какъ и *C. Kloptsockii. C. ferrugineum. C. interruptum*.

446. *Cessus quinquefolia*. *Переступень*. Вьющееся растение; цвѣтетъ осенью, зеленоватыми цвѣтами; разводится въ грунтъ, на почву не прихотливо.

447. *Cestrum laurifolium*. Оранжевое растение.

Другіе виды: *C. parqui* листья имѣютъ запахъ жареной телятины.

C. aurantiacum. Кустарникъ вышиною до 4 футъ, съ большими, душистыми цвѣтами, распускающимися осенью.

Когда отцвѣтеть поливается весьма мало. На лѣто высаживается въ грунтъ, причемъ любитъ солнечное мѣсто и сильную поливку. Размножается черенками, на которые употребляются весной молодые побѣги, причемъ черенки выращиваютъ подъ стекляннымъ колпакомъ.

448. *Cetraria islandica*. *Исландскій мохъ*. Дикорастущее на сѣверѣ, лекарственное растеніе.

449. *Chaenestes lanceolata*. Оранжевое растеніе съ пониклыми синими цвѣтами, на лѣто высаживается въ грунтъ, въ тучную землю.

450. *Chaenostoma hispidum*. Однолѣтнее, оранжевое растеніе, съ цвѣтами бѣлыми съ желтымъ или персиково-красными, съ желтымъ звонкомъ. Весною размножается сѣменами, подъ стекломъ, въ парникъ или теплицѣ; высаживается въ четырехъ-вершковые горшки и лѣтомъ пересаживается въ цвѣтникъ.

Другой видъ: *C. fastigiatum*. Полукустарникъ.

451. *Chaerophyllum bulbosum*. *Бутень*. Изъ семейства *Umbelliferae*. Дикорастущее и разводимое въ огородахъ, какъ овощъ,—растеніе, коренья котораго въ видѣ небольшой рѣпы, употребляются въ пищу, какъ приправа къ супу. Вкусомъ похоже на миндаль. Сѣется осенью. Имѣетъ душистые листья отчего и получило названіе (*Chaira*—восхищаться и *phyllon*—листь).

Другой видъ: *C. Prescottii*. *Путырь*. Дикорастущее.

452. *Chamaecyparis*. Хвойное растеніе, размножается черенками.

Виды: *C. cricoides*. Весьма густое, пирамидальное, колоколообразное деревцо, съ небольшими сѣро-зелеными листьями.

C. nutkaensis. *Душиное дерево*. Дикорастущее.

C. nutkaensis glauca. Великолѣпное, кустистое дерево, съ сѣро-зелеными листьями.

453. *Chamaedorea*. Тепличная, американская Пальма, съ тонкими и гибкими, какъ тростникъ стеблями; съ желтыми или красными цвѣтами, расположенными пирамидально и вырастающими у самой поверхности земли. Размножается сѣменами и

отростками; требует листовую землю съ примѣсю половинной пропорціи дерновой и немного песку.

Виды: *C. elegans*. *C. gracilis*. *C. Schiedeana*. *C. Palmata*. *C. Martiana*. *C. Canna St. Pablo*. *C. graminifolia*. *C. Wendlandi*. *C. Ernetsi Augusti*. Съ красными цвѣтами.

454. *Chamaerops*. *Тепличная Хамедорея*. Родъ самой распространенной въ свѣтѣ Пальмы. Низкорослая, можетъ очень хорошо расти въ комнатѣ; имѣетъ стебли низкіе, иногда даже ползучіе; листья рукообразные, усаженные колючками; цвѣты желтые. Разводится сѣменами. Культура та же, что и для прочихъ Пальмъ; требуетъ затѣненія, влажности и умѣренной температуры. Имѣетъ до 50 видовъ, исчислимъ главнѣйшіе:

C. elation. Видъ, наиболѣе распространенный въ нашихъ теплицахъ.

C. humilis. Въ дикомъ состояніи похожъ на кустарникъ. Листья употребляются на разные подѣлы.

C. fragrans. Съ душистыми цвѣтами.

C. Schéedlana. Легко цвѣтущее, Мексиканское растеніе.

C. Ghiesbreghtii fol. variegatis. Пестро-листное растеніе.

C. pygmaea. Въ природѣ недостигаетъ и нѣсколькихъ футовъ.

C. Ernesti Augusti. Съ цѣльными, нераздѣльными листьями.

C. glaucifolia. Съ сѣро-зелеными листьями.

C. Chinensis. Китайское растеніе. Единственная Пальма, которая растетъ на открытомъ воздухѣ въ Южной Европѣ.

C. Stauracantha. *C. hytris*. *C. arborea*. *C. excella*. *C. Ghiesbreghtii*.

455. *Chameranthemum Gaudichaudi*. Изъ семейства *Acanthaceae*. Зеленый, бархатистый листъ, съ свѣтлыми по немъ узорами.

456. *Charies coerulae*. Однолѣтнее, низенькое, цвѣточное растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ; синіе или бѣлые цвѣты его распускаются въ Іюнѣ.

457. *Cheilanthes*. Тепличное растеніе, изъ семейства Папоротниковъ, требуетъ одинаковой культуры съ прочими родами того же семейства.

Видъ его: *C. fariuosa*.

458. Cheiranthra linearis. Изъ семейства *Pittosporeae*. Оранжевое растеніе съ фіолетовыми цвѣтами; боится сырости; требуетъ листовую землю съ пескомъ. Размножается черенками. Лѣтомъ притѣняется или выставляется на воздухъ, въ ползатѣнное мѣсто.

459. Cheiranthus annuus. Изъ семейства *Cruciferae*. *Лѣтній и осенній левкой*. Однолѣтнее грунтовое, всѣмъ извѣстное растеніе, съ душистыми у многихъ видовъ махровыми цвѣтами, разныхъ колеровъ. Принадлежитъ къ числу медоносныхъ. Чтобы имѣть левкой въ цвѣту все лѣто, его надлежитъ высѣвать три раза въ годъ, въ глинистую, неудобренную землю. Первый разъ его надо сѣять въ Мартъ, въ оранжереѣ или въ комнатѣ; второй разъ въ Апрѣлѣ въ умѣренный парникъ, и третій разъ въ Маѣ, въ такой же парникъ. По всходѣ, его аккуратно поливаютъ и даютъ много свѣта и воздуха. Въ случаѣ, если растеньица начнутъ валиться, между ними подсыпаютъ песку; когда растеніе дастъ нѣсколько первыхъ листьевъ, ихъ рассаживаютъ довольно густо и затѣмъ, когда они начнутъ касаться другъ друга, рассаживаютъ, растеньица по три въ одинъ горшокъ, а когда уже образуются у нихъ цвѣточные почки, левкой пересаживаютъ въ горшки, если предназначаютъ для цвѣтенія въ нихъ, или въ грунтъ. При этой, послѣдней пересадкѣ одинокіе левкой обыкновенно выбрасываютъ, а сажаютъ только махровые; распознаютъ левкой, прижимая зубами цвѣточную почку растенія — у махровыхъ левкоевъ почка не хрустнетъ, а у одинокихъ хрустнетъ.

Левкоевъ существуетъ нѣсколько сортовъ, а именно:

а) *Махровые букетные*, отличаются большею или меньшею гладкостью листьевъ. Бываютъ различныхъ цвѣтовъ, какъ-то: бѣлые, лиловые, малиновые, персикового или яблоннаго цвѣта, желтые разныхъ оттѣнковъ, красные—различной степени яркости, пепельные, голубые, лазуревые, сѣрые и разныхъ, переходныхъ изъ одного въ другой, сейчасъ поименованныхъ цвѣтовъ.

б) *Крупноцвѣтные*, столь же разнообразныхъ колеровъ и оттѣнковъ.

в) *Пирамидальные, букетные*, тоже весьма разнообразныхъ цвѣтовъ.

г) *Исполинскіе, древковатые* — тоже.

д) *Осенніе*, полученные чрезъ оплодотвореніе лѣтнаго левкоя съ зимнимъ. — Двухлѣтнее растеніе.

е) *Левкои Императорскіе* или *вѣчноцвѣтущіе*.

Зимою цвѣтутъ только лѣтніе левкои. Чтобы постоянно имѣть въ цвѣту левкои всю зиму, дѣлается нѣсколько посѣвовъ.

Первый посѣвъ лѣтнихъ и осеннихъ левкоевъ, дѣлается въ половинѣ Мая, они начинаютъ цвѣсти съ Октября.

Второй посѣвъ тѣхъ же сортовъ дѣлается въ началѣ Іюня; когда растенія образуютъ цвѣточную почку, ихъ ставятъ въ холодную оранжерею, къ окну и умѣренно поливаютъ.

Третій посѣвъ дѣлается около половины Іюня и послѣдній посѣвъ однихъ раннихъ левкоевъ, дѣлается въ началѣ Іюля. Эти растенія ставятся въ парникъ, на доски, подъ самыя рамы, которыя ежедневно, до наступленія морозовъ снимаются для провѣтриванія растеній; съ наступленіемъ морозовъ парникъ покрывается рогожами и обкладывается навозомъ. При теплой погодѣ растенія продолжаютъ провѣтривать и поливаютъ крайне умѣренно. Вообще посѣвы, предназначаемыхъ къ зимнему цвѣтенію лѣтнихъ и осеннихъ левкоевъ, дѣлается слѣдующимъ образомъ. Сѣмена высѣваются въ холодный парникъ безъ навоза, когда же взшедшіе сѣянцы окрѣпнутъ, ихъ рассаживаютъ въ пустые парники; при появленіи почекъ, собственнo махровые цвѣты, рассаживаютъ въ горшки, ставятъ въ тѣнистое мѣсто и спрыскиваютъ по нѣскольку разъ въ день, пока не укоренятся, затѣмъ ихъ выставляютъ на солнцѣ. Землю для этихъ левкоевъ употребляютъ, приготовленную за два года до употребленія ея, изъ свѣжаго коровьяго навоза съ крупнымъ рѣчнымъ пескомъ и дерновою землею.

Въ журналѣ Р. Общества любителей Садоводства за 1866 годъ, В. Бехтѣвъ рекомендуетъ слѣдующій уходъ за левкоями.

Легкою навозною землею пополамъ съ пескомъ насыпаютъ до половины большія плошки, вышиною въ 3 вершка. Земля предварительно хорошо высушивается, на печкѣ, въ предохраненіе отъ бѣлыхъ червяковъ, которые нерѣдко, уничтожаютъ весь посѣвъ. Земля поливается, пока не обратится въ грязь, тогда черезъ сито насыпается мелкая, песчаная земля съ такимъ расчетомъ, чтобы сравнялась поверхность политой земли и затѣмъ раскладываются сѣмена левкоевъ такъ, чтобы

не касались другъ друга; сѣмена засѣваются землею сквозь сито слоємъ въ два или три раза толще слоя сѣменъ и ставятся въ теплое мѣсто. Пока растенія не задали первой пары листьевъ, чтобы вывести хорошія штабмы кустиковъ и усилить развитіе корней, надлежитъ обсыпать растеніица мелкою, песчаною землею, до первыхъ листочковъ, причемъ по возможности выправлять засыпаемые стебли.

Первое время послѣ посѣва плошки содержатся довольно сыро, когда же всходы вышли наружу, поливка согласуется съ состояніемъ погоды: въ ясную—поливка усиливается, въ ненастную—уменьшается и даже вовсе прекращается, въ предупрежденіе развитія плесени, губительной для растенія,—единственное, но и то слабое противъ ней средство—обсыпка сухимъ пескомъ.

Пока всходы не получаютъ яркой окраски, ихъ надлежитъ притѣнять отъ полуденнаго солнца; до выхода второй пары листьевъ, всходы поливаются вѣничкомъ, но отнюдь не лейкою; удобнѣйшее время поливки—послѣ полудня.

Когда установится теплая погода, плошки выносятся на воздухъ, въ защищенное отъ вѣтра мѣсто.

Для левкоевъ готовится гряда въ нѣсколько притѣненномъ мѣстѣ, изъ легкой, жирной земли, глины и песку, въ равныхъ частяхъ. Левкой высаживаются на грядѣ по колерамъ. Когда покажутся первые бутоны, отбираются махровые цвѣты, (съ круглыми, нѣсколько сплюснутыми сверху въ низъ бутонами) у одинокихъ левкоевъ—бутоны удлиненные, тонкіе и пересаживаются на лѣто въ цвѣтникъ, или горшки.

Чтобы имѣть штамбовые левкои, обрѣзываютъ у растенія всѣ нижніе цвѣточные вѣточки и оставляютъ на верху двѣ или три, а если растеніе сильно, и желаютъ, чтобы оно было гораздо выше, оставляютъ одинъ главный штабъ.

Вообще надлежитъ принять за правило: у левкоевъ всѣхъ сортовъ, обрѣзывать нижнія, цвѣточные вѣточки—кустъ лучше формируются и роскошнѣе цвѣтеть.

Другой видъ:

S. incanus. Зимній левкой. Двухлѣтнее растеніе, сѣется въ Мартѣ или Апрѣлѣ; въ Маѣ высаживается на гряды и въ Августѣ вынимается изъ грунта и вновь сажается въ горшки причемъ сильно обрѣзываютъ корень, даютъ постоять нѣсколько

дней въ тѣни, причемъ ежедневно опрыскиваютъ и вносятъ въ оранжерею, гдѣ сперва держать далѣе отъ свѣта, а зимою, напротивъ, даютъ какъ можно больше свѣту, защищаютъ отъ сырости и тщательно очищаютъ отъ загнившихъ листьевъ.

- 460. *Cheiranthus maritimus*.** Изъ семейства. **Cruciferae.** Однолѣтнее цвѣточное, низенькое растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ въ Маѣ. Красные и бѣлые цвѣтки его распускаются въ Іюлѣ.

***Cheiranthus Cheire*.** *Желтофіоль* или *Лакъ-фіоль* разводится и содержится благодаря своимъ душистымъ и при томъ медоноснымъ цвѣтамъ, преимущественно тѣмъ же способомъ, что и зимній левкой. Размножается сѣменами. Требуется землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой и лиственной, съ примѣсью восьмой части песку. Если у рано посаженнаго растенія, зимою образуются цвѣточные почки, то его надлежитъ поставить на умѣренно теплое мѣсто теплицы, гдѣ оно и разовьется.

Древесный желтофіоль съ махровыми цвѣтами, не даетъ сѣменъ и размножается черенками. Онъ цвѣтетъ зимою, при умѣренномъ теплѣ и наиболѣе пригоденъ для комнатъ.

- 461. *Cheirostemon platenoides*.** *Дерево-рука*. Изъ семейства **Vombaceae**. Мексиканское дерево, имѣющее цвѣтокъ, формою похожій на человѣческую руку. Размножается черенками. Въ умѣренномъ климатѣ можетъ расти въ грунтѣ. Содержится въ оранжерей.

- 462. *Cheirostylis marmorata*.** Тепличное растеніе съ бѣлымъ колосомъ цвѣтовъ на розовомъ стеблѣ, высоко поднимающемся изъ группы изящныхъ листьевъ, росписанныхъ какъ бы золотыми и серебрянными полосами. Требуется того же ухода, что и ***Anaectochilus setaceus***.

- 463. *Chelidonium majus*.** *Чистякъ*. *Чистотѣль*. Дикорастущее, имѣетъ лекарственныя свойства.

Другой видъ: ***C. uniflorum***. *Одноцвѣтный чистотѣль*. Съ большими золотисто-желтыми цвѣтами, распускающимися очень рано.

- 464. *Chelone*.** *Черепашникъ*. Долголѣтнее, грунтовое, садовое

растение, съ ярко-красными цвѣтами—кистью. Зимую требуетъ надежной покрывки.

Виды: *C. atropurpurea*. Л. темно-красный.

C. Carbata. Ч. мексиканскій. Съ темно-красными цвѣтами.

C. pubescens. Ч. Пушистый.

C. glabra. Съ бѣлыми цвѣтами.

C. obliqua. *C. nemorosa*. Два оранжерейные вида.

465. *Chenopodium bonus Hernicus*. Лебеда. Марь. Семейство *Chenopodiaceae*. Дикорастущее. Молодые отпрыски этого растенія употребляются въ пищу.

Другіе виды. *C. quinoa*. Квиноа или Перувианскій шпинатъ. Однолѣтнее растение. Сѣется въ Мартъ и Апрѣль или въ Августъ и Сентябрь—прямо на гряды. Молодые листья Квиноа употребляются въ пищу до половины лѣта, какъ обыкновенный шпинатъ, которому, впрочемъ, предпочитаютъ. Изъ сѣменъ Квиноа готовятъ крупу.

Дикорастущіе: *C. ambrosioides*. *C. Urbicum*. Глухой водопьянъ. *C. Botrys*. Кудрявецъ. *C. vulvaria*.

466. *Chenostoma fastigiatum*. и *C. polyanthum*. Однолѣтнее цвѣточное растение.

467. *Chimaphila umbellata*. Становникъ. Дикорастущее.

468. *Chimonanthus fragrans*. Оранжерейное растение. Смотри *Calycanthus praecox*.

469. *Chirita*. Маленькое, тепличное растение изъ семейства Геснерійныхъ. Культура та же, что и *Gloxinii*.

Другіе виды: *C. Chinensis*. Съ лиловыми цвѣтами. Тщательно предохраняется отъ пыли.

C. mooni. Съ большими, лилово-синими цвѣтами внутри и розоватыми снаружи; тычинки и пестики желтые.

C. Zeilanica. Съ лиловыми внутри и розовыми снаружи цвѣтами. Легко размножается черенками.

C. Walkeria. Съ темно-фіолетовыми цвѣтами.

470. *Chironia linifolia*. Оранжерейное растение, съ розово-пурпуровыми цвѣтами и листьями, похожими на листья льна. Любитъ вересковую землю.

471. *Chlora grandiflora*. Оранжевейное, двухлѣтнее, декоративное растение. У насъ на Югѣ растетъ въ грунту. Весною высаживается въ горшки, въ смѣсь равныхъ частей лиственной, торфяной и дерновой земли. Цвѣты золотисто-желтые, съ оранжево-краснымъ зѣвомъ.

472. *Cloranthus inconspicuus*. Оранжевейное растение.

473. *Chlorocodon Whitei*. Большое, тепличное, вьющееся растение, съ пурпуровыми цвѣтами.

474. *Chloroxylon Swietenia*. Дерево съ Гималая. Имѣетъ зеленовато-желтую древесину, принимающую отличную полировку.

475. *Choetogastra*. Американское, кустовое растение, съ прекрасными малиновыми и пунцовыми цвѣтами. Размножается черенками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Можетъ расти и въ комнатѣ.

Виды. *C. Strigosa*. *C. Lindleyana*.

476. *Choisia ternata*. Орнаментальный оранжевейный кустарникъ, съ бѣлыми пахучими, какъ у померанца, цвѣтами.

477. *Chorosema*. Многолѣтнее, оранжевейное, вьющееся растение, съ красивыми оранжевыми, желтыми, лиловыми или красными цвѣтами; можетъ расти и въ комнатѣ; зимою поливается весьма умеренно; размножается сѣменами и черенками; требуетъ вересковую землю, съ примѣсю такого же количества дерновой, пополамъ съ лиственной.

Виды: *C. ilicifolia*. *C. ovata*. *C. Henchmanni*. *C. spectabile*. *C. microcanthum*. *C. rhombeum*. *C. varium*. Съ красными цвѣтами; распускается рано весною и если держать его въ оранжереѣ, при 8° Р., давая ему достаточно свѣта, вторично зацвѣтаетъ въ началѣ зимы; размножается черенками, которые цвѣтутъ въ раннемъ возрастѣ.

C. cordatum. Съ красными цвѣтами.

478. *Chrysanthemum indicum*. *Златоцвѣтъ*. Изъ семейства *Compositae*. Оранжевейное, многолѣтнее растение, съ бѣ-

лыми, розовыми, лиловыми, желтыми, фиолетовыми, красными, пурпуровыми, коричневыми, различных оттенковъ цвѣтами, весьма похожими то на Астру, то на Маргаритку, только на стебляхъ, доходящихъ до 3 аршинъ вышины, Хризантема можетъ разводиться въ грунтѣ. Растеніе это для любителя драгоценно тѣмъ, что оно цвѣтетъ тогда, когда нѣтъ въ цвѣту почти никакихъ другихъ цвѣтовъ, а именно въ концѣ октября и ноябрѣ. Комнатнаго воздуха почти не выносятъ. Все лѣто ихъ надлежитъ держать въ грунтѣ, въ затѣненномъ мѣстѣ; передъ наступленіемъ морозовъ внести въ оранжерею, гдѣ и дать налиться цвѣточному бутону, а потомъ когда образуется сильная почка, внести въ теплицу, гдѣ скорѣе распустятся. Затѣмъ, если цвѣты нужны для букетовъ, опять внести въ оранжерею, гдѣ будутъ цвѣсть очень долго и пышно. Размножается сѣменами, черенками, отводками, сажаемыми въ апрѣлѣ и дѣленіемъ корней. Требуется землю, составленную изъ равныхъ частей вересковой, лиственной и дерновой. Посредствомъ дѣленія корня получаютъ только большія растенія и этотъ способъ размноженія Хризантемъ, употребляется собственно для разведенія ихъ въ грунтѣ, и въ этихъ видахъ растеніе пересаживается въ грунтъ рано весною. Когда черенки растенія, да и самое растеніе, пойдутъ въ ростъ, оно обильно поливается, изрѣдка даже жидкимъ удобреніемъ. Вообще слабыя и густо разросшіяся вѣтви Хризантемъ срѣзываются, чтобы она росла кроной. Для букетовъ, чтобы имѣть Хризантемы поздною осенью въ значительномъ количествѣ, срѣзываютъ, съ сидящихъ въ грунтѣ Хризантемъ, вѣтки съ почками и ставятъ ихъ въ воду, въ теплицу или въ комнату, гдѣ онѣ и растутъ.

Виды: *C. venustum*. Пунцовый цвѣтокъ, съ желтою серединою.

C. coccineum. *Поповникъ алый*. Многолѣтнее садовое растеніе.

C. leucanthemum. *Поповникъ*. Дикорастущее. Весьма дѣйствительное средство противъ блохъ.

C. Dunetti plenum. *C. hybridum plenum*. *C. purpureum*.

Нижепоименованные виды принадлежать къ однолѣтнимъ грунтовымъ растеніямъ; даютъ цвѣты простые и махровые;

высѣваются въ парникъ или горшокъ, потомъ пересаживаются въ сильную почву, на солнечную сторону цвѣтника.

C. carinatum, съ желтыми или бѣлыми съ желтымъ внутри цвѣтами. Совѣтуютъ сажать въ грунтъ вмѣстѣ съ горшкомъ, въ которомъ выведено.

C. indicum flore roseo albo punctata. Малиновые цвѣты, испещрены бѣлыми крапинками.

C. coronarium. Съ бѣлыми или желтоватыми цвѣтами.

C. Buridgianum. Бѣлый цвѣтокъ, въ серединѣ желтый кругъ, обведенный малиновою полосой.

C. annulatum. *C. atrococcineum*.

479. *Chrysocoma ciliata*. Оранжевое растение; стебли оканчиваются пучками желтыхъ цвѣтовъ, отчего и получило свое названіе. (*Chrysos*—золото и *Kome*—волось). Другой видъ: *C. Lynosyris*. Долголѣтнее садовое растение.

480. *Chrysophyllum*. Тепличное деревцо, съ бѣлыми или желтыми цвѣтами; листья покрыты съ изнанки серебристыми или золотистыми волосками, отчего и получило свое названіе. (*Chrysos*—золото и *phyllon*—листъ). Можетъ расти и въ комнатѣ. Размножается сѣменами и черенками. Требуется земля дерновую пополамъ съ листовною и съ небольшою примѣсью песку.

Виды: *C. macrophyllum*. Листья покрыты съ изнанки золотистыми волосками.

C. splendens. *C. cainita*. *C. argenteum*. *C. grandifolium*. *C. oliviforme*.

481. *Chrysostema Tripteris*. Однолѣтнее цвѣточное растение.

482. *Chrysurus aureus*. Нѣжный, однолѣтній злакъ, высѣвается прямо въ грунтъ.

483. *Chysis*. Орхидея. Съ душистыми, красными съ желтымъ цвѣтами; размножается дѣленіемъ корней; сажается прямо въ землю; требуетъ листовную землю пополамъ съ вересковою.

Виды: *C. aurea maculata*. Золотисто-желтые цвѣты, съ темно-оранжевыми пятнами.

C. bractescens. Бѣлые цвѣты съ желтою серединою.

C. levis.

484. Cibotium. Древоидный папоротникъ. Тепличное растеніе. Культура та же, что и другихъ папоротниковъ.

Виды: *C. princeps*. Великолѣнное растеніе; стебель и листовые черенки его покрыты густымъ, золотисто-бурымъ пухомъ. Превосходно идетъ въ оранжереѣ.

C. Schiedaei.

485. Cisca disticha. Тропическое растеніе; его кислосладкіе плоды употребляются въ пищу свѣжими.

486. Cicer arietinum. *Пузырное сѣмя. Испанскій горохъ. Малайскій горохъ. Материнка.* Однолѣтнее растеніе; зерна его употребляются въ пищу какъ горохъ. Существуетъ двухъ сортовъ — съ бѣлыми и коричневыми зернами. Сѣется въ апрѣлѣ; земля вокругъ его мотыжится и опалывается; поливается только въ большую засуху; сѣмена созрѣваютъ въ августѣ или сентябрѣ.

487. Cichorium Intybus. *Цикорій.* Изъ семейства *Synanthegaeae*. Дикорастущее, медоносное растеніе. Молодые, выбѣленные листья его употребляются какъ салатъ. Бѣленіе листьевъ цикорія производится очень просто: пересаживаютъ корни въ горшокъ, покрываютъ пустымъ горшкомъ и ставятъ близъ печи; вырастающіе затѣмъ листья цикорія будутъ бѣлые и нѣжные. Корень идетъ въ приправу къ кофею. Сѣется въ апрѣлѣ. Любить глубокую, суглинистую, плодородную почву. Осенью корни выкапываютъ и сажаютъ въ погребъ, гдѣ при недостаткѣ свѣта развиваются блѣдно-зеленые листья. Выращиваютъ цикорій и другимъ способомъ, а именно: кладутъ въ продырявленную бочку и ставятъ въ конюшню — листья растутъ и вытягиваются въ дыры бочки. Еще способъ выращивать цикорій: гряду съ цикоріемъ покрываютъ, на зиму, старыми опилками, пескомъ и землею. Въ февралѣ, когда ужъ не будетъ сильныхъ морозовъ, все наваленное на гряду сгребаютъ въ кучу, почти обнажая верхушки цикорія и когда онъ начнетъ расти и показываться надъ оставшеюся на немъ землею, то его вновь приваливаютъ землею и такимъ образомъ продолжаютъ его покрывать, отчего онъ вытягивается въ землѣ на достаточную для его употребленія длину и дѣлается бѣлымъ и нѣжнымъ.

Отличаютъ два сорта цикорія: *бѣлый брауншвейгскій* и *пестролистный* или *нѣмецкій*.

Другой видъ: **C. Endivia.** *Эндивій*. Двухлѣтнее растеніе трехъ сортовъ, съ широкими, узкими и кудрявыми листьями. Употребляется осенью и зимою въ супъ и какъ салатъ. Любитъ плодородную землю; сѣется въ парникъ или разсадникъ, преимущественно въ Іюнѣ и Іюлѣ. Когда же всходы будутъ имѣть до шести листьевъ, высаживается на гряды. Требуется частой поливки и разрыхленія почвы вокругъ него.

За двѣ недѣли до употребленія листья Эндивіи связываютъ вверху, чтобы въ середину ихъ не попадала мокрота, тогда поливка растенія прекращается. Середина Эндивіи отъ этого ухода дѣлается бѣлою. Зимою его сохраняютъ въ погребахъ нанизаннымъ на снурки, въ опрокинутомъ положеніи, причемъ онъ не долженъ касаться другъ друга, иначе загниетъ. На сѣмена, Эндивію сажаютъ осенью въ ящикъ, берегаютъ въ подвалѣ и въ Апрѣлѣ высаживаютъ на солнечное мѣсто.

488. Cimicifuga foetida. *Вонючка.* Дикорастущее.

Другой видъ: **C. americana.** Долголѣтнее садовое растеніе, требуетъ покрывки на зиму; ему приписываютъ свойство прогонять клоповъ отчего и получило свое названіе. (*Cimex* — клопъ и *fugo* — прогонять).

489. Cinaria Scolimus. *Артишоки.* Многолѣтнее растеніе. Любитъ питательную глубокую почву и солнечное мѣсто; размножается сѣменами, а преимущественно весеннею посадкою побочныхъ побѣговъ, образующихся отъ корней. Побѣги эти сажаютъ въ горшки и ставятъ въ парникъ въ тѣнь; недѣли черезъ три, въ Маѣ, растеніе высаживаютъ на гряды. Побѣги срѣзываютъ каждую весну. При снятіи овоща болѣе трехъ цвѣточныхъ головокъ на одномъ стеблѣ не оставляютъ. Гряды служатъ до 8 лѣтъ. Зимою растеніе страдаетъ больше отъ мокроты, чѣмъ отъ холода, поэтому, передъ наступленіемъ морозовъ, растеніе срѣзываютъ, даютъ обсохнуть и, покрывъ ихъ ящиками или большими горшками, заваливаютъ землею и навозомъ.

Существуетъ много разновидностей артишоковъ, лучшія: *Большой фіолетовый*, *Большой зеленый*, *Итальянскій фіолетовый*, *Бретонскій* съ круглою головкою.

Употребляется въ пищу неразвитая цвѣточная головка артишока, сѣменное ложе и нижняя, мясистая часть листочковъ чашечки.

490. *Cineraria speciosa*. *Пепельница Даурская*. Многолѣтнее садовое растеніе, дающее большее количество желтыхъ цвѣтовъ. Исъ подъ листьевъ покрытъ бѣловатымъ пухомъ, отчего и получило свое названіе. (*Cineres*—зола).

491. *Cinnamomum* *Корица*. Тепличное и вмѣстѣ комнатное, красивое дерево, съ лоснящимися листьями, на которыхъ рѣзко обозначены три продолговатыя жилки; даетъ желтоватые, мелкіе цвѣты и лиловые плоды въ видѣ желудя; кора этого дерева — извѣстная пряность. Дерево размножается сѣменами и отводками; требуетъ листовую землю, съ примѣсю третьей части дерновой и третьей части вересковой.

Виды: *C. aromaticum*. Незрѣлые плоды употребляются какъ пряность и на выдѣлку коричневаго масла.

C. Ceylanicum. Кора даетъ настоящую корицу.

C. Culilawan. Кора употребляется противъ холеры.

C. Rheinwardsii. Растетъ на островѣ Явѣ.

C. pedunculatum. Даетъ плохой сортъ корицы.

C. cassia. *C. nitidum*.

492. *Cirtium serrulatum*. *Татарникъ*. Изъ семейства *Synanthreae*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе.

Другіе виды: *C. lanceolatum*. *Т. Ланцетолистный*. Дикорастущее двухлѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ съ Іюля до конца Сентября.

C. eriophorum. *Татарка шерстистая*. Дикорастущее, двухлѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ въ Іюль и Августъ.

C. heterophyllum. *Маточникъ*.

C. arvense. *Осотъ*.

C. ascaule. *Губжа*.

C. oleraceum. Многолѣтнее растеніе, употребляемое въ пищу, какъ шпинатъ. Цвѣты зеленовато-желтые.

C. Grahmi. Двухлѣтнее растеніе; стебли и обратная сторона его листьевъ снѣжно-бѣлая, а цвѣты ярко-карминовые.

493. Cissus. Изъ семейства **Ampelideae** (виноградныхъ). Тепличное растеніе, воспитывается на шпалерѣ или растянутымъ по стѣнѣ; требуетъ легкую землю и сухое помѣщеніе зимою.

Виды: **C. discolor.** Съ прелестными, бархатистымъ, темно-пурпуровымъ съ розовымъ и зеленоватымъ, пестрымъ листомъ, на малиновыхъ вѣточкахъ.

C. porphyrophyllus. Великолѣпный листъ, росписанный бѣлымъ и малиновымъ, съ изнанки фіолетовый.

C. Lindeni. Вьющееся растеніе съ бархатистыми, ярко-цвѣтными листьями.

C. antarctica. Оранжевое растеніе, даетъ ягоды, изъ которыхъ туземцы готовятъ вино. Содержится въ комнатѣ подъ именемъ дикаго винограда.

C. albo nitens. Тепличное вьющееся растеніе, съ сердцевидными листьями, верхняя сторона которыхъ отливается сребристымъ блескомъ.

C. velatinus.

494. Cistus. Семейства **Cistineae.** Оранжевое растеніе, размножается сѣменами и черенками.

Виды: **C. purpureus.** *Ладонникъ.* Цвѣты пурпуровые, съ краснымъ пятномъ внизу каждаго лепестка. Требуетъ вересковую землю.

C. albidus. C. crispus. C. laxus. C. salvifolius.

C. Creticus. Даетъ ладонь. **C. vaginatus,** съ розовыми цвѣтами.

495. Citharexylon quandragulare. Западно-Индійское дерево, называемое бѣло-желѣзнымъ и употребляемое на музыкальные инструменты.

496. Citrus. Изъ семейства **Aurantiaceae** (померанцевыхъ). Содержится въ оранжереѣ, съ половины Мая до половины Октября; можетъ расти въ комнатѣ; зимою требуетъ весьма умѣренной поливки. Размножается сѣменами, черенками и прививкою. Чтобы заставить непривитое растеніе давать плоды, сажается въ землю цѣлый плодъ, т. е. апельсинъ или лимонъ. Требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой, съ примѣсью самага незначительнаго количества навозной. Если у растенія начнутъ желтѣть листья, то это показываетъ, что надлежитъ или пересадить его или уменьшить его поливку. Вообще, когда дерево еще

молодо, оно пересаживается через 2—3 года. Въ Сентябрѣ растеніе подрѣзываютъ. Способъ ранней выгонки этого растенія въ цвѣтъ, состоитъ въ задержаніи времени цвѣтенія его, посредствомъ уменьшенія питанія. Наиболѣе пригодны для ранней выгонки—померанцы. На лѣто растеніе оставляется въ оранжереѣ и поливается такъ мало, чтобы только не засохло. Послѣ Октября поливку понемногу усиливаютъ и въ Ноябрѣ ставятъ растеніе въ теплицу—черезъ 6 недѣль оно зацвѣтетъ.

Есть другой способъ ранней выгонки померанцевыхъ деревьевъ въ цвѣтъ. Четырех годовое деревцо вынимаютъ въ Мартѣ изъ горшка, совершенно очищаютъ корни отъ земли и сажаютъ въ крупный, рѣчной песокъ; ставятъ въ тѣнистое мѣсто и умеренно поливаютъ. Къ Августу у растенія развивается почка и тогда его пересаживаютъ въ горшокъ съ землею и ставятъ въ теплый парникъ, постоянно вспрыскиваютъ и даютъ много воздуха. При такомъ уходѣ померанецъ будетъ цвѣсть поздно осенью.

Виды: *C. Bigaradia*. Померанецъ. Съ горькими плодами.

C. aurantium dulce. Апельсинъ. Съ сладкими плодами.

C. chinensis *C. mirtifolia*. Съ мелкими листьями и маленькими плодами, употребляемыми на варенье.

C. nobilis. Мандаринъ. Съ небольшими, очень сладкими плодами.

C. pyramidalis. *C. pyriformis*. *C. Algeriensis*. *C. Maltensis*. *C. limonium*. Лимонъ.

C. pomum Adami. Адамово яблоко. Разновидность предъидущаго. Имѣетъ зеленоватые или желтые плоды, будто выкушенные сверху — отъ этого повѣрье, что это-то самое яблоко, которое Ева подала Адаму, искушая его въ раю. Растетъ въ Калабріи и Сициліи.

C. Medica Cedra. Цитронъ. Цедратовое дерево. Съ огромными, душистыми, сладковато-кислыми плодами.

C. limetta. Сладкій лимонъ.

C. Japonica. Съ маленькими, продолговатыми плодами; размножается черенками, которые цвѣтутъ очень молодыми.

C. sinensis. Тоже.

C. vulgaris risso. *C. v. crispa*. *C. v. myrtifolia*. *C. v. fol. variegatis*. *C. v. salcifolia*. *C. decumana*. Памиль—муссъ. или Пампелеонъ, съ весьма крупными плодами.

497. *C. larcia*. Красивое, однолѣтнее, грунтовое растеніе, высѣ-

вается въ Апрѣлѣ, въ парникѣ, или въ Маѣ въ грунтѣ. Высаживается въ цвѣтникъ, на рыхло-песчанистую, неудобренную землю. Пригодно для группъ и для бордюровъ, а также растетъ и въ комнатѣ.

Виды: *C. elegans*. Съ красными цвѣтами.

C. e. rosea plena. Съ розовыми, махровыми цвѣтами.

C. e. violacea plena. Съ фіолетовыми, махровыми цвѣтами.

C. e. alba flore pleno. Съ бѣлыми цвѣтами.

C. pulchella. Бордюрное растение.

C. p. rosea и *C. p. alba*. Зимуетъ въ холодномъ парникѣ.

C. p. rosea plena. Съ махровыми цвѣтами.

C. p. purpurea. Съ красными цвѣтами.

C. p. marginata plena. Махровая.

C. gauroides. Изъ Калифорніи, съ лиловыми цвѣтами.

C. pulchella integripetala. *C. p. i. nana*. *C. p. marginata*. *C. pulcherima*.

498. *Clavia ornata*. Изъ семейства *Mirsiaceae*. Тепличное растение, декоративное, съ короною большихъ листьевъ и оранжевыми цвѣтами. Размножается посадкою срѣзанной верхушки.

499. *Claytonia virginica*. *Кимича*. Дикорастущее.

Другой видъ: *C. cubensis*. *Вестъ-Индскій шпинатъ*. Однолѣтнее растение, употребляемое въ пищу какъ зелень. Любитъ легкую почву. Высѣвается въ Апрѣлѣ и слегка покрывается землею. Для ранняго употребленія сѣется въ плоски и потомъ разсаживается на гряды. Листья обрѣзываются до сердечка.

500. *Clematis*. *Ломоносъ*. Изъ семейства *Ranunculaceae-Clematideae*. Оранжевое и вмѣстѣ грунтовое, вьющееся растение, съ большими бѣлыми, синими и лиловыми цвѣтами. Одни виды его—кустовые, другіе—травянистые. Можетъ расти въ комнатѣ; размножается черенками, отрезками и дѣленіемъ корней. Требуется листовую землю пополамъ съ дерновою, съ незначительною примѣсью песку.

Виды кустарниковъ Ломоноса, разводимыхъ въ паркахъ и садахъ и требующихъ покрывки на зиму:

C. grandiflora Amalia. *C. atro purpurea*. *C. grandiflora Helena*. *C. g. Louise*. *C. g. monstrosa*—съ огромнымъ цвѣткомъ. *C. g. Sophia*. *S. g. s. plena*. *C. g. violacea*. *C. indivisa lobata*. Большіе, бѣлые цвѣты съ жел-

тою середкою и розовыми тычинками и пестиками. *C. bicolor plena*. *C. florida plena*. *C. fortunei plena*. Съ большими прекрасными, бѣлыми махровыми цвѣтами. *C. hybrida splendida*. *C. prince of Wales*. *C. rubro violacea*. Большіе темно-фіолетовые цвѣты съ красными тѣнями и желтою середкою.

C. florida Sieboldi. Съ большими желтоватыми цвѣтами, фіолетовыми въ середкѣ.

C. Jackmani. Съ большими синими цвѣтами и пятью темно-фіолетовыми полосами.

C. cirrhosa. Л. Кудрявый. *C. Stadnicke*. *C. viticella plena*. Черноволосникъ махровый. *C. v. venosa*. Цвѣты фіолетовые, бѣлые въ середкѣ. *C. v. rubro*. *C. Brasiliana*. *C. graveolens*. Съ желтыми цвѣтами. *C. Grahani*. *C. Mauriciana*. *C. lanuginosa*. Съ большимъ цвѣткомъ. *C. l. candida*. *C. Virginiana*. Л. Виргинскій.

Дикорастущіе виды Ломоноса:

C. vitalba. Л. обыкновенный. Вьющійся кустарникъ, съ бѣловатыми, душистыми цвѣтами, въ видѣ кисти.

C. orientalis. Л. душистый. Съ желтыми цвѣтами.

C. flamula. Л. жуучій. Нарывная трава. Л. благоухающій. Вьющееся растеніе, разводится для украшенія бесѣдокъ и рѣшетокъ; цвѣты бѣлые въ видѣ кисти.

C. integrifolia. Л. синій. Съ темно-фіолетовыми цвѣтами.

C. cylindrica. Съ очень красивыми цвѣтами.

C. hispanica. *C. lasiantha*. *C. lathyrifolia*. *C. viorna*.

Всѣ эти шесть видовъ принадлежать къ числу травянистыхъ.

C. Loku gauld Veitch. Японское растеніе, съ бѣлымъ, нѣжнымъ, махровымъ цвѣткомъ. Во Франціи растетъ на открытомъ воздухѣ. Любитъ смѣсь песчаной земли съ глинистою.

C. aethusifolia. Бородавникъ. Садовое, полукустарное, многолѣтнее, вьющееся растеніе; подымается на сажень и больше; съ многочисленными, колокольчатыми, желтоватыми цвѣтами.

C. glauca. Многолѣтнее, вьющееся, садовое растеніе, съ сѣроватыми цвѣтами.

C. fusca Turchaninou. Вьющееся растеніе, выдерживаетъ зиму въ грунтѣ безъ покрывки, размножается сѣменами и черенками.

C. patens. Большой фиолетовый цвѣтокъ, съ широкою, зеленою полоскою на каждомъ лепесткѣ.

C. p. var. Amalia. Большой бѣлый цвѣтокъ; лепестки по краямъ нѣжно-фиолетовые.

C. p. flore pleno. *Махровый, пониклый Ломоносъ.* Съ блѣдно-лиловыми цвѣтами, по срединѣ съ зеленою, блѣднѣющею со временемъ, полоскою. Оранжевое растеніе. Зимой теряетъ листья, но весною покрывается крупными цвѣтами; любитъ питательную, дерновую или садовую землю; размножается прививкою къ корню, причемъ наблюдается, чтобы привитая часть покрывалась землею, а наружи оставался бы только черенокъ. Впрочемъ можетъ размножаться съѣменами отводками.

C. smilacifolia. Тепличное растеніе, съ цвѣтами розовыми и желтыми съ фиолетовымъ.

C. altaica. Многолѣтнее, травянистое, **грунтовое**, садовое растеніе.

C. Calycina. *Л. выторский.* Тоже.

C. erecta. *Л. выпрямленный.* Тоже, съ бѣлыми цвѣтами и ядовитыми листьями, употребляемыми противъ сифилиса.

501. Cleonia spinosa. Однолѣтнее растеніе, съ розовато-красными цвѣтами, распускается въ Іюль; сперва сѣется въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ.

502. Cleome speciosissima. Весьма красивое, однолѣтнее растеніе. Изъ семейства Каперсовъ. У насъ на открытомъ воздухѣ расти не можетъ, а разводится подъ рамами; высѣвается въ Февралѣ или въ началѣ Марта; даетъ свѣтло-пурпуровые цвѣты.

Другой видъ: **C. arborea.** Съ лиловыми цвѣтами и красивыми, лапчатыми листьями.

503. Clerodendron. Изъ семейства **Verbenaceae.** Тепличное и вмѣстѣ комнатное деревцо или кустарникъ, съ сердцеобразными душистыми листьями; бѣлыми, розовыми или алыми цвѣтами — зонтикомъ. Зимой теряетъ листья и тогда содержится суше; размножается черенками и отводками; требуетъ легкую, глинисто-дерновую землю.

Виды: **C. bungei.** Съ большимъ, розовымъ цвѣткомъ. Оранжевое растеніе.

C. sinuatum. Съ бѣлыми, весьма душистыми цвѣтами; распускается весьма рано. Любитъ землю, составленную изъ чернозема пополамъ съ перегнившими остатками растений. Требуется много свѣту, сильнаго тепла и влажности во время роста. Размножается сѣменами и черенками, на которые рѣжутъ травянистые отростки.

C. Lindleyi. *Клеродендронъ Линдлея.* Съ розовыми, отчасти душистыми цвѣтами. Зимую содержится въ оранжереѣ при 6° Р.; весною пересаживаются въ рыхлую, глинистую, дерновую землю и ставится въ теплицу. Размножается черенками и отводками.

C. Thompsoni. Цвѣты бѣлые, съ пурпуровыми вѣнчиками.

C. fragrans flore plena. *Японская Волжмерія.* Чтобы цвѣла зимою, держать какъ можно холоднѣе весною и притомъ лѣтомъ очень мало поливають. **C. hastatum.** **C. fallax.** **C. Balfuri.**

Оранжерейные виды: **C. infortunatum.** **C. viscosum.**

504. **Clethra arborea.** Оранжерейное растеніе.

Другіе виды: **C. a. fol. variegatis** и **C. alnifolia.**

505. **Clanthus Dampieri.** Изъ семейства **Leguminosae.** Красивый, австралійскій, декораціонный, однолѣтній, сильно вѣтвящійся кустарникъ, съ бѣлыми и пурпуровыми цвѣтами. Высѣвается въ началѣ Марта, въ вересковую землю, въ теплицѣ или въ горшки, причемъ ставится на окнѣ, въ комнатѣ. Въ началѣ Апрѣля разсаживается по одиночѣ въ маленькіе горшки, въ землю глинистую пополамъ съ вересковою. Въ началѣ Мая пересаживается изъ этихъ горшковъ въ другіе— побольше. Весь Іюнь выдерживается въ умѣренной теплицѣ или въ комнатѣ, на окнѣ будучи приучаемо къ воздуху. Въ Іюлѣ высаживается на солнечное мѣсто, хорошо при томъ защищенное, гдѣ-нибудь у стѣны, на грядку, тщательно приготовленную слѣдующимъ образомъ: вырывъ канаву глубиною въ футъ, наполняютъ ее свѣжимъ конскимъ навозомъ и покрываютъ, поверхъ навоза, на одинъ футъ толщины, смѣсью песчанистой и вересковой земли въ смѣси съ такимъ же количествомъ глинистой. Въ дождливое время растеніе прикрываютъ парниковыми рамами и поливають вообще такъ, чтобы

вода не попадала на стебли, а для того обыкновенно у стебля дѣлають возвышеніе земли.

Другіе виды: *C. puniceus*. *Клантъ пунсовый*. Оранжевей-
тое растеніе, съ красно-пурпуровыми цвѣтами, размножается
черенками; зимою теряетъ листья и тогда содержится сухо;
требуется вересковую землю, съ примѣсью половины дерно-
вой и половины лиственной. Во время роста любитъ обильную
поливку.

C. p. magnificus. Требуется того же ухода, что и преды-
дущее. Большіе, пунцовые цвѣты.

C. d. flore albo, rubro marginata. Превосходный, боль-
шой бѣлый цвѣтокъ, каждый лепестокъ котораго отороченъ
малиновою каймою, а на двухъ верхнихъ лепесткахъ, боль-
шее темно-фіолетовое, сердцевидное пятно, съ двумя бѣлыми
глазками.

506. Clinostigma. Родъ Пальмъ.

C. Samoense. Единственный видъ этого рода, представляетъ
собою гладкое дерево; получило названіе по группѣ Самуан-
скихъ острововъ, гдѣ найдено въ недавнее время и еще въ
культуру не распространено.

507. Clintonia. Изъ семейства *Lobeliaceae*. Весьма красивое,
однолѣтнее, грунтовое растеніе, вырастающее на 1 футъ, съ
голубыми, красноватыми и бѣлыми — съ желтымъ цвѣтами.
Сажается отдѣльною клумбою и бордюромъ. Выводится въ умѣ-
ренномъ парникѣ или на окнѣ, въ комнатѣ. Пересаживается
въ вересковую землю съ примѣсью глинисто-дерновой, но не
любитъ перегноя.

Виды: *C. elegans*. Цвѣты синіе съ бѣлымъ пятномъ, рас-
пускается въ Іюль.

C. pulchella. *C. p. alba* — съ бѣлыми цвѣтами. *C. p. ci-
nerea*. *C. flore coeruleo* — съ синими цвѣтами. *C. f. viola*.
Съ фіолетовыми цвѣтами.

508. Clivia. Тепличное и вмѣстѣ комнатное растеніе, изъ семей-
ства Амариллисовыхъ, имѣетъ луковичный, продолговатый ко-
рень и красивые, красные цвѣты. Размножается отростками
и сѣменами, которыя должно сѣять лишь только созрѣють.

Требуется земля легкую, дерновую, съ примѣсью лиственной. Цвѣтетъ зимою.

Виды: *C. miniata*. Съ оранжевыми цвѣтами.

C. nobilis. *C. cyrtantiflora*. *C. titoni*. *C. sardneri*.

509. *C. Clusia*. Очень красивое, по своимъ листьямъ, тепличное и вмѣстѣ комнатное деревцо, съ воздушными корнями на стволахъ и вѣтвяхъ; съ большими бѣлыми, розовыми или желтыми цвѣтами. Размножается черенками. Требуется дерновую землю пополамъ съ лиственной и съ примѣсью нѣкотораго количества вересковой.

Виды: *C. alba*. Большое дерево. Изъ надрѣзовъ, дѣлаемыхъ на его корѣ, вытекаетъ горькій бальзамъ, имѣющій слабительное свойство.

C. Humboldtii. *C. rosea*. *C. flava*. *C. superba*.

510. *Sceorum triccocum*. Оранжевое растение.

511. *Cobaea scandens*. Вьющееся Кобеа. Изъ семейства Polemoniaceae. Вьющееся оранжевое растение, съ темно-фіолетовыми, кубкообразными цвѣтами, распускающимися въ Декабрѣ, если содержится въ температурѣ выше 6° Р., Размножается весной, сѣменами или черенками.

Другіе виды: *C. scandens foliis albis marginatis*. Листья по краямъ окаймлены бѣлою полосой. Большой, темно-фіолетовый цвѣтокъ. Содержится въ умеренной теплицѣ. Боятся сырости въ тотъ періодъ времени, когда солнце рѣдко показывается. Размножается черенками, въ тепличкѣ подъ стекляннымъ колпакомъ, а также еще успѣшнѣе сѣменами.

C. penduliflora. Цвѣты зеленоватые, съ длинными, падающими отъ основанія цвѣтка, лентообразными лепестками, пунцовыми, волнистыми тычинками и желтыми пыльниками.

512. *Coburgia Brunswigia*. Огромная луковица, дающая алые, или оранжевые цвѣты. Можетъ цвѣсти въ комнатѣ. Размножается отростками. Зимой содержится сухо. Требуется лиственную землю, пополамъ съ дерною и съ примѣсью четвертой части песку.

Другіе виды: *C. incarnata*. *C. fulva*.

513. Coccobola. Изъ семейства *Polygonaceae*. Тепличное и комнатное, орнаментальное деревцо, съ большими, круглыми, очень красивыми листьями. Размножается отводками и черенками. Требуется питательной, дерновой земли.

Виды: *C. Nymphaeifolia*. Вьющееся растение.

C. uvifera. Изъ его древесины готовится красная краска а плоды идутъ въ пищу.

C. pubescens. Твердое дерево, известное въ торговлѣ подъ именемъ „железнаго“.

C. macrophylla. Пунцовый цвѣтокъ столбикомъ.

C. latifolia. Съ широкими листьями.

C. majestica. Самое цѣнное растение.

C. exscoriata. *C. ovalifolia*. *C. speciosa*.

514. Cochlearia armoracia. Изъ семейства *Cruciferae*. Хризм. Дикорастущее и разводимое на огородахъ растение, корни котораго употребляются какъ приправа въ пищу и какъ лекарственное средство. Больше двухъ лѣтъ на одной грядѣ не оставляютъ; большіе корни выкапываютъ для употребленія, а мелкіе собираютъ до весны и сажаютъ въ нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, въ косвенномъ положеніи, причемъ верхній конецъ корешка долженъ находиться на поверхности земли.

Другой видъ: *C. officinalis*. Цыотная трава. Баруха.

Дикорастущее лекарственное растение, изъ листьевъ выгоняется спиртъ.

515. Cochliostema jacobianum. Изъ семейства *Commelinaceae*. Тепличное растение съ лиловыми большими цвѣтами, частью темными, частью свѣтлыми.

516. Cocos. Кокосъ. Родъ Пальмъ. Очень красивое тепличное растение, можетъ содержаться и въ комнатѣ, хотя и не вполне для ней пригодно, потому что очень скоро достигаетъ значительной высоты; даетъ плоды, известные подъ именемъ кокосовыхъ ореховъ. Размножается сѣменами; требуетъ той же культуры, что и другія пальмы. Замѣчательно, что окончательность кокосоваго орѣха похожа на морду обезьяны, отчего и получило названіе, (Coco по португальски—мартышка).

Виды: *C. nucifera*. Типическій видъ этого растенія, наиболѣе полезенъ человѣку разнообразными примѣненіями.

C. flexuosa. Изъ орѣховъ добывается масло.

C. butyracea. Доставляетъ масло, похожее на сливочное и винный напитокъ.

C. coronata, даетъ сердцевину, употребляемую въ пищу, — изъ ней готовится хлѣбъ, а изъ орѣховъ добывается масло.

C. australis, даетъ пальмовую капусту и съѣдобные орѣхи.

C. schyzophylla, сокъ его употребляется какъ лекарство, въ болѣзняхъ глазъ.

C. oleracea. *C. Bonetti*. *C. campestris*. *C. chilensis*. *C. mikaniana*. *C. plumosa microcarpa*.

517. *Coscoscaria officinalis*. *Ложечная трава*. Двухлѣтнее, дикорастущее, на берегахъ сѣверныхъ европейскихъ морей, лекарственное растеніе, имѣющее преимущественно противоцинготное свойство. Разводится посѣвомъ раннею весною прямо на гряды.

518. *Codiaeum (Croton) variegatum Johannis*. Тепличное, кустарное растеніе, съ пестрыми, блестяще-зелеными листьями, съ ярко-желтыми краями.

Другой видъ: *C. variegatum multicolor (Croton)*. Пестролистный тепличный кустарникъ, съ длинными неправильной формы, листьями, суженными у середины, и свитыми по концамъ, свѣтло-зелеными съ желтыми пятнами; впоследствии цвѣтъ этихъ листьевъ, измѣняется въ темно-зеленый, пятна дѣлаются красноватыми, причемъ срединная жилка дѣлается кармино-красною, а нижняя сторона красною.

519. *Sadonopsis gracilis*. Изъ семейства *Campanulaceae*. Вьющееся тепличное растеніе съ голубыми цвѣтами, въ видѣ колокольчиковъ.

520. *Coelia macrostachya*. Тепличная Орхидея, съ большимъ султаномъ розовыхъ цвѣтовъ.

521. *Coeliopsis hyacinthosma*. Орхидея тепличная; цвѣты ея пахнутъ гиацинтомъ, бѣлые съ оранжевыми крапинками на верхней долѣ, лепесткахъ и губѣ; послѣдняя у основанія оранжевая, а по срединѣ съ карминовыми пятнами.

522. *Coelogyne*. Тепличное растеніе изъ семейства Орхидей, требуетъ той же культуры, что и другія древесныя Орхидеи.

Виды: *C. Cumingii*. Съ бѣлыми цвѣтами. *C. cristata*, распускается зимою и цвѣтетъ очень долго большими бѣло-снѣжными, съ желтою полоскою, на нижней губѣ цвѣтами.

C. sulphurea. Тепличная Орхидея съ метелкою желто-зеленыхъ цвѣтовъ, съ бѣлою губою, по которой проходятъ желтыя черточки.

523. *Coix saccharata*. Однолѣтній злакъ, высѣвается предваритель-но въ парникѣ, а потомъ высаживается въ грунтъ.

Другой видъ: *C. lacryma*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

524. *Coffea*. Кофейное дерево. Изъ семейства *Cinchonaceae*. Тепличное дерево, выдерживающее и комнатную культуру. Имѣетъ мелкіе желтоватые цвѣты; плоды въ видѣ овальной, темно-красной ягоды, съ крѣпкимъ зерномъ, въ зрѣломъ состояніи идущемъ въ пищу, подъ именемъ *Кофея*. Размножается черенками и свѣжими сѣменами; требуетъ землю листовую, пополамъ съ пескомъ и съ нѣкоторою примѣсью дерновой.

Виды: *C. arabica*. Съ него преимущественно собираются кофейныя зерна.

C. paniculata и *C. Mauritiana*.

525. *Colax jugosus*. Превосходная Орхидея. Уходъ за нею очень затруднителенъ. Задняя часть цвѣтка совершенно бѣлая, передняя покрыта лилово-темно-синими крапинками.

526. *Colchicum autumnale*. Зимовикъ. Безвременный цвѣтъ. Семейства *Liliaceae*. Дикорастущее у насъ, и содержащее въ оранжереѣ, а также въ грунтѣ, многолѣтнее луковичное растеніе, съ бѣлыми, красными или полосатыми махровыми цвѣтами; сажается лѣтомъ въ горшки, держится въ тѣни, а въ Октябрѣ зацвѣтаетъ. Зимою поливается весьма умѣренно; весною вкапывается въ землю съ горшками.

Виды: *C. bysantinum*. Съ большими, широкими листьями.

C. variegatum. (*C. Agrippine*). Съ пестрыми, малиново-лиловыми цвѣтами.

C. speciosum. Похоже на крокусъ.

C. floribus albo plenis. Съ бѣлыми, махровыми цвѣтами.

C. t. purpurea plenis. Съ красными махровыми цвѣтами.

C. lactum. Красивый зимовикъ. Дикорастущее на Кавказѣ, съ лиловыми цвѣтами, распускающимися въ Сентябрѣ. Требуется одного ухода съ красивымъ крокусомъ.

C. hybridum.

527. *Colea*. Прекрасное, тепличное и вмѣстѣ комнатное деревцо, съ большими листьями и длинными, трубковидными, розовыми или желтыми цвѣтами. Размножается черенками. Держать его должно на дубильномъ корѣ и сажать въ дерновую землю.

Виды: *C. undulata*. Тепличный кустарникъ, съ большими листьями и желтыми цвѣтами, съ розово-лиловыми краями.

528. *Coleus*. Изъ семейства *Labiatae*. Тепличное, нестролистное растеніе, можетъ выносить и комнатную культуру. Размножается сѣменами, черенками и отрезками. Землю любитъ составленную изъ равныхъ частей: листовенной, дерновой и песку. Зимой у этого растенія сваливаются листья и стѣбли и въ это время оно требуетъ умеренной поливки. Лучшая пора для дѣланія черенковъ — весна. Колеусы можно высаживать на открытый воздухъ, но приучивъ къ нему растеніе постепенно, притомъ надлежитъ сперва вырастить крѣпкій экземпляръ.

Виды: *C. Blumei*, прелестные, темно-малиновые, съ зеленымъ, листья, а цвѣтокъ фиолетовый съ бѣлымъ.

C. scutellarioides. Съ темно-фиолетовыми, почти черными листьями, съ узенькою зеленою каймою, по краямъ.

C. Albert-Victor. Замѣчательный красивымъ ростомъ.

C. aurea variegata. Листья съ блѣдно-желтыми краями.

C. Bausei. Требуется для лучшаго развитія температуры отъ 6 до 12°, лучший сортъ, какъ горшечное растеніе; листья по зеленому полю расписаны темно-малиновымъ.

C. Berkeleyi. Листья грязноватаго цвѣта.

C. Gibsoni. Листья пурпуровые.

C. marmoratus. Съ мраморными, зелеными разводами, по красному фону.

C. princesse royale. Отличается густотою окраски листьевъ.

C. soundersii. Пригоденъ для горшечной культуры.

C. Scotti. Черные листья съ зелеными прожилками.

C. Veitchii. Представляет собою нечто среднее между

C. Gibsoni и слѣдующимъ.

C. Verschaffeltii. Красно-пурпуровые листья; сажается рядами на цвѣтныхъ клумбахъ; отличается отъ другихъ видовъ чистотою и яркостью колера.

C. nigricans. Темно-лиственный.

C. Ruckii. Временно бываетъ какъ бы совершенно чернымъ.

C. aromaticu. Не отличается пестротой листьевъ, но они имѣютъ ароматическій запахъ. Зимой, въ теплицѣ даетъ маленькіе, голубые цвѣты. Листья имѣютъ лекарственное свойство, какъ и листья *C. lanuginosus*.

C. Candolei. *C. Clarkei*. *C. Dixii*. *C. Hendersonii*.

C. Her Majesty. *C. Marschallii*. *C. Prince of Wales*.

C. Rewesii. *C. Wilsenii*.

529. *Colidago Canadensis*. Золотарникъ Канадскій. Грунтовое, садовое растеніе съ желтыми цвѣтами.

530. *Collania urceolata*. Изъ семейства Амариллисовъ. Тепличное, луковичное растеніе, съ большими, пониклыми желтыми цвѣтами, къ краю зелеными, съ бѣлою каймою.

531. *Colliguaja odorifera* Molina. Тепличное дерево, похоже на Сандальное и пахнетъ розою.

532. *Collinsia*. Изъ семейства *Scrophulariaceae*. Красивое, бордюрное, однолѣтнее, грунтовое растеніе, высѣвается въ Мартѣ, въ горшки или въ парникъ и въ Маѣ высаживается въ цвѣтникъ, въ рыхлую, песчанистую, но отнюдь, не унавоженную землю — на солнечную сторону.

Виды: *C. Verna*. Цвѣты бѣлые съ голубымъ.

C. bicolor. Двухлѣтняя Колинзія. Бордюрное растеніе, съ цвѣткомъ фіолетовымъ съ бѣлымъ.

C. b. alba. *C. b. candida*. *C. b. carnea*. *C. b. marmorata*. *C. b. speciosa*. *C. b. heterophilla*. Вообще, колинзію *bicolor* можно заставить цвѣсти зимою. Для того колинзія сѣется въ парникъ въ Сентябрѣ, когда окрѣпнетъ, рассаживается въ горшки, по нѣскольку штукъ въ каждый,

выставляется на воздухъ и держится тамъ, пока не наступитъ холодное время. Тогда, до заморозковъ еще она ставится въ парникъ и держится тамъ нѣкоторое время или вносится въ оранжерею.

C. grandiflora. Верхняя часть цвѣтка свѣтло-фіолетовая, а нижняя бѣлая.

C. corymbosa. Съ бѣлыми и голубыми цвѣтами, расположенными щитками.

C. atrorubra. Съ темно-краснымъ цвѣткомъ.

C. violacea. Имѣетъ верхнюю губу цвѣтка бѣлую, а нижнюю фіолетовую.

533. *Colletia ferox bictoniensis*. Семейство *Rhamnaceae*. Оранжевое растение, съ колючими небольшими листьями на толстомъ стеблѣ и желтоватыми цвѣтами.

534. *Collomia*. Однолѣтнее, грунтовое растение, высѣвается прямо въ грунтъ, въ удобренную, но отнюдь не свѣжимъ навозомъ, землю.

Виды: *C. coccinea*. Употребляется для бордюровъ, съ красно-сुरиковыми цвѣтами.

C. linearis. Съ лиловыми цвѣтами.

C. grandiflora. Съ крупными, оранжевыми цвѣтами.

C. bicolor. Съ синими и бѣлыми цвѣтами.

535. *Colocasias*. Изъ семейства Арумовыхъ. Травянистое растение, съ зеленоватыми цвѣтами; можетъ расти и въ комнатѣ. Зимой содержится почти сухо. Размножается отростками корней. Требуется дерновую землю, пополамъ съ листовенною и съ примѣсю половинной пропорціи торфяной и половинной песку.

Виды: *C. odora*. *C. Nymphaeaeifolia*. *C. metalica*.

536. *Colquhounia tomentosa*. Тепличный кустарникъ, съ темно-оранжевыми цвѣтами; на лѣто его можно высаживать въ грунтъ.

537. *Columnea*. Изъ семейства Геснерій.

Оранжевые виды: *C. Schiedeana*. *C. Splendens*. *C. zebrina*. *C. aurantiaca*. Съ оранжевыми цвѣтами.

Однолѣтнія цвѣточныя растения: *C. Coccinea* *C. grandiflora*.

Тепличные виды: *C. crassifolia*. Съ стоячими листьями, отличающимся яркою красною полоскою на оборотной сторонѣ; большіе, ярко-пунцовые цвѣты, покрытые волосками, съ желтыми тычинками и пестиками.

C. pillosa. Длинные, золотистые волоски, покрываютъ какъ стебель, такъ и листья растенія, придавая имъ необыкновенно красивый видъ. Во время покоя содержится почти сухо, а во время развитія требуетъ достаточной влажности. Сажается въ очень хорошо дренированный горшокъ, въ тучный компостъ, смѣшанный съ кусочками кирпича и гнилаго дерева. Цвѣтеть осенью и весьма раннею весною, а потому находится въ состояніи покоя—лѣтомъ и въ это время содержится въ тѣни холодной оранжереи. Размножается посадкою черенковъ, на которые вѣтки рѣжутся до сочлененія; а также размножается сѣменами.

538. *Colutea arborescens*. *Мошникъ обыкновенный*. *Пузырное дерево*. *Овечья чечевица*. Кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ и парковъ, съ желтыми цвѣтами. Размножается сѣменами и отпрысками. Не любитъ обрѣзки вѣтвей.

Другіе виды: *C. orientalis*. *Пузырникъ темно-красный* и *C. rossickii*. *П. Покока*. Оба дикорастущіе вида.

C. cruenta. *Труджа*. Цвѣты желтые съ краснымъ. На зиму требуетъ надежной защиты.

C. frutescens. Оранжерейное растеніе.

539. *Comaclinium aurantiacum*. Изъ Семейства *Compositae*. Тепличное растеніе, съ оранжевыми цвѣтами. Требуется хорошую садовую землю и надлежащій водостокъ въ горшкѣ. Размножается черенками.

540. *Combretum*. Тепличное и вмѣстѣ комнатное, вьющееся кустовое растеніе, съ оранжевыми, бѣлыми или пурпуровыми цвѣтами. Зимой часто теряетъ листь и тогда содержится сухо. Размножается черенками, требуетъ питательной земли и сильнаго провѣтриванія.

Виды: *C. argenteum*, *C. comosum*, *C. farinosum*, *C. Pinceanum*, *C. grandiflorum*, *C. purpureum*.

541. *Commelina*. Семейство *Commeline*. Хотя это растеніе

разводится въ грунтѣ, какъ однолѣтнее, причемъ весною высѣвается въ теплицѣ и въ Іюнѣ высаживается въ грунтъ, но его можно разводить и корнями, содержа зимою его клубни въ песокъ. На почву не разборчиво.

Виды. *C. coelestis*. (*C. tuberosa*). Съ лазуревыми цвѣтами.

C. deficiens foliis variegatis. Тепличное, многолѣтнее, низенькое растеніе, съ мелкими голубыми цвѣтами и пестрыми, бѣлыми съ зеленымъ листьями.

C. coelestis variegata. *C. alba*. *C. angustifolia*. *C. claudestina*. *C. scapigera*. *C. Karwinskyi*.

542. *Comporettia rosea*. Орхидея съ розовыми цвѣтами, падающими и весьма красивыми. Требуется того же ухода, что и прочія эпифитныя орхидеи.

543. *Compostema rubicundum*. Изъ Семейства *Leguminosae*. Оранжерейное растеніе, съ красными цвѣтами. Размножается черенками.

544. *Conferva*. *Водяной мохъ*. Дикорастущее.

545. *Conium maculatum*. *Омега пестрый*. *Борецъ*. *Болитоловъ*. Изъ Семейства *Umbelliferae*. Дикорастущее, многолѣтнее, ядовитое растеніе, разводится на влажной почвѣ, какъ имѣющее нѣкоторыя лекарственныя свойства.

546. *Conoclinium ianthinum*. Тепличное растеніе.

547. *Conostylis setigera*. Оранжерейное, травянистое растеніе, съ желтыми цвѣтами. Можетъ служить въ оранжереѣ, какъ низенькое, постоянно зеленое, бордюрное растеніе. Сажается въ горшокъ съ вересково-песчанистою землею. На лѣто его выносятъ на открытый воздухъ, въ затѣненное мѣсто и держатъ въ нѣкоторой влажности. Размножается отдѣленіемъ отпрысковъ.

548. *Convallaria majalis*. *Ландышъ*. Изъ Семейства *Liliaceae*. Дикорастущее, съ шишковатыми корнями многолѣтнее растеніе съ ароматическими, преимущественно бѣлыми цвѣтами, можетъ разводиться въ саду и подвергаться ранней выгонкѣ. Съ этою

последнюю цѣлью, въ Іюль или Августѣ, пока еще не увяли листья Ландыша, выбираютъ въ лѣсу трехлетнее растеніе, съ самыми толстыми и крѣпкими корнями и осторожно сажаютъ ихъ, по нѣскольку штукъ, или въ маленькій горшокъ, или въ небольшой ящикъ. При этомъ стараются такъ располагать сажаемые въ горшокъ ландыши, чтобы, почки ихъ были обращены внутрь горшка къ нѣскольکو возвышенной, по срединѣ его, землѣ. Сажаютъ корневища не глубоко, въ обыкновенную рыхлую землю, сильно поливаютъ и оставляютъ на воздухѣ, до начала зимы, вкопавъ горшки въ землю, пока не ударитъ морозъ градуса въ три. Чтобы получить цвѣтущій Ландышъ къ Рождеству, въ началѣ Ноября вносятъ въ теплицу или парникъ, покрываютъ горшкомъ слегка набитымъ мхомъ и ставятъ въ теплицѣ на печку или боровъ, если же Ландышъ посаженъ въ ящикъ, то его покрываютъ однимъ мхомъ. Когда стебельки растенія стануть касаться дна опрокинутого горшка, то покрывку снимаютъ, не перемѣщая растенія, пока не откроются колокольчики, — тогда ставятъ Ландышъ въ свѣтлое, прохладное мѣсто. Ландыши можно высаживать изъ ящика въ маленькіе горшки или вазы, въ полномъ уже цвѣту.

Для Ландышей собственно устраиваютъ парникъ, гдѣ ихъ сажаютъ въ песокъ и покрываютъ мхомъ; въ парникѣ содержать ровную температуру, изъ парника, распустившіеся цвѣты, тотчасъ пересаживаютъ въ горшки.

Существуютъ нѣкоторые другіе виды Ландыша.

C. majalis flore rubro.

C. m. f. pleno. *Махровый.*

C. m. f. striato. *Струйчатый.*

C. polygonatum latifolia. *Соломонова печать.*

C. p. plena. C. racemosa. C. bifolia. Л. Двумистый.

549. Convolvulus. *Березка. Повелинъ.* Семейство **Convolvulaceae.** Однолѣтнее, грунтовое растеніе, съ лежащимъ, сильно вѣтвящимся стеблемъ и крупными цвѣтами въ видѣ колокола, иногда махровыми, темно-синими, бѣлыми, фіолетовыми, частью съ желтою серединою и полосатыми. Въ половинѣ Мая высѣвается прямо въ грунтъ или бордюромъ, или сплошною клумбою. Для ранняго цвѣтенія разводится въ горшкахъ;

требуетъ открытаго теплаго мѣста, цѣлый день освѣщаемаго солнцемъ; довольствуется всякою почвою; цвѣтки на ночь закрываютъ.

Виды: *C. tricolor*. *Бель де журз*. Большой цвѣтокъ бѣлый, съ синимъ или лиловымъ.

C. t. unicaulis. Темно-лазореваго цвѣтокъ, отличается прямымъ ростомъ.

C. t. alba. *C. t. asurea*. *C. t. monstrosa*. *C. t. plenissim*. *C. t. splendens*. *C. t. striata*. *C. t. subcoerul*. *C. t. violacea*. *C. t. vittatis*. *C. bicolor*.

C. arvensis. *Павлика*. Дикорастущее.

C. enorum. Оранжеваго растеніе.

C. althaeoides var. *argurea*. Съ нѣжно-розовыми цвѣтами.

C. serpium. (*Calystegia serpium*). Вьюнокъ, съ бѣлыми или свѣтло-розовыми цвѣтами. Размножается дѣленіемъ ползучаго корневища.

C. pubescens. Меньше ростомъ предыдущаго, впрочемъ сходенъ съ нимъ.

C. dahuricus. Цвѣты крупнѣе предыдущаго.

C. Batatus. *Батамъ*. Многолѣтнее растеніе, клубни котораго употребляются въ пищу какъ картофель. Любитъ теплую мѣстность, суглинисто-черноземно-песчаную почву. Для разведенія, корневища этого растенія сохраняютъ въ ящикахъ съ пескомъ или угольнымъ порошкомъ, въ сухомъ мѣстѣ, при температурѣ отнюдь не болѣе 12°. Въ Мартѣ корневища сажаютъ въ теплый парникъ, гдѣ образуется множество побѣговъ, ихъ отдѣляютъ съ корнями у-основанія и пересаживаютъ въ концѣ Апрѣля; лѣтомъ ихъ полиютъ и облачиваютъ навознымъ компостомъ. Существуетъ нѣсколько разновидностей: желтый, розовый, длинный, круглый.

550. *Sopernicia*. Родъ Пальмъ. Нижняя сторона молодыхъ листьевъ этого растенія отдѣляетъ воскъ; дерево средняго роста, съ гладкими, прямыми стеблями, покрытыми остатками листовыхъ черешковъ.

Виды. *C. cerifera*. *C. tectorum*. *C. hospita*. *C. barbadensis*. *C. maritima*. *C. robusta*.

551. *Cookia punctata*. Тропическое дерево, плоды, похожие на крыжовникъ, употребляются китайцами въ пищу.

552. *Corbularia Bulbocodium*, изъ семейства Амариллисовъ, съ желтыми цвѣтами, весьма пригодно для разведенія въ горшкахъ.

553. *Corchorus*. *Корхорусъ*. Кустарникъ, разводимый въ паркахъ и садахъ, имѣетъ слабительное свойство.

Виды: *C. japonicus fol. variegatis*. (*Kerria japonica*). *Корхорусъ японскій, пестролистный*. Собственно оранжерейное растеніе, съ желтыми махровыми цвѣтами; на лѣто его можно высаживать въ грунтъ; зимою теряетъ листья, но въ Декабрѣ, будучи поставлено къ свѣту, образуетъ множество цвѣточныхъ бутоновъ и пышно зацвѣтаетъ въ томъ же мѣсяцѣ, прежде чѣмъ успѣютъ образоваться его листья. Постѣ цвѣтенія верхушка кустарника срѣзается, чтобы образовалось растеніе болѣе пышное и округлое. Размножается черенками, отводками и отсадкою корневыхъ побѣговъ.

554. *Cordyline Guilfoylei*. Изъ семейства *Liliaceae*. Оранжерейное, оранжерейное растеніе, съ прямымъ стеблемъ, листьями, расположенными какъ у Драценъ; испещренными бѣлыми полосами.

Виды: *C. vivipara*.

C. Sieboldii var. maculata. (*Draceae*). Тепличное растеніе, съ бѣлыми цвѣтами и листьями, испещренными свѣтлыми пятнами. Любитъ тучную землю и хорошій дренажъ въ горшкѣ. Размножается черенками.

C. australis. Зимуетъ въ холодной оранжерей, размножается черенками и сѣменами; можетъ быть на лѣто высажено въ грунтъ, въ полузатѣненное и защищенное мѣсто. Любивъ глинистую, дерновую землю, большую посуду и въ періодъ роста жидкое удобреніе.

C. Haagiana, оранжерейный кустарникъ съ бѣлыми цвѣтами.

C. lentiginosa. Оранжерейное кустарное растеніе, съ листьями буроватаго цвѣта.

555. *Coreopsis*. Однолѣтнее грунтовое растеніе, вышиною до 1

аршина; имѣть множество видоизмѣненій, съ цвѣтами разныхъ колеровъ, отъ желтаго до пурпуроваго; цвѣтеть съ начала лѣта до самыхъ морозовъ; высѣвается въ Мартъ въ горшки, въ оранжереѣ или парникѣ, въ сильную, глинистую землю, когда взойдетъ, разсаживаютъ по нѣскольку растений въ небольшіе горшки и держатъ подъ рамами; когда же наступитъ настоящая теплая погода; высаживаютъ въ грунтъ стуломъ.

Виды: *C. articulata* (*C. longipes*).

C. Drummondii, цвѣтки краснобурые или желтые, съ темнымъ пятномъ въ серединѣ.

C. aristosa. Съ крупными оранжевыми цвѣтами, похожими на георгину.

C. cardaminifolia. *C. c. atrosanguinea*. *C. coronata*. *C. tinctoria*. *C. t. atropurpurea*. *C. t. monstrosa*. *C. t. marmorata*. *C. t. nana*. *C. t. nana atropurpurea*.

C. atkinsoniana и *C. tennifolia*. Многолѣтнее садовое растеніе.

C. verticillata. Тоже. Сѣверо-американскій видъ.

556. *Coriandrum sativum*. *Киндифъ*. Изъ семейства *Umbelliferae*. Дикорастущее, однолѣтнее, медоносное растеніе, разводимое для сѣменъ, употребляемыхъ какъ пряность и въ лекарство; цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ; листья его имѣютъ запахъ, нѣсколько напоминающій запахъ клопа, отчего и получило названіе (*Koris* — клопъ).

557. *Cornus*. *Деренъ*. Дерево-кустарникъ, разводимое въ нашихъ садахъ для фруита и какъ живая изгородь. Любитъ нѣсколько тѣнистое мѣсто; размножается посѣвомъ сѣменъ; тотчасъ по сборѣ ихъ, отводками весною и черенками зимою.

Виды: *C. mascula*. Обыкновенный деренъ. *Кизиль*. Дикорастущее въ лѣсахъ дерево, съ вкусными плодами. Растетъ медленно. Можетъ расти на самой дурной почвѣ; имѣетъ весьма крѣпкую и гибкую древесину.

C. sanguinea. *Д. кровавый*. *Глогъ*. *Слпокуръ*. Кустарникъ, съ годами получающій кровавый цвѣтъ; даетъ черныя ягоды; въ пищу не употребляется; на почву не прихотливъ; имѣетъ весьма твердую древесину, употребляемую на разные подѣлки.

- C. alternifolia.* Тернз Американскій.
- C. asperifolia.* Т. остролистный. Съ фіолетовыми ягодами; цвѣтеть позже другихъ видовъ.
- C. fastigiata.* Т. негибкій.
- C. candidissima.* Т. снѣжный.
- C. c. fol. variegatis.* Т. пестролистный.
- C. circinnata.* Т. курчавый.
- C. paniculata.* Д. вѣнчиковый; съ бѣлыми плодами.
- C. florida.* Т. цвѣтистый. Съ желтоватыми цвѣтами и длинными красными плодами; требуетъ покрывки на зиму.
- C. sericea.* Т. голубой, съ синими ягодами.
- C. Sibirica.* Свидина. Красное дерево. Съ красною корою.
- C. australis.* Чума-Агачъ.
- C. suecica.* Вороньи ягоды. Д. шведскій.
- C. alba.* Д. бѣлый. Американское растеніе, съ ярко-красною корою и бѣлыми плодами.
- C. stolonifera.* Д. дающій отпрыски.
- C. pyramidalis.* Д. пирамидальный.
- C. thelieranis.* Съ желтыми цвѣтами, испещренными красно-оранжевыми жилками.
- C. Canadensis.* Д. канадскій.

558. *Corokia buddleioides.* Буддлевидная Корокія. Оранжевый кустарникъ, вышиною до 10 футъ. Вѣтви и нижняя поверхность листа бѣлопушистая съ маленькими желтыми цвѣтами. Любитъ рыхлую, глинисто-дерновую землю.

559. *Coronilla varia.* Горохъ полевой. Вязиль. Изъ семейства Papilionaceae. Дикорастущее.

Другіе виды: *C. glauca.* Вязовая бирюзель. Съ желтыми, мотыльковыми цвѣтами; въ свѣтлой оранжевѣ цвѣтеть всю зиму.

C. variegata. Пестрая Вязиль. Тоже.

C. emerus. Вязель. Кустарникъ растущій въ грунту и подвергаемый ранней выгонкѣ въ оранжевѣ. Даетъ золотисто-желтые цвѣты. Предназначаемое къ ранней выгонкѣ растеніе, вынимается изъ грунта весною, сажается въ горшокъ и закапывается въ землю до края горшка, въ тѣнистомъ мѣстѣ, гдѣ поливается довольно часто и опрыскивается. Когда можно ожидать заморозковъ, растеніе вносится въ оранжевую или ста-

вится въ темное мѣсто холодной комнаты; въ Декабрѣ или Январѣ растеніе ставится въ умѣренную теплоту, а за тѣмъ обильно цвѣтеть. Размножается дѣленіемъ корня.

560. Correa. Изъ семейства *Diosmeae*. Оранжевое растеніе, будучи содержимо при 8° Р. Цвѣтеть почти всю зиму. Лѣтомъ содержится на открытомъ воздухѣ. Пересаживается въ краткій періодъ его покоя, т. е. въ Іюль или Августѣ. Любитъ землю составленную изъ двухъ частей лиственной и части песчаной. Поливается: лѣтомъ сильно, а зимою весьма умеренно. Размножается сѣменами, черенками, отводками и прививкою.

Виды: *C. cardinalis*. Цвѣты пунцовые. съ желтыми головками.

C. bicolor. Лучше и раньше другихъ цвѣтущій сортъ, также какъ и *C. rosea*. Цвѣты бѣлые, у основанія розовые.

C. Cavendishii. *C. grevillei*. *C. Harrisii*. *C. Lindleyana*. *C. longiflora*. *C. speciosa*. *C. pulchella*. *C. alba*.

561. Cortusa Matthioli. *Личуха*. Многолѣтнее, грунтовое растеніе, съ темно-пурпуровыми цвѣтами; распускается въ Апрѣлѣ; существуетъ у насъ и въ дикомъ состояніи.

562. Coryanthes. Одна изъ красивѣйшихъ Орхидей, съ большими цвѣтами, бѣлыми въ крапинкахъ, желтыми съ малиновымъ или съ пурпуровымъ. Размножается дѣленіемъ корней. Сажается на кускѣ угля. Требуется лиственную землю, съ прибавкою половиною пропорціи вересковой.

Виды: *C. Albertinae*. Цвѣты желтые, испещренные красными крапинками, нижняя губа малиновая съ бѣлымъ.

C. Speciosa. *C. macrantha*. *C. Albertini maculata*.

563. Corydalis solida. *Головастики*. Дикорастущее. Такъ называется потому, что стебель его подымается изъ шишекъ, почти шаровидной.

Другіе виды: *C. eximia*. Долголѣтнее, садовое растеніе, требуетъ покрывки на зиму.

C. Bulbosa, (cava) *fabacea*, *Halleri*. *Хохлатка*. Дикорастущее, многолѣтнее растеніе съ шишковатыми корнями, розовыми или бѣлыми цвѣтами, похожими на гіацинтъ; можетъ

подвергаться ранней выгонкѣ, которую производить также, какъ и выгонку анемоновъ, сажая по 3 и по 4 шишки въ одинъ горшокъ, съ обыкновенною землею. Дикорастущая Хохлатка, предназначенная къ выгонкѣ, высаживается въ дѣсу не позже Апрѣля.

C. nobilis. (fumaria). Хохлатка, съ большими желтыми цвѣтами.

C. longiflora. Выдерживаетъ зиму въ грунту безъ покрывки. Цвѣты свѣтло-розовые съ бѣлымъ. Размножается сѣменами, высѣваемыми тотчасъ послѣ того какъ созрѣютъ.

C. bracteata. Цвѣтетъ въ Маѣ. Цвѣты желтые. Любитъ рыхлую, песчаную землю, смѣшанную съ глинистою и торфяною. Выдерживаетъ зиму въ грунту, безъ покрывки.

C. fungosa. Вьющееся, многолѣтнее растеніе; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

564. *Corylus.* Лещина. Орешникъ. Изъ семейства *Capuliferae*. Дикорастущій кустъ, разводимый въ садахъ и паркахъ для плода имѣ производимаго. Съ его цвѣтовъ пчелы берутъ взятокъ въ Апрѣлѣ. Размножается сѣменами, корневыми отпрысками и отводками. Сѣется зернами вынутыми изъ скорлупы, на такую глубину, какой толщины высѣваемый орѣхъ. Хорошо растетъ въ тѣни.

Виды: *C. avellana.* Лещина. Лѣсной орѣхъ. Дико растетъ по всей Европѣ. Въ саду любитъ положеніе между двумя кустарниками.

Разновидность его. *avellana purpurea*, съ темно-пурпуровыми листьями.

C. fol. laciniatis—съ разрѣзными листьями.

C. grandis. Барселонскій орѣхъ.

C. colurna. Турецкій орѣхъ; у насъ въ садахъ вымерзаетъ. Большое дерево, растущее въ Турціи и на всемъ Востокѣ, съ пробкообразною корою и большими плодами.

C. sativa fr. maxima. *C. s. f. gigantea.* *B. s. f. longissima.* *C. s. americana.* *C. s. belgica.* *n. s. hispanica.* *C. s. spicata.* *C. s. fertilis.*

C. mandschurica. Уржумки—маньчжурское растеніе.

C. heterophylla. Зяблица. Растетъ въ Дауріи и на Амурѣ.

C. tuberosa villa. О. Ламбертскій. Фундукъ. Въ нашемъ

климатъ вымерзаетъ. Древообразный кустарникъ дико растеть въ Южной Европѣ.

C. Americana. *Американская лещина.* Низкорослый кустъ, съ шарообразнымъ къ основанію, нѣсколько расширеннымъ орѣхомъ.

C. rostrata. *О. рогаый.* Американское растеніе, названо такъ по оболочкѣ орѣха, имѣющаго видъ рога или елюва. Разводится въ Южной Европѣ.

565. Corypha. Родъ пальмъ. Красивое тепличное растеніе, выдерживающее и комнатную культуру; не растеть выше 30 футъ, съ большими вѣерообразными, повисшими листьями, болѣе или менѣе разрывными и вырастающими изъ макушки стебля; нѣкоторые виды не имѣютъ стебля и даютъ отростки отъ корня; размножается сѣменами и отростками; требуетъ обыкновенной культуры пальмъ.

Виды. **C. umbraculifera.** Листья употребляются вмѣсто зонтика.

C. gebang. C. Cumingii. C. elata.

Другіе виды содержатся въ оранжереѣ и зимою требуетъ 5—8° Р., напримѣръ:

C. hystrix. C. Australis. C. Miraguana.

566. Copernicia. *Пальма.* Тепличное растеніе съ вѣерообразными листьями и стеблями, покрытыми веществомъ, похожимъ на воскъ; размножается сѣменами; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: **C. cerifera. C. tectorum.**

567. Cosmanthus fimbriatus. Семейство **Hydrophyllaceae.** Однолѣтнее, маленькое, нѣжное растеніе, съ бахромчатыми, бѣлыми, синеватыми лепестками; высѣвается предварительно въ парникъ, потомъ высаживается въ грунтъ; цвѣтетъ въ Іюлѣ.

Другой видъ: **C. grandiflorus.** Съ свѣтло-лиловыми цвѣтами.

568. Cosmea bipinnata. Однолѣтнее грунтовое растеніе; пурпуровый цвѣтокъ распускается очень поздно; высѣвается въ парникъ и по всходѣ пересаживается въ цвѣтникъ.

569. *Cosmelia rubra*. Изъ семейства **Erascridaeae**. Оранжевейное растеніе, съ красными цвѣтами. Требуется весьма умѣренную поливку и хорошую, вересковую землю. Весьма нѣжное растеніе, для гибели котораго достаточно: разъ не полить его во-время или дать ему слишкомъ сухой воздухъ. Размножается сѣменами и черенками.

570. *Cosmidium Burridgeanum*. Однолѣтнее грунтовое растеніе, вырастаетъ до 2 футъ, съ перистыми, нитевидными листьями; цвѣты темно-красные, съ золотисто-желтою каймою; высѣвается въ парникъ; по всходѣ пересаживается въ грунтъ.

Другой видъ: *C. Filicifolium*. Съ желтыми, лучевыми цвѣтами.

571. *Cosmophyllum sacaloides*. Лиственное растеніе, съ большими листьями, имѣющими запахъ спѣлыхъ яблокъ. Зимуетъ въ оранжереѣ, размножается черенками въ Январѣ и Февралѣ. Можетъ быть на лѣто высажено въ грунтъ.

572. *Costus Maelorticanus*. Красивое, тепличное растеніе. Большіе цвѣты желтые съ краснымъ.

Другой видъ: *C. speciosus*. Имѣетъ лекарственное свойство.

573. *Cotoneaster vulgaris*. *Ирга. Кизильникъ.* Дикорастущее. Другіе виды: *C. microphylla*. Оранжевейное растеніе.

C. reflexa. Кустарникъ съ бѣлыми цвѣтами и ярко-красными плодами; размножается прививкою на Айву, Кратегусъ и *Coloncaster frigida*.

574. *Cotyledon orbiculata*. Оранжевейное растеніе, съ чашевидными листьями.

575. *Cotula viscosa*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе; высѣвается прямо въ грунтъ. Синеватые цвѣты его распускаются въ Іюнь.

Другой видъ: *C. aurea*. Тоже бордюрное растеніе, съ желтыми цвѣтами.

576. *Crambe maritima*. *Морская капуста. Катранъ.* Многолѣтнее растеніе. Молодые побѣги употребляются какъ овощъ или салатъ, причемъ предварительно снимаютъ съ нихъ наружную кожицу. Любитъ глубоко перекопанную, удобренную

глинисто-песчаную почву. Сѣется въ Апрѣлѣ. Остается на градѣ 10 лѣтъ. Въ первый годъ града взрывается, и усыпается пескомъ у корней, вершка на два толщины. На слѣдующій годъ песокъ ввапывается въ землю. На третій годъ, послѣ посѣва въ Апрѣлѣ, ставятъ на кусты опрокинутые цвѣточные горшки, насыпавъ предварительно на растеніе кучу песка, въ который капуста вростаётъ и бѣлится.

Другіе виды: *C. tartarica*. Катранъ бѣлый. Дикорастущее.

C. pinnatifida. Дикій хренъ. Тоже.

577. *Crasulla*. Красуля. Пуццовый толстолистникъ. Толстянка. Оранжевое растеніе, однако можетъ, съ успѣхомъ, расти и въ комнатѣ, съ толстыми, сочными листьями, малиновыми или алыми цвѣтами; размножается черенками изъ вѣтвей и листьевъ; зимою содержится почти сухо; требуетъ дерновую землю пополамъ съ листовною и съ примѣсью малой части песку.

Виды: *C. arborescens*. *C. aloides*. *C. Boildieu*. *C. coccinea*. *C. Dr. Naudin*. *C. Ed. Orties*. *C. Fr. Desbois*. *C. grandiflora*. *C. M-me Desbordes*. *C. M-me Celeste*. *C. marmorata*. *C. Mozart*. *C. portulacca*. *C. pinnata*. *C. Rosalba*. *C. spontini*. *C. Sultan Achmed*.

C. spectulata. Толстолистникъ лопатный. Съ бѣлыми, испещренными розовымъ, метелко-образными цвѣтами.

C. lactea. Съ бѣлыми цвѣтами, обыкновенно распускается раннею весною, но можетъ цвѣсти въ Январѣ, если осенью его поставятъ къ окну въ теплицѣ. Лѣтомъ его держать на солнцѣ, въ Августѣ пересаживаютъ въ песчанистую землю, на толстый слой черепковъ.

C. corymbosa, съ большими кистями блѣдно-розовыхъ цвѣтовъ; распускается въ Январѣ или Февралѣ.

578. *Crataegus*. Боярышникъ. Гладъ. Изъ семейства *Romaseae*. Кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ и парковъ, также для живыхъ изгородей. Цвѣты его вредны пчеламъ. Размножается сѣменами; любитъ хорошую, нѣсколько влажную почву. У насъ наиболѣе разводится обыкновенный боярышникъ. Любитъ тѣнь. Покрываетъ твердыми колючками, выходящими изъ промежутка листьевъ. Производитъ бѣлые цвѣты и ярко, красные плоды, величиною съ крупную горошину.

Виды: *C. aria*. Б. мушкетер. Мушкетерское дерево.

C. amelanchier. Б. круглолистный.

C. alpestris. *C. asplenifolia*. *C. colpodendron*.

C. arbutifolia. Б. толокнянолистный. Американская порода.

C. coccinea. Б. пунцовый.

C. caroliniana. *C. coccinea macrocarpa*.

C. c. mollis. *C. C. Wendlandii*. *C. cordata*.

C. crus galli. Пятнистый. Съ большими волочками.

C. c. g. splendens. Тоже.

C. cuneifolia. *C. Douglasi*. *C. edulus*. *C. elliptica*.

C. pinatifida. Дугласов.

C. humilis. Б. Мажорский.

C. pyracantha. Чайковское дерево.

C. latifolia. Б. широколистный.

C. flava. *C. lucida*.

C. monogyna. Глодз. Б. одноствольный. Имѣть по одной косточкѣ въ ягодѣ.

C. m. fol. argentea variegata.

C. m. f. rubra. Съ розовыми цвѣтами.

C. m. f. splendens.

C. m. f. s. plena. Съ махровыми, розовыми цвѣтами.

C. nigra. Имѣть бѣлую изнанку листьевъ.

C. orientalis. Б. восточный.

C. melanocarpa. Черный Глодз.

C. pyrifolia. Б. Грушелистный. Американская порода.

C. oxyacantha. Б. обыкновенный. Боярка.

C. oxyacantha var. horrida. Иглы сидятъ на стеблѣ большими группами.

C. o. alba plena. Тоже, съ бѣлыми, махровыми цвѣтами.

C. o. rubra plena. Съ розовыми, махровыми цвѣтами.

C. o. f. variegatis. *C. o. f. argentea variegatis*.

C. o. pendula. *C. o. fructu luteo*.

C. o. quercifolia. *C. prunifolia nivea*. Б. сливолистный.

C. virginica.

C. sanguinea. Б. черный или Сибирский.

C. terminalis. Богородникъ. Б. кленолистный.

C. spinosa. Б. иловатый.

579. *Crataeva Tapia*. Тропическое дерево. Сладкіе плоды его употребляются въ пищу.

580. *Crepis barbata*. Однолѣтнее, бордюрное, цвѣточное растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ.

Другіе виды: *C. rubra*. Имѣетъ запахъ карболовой кис-
C. alba. *C. Drummondii*. Съ бѣлыми и красными цвѣтами,
распускается въ Іюль.

Дикорастущіе виды: *C. tectorum*. Пушкинъ. *C. Sibirica*.
Скерда.

581. *Crescentia cujete*. Калабасовое дерево. Тепличное дерево. Употребляется на подѣлки, а плоды имѣютъ лекарственное свойство и употребляются въ пищу.

Другой видъ: *C. alata*. Изъ плодовъ готовится ле-
карство отъ горловыхъ болѣзней.

582. *Crinum*. Кринъ. Тепличное и вмѣстѣ комнатное, луковичное растеніе. У нѣкоторыхъ видовъ луковицы вырастаютъ въ вышину и принимаютъ форму, схожую съ обыкновеннымъ стеблемъ. Большой бѣлый, желтоватый, или съ розовыми полосками цвѣтокъ, состоитъ изъ нѣсколькихъ (до 8) цвѣтковъ, сидящихъ на одномъ стеблѣ и расположенныхъ зонтикомъ. Нѣкоторые видъ имѣютъ цвѣтокъ очень душистый. Размножается сѣменами и отдѣленіемъ дѣтковъ, которыя только тогда отнимаются отъ растенія, когда у нихъ образуются свои корни; чтобы приростаніе ихъ было успѣшно и чтобы ранка, остающаяся при отдѣленіи дѣтки, существовала, по возможности, меньше, въ первое время отдѣленное растеніе держать сухо и сажаютъ въ песчаную, легкую землю. Требуется обильной поливки, но только не зимою. Любитъ сильную землю; помѣщается на корѣ. Чтобы заставлять его цвѣсти, надо оставлять его года по два безъ пересадки.

Виды: *C. americanum*. *C. amabile*. *C. Asiaticum*.
C. Australis. *C. cruentum*. *C. giganteum*. Съ большимъ бѣлымъ, душистымъ цвѣткомъ. Требуется питательной, не очень легкой земли и много свѣта.

C. brachynervum. Прекрасное растеніе, съ широкими листьями и бѣлыми, душистыми цвѣтами.

583. *Crocasmia aurea*. Изъ семейства *Iridaeae*. Тепличное ра-

стеніе, съ оранжевыми, пахнущими шафраномъ цвѣтами. Любить листовную землю. Въ концѣ Октября луковицы сажаютъ въ горшки. Зимю охраняютъ отъ сырости и даютъ много воздуха. Когда весною растение зацвѣтетъ, его при- тѣняютъ. Въ концѣ Іюля растение предается покою, тогда его луковицу вынимаютъ изъ земли и держатъ въ сухомъ мѣстѣ.

584. *Crocus*. Шафранъ. Крокусъ. Семейство **Irideae**: Маленькое, луковичное растение, разводится въ грунту и употребляется для ранней выгонки. Съ этою цѣлью, въ Сентябрѣ или началѣ Октября сажаютъ по одной луковицѣ въ маленькіе горшки, либо по 2 по 3 луковицы въ четырехъ-дюймовые горшки, ставятъ въ холодное, темное мѣсто, на влажный песокъ и вершка на два покрываютъ такимъ же пескомъ. Горшки оставляются подъ землею только недѣлю, (въ противномъ случаѣ растение слишкомъ тянется) и какъ только дасть хорошіе корни и ростки, приставляется, въ оранжереѣ, прямо къ свѣту, отнюдь ничѣмъ не покрывая ихъ; въ теплое мѣсто Крокусы переносятся не раньше Рождества; но если ихъ приставлять на окны теплицы или комнаты, въ Январѣ или Февралѣ, когда растение уже достаточно развито, оно разцвѣтаетъ въ 8 дней; послѣ же Февраля Крокусы цвѣтутъ сами собою, въ оранжереѣ или въ прохладной комнатѣ. Во время цвѣтенія, Крокусы требуютъ сильной поливки. Для разведенія Крокусовъ, пригодныхъ для выгонки, собираютъ остающіеся въ горшкахъ зубки, и сажаютъ ихъ осенью въ питательную песчаную землю, смѣшаную съ коровьимъ перегноемъ. Черезъ два—три года эти саженцы дѣлаются годны для выгонки; цвѣтущія въ этомъ году луковицы цвѣтутъ еще и въ будущемъ году. Тычинки цвѣтеа Крокусовъ употребляются какъ красильное вещество подъ именемъ Шафрана. Для ранней выгонки употребляются:

C. versicolor lutea, цвѣтетъ очень рано, темно-оранжевымъ цвѣткомъ.

C. susiana. Маленькій весьма рано распускающійся цвѣтокъ.

C. nivalis. Цвѣтетъ въ Декабрѣ, даже не будучи подвергаемъ ранней выгонкѣ.

C. imperati (suaveolens) съ большими, душистыми, фио-

летовыми цвѣтами, желтымъ зѣвомъ и пурпуровыми полосками снаружи.

C. luteus. Цвѣтетъ весьма рано и сильно.

C. reticulatus. Бузликъ. Синій цвѣтокъ съ фіолетовыми полосками.

C. neapolitanus. Самый поздній крупный, пурпурово-фіолетовый цвѣтокъ.

C. vernus. К. весенній.

C. officinalis.

C. Omer pacha. Цвѣтокъ большой фіолетовый.

C. grand jaune. Желтый цвѣтокъ.

C. scottisch. Росписной цвѣтокъ, фіолетовый съ былымъ.

C. Mamouth. Большой бѣлый цвѣтокъ.

C. drap d'or. Маленькій желтый цвѣтокъ, росписанный коричневыми жилками.

C. Louis Napoléon. Весьма большой темно-фіолетовый цвѣтокъ.

C. Albion. Большой бѣлый цвѣтокъ, росписанный малиновымъ.

C. vernus var. majestuosus. Большой цвѣтокъ, фіолетовый съ бѣлымъ.

C. satirus. Дикорастущая у насъ луковица.

C. orientalis. Пасочникъ. Тоже. Осенніе крокусы высаживаются въ горшки, въ Іюль или Августъ и оставляются на волѣ или въ ящикѣ, пока не разцвѣтутъ въ Октябрѣ или Ноябрьѣ. Лучшій сортъ осенняго Крокуса: *C. sativus autumnalis*, даетъ въ Октябрѣ свѣтло-пурпуровые цвѣты, съ темными полосками.

C. orphanidis. Красивый осенній крокусъ. Луковица бутылчатой формы; блѣдно-лиловые цвѣтки безъ жилокъ; изъ цвѣтка впоследствии выходитъ пучекъ много разбѣченныхъ рылецъ, темнаго, красно-оранжеваго цвѣта.

C. Thomasii, съ розовыми цвѣтами, распускающимися въ Октябрѣ.

C. speciosus. Красивый крокусъ, съ крупными фіолетовыми цвѣтами, раскрывающимися въ Октябрѣ. На почву не прихотливъ.

C. serotinus. Свѣтло-фіолетовый, съ красными жилками, цвѣтетъ въ Октябрѣ или Ноябрьѣ.

585. Croton. Тепличное и вмѣстѣ комнатное растеніе, съ лоснящимися или пушистыми листьями, съ мелкими бѣлыми или желтоватыми цвѣтами — кистью; размножается черенками, требуетъ зимою самой умѣренной поливки и землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: *C. variegatum*, ярко-зеленые листья съ желтыми жилками.

C. balsamiferum, изъ котораго добываютъ душистый бальзамъ.

C. pictum. Листья испещрены розовыми или красными жилками.

C. multicolor. Съ листьями уродливой формы, въ молодости свѣтло-зелеными, испещренными желтыми пятнами; со временемъ цвѣта эти темнѣютъ; обратная сторона листьевъ красная. Содержится въ теплицѣ.

C. irregulare. Листья неправильной формы, темно-зеленые съ желтою полоскою посрединѣ и такими же пятнами.

C. lacteum. Листья испещрены бѣлыми, выдающимися въ свѣтло-желтый цвѣтъ жилками.

C. Johannis. Съ длинными, узкими зелеными листьями, по краямъ съ ярко-оранжевыми полосками.

C. Weismanii. Одна изъ лучшихъ разновидностей. Длинные листья испещрены прекрасными, желтыми правильно расположенными чертами.

C. Hookeri. Одинъ изъ красивѣйшихъ видовъ; на его темно-зеленыхъ листьяхъ красуется свѣтло-желтая лента различной ширины.

C. interruptum, съ длинными листьями, имѣющими необыкновенный видъ: листья эти то широкіе вначалѣ, то какъ бы оборванные и состоящіе изъ одной средней жилки и затѣмъ опять внезапно дѣлаются широкими; — то свернуты нѣсколько разъ спиралью, — то будто перехвачены въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

C. maximum, съ весьма большими овально эллиптическими листьями, оторочены и исполосованы, ярко-желтымъ, золотистымъ цвѣтомъ.

C. Veitchianum. Красивѣйшій изъ всѣхъ видовъ. По широкимъ, темнымъ листьямъ этого растенія проходитъ весьма

узорчатая, ярко-желтая полоса, которая, со временемъ перемѣняетъ свой цвѣтъ въ розовый и малиновый.

C. aucubefolium. *C. Hillebrandii*. *C. discolor*. *C. farinosum*. *C. longifolium*. *C. salicifolium*.

586. *Cryptanthus bivittatus*. Тепличное, декоративное растеніе, любить рыхлую землю и свѣтъ. Размножается боковыми побѣгами, образующимися послѣ того какъ отцвѣтеть.

587. *Cryptocarya pretiosa*. Американское растеніе содержится въ теплицѣ, кора его имѣетъ сильный ароматъ и жгучій вкусъ.

588. *Cryptomeria*. *Криптомерія*. Хвойное, оранжерейное дерево, размножается черенками, но еще лучше сѣменами.

Виды: *C. araucarioides*. Очень красивое дерево, съ темно-зелеными листьями.

C. elegans. *C. japonica*. Красивое, пирамидальное, вѣтвистое дерево, съ висячими вѣтвями.

C. Lobbii. Весьма схоже съ предыдущимъ видомъ, но ниже его ростомъ и кустистѣе.

589. *Crucinella*. *Приметъ*. *Старецъ*. Дикорастущее. Листья расположены крестообразно, отчего и получило названіе. (*Crus*—*Крестъ*.)

Видъ: *C. stylosa*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

590. *Cubeba officinalis*. Тепличное растеніе, изъ котораго готовится лекарство, подъ именемъ „*Кубебы*“.

591. *Cucubalis bacciferus*. *Бирючьи ягоды*. Многолѣтнее, дикорастущее растеніе, истощающее почву, на которой растетъ. Молодые листья его употребляются для приготовления зеленыхъ щей.

592. *Cucumis melo*. *Дыня*. Изъ семейства *Cucurbitaceae*. Однолѣтнее растеніе; зрѣлый плодъ его употребляется въ пищу, въ сыромъ видѣ и приготовленнымъ различными способами. Зрѣлость плода узнается по сильному запаху или потому, что кожица его начинаетъ лопаться у стебля.

Дыня разводится на открытомъ воздухѣ, на бахчахъ или

нарочно устраиваемыхъ насыпяхъ, въ парникахъ и теплицахъ.

На бахчахъ, въ степныхъ мѣстностяхъ, гдѣ стоитъ знойное и продолжительное лѣто, сажаютъ сѣмена дыни прямо въ грунтъ, преимущественно въ тучную, неистощенную землю; остальной уходъ за растеніемъ заключается въ опалываніи растенія, въ разрыхленіи вокругъ него почвы, въ окучиваніи и въ поливкѣ его.

На особо устраиваемыхъ насыпяхъ или буграхъ, дыни разводятся слѣдующимъ образомъ.

Дѣлаютъ углубленіе въ грядѣ, наполняютъ его полусвѣжимъ навозомъ, съ верхомъ, на аршинъ съ четвертью вышины и ширины, сильно утаптываютъ и покрываютъ насыпью хорошей садовой земли съ компостомъ; сверху бугоръ дѣлается плоскимъ, съ углубленіемъ посрединѣ въ полъ аршина, которое наполняется навознымъ компостомъ. Въ это углубленіе сажаютъ дыни, предварительно вырощенныя въ парникѣ. Для выращивания дынныхъ саженцовъ, въ началѣ Апрѣля, сажаютъ трехъ или шести-лѣтнія сѣмена въ парникъ; когда они дадутъ ростки и сдѣлаютъ по одному листку, ихъ рассаживаютъ въ маленькіе горшки и когда выростутъ вторые листки, вновь рассаживаютъ по горшкамъ. Въ концѣ Мая ростки дынь вынимаютъ стуломъ и сажаютъ на мѣсто. Когда на дынномъ росткѣ образуется четвертый листокъ, то верхушку растенія сощипываютъ, а у образующихся затѣмъ боковыхъ побѣговъ отрѣзываются верхушки когда выростутъ 3, 4 и 5-й листики. Затѣмъ слабыя плети, безъ завязей, срѣзаются вовсе, а тѣ, которыя съ плодомъ, срѣзываются выше третьяго и четвертаго листьевъ.

Чтобы дать растенію больше тепла, его покрываютъ стекляннымъ колпакомъ или покрывшею изъ бѣлаго вымазаннаго лакомъ коленкора.

Растеніе въ теплую погоду тщательно поливается.

Для болѣе ранней выгонки дынь, употребляютъ парники и теплицы.

До посадки въ парникъ, дыни выращиваются, какъ выше значится; затѣмъ ихъ сажаютъ по двѣ штуки подъ парниковую раму. Сначала роста, въ парникѣ поддерживаютъ значительное тепло, во время же цвѣтенія парникъ часто провѣтриваютъ и искусственнымъ образомъ оплодотворяютъ растеніе, вкладя, въ

полдень, мужскіе цвѣтки на женскіе. Обрѣзка растенія производится вышеуказаннымъ порядкомъ, съ тѣмъ, что плети обрѣзываются каждые 8 дней и упавшіе цвѣтки выбрасываются изъ парника. Вообще выбрасывается изъ парника всякая гниль, а гнилыя пятна на стебляхъ засыпаются кирпичною пылью. Въ парникѣ температура почвы должна доходить до 35°, а температура воздуха до 24° Р.

Посадку дынныхъ сѣменъ надлежитъ производить въ половинѣ Февраля.

Поливка парника производится лейкою, безъ ситки, не орошая листьевъ и стеблей.

Для ранней выгонки наиболѣе пригодны *Кантолуны* и *сптчатая дыня*, съ бѣлымъ мясомъ; за ними слѣдуютъ сорта съ зеленымъ, желтымъ и краснымъ мясомъ.

Для разведенія на открытомъ воздухѣ, предпочитаютъ слѣдующіе сорта:

Камела изъ Гаванны. *Large musc. Москателло. Мускатная. Южно-каролинская. Сптчатая греческая. Бѣлая королевская. Бѣлая Американская. Ананасская. Афинская. Китайская апельсинная. (Тифлисская).*

Другіе виды: *Cucumis sativa. Огурцы.* Всѣмъ извѣстная овощъ, употребляемая въ пищу какъ въ сыромъ видѣ, такъ различными способами приготовленная; разводится на огородахъ и поляхъ, въ теплицахъ и парникахъ; съ цвѣтовъ его пчелы берутъ обильный взятокъ.

Огурцы, разводимые въ грунту, требуютъ свѣжеудобренной, но не иначе, какъ съ осени, рыхлой почвы и защищеннаго отъ вѣтровъ мѣста. На грядѣ огурцы высѣваются послѣ совершеннаго прекращенія морозовъ, не раньше половины Мая, причемъ семя предварительно сутки мочатъ и двое сутокъ проращиваютъ; сѣются на глубину пальца, въ нѣсколько рядовъ на грядѣ сѣмя отъ сѣмени на $\frac{1}{2}$ вершка, причемъ сѣмечко втыкается острымъ концемъ наискось въ землю. Всходы, когда они достигнутъ полувершка, нѣсколько разъ, до появления плетей, окучиваютъ; гряды тщательно полютъ и растеніе часто поливаютъ, но не у корня а вокругъ; лишнія плети обрѣзаютъ и вообще укорачиваютъ, послѣ 9 паръ листьевъ. На грядѣ въ 10 сажень длины и $1\frac{1}{2}$ арш. ширины высѣваютъ 3 лота сухихъ сѣменъ. Лучше всего, въ тѣхъ случаяхъ, когда

высѣвается не особенно большее количество огурцевъ, первоначально сажать ихъ въ маленькіе горшки или въ яичную скорлупу, по одному зернышку въ каждую, когда же растеньице хорошо укоренится, пересаживать его стуломъ на гряду.

Для увеличенія плодородія огурцевъ, совѣтуютъ отъ корня отгребая землю, присыпать къ нему куриного помета, а также втыкать у огуречныхъ плетей хворостъ, за который онѣ будутъ цѣпляться усами и виться. Также необходимо, для усиленія урожая огурцевъ, разстилать и расправлять ихъ плети, подкладывая подъ нихъ хворостъ, такъ, чтобы онѣ не перепутывались между собою, а лежали ровно во всѣ стороны. При сухой погодѣ огурцы слѣдуетъ ежедневно сильно поливать, но такъ, чтобы вода не шла къ самому корню.

На сѣмена оставляютъ вполне созрѣлыхъ нѣсколько огурцевъ, подкладывая подъ нихъ плитки, чтобы не загнивали; срываютъ; даютъ пролежать нѣсколько дней; вынимаютъ сѣмена; мочатъ въ водѣ, дней 6, промываютъ и просушиваютъ. Лучшіе для посѣва сѣмена двухгодовалыя.

Ранняя выгонка огурцевъ дѣлается различными способами. Укажемъ на нѣкоторые:

1) Въ Февралѣ или Мартѣ сажаютъ заранѣе выгнанные въ горшкахъ огурцы, въ теплые парники, по 3 по 4 ростка подъ раму; плети распредѣляютъ равномерно во всѣ стороны; парникъ часто провѣтриваютъ, особенно когда огурцы цвѣтутъ, и поливаютъ только въ ясную погоду.

2) Въ половинѣ Февраля, выращенныя уже въ горшкахъ молодыя растеньица, сажаютъ въ теплый парникъ, какъ выше значится, зарывая ихъ до листочковъ, въ смѣсь изъ навоза и лиственной земли. Въ парникѣ, посредствомъ обкладыванія его горячимъ навозомъ и покрыванія, поддерживаютъ въ почвѣ до 27° тепла, а въ воздухѣ до 20° Р. Парникъ провѣтриваютъ, но, впрочемъ очень осторожно въ началѣ; холодный въ него воздухъ не допускается рогожами, которыми завѣшивается открытое пространство, образуемое поднятыми рамами. Когда на стебляхъ появится по три почки, ихъ тотчасъ сощипываютъ; плети расправляются равномерно; слабыя плети обрѣзаются, прочія укорачиваются; земля вокругъ растенія разрыхляется и окучивается. Въ первое время огурцы не поливаютъ вовсе, но потомъ поливка усиливается. Когда пока-

жуются цвѣты, ихъ искусственно оплодотворяютъ, срывая мужскіе цвѣты и разсыпая ихъ пыльники на рыльца женскихъ цвѣт-
ковъ. Молодые огурчики завертываются въ мохъ, для предо-
храненія ихъ отъ гнили и для ускоренія ихъ роста.

Огурцевъ существуетъ множество сортовъ; болѣе замѣча-
тельны:

Голландскіе, ранніе, бѣлые. Очень хорошій сортъ.

Тоже—зеленые.

Бѣлогубые, превосходные для разведенія, плодovиты и очень
вкусны.

Англійскіе длинные: бѣлые и зеленые, оба превосходные
сорта.

Большіе Испанскіе бѣлые.

Средніе, зеленые, Эрфуртскіе, очень хороши для разведенія.

Малые, виноградные, ранніе.

Муромскіе. Весьма плодovиты, маленькіе, круглые, превос-
ходны для солки.

Павловскіе и Вязниковскіе, тоже очень плодovиты.

Самые ранніе парниковые.

Китайскіе зеленые, самые длинныя, очень плодородны и
особенно выгодны для большихъ посѣвовъ.

Исполинскіе. Лучшій сортъ для ранней выгонки.

Бѣлые Арништатскіе.

Conqueror of the West.

Cutthill's blackspine очень хороши для ранней выгонки.
Raulors. Victory of Bath, превосходны для ранней выгонки.

*Бѣлые Нубійскіе. Kirkley's Hall Defiance. Kenyon's
Favourite. Semperfructiferus.*

C. Citrillus. *Арбузъ.* Однолѣтнее растеніе, зрѣлый плодъ
его употребляется въ пищу въ сыромъ видѣ, изъ него же
добывается патока; въ состояніи неполной зрѣлости употреб-
ляется въ пищу соленымъ. Разводится на открытомъ воздухѣ,
въ болѣе теплыхъ мѣстностяхъ, гдѣ стоятъ продолжительные
жары, а для ранней выгонки, употребляются парники.

На открытомъ воздухѣ высѣвается на самой тучной землѣ,
на мѣстности, обращенной къ солнцу. Сѣмена, пролежавшія
уже нѣсколько лѣтъ, сажаютъ прямо въ грунтъ, затѣмъ весь
за арбузами уходъ заключается въ опалываніи растенія и въ
поливкѣ его.

При разведеніи въ парникѣ, обрѣзкѣ не подвергается; сажаютъ вынутыя изъ горшка растенія стуломъ, причѣмъ выбираютъ саженцы, уже сдѣлавшіе два или три листика. Когда плети дадутъ сильный ростъ, ихъ расправляютъ и прищипливаютъ къ землѣ маленькими крючками, а выведя плети изъ парника, даютъ имъ свободно распространяться; снимаютъ на день парниковыя рамы, а на ночь накладываютъ ихъ вновь, для предохраненія отъ холодныхъ росъ. Зрѣлость плода узнается по треску кожи, при сдавливаніи его.

Лучшіе сорта арбузовъ для разведенія въ парникахъ:

Scarvis amarilles, съ разноцвѣтною коркою.

Сарептскій—темно-зеленый.

Long Island—длинный съ зеленою коркою.

Никарагуа—разноцвѣтный.

Виргинскій—длинный, желтый.

Китайскій—съ зеленою гладкою коркою.

Кубскій—съ черною коркою.

Cucurbita pepo. *Тыква*. Семейство **Cucurbititaceæ** однолѣтнее, цвѣтное, лазящее посредствомъ усомъ растеніе. Одни виды тыквы разводятся какъ декоративное растеніе въ садахъ преимущественно для закрытія заборовъ, изгородей и бесѣдокъ,—другіе виды какъ овощи на поляхъ и огородахъ.

А. *Декоративныя* или *фигурныя тыквы*, высѣваются въ Мартѣ въ парники или въ горшки, въ оранжереѣ и высаживаются въ грунтъ, когда подростутъ.

Изъ фигурныхъ тыквъ болѣе замѣчательны:

C. aurantiaca—*Оранжевая тыква*.

C. maxima—*Пудовая*.

C. ovifera—*яичная*.

C. pyriformis—*грушеобразная*.

C. turbaniformis—*Чалмовидная*.

Б. Тыквы, употребляемыя какъ овощъ, высѣваются въ концѣ Апрѣля прямо на мѣсто, либо въ Мартѣ въ горшки и высаживаются стуломъ на мѣсто. Въ сухое время требуютъ сильной поливки; подъ дозрѣвающія тыквы подкладываются плоскіе камни; для полученія крупныхъ тыквъ, во-первыхъ сажаютъ ихъ въ тучную землю или на компостную кучу, въ половинѣ Мая, затѣмъ берутъ шерстяную тряпку, однимъ концомъ вкапываютъ ее къ корнямъ тыквы, а другой опускаютъ въ гор-

шокъ съ водою, которую часто въ него подливаютъ,—вода будетъ переходить постоянно по тряпкѣ, изъ горшка къ корнямъ растенія; притомъ же на одномъ корнѣ, не слѣдуетъ оставлять болѣе двухъ тыквѣ.

Лучшіе виды: **Melopepo**—*Пудовая*. Имѣетъ различныя разновидности.

C. Ceracotreus. *Растительный мозгъ*.

C. Vegetable Marrou. Вкусомъ похожа на цвѣтную капусту. Употребляется въ пищу, когда достигнетъ зрѣлости огурца.

C. pepo citriformis. *Ханки*.

C. reticulata.

593. Cummingia trimaculata. Луковичное растеніе, прозябаетъ въ грунтѣ какъ Нарциссъ, но на зиму покрывается ящикомъ опрокинутымъ и заваленнымъ навозомъ. Лѣтомъ, когда распустятся его превосходные синіе цвѣты, ихъ затѣняютъ отъ палящихъ лучей солнца.

594. Cuphea miniata. Изъ семейства **Lytharicae**. Однолѣтнее, грунтовое растеніе, образующее кустъ до фута вышины; покрыто упругими волосками; цвѣты киноварно-красные. Сѣется въ Мартѣ, въ теплицѣ, въ началѣ Іюня высаживается на солнечныя гряды; также размножается черенками; цвѣтетъ все лѣто; требуетъ рыхлой, питательной почвы; можетъ разводиться и въ комнатѣ.

Другіе виды: **C. lanceolata**. Выше фута. Цвѣты пурпуровые, болѣе или менѣ темные; сѣется въ Апрѣлѣ въ парникѣ; на землю не прихотливо.

C. silenoides. Съ черно-пурпуровыми цвѣтами.

C. purpurea hibrida. Цвѣты различныхъ, красныхъ оттенковъ.

C. purpurea rosea. Съ розово-красными цвѣтами.

C. procumbens. Съ свѣтло-красными цвѣтами.

C. platiceutra. Съ ярко-красными цвѣтами, къ концамъ фіолетовыми съ бѣлымъ. Лѣтомъ высаживается въ грунтъ, гдѣ превосходно разрастается.

C. limarani. Съ боковыми темно-пурпуровыми цвѣтами, у верхнихъ лепестковъ края нѣсколько свѣтлѣе. Грунтовое растеніе, любитъ легкую землю.

C. ignea. Маленькій, многолѣтній полукустарникъ, съ яркими, суриковаго цвѣта, трубчатыми цвѣтами. Его содержатъ и какъ однолѣтнее, высѣвая въ началѣ Марта въ оранжереѣ или парникѣ и разсаживая потомъ въ маленькіе горшки.

C. Doonkelari. C. viscosissima.

Оранжерейные виды: *C. floribunia*.

C. strigulosa. Съ цвѣтами оранжевыми съ желтымъ или зеленоватымъ оттѣнкомъ. На лѣто ставится въ грунтъ съ горшкомъ или высаживается въ грунтъ; передъ заморозками вынимается и вносится въ оранжерею, гдѣ весьма умѣренно поливается. Зимой теряетъ листь, но стебель очень хорошо сохраняется. Чтобы держать въ горшкѣ пересаживаютъ въ Апрѣлѣ и когда станетъ давать молодые побѣги, ихъ прищипываютъ.

C. eminens. Съ желтыми цвѣтами.

C. cordata. Пунцовые цвѣтки, имѣющіе видъ бабочки, съ поднятыми крылышками.

C. cinnabarina. Съ малиновыми цвѣтами такой же формы.

C. verticillata. Такой же формы цвѣтки, розовые съ малиновымъ.

595. Cupressus. Кипарисъ. Изъ семейства *Cupressineæ*. Оранжерейное, вѣчно зеленое, хвойное дерево. Растетъ пирамидально. Зимой мало поливается, но отнюдь не засушивается. Можетъ существовать и въ комнатѣ, будучи поставлено на южную сторону, поближе къ свѣту. Размножается сѣменами, черенками, на которые употребляются боковые побѣги и отводками. Требуется вересковую землю съ примѣсью одной части лиственной и одной дерновой.

Виды: *C. tortulosa*. Пирамидальное, сильно развѣтвленное дерево, со свѣшенными боковыми ваями.

C. uhdeana. Широкорастущее, пирамидальное дерево.

C. funebris. Гималайскій кипарисъ. Небольшое дерево. употребляемое въ Китаѣ для украшенія кладбищъ.

C. fastigiata. Обыкновенный кипарисъ. Имѣетъ лекарственные свойства.

C. horisontalis. C. macrocarpa. C. Knightii. C. glauca. Очень красивое дерево съ довольно широкою кроною.

C. Lawsonii. Быстро растущее деревцо съ изящно-свѣсившимися вѣтвями.

C. L. foliis variegatis. Имѣть зеленыя вѣтви перемѣшанныя съ желтымъ.

C. dysticha. *Виргинскій кипарисъ.* Въ болѣ теплыхъ мѣстностяхъ можетъ расти на открытомъ воздухѣ, но на зиму хорошо укрывается; любитъ рыхлую, влажную почву.

C. Thyoides. *К. бѣлый.* Черенки его сажаются въ свѣжую, сыроватую почву.

C. Sempervirens. *К. вѣчно-зеленый.* Обыкновенный, всѣмъ извѣстный видъ.

C. Benthami. Красивое, пирамидальное дерево, съ яркими, свѣтло-зелеными листьями.

C. cashmeriana. Красивое, пирамидальное дерево, съ яркими сѣро-зелеными листьями, очень мелкими, съ нѣскольکو повислыми боковыми вѣтвями.

C. Goweniana. Весьма красивое, пирамидальное дерево, съ яркими свѣтло-зелеными листьями.

C. Lindleyi. Одно изъ красивѣйшихъ густо-растущихъ, пирамидальныхъ деревьевъ.

C. Turnefortii. *C. pyramidalis.*

596. *Curcas purgans.* Тропическое растеніе; содержится въ теплицѣ; сѣмена его имѣютъ лекарственное свойство, а въ большихъ приѣмахъ ядовиты.

597. *Curculigo.* Оранжевое растеніе. Цвѣтетъ очень рано желтыми цвѣтами. Зимой теряетъ свои очень изящно сморщенные листочки. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается отростками отъ корня. Требуется листовенную землю пополамъ съ дерновою съ примѣсью $\frac{1}{4}$ части песку.

Виды: *C. Sumatrana.* *C. plicata.* *C. latifolia.* *C. recurvata.*

598. *Curcuma aromatica.* Изъ семейства *Zingiberaceae.* Оранжевое растеніе.

Другіе виды: *C. albiflora.* Тепличное многолѣтнее растеніе, съ бѣлыми цвѣтами, испещренными желтыми жилками на нижнемъ сегментѣ.

C. leucorrhiza. Корневища даютъ муку, употребляемую туземцами въ пищу.

C. viridiflora. Идетъ на краску.

C. cordata. Тепличное растеніе съ желто-красными цвѣ-

тами—столбомъ. Послѣ того какъ растеніе отцвѣтетъ, постепенно прекращаютъ его поливку и вносятъ въ оранжерею, а потомъ кладутъ въ чистый песокъ и держатъ въ темномъ мѣстѣ, въ теплицѣ, съ достаточнымъ доступомъ воздуха, причемъ избѣгаютъ излишней сухости, умерщвляющей растеніе. Весною будучи пересажено въ листовую землю, размножается отдѣленіемъ молодыхъ туберкулъ, ежегодно вновь развивающихся.

599. *Cuscuta.* Повитель. Изъ семейства *Cuscutaceae*. Дикорастущая, безлистная, вьющаяся травка.

600. *Synanthium.* Можетъ быть красивѣйшее изъ тепличныхъ листовыхъ растений. Листья его представляютъ удивительно изящный рисунокъ, какъ-бы розово-коричневого кружева, наложеннаго на зеленоватую подкладку,—особенно хороши молодые листья. Требуется легкой дерновой, не очень питательной земли съ примѣсью хорошо перепрѣвшаго перегноя. Во время развитія нужна ему повторенная пересадка и поливка слабымъ растворомъ жидкаго удобрения. Растеніе это вырывается съ горшкомъ въ дубильное корье и лѣтомъ часто опрыскивается, хорошо провѣтривается и притѣняется.

Виды: *C. magnificum*.

C. speciosum, съ бѣлыми цвѣтами.

601. *Cyathea.* Древовидный папоротникъ, тепличное растеніе, могущее рости и въ комнатѣ; съ длинными до 4-хъ аршинъ листьями, расположенными большимъ букетомъ; размножается отростками; требуетъ торфяную землю съ примѣсью половины листовой и восьмой части песка.

Виды: *C. dealbata*. *C. elegans*. *C. arborea*. Оранжерейные виды: *C. medullaris*. *C. Beyrichii*.

602. *Succas.* Тепличное и вмѣстѣ комнатное растеніе, съ круглымъ, невысокимъ стволомъ и жесткими листьями: размножается сѣменами и отростками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и листовой.

Виды: *C. Rumphii*. *C. Circinalis*. *C. revoluta*. Оранжерейное растеніе.

803. Cyclamen. *Цикламенъ. Дріаква. Альпійская фіалка.* Изъ семейства *Primulaceae*. Оранжевое и вмѣстѣ комнатное, многолѣтнее растеніе, съ клубневидными корнями и душистыми розово-бѣлыми или красными цвѣтами. Цвѣтеть по нѣскольку разъ въ годъ, даже глубокою осенью и зимой. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей вересковой, лиственной и старой глинистой не просѣянной, а положенной комками. При посадкѣ, на дно горшка кладется толстый слой черенковъ. Размножается раздѣленіемъ клубней, причемъ порѣзы, если таковыя произойдутъ, засыпаются угольнымъ порошкомъ; также выводится посѣвомъ сѣменъ въ вересковую землю, причемъ цвѣтутъ черезъ 2—3 года. Дріаква лѣтомъ содержится сухо, на воздухѣ въ тѣнистомъ мѣстѣ, вообще поливается весьма умеренно во время покоя и сильнѣе при ростѣ; въ комнатѣ поливка производится на поддонъ. Дріакву можно имѣть въ цвѣту всю зиму, для этого растеніе, образовавшее цвѣточные почки, осенью держать въ холодномъ мѣстѣ.

Болѣ замѣчательные виды:

C. europaeum. *Дряква.* Съ бѣлыми или красными, душистыми цвѣтами; при посадкѣ всѣ корневые пиццы должны быть покрыты землею; растетъ у насъ въ дикомъ состояніи.

C. africanum. Цвѣты малиновые съ розовымъ.

C. persicum. *Ц. Алепскій.* Съ бѣлыми, розовыми или красными, ароматическими цвѣтами; цвѣтеть всю зиму, начиная съ Декабря, если подольше продержать, съ почками, въ холодномъ мѣстѣ.

C. p. Haageanum. Съ большими цвѣтами.

C. coum. Съ маленькими, душистыми ярко-пурпуровыми цвѣтами, листья сидятъ на красныхъ стебелькахъ.

C. coum Atkinsialbum и **C. roseum.** Пышныя разновидности предыдущаго вида.

C. vernalum. Цвѣтеть зимою.

C. hederepholium. Съ бѣлыми или розовыми цвѣтами, безъ запаха; цвѣтеть позднюю осенью, до Декабря.

C. Neapolitanum. Съ пурпуровыми цвѣтами, распускается раннюю весною.

C. repandum. Съ крупными темно-красными цвѣтами, безъ запаха; цвѣтеть въ Февралѣ.

C. macrophyllum. Съ прекрасными листьями; цвѣты безъ запаха.

604. *Cyclanthera pedata*. Однолѣтнее вьющееся грунтовое растеніе, высѣвается въ Мартѣ въ парникъ и пересаживается въ грунтъ, когда подростетъ. Требуется теплаго климата; растетъ весьма быстро; имѣетъ весьма красивую, ярко-зеленую, густую листву.

Другой видъ. *C. exfoliata*. Тоже съ некрасивыми зеленноватыми цвѣтами.

605. *Cyclobothra alba*. Изъ семейства *Liliaceae*. Оранжевое луковичное растеніе, цвѣты въ видѣ пониклыхъ колокольчиковъ, полосками, внутри бѣлые. Зимой требуетъ освѣщеннаго мѣста. Раннею весною приставляется въ теплицы, чтобы скорѣе пошло въ ростъ. Когда зацвѣтетъ вносится въ оранжерею. Въ Февралѣ пересаживается и размножается отдѣленіемъ луковокъ.

606. *Cydonia. Pyris japonica*. *Пилва. Айва Японская. Квинт.* Изъ семейства *Romaseae*. Дерево, разводимое въ садахъ; съ большими и весьма ранними, красными или розовыми цвѣтами даетъ превосходный фруктъ, имѣющій форму яблока и свой совершенно особый аромат; на зиму требуетъ надежной покрышки. Дерево это ради его прекрасныхъ цвѣтовъ, подвергають ранней выгонкѣ. Для этого Айву держатъ въ грунтовомъ сараѣ, пересаживаютъ въ горшки и ставятъ въ холодную оранжерею, гдѣ она разцвѣтаетъ, при умѣренной теплотѣ. По окончаніи выгонки растеніе слегка срѣзывается.

Виды: *C. umbilicata*, съ ярко-красными цвѣтами.

C. communis. *Пилва обкновенная*. Большой кустарникъ; плодъ имѣетъ видъ груши, желтоватый, душистый, вязущаго вкуса; размножается черенками, отводками, прививкою, отпрысками, а иногда и сѣменами.

C. japonica fl. albo. *Пилва Японская* съ бутылковидными плодами и изящными красными цвѣтами.

C. j. fl. carneo. l. f. fl. rubro. l. j. f. pleno.

C. Mallardi.

C. angustifolia. C. vulgaris. *Бедна Цареградская*.

C. sinensis. *Пилва Китайская*.

607. Cymbidium. Тепличная орхидея, может содержаться и въ комнатѣ; съ пирамидальнымъ, большимъ душистымъ цвѣткомъ—желтымъ съ коричневымъ или зеленоватымъ съ краснымъ. Размножается дѣленіемъ корней; сажается прямо въ землю, впрочемъ требуетъ той же культуры, что и прочія орхидеи; въ комнатѣ становится на юговостокъ.

Виды: *C. atropurpureum*. *C. ensifolium*. *C. Gibsoni*.
C. Chinensis. *C. aloifolium*. *C. bicolor*.

608. Cymbopogon Schoenanthus. Листья пахнутъ лимономъ. Принадлежитъ къ числу тропическихъ злаковъ. Корень употребляется, въ Индіи, противъ холеры.

609. Cynachum acutum. *Отрава.* Изъ семейства *Asclepideae*. Дикорастущее.

Другіе виды: *C. volubile*. Долголѣтнее, грунтовое, садовое растеніе.

C. fuscatum. *Лускачъ темноватый.*

C. vincetoxicum. *Л. противуядный.* Бѣлые цвѣты въ видѣ раскрытаго зонтика.

610. Cynara. Cardunculus. *Испанскіе кордоны. Карды.* Многолѣтнее растеніе. Нѣкоторые виды съ колючками; любятъ хорошо удобренную почву и солнечное мѣсто; размножается сѣменами, которые мочутъ одинъ день, и сѣютъ въ Мартѣ, въ парникъ. Разсаду, когда образуются 4 листочка, высаживаютъ на гряды. Въ Сентябрѣ растеніе бѣлуетъ; для этого туго связываютъ листья, обвязываютъ соломой и какъ можно только выше окучиваютъ землею, такъ, чтобы только верхушка была свободна. Послѣ двухъ-трехъ, недѣльнаго бѣленія, мясистыя ребра листьевъ употребляютъ въ пищу. Съ наступленіемъ морозовъ растеніе выкапываютъ изъ грунта и вносятъ въ подвалъ гдѣ и зарываютъ въ землю. Употребляются въ пищу мясистыя ребра листьевъ; растенія, у которыхъ появляется цвѣточные стебли, надлежитъ тотчасъ выбѣливать.

Виды: *C. pursis*. Ранній, безъ колючекъ. *Турскій кордонъ*—лучшій сортъ.

611. Cynoglossum glochidiatum. (*C. Coelestinum*). Изъ семейства *Asperifolieae*. Очень красивое, однолѣтнее, грунтовое,

бордюрное растеніе, покрытое жесткими волосками; даетъ лазуревые цвѣты. Высѣвается въ парникъ, въ Августѣ.

Другіе виды: *C. officinale*. *Живокость*. Дикорастущее, цвѣты темно-красные.

C. omphaloides. *Чернокорень пушковатый*. Многолѣтнее растеніе, на лѣто высаживается въ грунтъ, а зиму сохраняется въ оранжереѣ или подвалѣ.

C. arrenianum. Многолѣтнее, грунтовое растеніе.

C. Cheirifolium. Тоже, съ темно-красными цвѣтами; высѣвается прямо въ грунтъ и зимуетъ безъ покрывки.

C. grandiflorum. Тоже съ бѣлыми или синими цвѣтами; зимою содержится въ подвалѣ или оранжереѣ, а на весну опять высаживается въ грунтъ.

612. *Cypella herberti*. Изъ семейства *Iridaceae*. Оранжевое растеніе, съ весьма оригинальными и красивыми, оранжево-желтыми цвѣтами, распускающимися въ Августѣ. Поливается только во время роста; въ горшкѣ долженъ быть устроенъ хорошій дренажъ, а то бульбы растенія гниютъ; при томъ бульбы эти надлежитъ всегда держать въ землѣ. Легко размножается дѣленіемъ и сѣменами.

613. *Cyperus alternifolius*. *Сыть*. Семейство *Cyperaceae*. Это глубоко пускающее корни и глубоко сидящее въ водѣ болотное растеніе, весьма красиво, легко разводится, постоянно зелено, наиболѣе пригодно для комнатнаго акварія. Растетъ всегда успѣшно, касаются ли воды одни только его корни или все растеніе находится подъ водою. По этой причинѣ Циперусъ можно разводить въ горшкахъ и ставить на произвольную глубину, для украшенія подводныхъ или надводныхъ каменныхъ группъ, а равно его можно сажать на дно акварія. Размножается дѣленіемъ корней. Серебристыя полосы и бѣлые стебли растенія, легко перерождаются и дѣлаются зелеными; въ отвращеніе этого надлежитъ отрѣзывать зеленые стебли, тотчасъ по ихъ появленіи.

Другіе виды: *C. a. fol. variegatis*. Листья покрыты серебристыми коймами и полосами. Особенно хорошо для акварія.

C. flabelliformis. Не такъ изященъ какъ предыдущій, но служитъ для украшенія акваріумовъ.

C. a. textillis. Стебли его употребляются на приготовление бумаги.

C. papyrus. Всю весну и лѣто очень сильно поливается, даже на все это время ставится на поддонъ съ водою. Древнѣе это растение служило вмѣсто бумаги.

C. Syriacus. Требуется торфяной земли, какъ и предыдущій видъ, пополамъ съ листовенною и небольшою частію песку.

C. esculentus. *Земляной миндаль.*

Cyperus. *Сыть.* Два послѣдніе вида — дикорастущая трава. Сладкіе стебли Сыти употребляются въ пищу простымъ народомъ сѣверныхъ мѣстностей, какъ лакомство.

614. Cyripedium. Сапожки. Красивая тепличная Орхидея, можетъ расти и въ комнатѣ, цвѣты желтые, зеленоватые съ розовымъ, лиловымъ или коричневымъ, формою похожи на башмакъ, отчего и получили названіе. (*Cypris* — Венера и *pedion* — башмачекъ). Размножается отростками и раздѣленіемъ бульбъ. Сажается прямо въ землю, впрочемъ требуетъ той же культуры, что и другія земныя Орхидеи.

Виды: **C. insigne.** Любитъ смѣсь глины, торфа, песку и черепковъ.

C. Javanicum. Листья испещрены темными пятнами; цвѣты зеленые, съ бѣлымъ или розовымъ.

C. venustum. Можетъ содержаться въ оранжереѣ. Листья его сверху темно-зеленые — снизу пурпуровые.

C. irapeanum. Съ желтыми цвѣтами; на нижней губѣ два ярко-красныя пятна.

C. spectabile. Розоватые цвѣты, съ розово-бѣлою полосою на нижней губѣ.

C. humile. Цвѣтокъ зеленовато-коричневый; нижняя губа розовая.

C. purpuratum. Листья пестрые; цвѣтокъ большой, весьма красивый; верхняя часть полосатая — бѣлая съ темно-фіолетовымъ, остальные части темно-фіолетовыя въ тѣнь, съ желтыми краями и полосами.

C. pubescens. *Пушистая зозулка.* Цвѣтокъ коричневый, нижняя губа желтая. Сажаютъ въ полутѣнистомъ мѣстѣ на градѣ, составленной изъ двухъ частей лѣснаго чернозема или

рыхлой, торфяной земли и одной части глинисто-дерновой земли.

C. Calceolus. Баиманк, Адамова голова. Многолѣтнее, грунтовое, растеніе.

C. barbatum grandiflorum. Можетъ содержаться и въ оранжереѣ, требуетъ самой умеренной поливки.

C. guttatum. Черная трава. Кукушкины слезки. Дикорастущее, многолѣтнее растеніе; цвѣты малиновые съ бѣлымъ, разводится и въ садахъ.

C. Lowii. Цвѣтокъ съ длинными лепестками, покрытыми пурпуровыми пятнами, съ зеленовато-пурпуровою губою. Дикорастущіе экземпляры имѣютъ до 10 цвѣтковъ на одной ножкѣ.

C. villosum. Съ большими буро-желтыми цвѣтами.

C. faireanum. Цвѣтокъ бѣтый, съ зеленоватымъ отливомъ, описанный темно-пурпуровыми полосами.

C. barbatum. Темно-пурпуровые цвѣты, съ бѣлыми полосками.

C. Roezli. Венеринъ баимачекъ Рецля. Розовый цвѣтокъ, съ желтоватою нижнею губою.

C. macranthum. Красные баимачки. Дикорастущее, съ пурпуровыми цвѣтами.

C. candidum. Цвѣтокъ оранжевый, испещренный, нижняя губа бѣлая.

C. macranthon. Цвѣты малиновые, испещренные темными черточками.

C. Hoockerae. Съ пестрыми листьями. Цвѣтокъ зеленоватый съ фіолетовымъ, нижняя губа зеленоватая съ темно-фіолетовымъ.

C. caudatum. Длиннохвостые сапожки. Венеринъ баимачекъ. Цвѣтокъ имѣетъ видъ туфли и длинные хвосты, буровато-красные съ желтоватымъ отливомъ. Воспитывается въ обыкновенныхъ горшкахъ, въ смѣси изъ рыхлой, глинисто-дерновой земли съ прибавкою рубленнаго мха и вересковой или болотной земли. Зимой требуетъ температуры отъ 10 до 15° Р. и малой поливки. Весною возвышается температура, усиливается поливка и провѣтриваніе.

C. Ashburtoniae. Тепличное растеніе съ темно-зелеными листьями и черными по нимъ крапинками. Зеленоватые цвѣты

съ пурпуровыми жилками и свѣтло-пурпуровою нижнею губою, у которой, около ноготка, имѣется желтое пятно, съ пурпуровыми крапинками.

C. niveum. Тепличная Орхидея безъ стебля; листья съ бѣлыми пятнами; цвѣты какъ бы восковые — бѣлые, съ красными крапинами.

615. *Cyrthanthera chrysostephana*. Тепличное растеніе, съ золотисто-желтыми цвѣтами.

Другой видъ: *C. Ghiesbreghtiana*. Съ малиновыми цвѣтами. Можетъ содержаться въ оранжереѣ. Любитъ тучную землю. Во все время роста содержится, по возможности, въ сыромъ мѣстѣ и часто опрыскивается для спасенія отъ атакующихъ его насѣкомыхъ. Верхушка прищипывается, чтобы растеніе кустилось, а не тянулось и цвѣло сильнѣе. Требуется частой пересадки. Быстро размножается черенками, на которыхъ рѣжутъ вѣточки на сочлененіяхъ.

616. *Cyrthanthus obliquus*. Оранжерейное, луковичное растеніе, изъ семейства Амариллисовъ, на высокомъ стержнѣ котораго развиваются желтые цвѣты, въ видѣ длинныхъ, большихъ, повислыхъ вокругъ стебля колокольчиковъ, имѣющихъ прекрасный запахъ. Землю требуетъ тучную, но легкую.

Другой видъ: *C. sanguineus*. Съ огненно-красными цвѣтами.

617. *Cyrtochilium leucochilum*. Тепличная Орхидея, съ пестрыми, ярко-розовыми цвѣтами. Сажается въ скорлупу кокосоваго орѣха.

618. *Cyrtodeira chontalensis*. Тепличное растеніе изъ семейства Геснерій. Цвѣты бѣлые. Коричневый, прекрасный листъ, съ свѣтло-зеленою полосой, по срединѣ.

619. *Cystidanthus campanulatus*. Тепличное растеніе, изъ семейства *Asclepideae*, съ большимъ букетомъ желтыхъ цвѣтовъ, похожими на цвѣтокъ *Ноуа* и требуетъ одной культуры съ этимъ растеніемъ.

620. *Cytisus*. *Ракитникъ*. Изъ семейства *Papilionaceae*. Кустъ, разводимый въ садахъ и паркахъ. Стѣдующіе, рано цвѣтущіе его виды подвергаются ранней выгонкѣ.

C. elongatus. Съ множествомъ, золотисто-желтыхъ цвѣтовъ.

C. sessilifolius. *Ракитникъ садовый*. Съ гладкими листьями.

C. Laburnum. *Цитизъ. Красная акація*. Съ золотисто-желтыми цвѣтами.

C. alpinus. Съ такими же цвѣтами; размножается сѣменами, отводками и черенками. Требуется, какъ и предыдущій видъ надежной покрывки, на зиму.

Что касается до высокорастущихъ сортовъ, то таковые годятся для ранней выгонки, только будучи привиты къ штамбамъ вышеназванныхъ.

Къ ранней выгонкѣ растение готовится пересадкою его въ горшокъ, раннею весною, причемъ оно закапывается въ землю, по самыя края горшка и когда наступятъ заморозки, вносится въ оранжерею, исключая *C. purpurens*, который прямо ставится въ теплицу и постепенно приучается къ теплу, до самаго разцвѣта.

C. capitatus. *P. Головачатый*.

C. folcatus. *P. Серпообразный*.

C. hirsutus. *P. Кудрявый*.

C. nigricans. *P. Черноватый*.

C. supinus. *P. Низкій*.

C. Alschingieri. Низкорослый кустъ.

C. purpurens. *P. Красноцвѣтный*.

C. p. atropurpureus.

C. incarnatus major. Съ бланжевыми цвѣтами.

C. i. minor. *C. Weldeni*. *C. austriacus*. *P. Луговой*.

C. biflorus. *Чилиа*.

C. leucanthus. *C. tomentosus*. *C. uralensis*.

C. Adami pendulus. Дерево, растущее въ садахъ южной Европы.

C. ramosissimus. *C. chrysobotrys*.

C. racemosus. Многочисленные, желтые цвѣты распускаются обыкновенно въ Маѣ или Апрѣлѣ, но если это растение поставить въ теплое мѣсто, то оно разцвѣтетъ въ Мартѣ.

621. *Dacrydium*. Красивое, хвойное, австралійское дерево, съ опущенными вѣтвями и мягкими, игольчатыми листьями. Можетъ расти и въ комнатѣ. Зимой поливается весьма умеренно; размножается сѣменами и посадкою срѣзанной верхушки, какъ

черенка, которая, впрочемъ, обыкновенно очень долго не принимается. Требуется вересковую землю съ примѣсью $\frac{1}{4}$ части дерновой и $\frac{1}{4}$ части лиственной. Изъ ствола растенія сочится смола въ видѣ капель слезъ, отчего и получило названіе (*dacry* — слеза).

Виды: *D. cupressinum*. Изъ Новой Голландіи. Очень изящное, высокое дерево, съ небольшими, темно-зелеными листьями, принимающими на солнцѣ, коричневой цвѣтъ.

D. elatum. Не высокое, но весьма красивое дерево, съ мягкими, шилообразными листьями.

D. Franklinii. Имѣетъ пирамидальный ростъ, съ висячими вѣтвями и ярко-зелеными листьями.

622. *Dactylis glomerata*. *Ежа*. Дикорастущее. Головка цвѣтка раздѣлена въ видѣ пальцевъ, отчего и получило свое названіе. (*dactylos* — палецъ).

Другой видъ. *D. glomerata fol. variegatis*. Трава съ листьями, испещренными бѣлыми полосами.

623. *Daemonorhops*. Родъ Пальмъ. Лазящій стволъ покрытъ иглами. Весьма нарядное растеніе съ темно-зелеными листьями.

624. *Dahlia*. *Георгина*. Изъ семейства *Synanthereae*. Названа въ честь шведскаго ботаника *A. Dahl*. Въ послѣднее время наиболѣе сдѣлавшееся распространеннымъ корневое, травянистое, многолѣтнее растеніе, съ цвѣтами все возможныхъ колеровъ и ихъ оттѣнковъ (кромѣ сянго и чернаго), также пестрыми и полосатыми; простыми или махровыми.

Георгины по росту, достигающему 4-хъ аршинъ, отъ $\frac{3}{4}$ -ей аршина, раздѣляются на: *высокорослыя*, *низкорослыя* и *карликовыя* или *малопушныя*.

Растеніе это размножается посѣвомъ сѣменъ, черенками и дѣленіемъ клубней. Семена высѣваются въ началѣ Марта въ парникъ или въ плошки въ теплицѣ; когда растеніе взойдетъ, его рассаживаютъ въ небольшіе горшечки и держатъ подъ рамами, доколѣ не вырастутъ на поларшина, тогда ихъ пересаживаютъ въ грунтъ. Рано выведенныя сѣменные растенія цвѣтутъ въ годъ посѣва. Только отъ посѣва получаютъ новыя разновидности георгинъ.

Черенками георгины разводятся очень просто: при рассадѣ

ихъ весною, всѣ отломившіеся молодые побѣги, а также нарочно отрѣзанные побѣги и ихъ части, равно части вѣтвей растенія, сажаютъ въ парникъ, притѣняютъ, и когда укоренятся, пересаживаютъ въ горшки, гдѣ даютъ имъ пойти въ ростъ и затѣмъ, когда они достигнутъ полуаршина или болѣе, пересаживаютъ въ грунтъ.

Дѣленіемъ клубней занимаются весною, при посадкѣ растений въ горшки. Для этого въ Февралѣ или началѣ Марта, берутъ корни георгинъ, очищаютъ ихъ, отдѣляя острымъ ножомъ всѣ загнившія части, и раздѣляютъ корень на столько частей, сколько корень далъ побѣговъ, наблюдая, чтобы каждый отдѣляемый побѣгъ, имѣлъ самостоятельный и надежный корень. Раздѣленные растенія сажаютъ въ листовенную землю, съ примѣсью части дерновой и части песку и поливаютъ; когда, черезъ нѣсколько дней, корень пойдетъ въ ростъ, то его, въ случаѣ если онъ опять далъ много побѣговъ, вновь вынимаютъ изъ горшка, стуломъ, стряхиваютъ землю и раздѣляютъ клубень вновь, по числу побѣговъ съ корнями, сажая ихъ въ отдѣльные горшки. Наконецъ при раздѣленіи корней и рассадкѣ оныхъ, останется много корней вовсе безъ побѣговъ; корни эти не выбрасываютъ, но сажаютъ въ ящикъ съ такою же землею. плотно другъ къ другу, поливаютъ и ставятъ или въ теплицѣ, къ стекламъ, или въ парникъ. Многіе изъ этихъ корней пойдутъ въ ростъ и дадутъ побѣги, тогда ихъ осторожно вынимаютъ изъ ящика и сажаютъ въ горшки, въ которыхъ и даютъ имъ расти, до пересадки въ грунтъ.

Когда, посаженные въ горшки георгинны пошли въ ростъ, имъ надлежитъ давать какъ можно больше свѣту, освѣжать ихъ притокомъ чистаго воздуха и держать въ умѣренной теплотѣ, чтобы онѣ не вытянулись. Самое лучшее устройство для нихъ канаву, въ видѣ парника, причемъ приладить рамы такъ, чтобы ихъ, по мѣрѣ выростанія георгинъ, можно былоподымать выше, посредствомъ накладки на стѣнки парника толстыхъ досокъ. Когда совершенно прекратятся морозные утренники, а именно не раньше послѣднихъ чиселъ Мая, георгинны высаживаются въ грунтъ; но кто хочетъ имѣть ихъ въ цвѣту раньше, тотъ, высадивъ ихъ въ грунтъ въ началѣ Мая, долженъ запастись плетенками изъ соломы, въ видѣ конуса или сахарной головы, и этими плетенками покрывать георгинны на ночь и въ холодъ

ное время. При посадкѣ въ грунтъ георгина привязывается, къ предварительному вбитому въ землю надежному колу.

Посадивъ георгину, вокругъ ней дѣлается лунка, которая наполняется солоmistымъ навозомъ, но такъ, чтобы онъ не касался ствола растенія; покрывка эта поддерживаетъ въ почвѣ необходимую для георгины влагу.

Георгина требуетъ сильной поливки, а именно: каждое утро она сильно поливается подъ корень, а вечеромъ опрыскивается изъ насоса или лейкой, черезъ ситку. Нѣсколько разъ въ дѣто георгина поливается навозною жижею, разбавленную водою. Георгины весьма чувствительны и погибаютъ при первомъ морозѣ; а потому, чтобы возможно долѣе пользоваться ихъ цвѣтами, когда уже можно ожидать морозовъ, ихъ покрываютъ на ночь, вышеупомянутыми соломенными колпаками; но это искусственное поддержаніе цвѣтка долго продолжаться не можетъ — морозы возьмутъ свое. Когда георгина уже убита морозомъ, срѣзаютъ ее стебель, у самаго корня, выкапываютъ корень и переносятъ въ помѣщеніе гдѣ бы земля у корней обсохла и обвалилась. Послѣ этого корни георгины кладутъ въ сухое мѣсто, въ погребѣ или подвалѣ, либо въ оранжерею и такимъ образомъ сохраняютъ всю зиму.

Георгина имѣетъ множество разновидностей. Въ преискурантахъ рижскихъ сѣменныхъ торговцевъ Вагнера и Шоха, также извѣстнаго московскаго садовода-любителя Кистера, приведены названія множества находящихся у нихъ въ продажѣ разновидностей георгинъ, съ подробнымъ указаніемъ разрисовки и колера цвѣтка, также размѣровъ его роста, такъ что желающій выписать георгины, можетъ по этимъ каталогамъ сдѣлать самый обстоятельный выборъ. Надо замѣтить разводящимъ георгины, что чѣмъ на меньшія части дѣлится корень георгины весною, тѣмъ онъ долѣе не вырождается.

При пересадкѣ георгины изъ горшка, для усиленія ея роста, необходимо обрѣзывать сѣтъ волоконъ, которыя образуются у стѣнокъ горшка.

625. *Dalbergia sissoo*. Индійское дерево, употребляемое на мебель.

626. *Dalechampia Roezlii rosea*. Тепличное растеніе, изъ семей-

ства **Euphorbiaceæ**, съ розовыми цвѣтами и желтою середкою. Размножается сѣменами.

- 627. Dammara.** Красивое, оранжерейное, хвойное дерево. Размножается сѣменами и черенками, которые принимаются трудно и нескоро. Можетъ выносить комнатную культуру. Требуется вересковую землю, съ примѣсью четвертой части дерновой и четвертой части лиственной.

Виды: **D. alba.** Дерево, съ широкими листьями; смола его идетъ для приготовленія лаковъ.

D. Australis. Съ широкими, коричневато-зелеными листьями; даетъ смолу, употребляемую для выдѣлки лаковъ.

D. orientalis. Съ ярко-зелеными листьями. Стволъ этого дерева достигаетъ 10 футовъ въ поперечникъ и даетъ свѣтлую смолу, которая черезъ нѣсколько дней дѣлается твердою, какъ камень и виситъ на деревѣ въ видѣ ледяныхъ сосулекъ.

D. obtusa. Съ широкими, толстыми, мясистыми листьями.

D. Brownii.

- 628. Daphne.** *Лавруша. Волче лыко. Волчьи ягоды.* Изъ семейства **Thymelacea**. Кустарникъ, растущій въ дикомъ состояніи и разводимый въ садахъ и паркахъ или содержащийся въ оранжереѣ (нѣкоторые виды и въ комнатѣ) получающій форму деревца. *Дикорастущая Лавруша* любитъ сухую и рыхлую почву и тѣнистое мѣсто, размножается посѣвомъ тотчасъ по созрѣваніи сѣменъ. Оранжерейные виды этого растенія имѣютъ душистые бѣлые или розовые цвѣты; размножается черенками; требуетъ вересковую землю съ примѣсью половинной пропорціи дерновой, четвертой части лиственной и четвертой — песку.

Виды: **D. thymelea.** *Л. Испанская.* Полукустарникъ, съ желтоватыми цвѣтами; дико растетъ въ Испаніи и Южной Франціи.

D. tartonraira. *Л. Прованская.* Растетъ на песчаныхъ, морскихъ берегахъ Прованса.

D. Alpina. *Л. Альпійская,* съ красивыми, красновато-бѣлыми душистыми цвѣтами.

D. pontica. *Л. Понтійская.*

D. laureola. *Волній Блющъ.* Весьма пригодно для разведенія въ садахъ, корни и ягоды употребляются въ лекарство.

D. Odora. *Л. Душистая*, съ розовыми, душистыми цвѣтами. Бѣится морозовъ.

D. sericea. *Л. Шелковистая*.

D. collina. *Л. Итальянская*. Маленькій кустарникъ. Бѣится морозовъ; можетъ расти въ комнатѣ.

D. salicifolia. Вѣтвистый кустарникъ, съ бѣлыми цвѣтами.

D. mezereum. *Л. обыкновенная. Волчій перецъ. Ягодки. Больше мѣло.* Лекарственный кустарникъ, дикорастущій и разводимый въ паркахъ и садахъ. Цвѣты пурпурово-красные съ запахомъ гіацинта; въ естественной жизни на югѣ распускается въ Февралѣ, а въ теплицѣ можетъ быть доведенъ до цвѣтенія къ Рождеству. Для ранней выгонки готовится или посѣвомъ сѣменъ, или пересажкою маленькихъ кустовъ изъ лѣсу въ садъ, въ тѣнистое мѣсто, гдѣ они разовьются, а потомъ пересаживаются въ парникъ. Любитъ рыхлую, листовенную землю; размножается также сѣменами. Части этого растенія имѣютъ острые свойства. Въ народной медицинѣ кора этого растенія играетъ роль, такъ какъ она будучи прикладываема къ тѣлу, натягиваетъ пузыри.

D. Delphini. Собственно оранжерейное растеніе.

D. Indica. *Л. Индейская. Волчій яодникъ*, съ бѣлыми, душистыми цвѣтами; можетъ расти и въ комнатѣ.

D. van Houttei. Можетъ расти въ комнатѣ.

D. striata, съ розовыми цвѣтами.

D. sneorum. *Л. розмаринолистная. Л. Швейцарская.* Оранжерейное растеніе, имѣетъ видъ ползучаго кустарника, въ вышину не болѣе четверти. Будучи привито къ **D. meze-
reum**, цвѣтетъ уже въ Мартѣ. Цвѣты снаружи бѣлые, внутри розовые или пурпуровые. Можетъ расти на открытомъ воздухѣ въ грунтѣ, но требуетъ надежной покрывки мхомъ.

D. Altaica. *Алтайскія ягодки.* Кустарникъ съ бѣлыми, душистыми цвѣтами и сизою зеленью. Растетъ на Алтаѣ и въ Джунгаріи. Не бѣится морозовъ, если сидитъ въ тѣни деревьевъ, въ почвѣ, состоящей изъ смѣси торфяной съ дерновою землею, причемъ, предъ наступленіемъ морозовъ, онъ обваливается у корня листомъ, а когда наступятъ морозы совсѣмъ закрывается листомъ и мхомъ. Весною покрывка снимается съ него исподволь.

D. fortunei. Оранжерейный маленькій кустарникъ. Розо-

ватые цвѣты его распускаются прежде листьевъ, которые ежегодно сбрасываетъ. Цвѣтетъ очень раннею весною; на лѣто выносятся на воздухъ и держится въ тѣни; любить дѣвственную землю съ вересковою. Размножается прививкою и черенками, на которые рѣжутъ травянистые побѣги, въ Маѣ или Юнѣ.

629. *Darlingtonia californica*. Рѣдкое растеніе съ желтыми цвѣтами, испещренными темно-красными жилками.

630. *Dasylium aerotrichum*. Изъ семейства *Asparagineae*. Растеніе, содержащееся въ умѣренной теплицѣ, съ длинными узкими листьями, ниспадающими каскадомъ съ вершины небольшого толстаго стебля. Любитъ дерновую землю въ смѣси съ листовною и съ пескомъ. Не должно обрѣзывать листьевъ, имѣющихъ зазубринки съ обѣихъ сторонъ.

631. *Datura ceratocaula*. Семейства *Solanaceae*. Однолѣтнее растеніе, достигающее сажени вышины, съ цвѣтами, снаружи свѣтло-фіолетовыми, внутри бѣлыми, душистыми, которые распускаются вечеромъ и закрываются въ 9 часовъ утра. Сѣется осенью въ горшки, въ холодной оранжереѣ; когда взойдетъ зимою, надлежитъ разсадить и постановить къ свѣту, а въ Апрѣлѣ дать болѣе теплое мѣсто. Въ тепломъ климатѣ высѣвается осенью прямо въ грунтъ.

Другіе виды: *D. Wrightii*. (*D. Meteloides*). Достигаетъ до 4 футъ; имѣетъ желтый цвѣтокъ съ бѣлыми краями и фіолетовою полоскою; высѣвается въ Мартѣ въ теплицѣ и пересаживается въ грунтъ, когда уже достигнетъ довольно значительнаго размѣра, иначе не зацвѣтетъ, требуетъ питательную землю.

D. Fastuosa. Имѣетъ цвѣтокъ лиловый, внутри бѣлый; растетъ въ тепломъ климатѣ.

D. f. alba plena. Съ большимъ, махровымъ, бѣлымъ цвѣткомъ. Требуется такого же ухода, какъ и *D. Wrightii*.

Той же культуры требуютъ и шесть слѣдующихъ видовъ: *D. f. coerulea plena*. *D. f. Huberiana plena*. *D. f. H. alba plena*. *D. inermis*. *D. metel*. *D. quercifolia*.

D. Stramonium. Дурманъ. Дикопроябляющее, ядовитое, однолѣтнее растеніе, съ бѣлыми цвѣтами. Сѣмена его употреб-

ляются какъ лекарство въ нѣкоторыхъ нервныхъ болѣзняхъ.

D. tatula. Травянистое растеніе.

D. arborea. *Древесный дурманъ.* Многолѣтнее растеніе, съ большими бѣлыми цвѣтами. Зимой содержится въ оранжереѣ, при самой умѣренной поливкѣ. Размножается черенками и посѣвомъ сѣменъ въ Мартѣ. Требуется земля, составленную изъ одной части вересковой, двухъ частей лиственной, одной части дерновой и одной части навозной. На лѣто высаживается въ грунтъ.

D. sanguinea. Тоже. Большой цвѣтокъ, внутри ярко-красный. Изъ плодовъ его готовятъ въ Перу опьяняющій напитокъ «Тонга».

D. albo flava. Тепличное растеніе.

D. humilis flava pleno. Многолѣтнее оранжерейное растеніе, съ желтыми, воронкообразными цвѣтами, иногда махровыми. Плодъ покрытъ колючками. Размножается черенками. Сажается въ грунтъ когда не ждутъ больше морозовъ.

D. atrovioleacea plena. D. ferox.

D. gigantea.

632. Daviesia. Оранжерейное растеніе, съ желтыми цвѣтами.

Виды: **D. ericoides. D. latifolia.**

D. mimosoides.

633. Daubentonia. Красивый кустарникъ, съ красными и желтыми цвѣтами; размножается сѣменами, высѣваемыми въ Февралѣ и черенками; зимой содержится довольно сухо; любитъ землю, составленную изъ вересковой, лиственной и дерновой.

Виды: **D. punica.**

D. Tripetiana. Оранжерейное растеніе.

634. Daucus carota. *Морковь.* Изъ семейства **Umbelliferae.** Двухлѣтнее, корневое и медоносное растеніе, цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ. Въ дикомъ видѣ составляетъ сорную траву пашихъ полей. Корень употребляется въ пищу въ сыромъ видѣ, вареный и какъ приправа къ различнымъ кушаньямъ.

Существуютъ два главные вида моркови: съ большимъ корнемъ и каротель. Тотъ и другой имѣютъ множество разновидностей: бѣлая, желтая, красная, фіолетовая и др. Изъ круп-

ной моркови лучшими сортами признаются: *Франкфуртская темно-красная*; *брауншвейгская длинная*, *альтрингамская белая*, *Давыдовская*. Из коротели лучшими сортами считаются: *Голландская парниковая* и *Франкфуртская*, самая мелкая, ранняя.

Морковь любитъ глубоко вспаханную песчанистую почву, открытое мѣстоположеніе; высѣвается или съ осени или самою раннею весною; сѣмя разбрасывается довольно рѣдко и прибивается, а когда взойдетъ слишкомъ густо, прореживается; земля вокругъ растенія разрыхляется и оно окучивается.

Для сѣменъ наиболѣе пригодны корни моркови съ наименьшимъ числомъ побочных отростковъ; ихъ сохраняютъ въ подвалѣ, зарывъ въ землю и въ Апрѣлѣ высаживаютъ на солнечное мѣсто. Для полученія ранней моркови сѣютъ коротель на гряды въ теплицѣ или въ парникѣ въ Февралѣ или Мартѣ, земля при этомъ должна быть какъ можно ближе къ рамамъ, а растенію давать какъ можно больше свѣжаго воздуха.

635. *Deckenia*. Родъ пальмъ. Нынѣ извѣстенъ одинъ только видъ этой пальмы:

D. nobilis, весьма красивый, съ перистыми листьями.

636. *Decaisnea insignis*. Изъ семейства *Lardizabaleae*. Оранжевое растеніе съ зеленоватыми цвѣтами — метелкою.

637. *Decumaria*. Оранжевое растеніе изъ семейства Миртовыхъ.

Виды: *D. barbara*. *D. sermentosa*. Оба въющіеся кустарники съ красивыми цвѣтами; размножается отдѣленіемъ отпрысковъ.

638. *Delphinium Ajacis*. *Риттеръ шпоры*. Изъ семейства *Ranunculaceae*. Однолѣтнее растеніе, достигающее 2 фута, съ простыми или махровыми, голубыми, фіолетовыми, блѣдно-розовыми и другими цвѣтами. Сѣется весною тотчасъ послѣ того какъ растаетъ земля, а потому мѣсто посѣва готовится съ осени; растеніе это на почву не прихотливо.

Другіе виды: *D. Consolida*. *Сокирки*. *Рогатые васильки*. *Живокость полевая*. Дикорастущее медоносное растеніе, цвѣтетъ съ Іюня, сѣмена употребляются противъ судорогъ.

D. orientale. Высокое растеніе.

D. Cordiopetalum. Бордюрное растеніе вышиною около фута, съ голубыми цвѣтами, сбѣтся въ Апрѣлѣ въ парникъ. Существуютъ многолѣтніе виды *Delphinium*. *Кавалерникъ.*

D. azureum. *К. Лазуревый.*

D. bicolor. *К. двухцвѣтнѣй,* съ синими цвѣтами, зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

D. Chinense. *К. Китайскій.*

D. C. flore albo. *К. бѣлый китайскій.*

D. grandiflorum. *К. великоцвѣтнѣй,* съ синими цвѣтами.

D. discolor. *К. разноцвѣтнѣй.*

D. exaltatum. *К. Американскій* съ синими цвѣтами.

D. cardinale. Съ красными цвѣтами.

D. intermedium. *К. среднѣй.*

D. vitifolium. *К. виноградолистнѣй.*

D. elatum. *Царь-земле.*

D. nudicaule, съ красными цвѣтами калифорнійское растеніе, зимуетъ безъ покрывки.

D. cheilanthus. D. triste. D. coelestinum. D. formosum, съ прекрасными синими цвѣтами.

D. glabellum. D. hybridum plenum. D. p. chauvieri.

D. pulchrum, съ большими голубыми въ срединѣ желтыми цвѣтами на кончикахъ цвѣточнѣхъ лепестковъ лилово-сѣрыя пятна.

D. ranunculiferum plenum.

D. elatum Keteleri. *Кетелеровъ Царь-земле,* съ махровыми цвѣтами; растетъ дико на южно-русскихъ степяхъ; размножается въ садахъ, лѣтомъ черенками, а осенью дѣленіемъ. Черенки сажаются въ горшки и ставятся въ парникъ; при дѣленіи наблюдается, чтобы каждая отдѣленная часть имѣла почку или часть стараго стебля.

D. staphis agria. Сѣмена ядовиты.

D. elatum alopecuroides. *Батамичниковый Царь-земле.* Тоже съ темно-лиловыми, махровыми цвѣтами.

639. *Dendrobium.* Тепличное растеніе изъ семейства Орхидей; можетъ расти и въ комнатѣ. Имѣетъ луковицы въ видѣ стеблей; цвѣты бѣлыя съ розовымъ, желтымъ или лиловымъ, — желтые и пестрые. Размножается дѣленіемъ корней; сажается на кускѣ

угля; землю требует листовную, пополамъ съ вересковою. Въ періодъ отдыха растеніе содержится сухо, лишь не допуская, чтобы его шишки морщились и засыхали. Разсаживается въ Мартъ или Апрѣль, прежде чѣмъ тронется въ ростъ; лѣтомъ впрыскивается раза два въ сутки; въ знойный день притѣняется.

Виды: *D. Paxtonii*. Съ ярко-желтыми цвѣтами и фіолетовымъ на нижней губѣ пятномъ.

C. Devonianum. Бѣлые цвѣты; нижняя губа съ двумя оранжевыми и однимъ малиновымъ пятномъ.

D. nobile. Надлежитъ сажать въ приставленные другъ къ другу, два, не обнаженные отъ коры, березовыя полѣна, внутри выдолбленные желобомъ, такъ, чтобы въ верхней части этой связки было отверстіе, какъ у горшка, вершковъ четырехъ въ діаметрѣ. Въ эту пустоту, на слой черенковъ насыпаютъ смѣсь, неразмельченную изъ равныхъ частей земли дерновой, пролежавшей годъ въ кучѣ, торфяной, мелко изрубленнаго бѣлаго, болотнаго мха и бѣлаго песку, прибавивъ немного древеснаго угля.

D. densiflorum. *D. Grifitii*. *D. Aureum*. *D. album*. *D. cambridjeanum*. *D. speciosum*.

D. acrobaticum, съ желтыми цвѣтами.

D. boorbatulum. Прекрасное растеніе съ бѣлыми цвѣтами, а въ серединѣ розовыми.

D. coelogyne. Цвѣтокъ въ серединѣ палевый, снаружи испещренъ пурпуровыми полосками; бульбы четырехгранныя.

D. fugae. Желтые цвѣты съ краснымъ. Весьма нѣжное растеніе, цвѣтетъ только нѣсколько минутъ.

D. annuligerum. Желтые или зеленые цвѣты, у которыхъ боковыя доли губы бѣлыя, съ пурпуровыми жилками, а наростъ оранжевый.

D. heterocarpum. Цвѣты желтоватыя; нижняя губа оранжевая въ полоскахъ.

D. cretaceum. Цвѣты бѣлые, нижняя губа желтая.

D. Dalhousianum. Большіе желтые цвѣты, по краямъ розовые, испещренные полосками; въ зѣвѣ, по два темно-фіолетовыя пятна.

D. formosum. Одинъ изъ красивѣйшихъ видовъ, съ боль-

шими бѣлыми цвѣтами, съ желтою полосою или пятномъ на нижней губѣ.

D. macranthum. Съ розовыми цвѣтами.

D. bigibrum. Розовые цвѣты. Нижняя губа малиновая.

640. *Dendromecon rigidum*. Изъ семейства *Papaveraceae*. Грунтовое растеніе съ желтыми цвѣтами.

641. *Dentella*. Вьющееся болотное растеніе, изъ Восточной Индіи.

642. *Desfontainia Hookeri*. Семейство *Desfontainiae*. Оранжевое растеніе.

643. *Desmanthus*. Изъ семейства бобовыхъ. Бываетъ травянистое и кустарное. Воспитывается въ оранжереѣ; любитъ хорошій черноземъ, тепло и влагу.

Виды: *D. Calistachys*. *D. diffusus*. *D. lacustris*. *D. plenus*.

644. *Desmodium penduliflorum*. Изъ семейства *Leguminosae*. Оранжевое растеніе, съ большою кистью ярко-красныхъ цвѣтовъ. Размножается черенками.

645. *Desmoncus*. Родъ Пальмъ. Мексиканское пальмовое, лазящее растеніе; не имѣетъ шипиковъ на листьяхъ; влѣзаетъ на деревья и свѣшивается съ нихъ.

Виды: *D. mexicanus*. *D. aculeatus*. *D. polyacanthus*.

646. *Deutzia Deuria*. Изъ семейства *Philadelphaeae*. Кустарникъ, разводимый въ паркахъ и садахъ для украшенія ихъ; на зиму требуетъ надежной покрывки листомъ, соломой и рогожами. Размножается отпрысками.

Виды: *D. crenata*. *D. crenata plena*. Съ бѣлыми, махровыми цвѣтами, имѣющими розовый отливъ.

D. c. p. fol. variegatis, съ совершенно бѣлыми цвѣтами. Если содержится въ оранжереѣ или вносится въ теплицу въ Декабрѣ, то цвѣтетъ въ Январѣ. Можетъ подвергаться ранней выгонкѣ и притомъ нѣсколько лѣтъ сряду, причѣмъ постоянно держится въ горшкѣ. Размножается травянистыми черенками, которые срѣзаютъ по окончаніи выгонки растенія.

D. gracilis. Съ большою кистью бѣлыхъ цвѣтовъ.

D. scabra flore pleno. Съ большими махровыми, бѣлыми цвѣтами.

D. parviflora. *Амурская дваница.* Маленькій кустарникъ, покрывающійся множествомъ бѣлыхъ цвѣтовъ.

647. Dianella. *Дианна.* Оранжерейное растеніе. Требуется земля, составленную изъ чернозема съ торфомъ и четвертою частию песку; лѣтомъ любить сильную поливку. Виды: **D. coerulea** съ синими цвѣтами.

D. longifolia. D. Stramosa.

648. Dianthus barbata. *Турецкая гвоздика.* Изъ семейства **Sileneae**. Однолѣтнее садовое растеніе, съ цвѣтами разныхъ колеровъ отъ бѣлаго до краснаго, простыми или махровыми; сѣется въ Апрѣлѣ въ парникъ и потомъ высаживается въ грунтъ.

Другіе виды: **D. Chinensis.** *Китайская гвоздика.* Многолѣтнее садовое растеніе съ бархатистыми цвѣтами, самыхъ разнообразныхъ колеровъ, отъ бѣлаго до краснаго, простыми и махровыми. Высѣвается въ Апрѣлѣ въ парникъ, морозовъ не боится, а потому еще въ Маѣ ее можно высаживать въ грунтъ; на почву не разборчиво.

D. Chinensis Heddewigii. Самый красивый видъ, съ большими простыми цвѣтами, имѣющими зубчатые лепестки, воспитывается какъ однолѣтнее растеніе.

D. chinensis laciniata, съ большими цвѣтами, лепестки которыхъ глубоко разсѣчены.

D. C. l. atropurpurea plena. Съ махровыми цвѣтами.

D. Chinensis imperialis. Самый красивый, махровый цвѣтокъ.

D. cruenta. Съ темно-пурпуровыми цвѣтами и синими тычинками и пестиками.

D. caryophyllus. (D. plumarius). Гвоздика Голландская.

Для ранняго цвѣтенія, такъ называемые ремонтантные сорта, держать въ горшкахъ, у окна оранжереи и не даютъ цвѣсти весною и лѣтомъ. Обыкновенно имѣютъ запасъ крѣпкихъ растеній, пересаживаютъ весною, послѣ зимняго цвѣтенія, въ маленькіе горшки и второй разъ въ Августѣ, въ горшки побольше, въ песчанистую торфяную землю.

Эбервейпъ, въ Вѣстникѣ Р. О. Садоводства за 1862 годъ, рекомендуетъ слѣдующій уходъ за голландскою гвоздикою.

Растеніе это требуетъ смѣсь 2 частей рыхлой, дерновой земли, 2 частей лиственной и 1 части хорошаго перегноя. На слишкомъ сильной почвѣ, гвоздика образуетъ уродливые цвѣты, если же почва, сверхъ того, легка, то растеніе загниваетъ и гибнетъ. Гвоздика также загниваетъ отъ продолжительной сырости; а потому послѣ цвѣтенія ее поливать надлежитъ весьма осторожно. Весною гвоздика разсаживается по одиночкѣ въ четырехъ-вершковыя горшки, ставится уступами на полки и защищается отъ дождей и отъ солнца. Лѣтомъ землю въ горшкахъ нѣсколько разъ разрыхляютъ, а въ концѣ Іюля или въ началѣ Августа дѣлаютъ отъ ней отводки. Для этого подсыпаютъ въ горшки рыхлой, просѣянной земли; надрѣзываютъ боковой побѣгъ, подъ узломъ, до середины стебля и раскалываютъ побѣгъ отъ этого разрѣза, вверхъ, до слѣдующаго узла, причемъ стараются произвести этотъ поперечный разрѣзъ, на такомъ разстояніи отъ основанія побѣга, чтобы при его наклоненіи, это мѣсто приходилось какъ можно ближе къ основанію горшка. Побѣгъ опускается въ свѣжую землю, такъ, чтобы расколота часть держалась въ землѣ вертикально. Вѣтвь утверждается въ этомъ положеніи крючками, а земля слегка приминается. По прошествіи 4 — 6 недѣль, отводки гвоздики окореняются, ихъ срѣзываютъ, и по одиночкѣ пересаживаютъ въ маленькія горшки, въ тощую, садовую землю; затѣмъ на зиму ставятъ на свѣтлое, сухое мѣсто и держатъ въ возможно низкой температурѣ, чтобы ослабить развитіе. Вообще пока растеніи сидятъ въ маленькихъ горшкахъ, его поливаютъ только тогда, когда начнутъ вянуть. Гвоздики разводятъ сѣменами, весною; всходъ разсаживается въ концѣ Мая въ грунтъ на солнечное мѣсто. Лучшіе экземпляры вынимаютъ, когда распустятся, пересаживаютъ въ горшки и немедленно дѣлаютъ отъ нихъ отводки.

Чтобы Голландскія гвоздики цвѣли зимою, въ Мартѣ сажаютъ черенки въ теплый, разводочный ящикъ; черезъ мѣсяцъ, когда растеніе окоренится, его разсаживаютъ въ маленькія горшки, затѣмъ, исподоволь, приучаютъ къ воздуху и, въ началѣ Іюня пересаживаютъ въ сильную землю въ грунтъ, когда высадки образуютъ сильныя экземпляры, въ Сентябрѣ ихъ вы-

нимають съ комомъ и сажаютъ въ горшки. Въ пристановкѣ растенія ставятъ какъ можно ближе къ стекламъ.

Хорошо составлять собраніе лепестковъ гвоздики, наклеивая ихъ аравійскою камедью, на толстую бумагу, и надъ каждымъ надписывая названіе цвѣтка.

D. Deltoides. *Грыжникъ.* Дикорастущее медоносное растеніе.

D. arboreus.

D. carthusianorum. *Полевая гвоздика.* Многолѣтнее, медоносное, дикорастущее, съ красными цвѣтами.

D. seguiera. *Красавочка.* Дикорастущее.

D. superbis. *Дикое мыло.* Многолѣтнее, садовое растеніе.

649. Diascia Barberae. Оранжевое травянистое растеніе, съ ярко-розовыми цвѣтами, желтыми въ середкѣ и съ длинными, фіолетовыми шпорами.

650. Diastema quinquevulnerum. Изъ семейства Геснерій. Съ желтоватыми цвѣтами. Оранжевое растеніе

651. Dichorisandra mosaica. Изъ семейства *Commelineae*. Тепличное растеніе. Цвѣты бѣлые съ голубымъ. Листъ весь расписанъ мелкими, свѣтло-зелеными черточками.

Другой видъ: **D. vittata.** Тепличное, многолѣтнее растеніе; листья зелено-пурпуроваго цвѣта съ пурпуровымъ исподомъ.

D. undata. Листъ съ красивыми свѣтло-зелеными полосами, на темномъ фонѣ.

652. Dicksonia selloviana. Древесный, тепличный папоротникъ.

653. Dicytra spectabilis. *Двушпорка.* Многолѣтнее, садовое растеніе, съ превосходными, рано цвѣтущими розовыми цвѣтами—серезками. Размножается дѣленіемъ корней. На зиму требуетъ покрывки. Для ранней пристановки, зимою держится въ подвалѣ или въ оранжереѣ. Для выращенія горшечныхъ экземпляровъ, весною дѣлаютъ отъ Диклитры черенки, сажаютъ въ грунтъ и въ Августѣ пересаживаютъ въ горшки. Впрочемъ, для ранней выгонки въ цвѣтъ горшечныхъ экземпляровъ, берутъ двухлѣтнія растенія, сажаютъ ихъ въ Августѣ въ горшки, съ наступленіемъ морозовъ ставятъ въ оранжерею и въ Январѣ переносятъ въ свѣтлое, теплое помѣщеніе.

Другіе виды: *D. tenuifolia*. *D. lachinaliaeflora*. Оба эти вида растутъ за Байкаломъ, въ дикомъ состояніи.

654. *Dictamnus fraxinella*. *Волжана*. *Ясенецъ*. Изъ семейства *Diosmeae*. Дикорастущее. Листья этого растенія похожи на листья ясени.

Другіе виды: *D. fraxinella purpureus*. *Ясенецъ красноцвѣтный*. Многолѣтнее, садовое растеніе, съ пурпуровыми цвѣтами. На почву не прихотливо.

D. albus. *Я. бѣлый*. *Баданъ*. Тоже; съ бѣлыми цвѣтами. Вечеромъ жаркаго дня, испареніе эфирныхъ маслъ цвѣтка, бываетъ такъ сильно, что съ приближеніемъ къ нимъ огня, вспыхиваетъ пламя, распространяющее сильный ароматъ.

655. *Dictyanthus pavonii*. Изъ семейства *Asclepideae*. Лазящее тепличное растеніе, съ весьма оригинальными цвѣтами, похожими на цвѣтокъ Стапелліи. Требуеъ листовенную землю, смѣшанную съ рѣчнымъ пескомъ. Во время роста любитъ сильную поливку, а во время покоя — наоборотъ. Размножается черенками лѣтомъ.

656. *Dictyocarpum*. Родъ пальмъ. Одно изъ самыхъ нѣжныхъ растений этого рода. Размножается сѣменами.

Виды: *D. Lamarckianum*. *D. Wallisi*.

657. *Didymocarpus crinitum*. Тепличное растеніе, изъ семейства *Cyrtandraceae*, съ весьма красивыми, зубчатыми листьями и желтоватыми, похожими на цвѣты Гесперіи, цвѣтами. Помѣщается въ небольшой горшокъ съ сильною землею. Зимой поливается весьма умѣренно. Размножается отдѣленіемъ отпрысковъ, ввидѣ короткихъ листьевъ.

Другой видъ: *D. Humboldtiana*. Съ свѣтлофіолетовыми цвѣтами, которые бываютъ открыты, 8—9 мѣсяцевъ въ году.

658. *Diervilla multiflora*. Изъ семейства *Caprifoliaceae*. Кустарникъ разводимый для украшенія садовъ и парковъ. На зиму закрывается надежнымъ способомъ. Размножается отпрысками.

Другіе виды: *D. floribunda*. Кустарникъ, весьма молодымъ уже даетъ красивые, темно-красные цвѣты, похожіе на цвѣты фуксіи.

D. Middendorffiana. Съ желтыми цвѣтами.

D. amabilis. Весьма изящные листья, съ желтою, по краямъ, каймою.

D. canadensis. Кустарникъ, достигающій 4 фута, съ желтыми цвѣтами.

D. rubro aurantiaca. Съ красно-оранжевыми цвѣтами.

659. D. Diffenbachia. Красивое тепличное, и вмѣстѣ комнатное, корневое, травянистое растеніе, съ большими, сердцобразными листьями и бѣловатыми, однопокровными цвѣтами. Размножается отрезками и черенками. Зимой поливается умеренно. Требуется земля, составленную изъ дерновой, вересковой и лиственной. Сокъ этого растенія имѣетъ ѣдкое и вредное свойство.

Виды: **Dif. Bausei.** *Диффенбахія Бауза.* Листья, какъ этого, такъ и **D. maculata** красиво испещрены бѣлыми пятнами.

D. Bowmani. Весьма красиво. Свѣтло-зеленые листья его испещрены темно-зелеными пятнами.

D. imperialis. Съ пестрыми листьями.

D. latimaculata. Листья съ желто-зелеными разводами и пятнами.

E. Seguine. D. picta. D. Baraquiniana. D. gigantea. D. Costata. D. Alliadora.

660. Digitalis. *Наперстная трава.* Изъ семейства **Scrophulariaceae.** Двухлѣтнее садовое растеніе, зимующее на открытомъ воздухѣ. Цвѣты формою похожи на геснерію.

Виды: **D. ferruginea.** *Наперстянка Итальянская.* Садовое растеніе, съ бурными цвѣтами.

D. lanata. Тоже. *Н. Мохнатая.* Цвѣты бѣлые, съ бурными пятнами.

D. lutea. *Н. желтая.* Тоже, съ желтыми пятнами.

D. purpurea. *Н. пурпуровая.* Съ пурпуровыми цвѣтами; разводится въ грунтъ; на почву не прихотливо; цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ.

D. alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

D. ambigua. Съ желтыми цвѣтами.

Дикорастущій видъ: **D. grandiflora.** *Наперстянка великолѣпная. Поздковый цвѣтъ.* Разводится и въ садахъ.

661. Dillenia speciosa. Тепличное растеніе. Плоды его замѣняютъ лимоны.

662. Dilluinia. Тепличное и вмѣстѣ комнатное кустарное растеніе, преимущественно съ желтыми цвѣтами; распускается въ Февралѣ. Любитъ легкую почву. Лѣтомъ требуетъ притѣненія.

Виды: *D. ericaefolia*. *D. speciosa*. *D. clavata*. *D. lanceolata*.

663. Dimorphantes edulis. Кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ и парковъ. Хорошо покрывается на зиму.

664. Dimorphoteca pluvialis. (Calendula pluvialis. C. hybrida). Однолѣтнее, грунтовое растеніе съ бѣлыми, снизу фіолетовыми цвѣтами. Цвѣтетъ только при солнцѣ. Въ теплыхъ мѣстностяхъ сѣется прямо въ грунтъ, а вообще, прежде высѣвается въ парникъ, а потомъ разсаживается.

665. Dionaea muscipula. Мухоловка. Изъ семейства *Droseraceae*. Маленькое, тепличное двухлѣтнее растеніе; можетъ расти и въ комнатѣ. Бѣлые цвѣты его расположены букетомъ. Продолговатые листья имѣютъ на концахъ по два овальныхъ листка, обсаженныхъ по краямъ колючками. Эти листки такъ чувствительны, что стоитъ только мухѣ или другому насѣкомому коснуться ихъ, они тотчасъ же складываются и сдавливаютъ насѣкомое, затѣмъ, чѣмъ сильнѣе оно вырывается, тѣмъ плотнѣе сжимаются листки, пока совсѣмъ не умертвятъ пойманнаго насѣкомаго. Какъ только насѣкомое перестанетъ шевелиться, листики понемногу принимаютъ свое обыкновенное положеніе и умерщвленное насѣкомое падаетъ близъ растенія. Уходъ за Діонеей очень труденъ. Земля ему дается легкая, торфяная и хорошій водостокъ. Поверхность земли прикрывается мхомъ; растеніе ставится на поддонъ съ водою, которую перемѣняютъ черезъ день. Весь годъ содержится на мѣстѣ пользующемся наибольшею теплотою и влажностью, подъ стекляннымъ колпакомъ, приподнятымъ съ одной стороны, для лучшаго доступа воздуха. Также и зимою въ почвѣ, въ которой сидитъ это растеніе, надлежитъ поддерживать всегда одинаковую влажность, хотя и не должно держать его слишкомъ сыро. Размножается сѣменами и отростками.

666. Dioon edule. Тепличное и вмѣстѣ комнатное растеніе; Сисодиар деревянистый стволъ коего имѣетъ круглую форму, въ родѣ луковицы, а съ годами вытягивается и принимаетъ видъ столба.

Перистые, жесткіе и колючіе листья его сидят на пушистыхъ черенкахъ. Имѣетъ зелено-желтые цвѣты въ видѣ еловой шишки. Размножается отростками и сѣменами; требуетъ, землю составленную изъ дерновой, лиственной и песку.

667. Dioscorea picta. (Discolor). Тепличное растеніе.

Другіе виды: *D. japonica*. *Igname*. *Ямсъ Китайскій*. *Иньямъ*. Многолѣтнее растеніе, употребляется какъ картофель; любитъ глубокую, плодородную, рыхлую почву; весьма плодороденъ: говорятъ одной грядки достаточно для годичнаго прокормленія человѣка. Для разведенія, корни этого растенія очень тѣсно сажаютъ въ нарочито приготовленную канаву, наполненную компостомъ и когда у растенія образуются побѣги, то ихъ рассаживаютъ. Также, слабые клубни разрѣзываютъ на столько кусковъ, сколько есть на нихъ глазковъ, сажаютъ ихъ весною въ парникъ и потомъ высаживаютъ въ грунтъ. Въ Китаѣ выкладываютъ подпочву гряды, приготовляемой подъ Ямсъ, кирпичемъ или камнемъ, чтобы корни его не слишкомъ углублялись и были толще.

D. Eldorado. Тепличное, травянистое растеніе, съ вьющимися стеблями и нарядными, росписными, оливково-зелеными атласистыми листьями, съ серебристою полоскою.

D. multicolor chrysophylla. Пестролистное, тепличное, травянистое растеніе.

D. Batatas. *Иньямъ Китайскій*.

D. multicolor metallica. Тепличное, травянистое растеніе, съ листьями бронзово-зеленаго цвѣта, съ полоскою тѣлесно-бронзоваго цвѣта, по атласистой поверхности.

D. m. Sagittata. Тоже, съ росписными, зелеными съ бѣлымъ листьями и вьющимся стеблемъ.

D. prismatica. Красивое, тепличное, травянистое растеніе, съ нѣжными пурпуровыми атласистыми листьями, окаймляющимися остриемъ, испещренными бѣлыми и пурпуровыми жилками.

668. Diosma. Оранжевое растеніе.

Виды: *D. cordata*. Съ душистыми, бѣлыми цвѣтами, распускающимися въ Маѣ; любитъ вересковую землю.

D. rubra. Цвѣтетъ преимущественно въ Февралѣ, также какъ и *D. Agathosma* и *D. Adenandra*.

D. alba. D. ericoides.

669. Diospyros lotus. *Хурма.* Кустарникъ. Любитъ низменную, тучную почву; размножается сѣменами и отводками; на зиму требуетъ надежной защиты.

Другіе виды: *D. castata.* Кустарникъ или низенькое деревце, съ кожистыми, глянцевитыми листьями и блѣдно-желтыми цвѣтами.

Другой видъ: *D. Ebenum.* Настоящее черное дерево.

670. Diphylleia. Изъ семейства барбарисовыхъ. Разводится въ садахъ, на зиму переносится въ подвалъ.

671. Diplacium shepherdii. Тепличный папоротникъ.

672. Diplacus glutinosus var. grandiflorus. Изъ семейства *Scrophulariaceae*. Оранжерейное растеніе, съ оранжевыми и бѣлыми цвѣтами. Требуется той же культуры, что и Петунія.

673. Dipladenia. Изъ семейства *Aprocynaceae*. Американскій, вьющійся, тепличный кустарникъ, съ цвѣтами, похожими на цвѣты Ипомеи. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается черенками. Требуется землю, составленную изъ дерновой, вересковой и лиственной. Любитъ сильное, частое опрыскиваніе въ лѣтнее время, для спасенія отъ насѣкомыхъ.

Виды: *D. Rosa campestris.* Съ превосходными крупными цвѣтами, розовыми съ малиновымъ.

D. atropurpurea. Съ темно-пунцовыми цвѣтами.

D. Harrisii. Съ желтыми цвѣтами.

D. splendens. Съ крупными, розовыми цвѣтами. Одно изъ красивѣйшихъ вьющихся растений въ природѣ. Требуется весьма тучной и плотной земли. Лѣтомъ любитъ сильную поливку и частое опрыскиваніе, которое постепенно уменьшается къ концу лѣта. Размножается черенками, на которые употребляются вѣтки, взятые у ихъ основанія, а отнюдь не тонкія развѣтвленія. Черенокъ до укрѣпленія его держится подъ стекляннымъ колпакомъ.

D. nobilis. Съ розовыми, пурпуровыми или оранжевыми цвѣтами. Сажается въ глубокіе горшки съ хорошимъ дренажемъ. Когда отцвѣтетъ, поливку его прекращаютъ и ставятъ горшокъ съ растеніемъ, въ сухое, но не холодное мѣсто. Че-

резъ нѣсколько времени обрѣзываютъ старыя, верхніе корни, пересаживаютъ въ новую землю и держатъ въ теплицѣ, на свѣтломъ мѣстѣ. Поливаютъ сначала умѣренно, а потомъ сильнѣе.

D. vincæflora. Съ лилово-розовыми цвѣтами.

D. Uraphylla. Розовые цвѣты съ желтою середкою.

D. insignis. Тепличное, вьющееся растеніе, съ крупными темно-карминовыми цвѣтами; наружная сторона цвѣточной трубки у основанія бѣлая. Разводится сѣменами.

674. *Diplochita*. Красивый, американскій кустарникъ, содержится у насъ въ оранжереяхъ.

675. *Diplolaena scabra*. Оранжерейное растеніе, цвѣтетъ раннею весною.

Другой видъ: *D. Dampieri*. Съ цвѣтами—кистью, желтыми съ красными кончиками. Не терпитъ сырости, а потому при пересадкѣ, на дно горшка кладется много черенковъ и зимою не поливается. Легко размножается черенками. На лѣто выставляется въ затѣненное, но вполнѣ доступное воздуху мѣсто.

676. *Diplotaxis pendula*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

677. *Diplothemium*. Родъ Пальмъ. Тепличное растеніе, почти безстебельное; исподъ его перистыхъ листьевъ бываетъ серебристый или сизый.

Виды: *D. littorale*. Даетъ съѣдобныя орѣхи.

D. maritimum. Отличается длинными, четырехсаженными, перистыми листьями.

678. *Dipsacus fullonum*. *Ворсянка*. Многолѣтнее, цвѣточное растеніе.

679. *Dipteracanthus*. Изъ семейства *Acantaceæ*. Тепличное, кустарное растеніе съ большими желтыми, синими или лиловыми цвѣтами; можетъ расти въ комнатѣ; разводится черенками; зимою требуетъ весьма умѣренной поливки и землю, составленную изъ равныхъ частой вересковой, дерновой и листовенной.

Виды: *D. spectabilis*. Превосходные, темно-синіе цвѣты.

D. ciliatus. *D. patulus*.

680. *Dipterix odorata*. Душистые сѣмена этого растенія при-
бавляются къ нюхательному табаку.

681. *Dirca palustris*. Сѣверо-американскій кустарникъ, любитъ
песчаную, но влажную почву; размножается сѣменами и кор-
невыми отпрысками.

682. *Disa*. Оранжевая Орхидея. Любитъ легкую, песчанистую
почву и температуру отъ 6 до 8° Р.

Другой видъ: *D. grandiflora*. Съ большими, пунцовыми
цвѣтами, отороченными желтымъ.

683. *Disandra prostrata*. Многолѣтнее растеніе; зимою содер-
жится въ теплицѣ или подвалѣ, а на лѣто высаживается въ
грунтъ.

684. *Dischida rafflesiana*. Изъ семейства *Asclepiadeæ*. Вьющееся
тепличное растеніе. Цвѣтокъ похожъ на цвѣтокъ *Ноуа*; но
растеніе имѣетъ ту особенность, что образуетъ гроздія плодовъ,
похожихъ формою на стручковый перецъ и наполненныхъ со-
комъ, дѣйствующимъ смертельно на разныхъ насѣкомыхъ на
него нападающихъ.

685. *Disteganthus basi-lateralis*. Изъ семейства Бромелій. Теп-
личное растеніе. Роскошный цвѣтокъ, совершенно своеобраз-
наго вида желтый на розовыхъ, имѣющихъ видъ ананаса,
листьяхъ. Сажается въ скорлупу кокосоваго орѣха, наполнен-
ную кусками торфа, смѣшанными съ листовнымъ перегноемъ

686. *Dodecatheon*. Изъ семейства *Primulaceæ*. Многолѣтнее ра-
стеніе; лѣтомъ держится въ грунту, а зимою въ оранжереѣ
или подвалѣ.

Виды: *D. Jeffroyi* съ розовыми, висячими цвѣтами.

D. Meadia, съ розовыми цвѣтами, содержится въ умѣрен-
ной теплицѣ или парникѣ.

D. M. album. Съ бѣлыми цвѣтами. Тоже.

D. M. elegans.

D. M. frigidum. Съ самыми яркими темно-красными цвѣ-
тами; на скалистыхъ горахъ, въ Америкѣ, подымается до вы-
соты 7000 футовъ.

687. *Dodonaea scabra*. Оранжевое растеніе.

688. Dolichos glycinoides. Оранжевое растение.

Другие виды: *D. lignosus*.

D. Lablab. Однолетнее цвѣщее растение. Цвѣтокъ бѣлый съ чернымъ, цвѣтетъ въ Іюлѣ. Высаживается предварительно въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ.

D. fumarium. Вьющійся, оранжевый кустарникъ, постоянно зеленый съ фиолетово-розовыми, съ пурпуровымъ, цвѣтами, размножается сѣменами.

689. Dombeya. Изъ семейства *Büttneriaceae*. Весьма красивое оранжевое дерево, могущее расти и въ комнатѣ, съ большими пушистыми листьями и бѣлыми, съ малиновою серединою, цвѣтами; размножается черенками; зимою теряетъ листъ; требуетъ землю дерновую, пополамъ съ листовною и съ примѣсью четвертой части песка и четвертой глинозема.

Виды: *D. Ameliae*. Тепличное деревцо. Цвѣты бѣлые съ малиновымъ и желтымъ.

D. viburniflora. Съ большимъ букетомъ бѣлыхъ цвѣтовъ, похожихъ на цвѣтокъ калины.

D. punctata. D. viscosa. D. ferruginea.

690. Doodia aspera. Оранжевое растение.

691. Dorianthes excelsa. Изъ семейства Амариллисовъ. Декоративное, оранжевое растение, съ ярко-пурпуровымъ цвѣткомъ на весьма большомъ стержнѣ, внутри розовымъ съ бѣлымъ отливомъ. Любитъ рыхлую, глинистую почву и свѣтлое мѣсто; размножается отдѣленіемъ корневыхъ побѣговъ.

692. Doronicum caucasicum. *Кавказскій Сайпанг-корень.* Грунтовое, бордюрное растение съ желтыми цвѣтами, любитъ тучную землю, цвѣтетъ съ Марта по Май.

Другой видъ: *D. austriacum*. Если оба эти растения содержатся въ умѣренной теплицѣ, то они цвѣтутъ и въ Январѣ.

693. Dorstenia Mannii. Тепличное растение съ пушистымъ стеблемъ, имѣетъ лекарственныя свойства.

694. Dracaena. *Драцена.* Изъ семейства *Liliaceae*. Тепличное деревцо, очень хорошо растетъ и въ комнатѣ, съ небольшими

бѣлыми или лиловыми цвѣтами. Драцена не имѣетъ волосковъ; стебель у ней бываетъ простой или вѣтвистый, съ колчатыми рубцами отъ опавшихъ листьевъ; листья къ вершинамъ стеблей и вѣтвей дѣлаются гуще; обыкновенно нераздѣленные; по большей части узко-ланцето-видные. Размножается сѣменами, отводками, отростками и черенками, на которые можно срѣзывать вершину растенія и рѣзать стебель на столько кусковъ, сколько есть на растеніи листьевъ, даже еще и эти кусочки можно разрѣзать на нѣсколько. Черенки сажаются въ плошку съ пескомъ и содержатся въ теплѣ и умѣренной влажности. Землю требуетъ, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: **D. Draco.** *Драконово дерево.* „Вѣстникъ И. О. Садоводства за Ноябрь 1872, такъ описываетъ это растеніе: Несмотря на тугость роста, оно по простествіи нѣсколькихъ столѣтій образуетъ громадный стволъ, развѣтвленный при вершинѣ и представляющійся пропорціонально ширинѣ, очень низкимъ. Въ настоящее время эта Драцена встрѣчается только на островѣ Тенерифѣ, на Мадерѣ она почти совсѣмъ истреблена, а въ Порто-Санто, гдѣ она въ прежнее время росла весьма обильно, совсѣмъ исчезла. Сильною бурей окончательно уничтожено знаменитое драконово дерево, росшее на Тенерифѣ, въ Вилла-де-Оратава. Это дерево имѣло въ 1843 году стволъ въ объемѣ 7 сажень, вся же вышина его не превосходила 10 сажень. Другой экземпляръ, совершенно здоровый, растетъ на томъ же островѣ въ Икодъ-де-лосъ-Виносъ; онъ хотя не такъ колоссаленъ, но все таки имѣетъ стволъ 5 сажень въ окружности на вышинѣ 1½ сажени и не менѣе 6 сажень въ окружности, у самой поверхности земли. Трудно составить себѣ понятіе о возрастѣ этихъ двухъ колоссовъ, потому что ростъ названнаго вида происходитъ весьма медленно. Такъ первый изъ приводимыхъ экземпляровъ былъ почти такой же величины и при покореніи испанцами Канарскихъ острововъ, т. е. въ началѣ XV столѣтія. Листья драконова дерева имѣютъ въ длину до аршина и нѣсколько болѣе, а въ ширину отъ 1 до 1¼ дюйма, растутъ букетомъ вверхъ; свѣтло-зеленые.

Разновидности: **D. D. strictifolia.**

D. D. laxifolia. Съ пониклыми нижними листьями.

D. D. pendulifolia. Съ болѣе или менѣе пониклыми листьями.

D. indivisa. Можетъ содержаться въ оранжереѣ; имѣетъ очень узкіе листья, растущіе вверхъ.

D. umbraculifera. Листья длиною въ аршинъ, расположены букетомъ, растутъ дугою. Одинъ изъ самыхъ красивыхъ видовъ. Стволъ прямой, толстый и короткій.

D. striata. Листья растутъ пирамидою.

D. immarginata. Листья растутъ пирамидою, съ красною каемкою по бокамъ; стволъ прямой, тонкій, вѣтвящійся.

D. Australis. Такое же расположеніе листьевъ, можетъ содержаться и въ оранжереѣ.

D. longifolia. Листья длиною до 2-хъ аршинъ.

D. Aletris fragrans. Листья пирамидою; бѣлые, душистые цвѣты выходятъ на высокомъ стеблѣ изъ середины листьевъ. Въ комнатѣ растетъ иногда лучше, чѣмъ въ теплицѣ; стволъ достигаетъ 9 футовъ вышины; листья ярко-зеленаго цвѣта.

D. Rumphii. Прямой, толстый стебель, съ сизаго цвѣта листьями длиною до 1½ фута. Цвѣторасположеніе макушечное, кистями изъ зеленоватыхъ цвѣтовъ.

D. rubra. Листъ длиною до ¾ аршина на короткихъ черенкахъ.

D. piota. Съ длинными испещренными листьями.

D. Sieboldtii. Зеленые листья съ свѣтлыми пятнами.

D. Porteana versicolor. D. Knerkiana. D. Concinna. Одна изъ лучшихъ тепличныхъ и комнатныхъ драценъ, съ прямымъ, толстымъ стволомъ, съ желто-зелеными листьями съ красно-бурою полосой по краямъ, ниспадающими дугою.

D. ensifolia. Лучшее, орнаментальное тепличное растеніе, выдерживаетъ комнатную культуру, не требуетъ много свѣта; прямой стебель достигаетъ 15 футовъ, съ узко-ланцетовидными, нѣсколько волокнистыми листьями; цвѣтетъ болѣе или менѣе пониклою метелкою, бѣлыхъ душистыхъ цвѣтовъ.

D. ensifolia Greigi. Мечевидная драцена Грейга. Пестролистная драцена выведена въ Петербургѣ, въ самое недавнее время, а потому еще мало распространена; листья съ бѣлыми полосами.

D. guatemalensis.

D. nigrescens, съ темными, какъ бы черными листьями.

D. Veitchii. Содержится въ оранжереѣ.

D. Cilindrica. Тепличное растеніе съ прямымъ, не вѣтвящимся стеблемъ и бѣлыми цвѣтами.

D. terminalis striata, половина листа малиновая, а другая половина полосами почти черными, зелеными и малиновыми, — великолѣпное растеніе. Содержится въ теплицѣ.

D. magnifica. Съ широкимъ, овальнымъ листомъ, отороченнымъ краснымъ цвѣтомъ.

D. chelsoni, съ блестящими, темно-зелеными, почти черными листьями, которые, старѣясь, покрываются темно-краснымъ отливомъ, съ такимъ же бордюромъ, по краямъ листьевъ.

D. mooreana, съ довольно крупными листьями; имѣетъ красноватые стебли, скоро переходящіе въ бронзовый цвѣтъ.

D. nobilis. Тепличное, кустарное растеніе съ зелеными листьями, ярко росписанными малиновымъ.

D. Dennisoni. Тепличное, кустарное, низкорослое растеніе, съ темно-бронзовыми листьями.

D. lutescens striata. Тепличное растеніе, въ выгнутыми блѣдно-желто-зеленаго цвѣта листьями.

D. splendens. Низкое, тепличное растеніе съ широкими, ланцетовидными листьями, темно-бронзоваго цвѣта.

D. Wiesemanii. Тепличное растеніе, съ бронзоваго цвѣта листьями, имѣющими красные края, а у молодыхъ растеній — бѣловатые.

D. Guilfoylei. Съ ярко-зелеными, отороченными розовымъ, листьями.

D. porphyrophylla. Съ весьма красивыми, коричнево-пурпуровыми листьями.

D. regina. Царская драцена. Одна изъ лучшихъ пестро-лиственныхъ драценъ; листья шириною болѣе 6 дюймовъ, съ широкою бѣлою каймою, съ узенькою по ней зеленою полоскою.

D. arborea. Одно изъ лучшихъ орнаментальныхъ растений для теплицъ и комнатъ, съ прямымъ, толстымъ стволомъ, съ кроною, темно-зеленыхъ, глянцевитыхъ, нѣсколько волокнистыхъ листьевъ.

D. angustifolia. Прямой стебель, вышиною до 10 футъ, съ прямостоячими, линейно-ланцетовидными листьями.

D. fruticosa. Кустарникъ съ листьями длиною до 20 дюймовъ.

D. Kochiana, съ прямымъ стеблемъ и ниспадающими листьями.

D. Stenophylla, съ тонкимъ стеблемъ, покрытымъ довольно мягкими листьями, имѣющими по темно-зеленой верхней сторонѣ короткія, продольныя полосы болѣе свѣтлаго цвѣта.

D. reflexa, съ тонкимъ стеблемъ и ниспадающими листьями, имѣющими верхнюю сторону темно-зеленую, а нижнюю болѣе свѣтлую.

D. cernua, похожа на предыдущую, имѣетъ листья съ красною оторочкою и пониклое цвѣторасположеніе.

D. latifolia, отъ сырости листья покрываются пятнами, похожа на *D. Rumphii*, но имѣетъ листья шире.

D. surculosa. Отъ одного корня вырастаетъ нѣсколько короткихъ стеблей толщиною въ гусиное перо, которые образуютъ, что-то похожее на древенистую соломину злаковъ, въ междоузліяхъ которой, ниже листа, находятся сухія, ланцетовидныя, остроконечныя чешуйки съ сильно-развитыми продольными жилками; эти чешуйки опадаютъ и тогда обнажаются зеленныя и глянцевитыя междоузлія. Имѣетъ желтоватые цвѣты.

D. S. maculata. Тоже, съ правильно расположенными, желтоватыми пятнами на листьяхъ.

D. nigra. Стебель вышиною до 3-хъ аршинъ и толщиною въ гусиное перо, съ темно-зелеными листьями собственно на вершинѣ растенія и съ желто-зелеными цвѣтами.

D. nigra maculata. Тоже, только на листьяхъ свѣтло-зеленныя, правильно расположенныя пятна.

D. spicata, отличается отъ предыдущаго ланцетовидными листьями.

D. Thwaitesii. По стеблю походить на *D. nigra*; листья ланцетовидные.

D. ovata. По стеблю походить на *D. nigra*, съ свѣтло-зелеными, эллиптически-остроконечными, очень волнистыми листьями.

D. bicolor. Кустарникъ, листья сидятъ въ короткомъ, толстомъ, желобковатомъ черенкѣ.

D. javanica, съ тонкимъ, маловѣтвистымъ стеблемъ.

D. terniflora. Походитъ на предыдущую, но отличается болѣе длинными концами листьевъ.

D. Griffithi. Вѣтвистый кустарникъ съ вѣтвями толщиною въ гусиное перо и съ листьями, сближенными какъ-бы въ кольца, на концахъ вѣтвей.

D. thalioides. Стебель толстый, покрытый на большей своей части листьями, идущими двумя спиралями ярко-темно-зелеными сверху и болѣе блѣдными снизу.

D. phrinoides. Низкій кустарникъ съ овальными, остро-конечными листьями.

D. pulcherrima. Драцена красивая, съ многочисленными раскидистыми узкими листьями; листья въ первое время покрыты розовыми крапинами, а нѣкоторые бѣлыми съ розовымъ. Нижняя часть листа и крылья черенка—съ красными краями.

695. Dracoscephalum Ruyschiana. Синій Звѣробой. Какъ это такъ и слѣдующіе, признаются дикорастущими видами:

D. Moldavica. Турецкая Мелисса. Змѣеголовникъ Молдавскій. Низенькое, медоносное растеніе; цвѣтетъ въ Іюль; высѣвается прямо въ грунтъ; бываетъ съ бѣлыми и синими цвѣтами.

D. thymiflorum. Шерда. Змѣеголовникъ Тимьяноцвѣтный. Однолѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтетъ, начиная съ половины Мая.

D. peltatum.

D. virginianum. Оранжевое растеніе.

D. austriacum. Дракоцефалъ австрійскій. Грунтовой, не прихотливое на почву растеніе, съ пурпурово-голубыми цвѣтами; распускается въ Іюль.

D. speciosissimum. Многолѣтнее растеніе, съ синими цвѣтами; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

696. Dracopis amplexicaulis. Однолѣтнее растеніе, съ цвѣтками оранжевыми, при основаніи бурыми.

697. Dracunculus crinitus. Изъ семейства Aroideæ. Оранжевое растеніе, съ огромнымъ цвѣткомъ, похожимъ на цвѣтокъ Калліи Эфіопки. Внутренняя сторона раструба испещрена малиновымъ, съ желтовато-коричневымъ, какъ тигровая кожа

и вся покрыта пушистыми волосами. Пестикъ мохнатый, зеленый; наружная часть цвѣтка, тоже пестрал. Внутренность цвѣтка издаетъ особый запахъ, на который слетаются мухи и, запутываясь въ его волосахъ, погибаютъ отъ означеннаго запаха. Можетъ расти на открытомъ воздухѣ во время лѣта, а на зиму вносится въ оранжерею.

- 698. Dryandra.** Изъ семейства *Proteaceæ*. Растеніе, отличающееся красотою листьевъ; некрасивые цвѣты держатся всю зиму въ оранжереѣ.

Виды: *D. nobilis*. Съ оранжевыми цвѣтами. Надлежитъ охранять отъ загниванія корни растенія, а самое растеніе отъ сильныхъ солнечныхъ лучей. Требуешь легкую землю.

D. formosa. D. floribunda. D. speciosa.

- 699. Drymadia picta.** Одна изъ самыхъ маленькихъ Орхидей, безъ листьевъ. Сплюснутыя бульбы; маленькіе, зеленые цвѣты, съ пурпуровыми крапинками и темно-пурпуровою губою.

- 700. Drymomia cristata.** Изъ семейства Геснерій, съ свѣтло-желтыми цвѣтами. Лазящее растеніе, требуетъ той же культуры, что и *Alloplectus pinelianus*.

- 701. Duranta macrocarpa.** Оранжерейное растеніе.

Другіе виды: *D. microphylla. D. Plumeria. D. Ellisia*. Кислосладкія ягоды, употребляются въ пищу.

- 702. Dyckia remontiflora.** Изъ семейства Бромелій. Корневое, травянистое растеніе, съ сочными, круглыми, растущими дугою, жесткими листьями и ярко-оранжевыми цвѣтами. Размножается корневыми отростками. Землю требуетъ листовенную, съ примѣсю половины дерновой. Даетъ множество отростковъ, а потому его надлежитъ держать въ широкомъ горшкѣ. Можетъ расти въ комнатѣ.

- 703. Dypsis.** Родъ Пальмъ. Гладкоствольное растеніе съ острова Мадагаскара. Размножается сѣменами.

- 704. Escremocarpus (calampelis) Scaber.** Оранжерейное растеніе, но можетъ расти и въ грунтѣ, употребляется для шпа-

леръ и высѣвается предварительно высадки въ грунтъ,—въ парникъ или плошки.

705. Echeveria. Оранжевое растеніе, высаживаемое на лѣто въ цвѣтникъ; вовсе безъ ствола или съ коротенькимъ стволомъ; застилаетъ землю множествомъ нижнихъ листовыхъ розетокъ.

Виды: **E. Coccinea.** Съ желтовато-красными цвѣтами.

E. grandiflora. Съ красновато-желтыми цвѣтами. Оба эти вида цвѣтутъ въ Октябрѣ и Ноябрѣ.

E. argentea et farinosa. Прелестный, большой, бѣлый цвѣтокъ, будто покрытый серебристою пылью.

E. californica. E. metallica.

E. gibbiflora. Съ довольно высокимъ стеблемъ.

E. Secunda. Изъ Мексики. Съ круглыми, лапчатыми, сизоватыми листьями, съ красною каймою, безъ стебля, также какъ **E. pumila.**

E. glauca. Съ короткимъ, развѣтвленнымъ стеблемъ и бѣловатыми листьями.

E. pulverulenta. Изъ Калифорніи. Съ такимъ же стеблемъ, но съ болѣе узкими листьями.

706. Echinacea intermedia. Воздушное растеніе съ пунцовымъ цвѣткомъ, похожимъ на большую астру, отличается острыми чешуйками цвѣтнаго ложа, отчего и получило свое названіе. (**Echinus**—ежъ). Любитъ сильную землю, достаточную поливку во время жары, вечеромъ передъ закатомъ солнца. Размножается дѣленіемъ корневища, въ началѣ весны, или посѣвомъ осенью, причемъ, когда совершенно прекратятся морозы, его высаживаютъ въ грунтъ.

707. Echinocactus. См. **Cactaeae.**

708. Echinops. *Мордовникъ.* Изъ семейства **Synanthereae.** Многолѣтнее, садовое растеніе.

Виды: **E. bannaticus. E. exaltatus.** *М. высокій.*

E. dahuricus. (E. Gmelini). *М. Даурскій Сырсонъ.*

E. Ritro. *М. Сибирскій малый. Крутой Мордовникъ.* Двѣ-роаствующее, многолѣтнее растеніе; цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ.

E. Sphaeroccephalus. *М. обыкновенный. Ежовникъ.*

709. Echinopsis. Смотри *Cactae*.

710. Echites. Семейство *Аросунеа*. Тепличный и вмѣстѣ комнатный, вьющійся кустарникъ, съ бѣлыми, желтыми или розовыми, нѣкоторые виды съ душистыми цвѣтами. Размножается сѣменами и черенками; зимою требуетъ самой умѣренной поливки. Любитъ листовенную землю съ примѣсью дерновой, вересковой и песку. Во время отдыха не поливается, а только обрызгивается.

Виды: *E. suaveolens*. Съ бѣлыми цвѣтами.

E. paltata. Съ желтыми цвѣтами.

E. longiflora. *E. umbellata*. *E. arguttraea*. *E. venosa*.

711. Echium vulgare. *Синякъ. Румянка обыкновенная.* Изъ семейства *Asperifoliae*. Дикорастущее медоносное, однолѣтнее растеніе; цвѣтетъ синими съ краснымъ цвѣтами, съ Іюня до половины Августа.

Другіе виды: *E. rubrum*. *Румянка красноцвѣтная.* Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ.

E. creticum. Съ желтыми цвѣтами.

E. giganteum. Оранжевое, многолѣтнее растеніе, съ синими цвѣтами, на лѣто можетъ быть высаживаемо въ грунтъ.

712. Edgworthia chrysantha. Оранжевое растеніе, имѣетъ листья только на верхушкѣ стебля, тогда какъ цвѣтокъ, ароматическій, золотисто-желтый, образуется подъ листьями. Любитъ легкую, вересковую землю; на лѣто выставляется на воздухъ; требуетъ хорошаго водостока въ горшкѣ и зимою весьма осторожную поливку.

713. Eichornia speciosa (Pontederia crassipes). Плавающее растеніе, съ листовыми стеблями, вздутыми на подобіе мѣшковъ, наполненными воздухомъ и имѣющими на оконечностяхъ пучки листьевъ. Растеніе это пускаетъ въ воду пучекъ корней и постоянно плаваетъ. Изъ основанія листьевъ выходятъ молодые ростки, на оконечностяхъ которыхъ развиваются новые пучки листьевъ. Въ акваріумъ сажаютъ совершенно развитыя растенія, т. е. уже плавающія на поверхности воды. Осенью ихъ пересаживаютъ изъ акварія, въ небольшіе горшечки, въ смѣсь ила и торфяной земли, смѣшанной съ рубленымъ мхомъ и пескомъ и ставятъ эти горшечки до поло-

вины въ воду акварія или на поддонъ съ водою, причемъ растеніе покрываютъ стекляннымъ колпакомъ. Весною растеніе опять пересаживается въ акварій. Растеніе это можетъ зимовать въ акваріѣ, не пересаженное, но при этомъ его надо постоянно очищать отъ желтѣющихъ листьевъ.

714. *Elaeis. Элаеисъ*. Родъ Пальмъ. Стволъ этого растенія пригибается и слабо держится немногими корнями; растетъ по болотамъ. Эта пальма доставляетъ масло, весьма сильно распространенное въ торговлѣ.

Виды: *E. guineensis. E. occidentalis.*

715. *Elaphoglossum Herminieri*. Орнаментальное, тепличное растеніе, съ толстымъ, чешуйчатымъ корневищемъ и сидячими ваями.

716. *Eleagnus. Лохъ*. Деревцо, съ желтоватыми цвѣтами, растетъ на открытомъ воздухѣ; можетъ существовать въ комнатѣ; размножается сѣменами, черенками и отводками; требуетъ листовенную землю пополамъ съ вересковою съ примѣсью такого же количества дерновой и немного песку. Если содержатся зимою въ оранжереѣ, то поливается весьма умѣренно.

Виды: *E. angustifolia. Л. узколистный*. Небольшое деревце; цвѣтки снаружи покрыты такими же серебристыми чешуйками, какъ и листья, а внутри желтые.

E. reflexa. E. fusca. Л. бурый.

E. hortensis. Л. садовый. Высокій кустарникъ. Нашей зимы не выносить. Кисловатые плоды его употребляются въ пищу подъ именемъ дикихъ маслинъ или Армянскихъ финиковъ.

E. nepalensis. Л. непальскій. Требуется покрывки на зиму.

E. orientalis. Л. восточный. Тоже.

E. argentea. (E. latifolia. E. glabra. E. macrophylla). Иерусалимская верба. Серебрянное дерево. По-турецки: *Саргу*. У насъ растетъ небольшимъ кустомъ, въ Турціи мы встрѣчаемъ его большимъ деревомъ. Верхняя сторона его листьевъ имѣетъ серебристый видъ. Маленькіе желтые цвѣты, также какъ и самые листья—весьма душисты. На почву не прихотливо. Выносить нашу зиму на открытомъ воздухѣ.

E. Spinosa. *Л. шиповатый.*

E. longipes crispa. Кустарникъ, нижняя поверхность листьевъ сребристая.

E. rotundifolia. Орнаментальное, кустарное растение, съ ниспадающимъ листомъ, снизу сребристо-бѣлымъ, съ красноватыми вѣтвями и маленькими, желтыми цвѣтами.

717. **Elichrysum argenteum.** Оранжевое растение.

Другіе виды: **E. fruticans.** **E. fulgidum.** **E. maritimum.** **E. microphyllum.**

E. bracteatum flore albo. *Безсмертникъ.* Съ бѣлыми, махровыми цвѣтами. Однолѣтнее цвѣточное растение; высѣвается сперва въ плошки или въ парникъ и высаживается въ грунтъ, когда уже нельзя ждать больше морозовъ.

718. **Elodea canadensis.** Водяное, травянистое растение изъ Канады, растущее до того быстро, что въ короткое время затягиваетъ цѣлые пруды.

719. **Elocarpus.** Очень красивое деревце, съ бѣлыми цвѣтами и зазубренными листьями въ видѣ пилы. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается сѣменами и черенками. Требуется вересковую землю пополамъ съ листовною и съ примѣсю четвертой части дерновой.

Виды: **E. cyanocus.** **E. serratus.**

720. **Eloedendron.** Тепличное деревце, съ бѣлыми или желтыми цвѣтами: можетъ расти въ комнатѣ; размножается сѣменами и черенками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей вересковой, дерновой и листовной съ примѣсю небольшого количества песку.

Виды: **E. orientale.** **E. Australe.** **E. croceum.** **E. longifolium.**

721. **Elzholtzia cristata.** *Шандра гребенчатая.* Дикорастущее, однолѣтнее, медоносное растение.

722. **Embotryum coccineum.** Изъ семейства **Proteaceae.** Оранжевое растение со множествомъ ярко-малиновыхъ цвѣтовъ.

723. **Emilia sagittata.** (**Casalia sonchifolia**). Однолѣтнее грун-

товое растеніе, вышиною въ футъ, съ ярко-красными цвѣтами. Сѣется бордюромъ, прямо въ грунтъ, въ обыкновенную садовую землю.

Другой видъ: **E. flammea**. Та же культура.

- 724. Empetrum. Накамникъ.** Дикорастущій по европейскимъ горамъ кустарникъ, размножается сѣменами, отростками и черенками. Любитъ тѣнь.

Другой видъ: **E. nigrum**. *Н. черный. Водяная Вороника.*

- 725. Emryopteris glutinifera.** Индійское растеніе. Изъ плодовъ его выдѣлываютъ клей.

- 726. Encerphalartos.** Изъ семейства Цикадъ. Очень красивое, тепличное и вмѣстѣ комнатное растеніе, съ длинными, жесткими, расположенными букетомъ листьями, иногда покрытыми колючками, или бѣлою пылью; размножается сѣменами и отростками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и песку.

Виды: **E. Wroomii**. Красивое, оранжерейное растеніе, съ толстымъ, чешуйчатымъ стволомъ, изъ котораго выходитъ корона большихъ, перистыхъ листьевъ.

E. horridus. E. Altensteinii. E. Safer. Южно-американское дерево, содержится въ оранжереѣ.

- 727. Eragris.** Оранжерейный, обильно цвѣтущій кустарникъ; размножается сѣменами и черенками. Весьма мелкія сѣмена его высѣваютъ въ Январѣ и въ Февралѣ, въ плошки, землею сѣмень не засыпаютъ а покрываютъ горшокъ стекломъ и ставятъ на поддонъ съ водою. Лишь разовьются сѣмянодоли, растеньице разсаживаютъ и ставятъ въ парникъ; потомъ, черезъ нѣсколько времени его вновь разсаживаютъ въ маленькіе горшки, когда же растеніе достигнетъ высоты дюйма, верхушки прищипываютъ, чтобы заставить растеніе куститься. Осенью его вносятъ въ оранжерею, держатъ въ умѣренной влажности и предохраняютъ отъ плесени.

Черенками это растеніе размножаютъ слѣдующимъ образомъ: берутъ въ Февралѣ или Мартѣ слабые побѣги и сажаютъ въ горшки, на дно которыхъ кладутъ толстый слой черенковъ и слой мху, потомъ насыпаютъ слой вересковой зем-

ли и затѣмъ слой песку, въ который и втыкають черенки. Горшокъ съ черенками покрываютъ стекломъ и защищаютъ отъ солнца.

Вообще Эпакрисы, въ Мартѣ или Февралѣ, пересаживаются въ нѣсколько большіе горшки. Не слѣдуетъ допускать, чтобы у корня растенія застаивалась вода, иначе растеніе гниетъ и гибнетъ. Въ концѣ Мая его вкапываютъ въ открытый песчаный грунтъ, съ горшкомъ. Во время жара растеніе необходимо притѣнять, а потому надъ куртиною съ Епакрисами долженъ быть сдѣланъ стеллажъ; посредствомъ его же защищаютъ растеніе отъ проливнаго дождя. Въ Іюнѣ или Іюлѣ, если Епакрисъ сильно развивается, его вновь должно рассадить. Растеніе зацвѣтетъ на слѣдующую весну. Экземпляры, неимѣющіе бутоновъ, обрѣзываютъ. При уходѣ за Епакрисами строго надлежитъ наблюдать, чтобы растеніе, у котораго показались бутоны, не пересохло, иначе, разъ поблекнувъ, растеніе непременно сронитъ всѣ цвѣточные почки.

Когда растеніе отцвѣтетъ, его сильно обрѣзываютъ и уменьшаютъ поливку недѣли на двѣ, затѣмъ его вновь пересаживаютъ въ нѣсколько меньшіе горшки. Растеніе это не любитъ животнаго перегноя и требуетъ вересковую или болотистую землю съ пескомъ и сильную поливку, чтобы весь его комъ пропитывался водою.

Виды. *E. campanulata*. *Епакрисъ колокольчатый*. Цвѣтетъ раннею зимою, до Мая, бѣлоснѣжными цвѣтами.

E. impressa. Съ ярко-красными или розовыми цвѣтами.

E. impressa ardens. *Надавленная, ярко-красная островершка*. Бываетъ съ цвѣтами бѣлыми, тѣлесными и красными, разныхъ оттѣнковъ. Содержится въ оранжереѣ, ближе къ рамамъ. Любитъ песчанисто-вересковую землю; размножается черенками, дѣлаемыми въ Мартѣ, послѣ того какъ отцвѣтетъ, и посѣвомъ, причемъ, пока не взойдетъ, земля только легко обрызгивается, но не поливается. Лѣтомъ выставляется на воздухъ, на солнечное мѣсто.

E. pungens. *E. venus victris*.

E. grandiflora. Съ ярко-красными цвѣтами, имѣющими бѣловатые концы. Цвѣтетъ весною.

E. miniata. Сурико-шарлаховые цвѣты, съ бѣлыми концами.

E. autumnalis. Съ цвѣтами пунцовыми, по краямъ бѣлыми.

E. purpurescens. Съ розовыми или пурпуровыми цвѣтами.

E. opiculata. Съ бѣлыми цвѣтами, также какъ и: *E. rus-cifolia*. *E. ceraeflora*. *E. sparsa*. *E. obtusifolia*. *E. he-tetonema*. *E. paludosa*. *E. execta*. *E. mucronulata*. *E. alba compacta*. *E. Bride*. *E. candidissima*.

E. onosmaeflora. Съ бѣлыми или красными цвѣтами.

E. microphylla. Съ маленькими, бѣлыми цвѣтами.

E. nivalis. Съ снѣжно-бѣлыми цвѣтами.

E. pulchella. Цвѣты бѣлые съ розовымъ.

E. variabilis. Цвѣты сначала бѣлые, потомъ алые.

E. ardentissima. Съ ярко-кармино-лиловыми цвѣтами.

E. coccinea. Съ шарлаховыми цвѣтами.

E. delicata. Съ цвѣтами нѣжнаго, тѣлеснаго цвѣта.

E. densiflora. Цвѣты нѣжно-алые.

E. flora. Розовые цвѣты.

E. hiacintiflora. Большие, нѣжно-розовые цвѣты.

E. Prinz von Preussen. Бѣлые цвѣты съ черными тычинками.

E. Princesse Royal. Большие розово-фіолетовые цвѣты, съ бѣлыми концами.

E. Lady Alice. Свѣтло-розовые цвѣты.

728. *Ephedra vulgaris*. Степная малина. Дикорастущее.

Другіе виды: *E. distachia*. Оранжевое растение.

E. monostachia. Растетъ въ Сибири. Плоды употребляются въ пищу.

E. altissima. Принадлежитъ къ породѣ хвойныхъ, съ длинными, тонкими, висячими вѣтвями, въ видѣ хвощей безъ листьевъ; размножается преимущественно сѣменами.

729. *Erica*. Хвойное, грунтовое растение, содержится и въ оранжереѣ.

730. *Epidendrum*. Тепличная Орхидея, можетъ воспитываться и въ комнатѣ, съ жесткими листьями и цвѣтами: бѣлыми, желтыми, розовыми, красными или лиловыми, а иногда двухъ или трехъ цвѣтовъ вмѣстѣ. Размножается дѣленіемъ корней, впро-

чемъ требуетъ обыкновенной культуры, свойственной эпифитнымъ Орхидеямъ.

Виды: *E. cochleatum*. *E. cinnabarinum*. *E. folcatum*. *E. glumaceum*. *E. incumbens*. *E. Parkinsii*. *E. Stamfordianum*. *E. odoratissimum*. *E. phoeniceum-vanillosum*. Съ темно-фіолетовыми цвѣтами и розовою губою. Издаетъ сильный, ванилевый запахъ.

E. vittelinum. Съ ярко-красными и желтыми цвѣтами.

E. aurantiacum. *E. gracile*. *E. macrochillum*.

E. atropurpureum. Съ темно-фіолетовыми цвѣтами и розовою нижнею губою, нѣсколько цвѣтковь сидятъ на одной вѣткѣ.

E. variegatum. *E. criniferum*. Съ желтовато-зелеными цвѣтами, имѣющими коричневныя крапинки и черточки; нижняя губа бѣлая.

E. erectum. Съ ярко-розовыми цвѣтами, и глубоко разрѣзанною, бахромчатою губою.

E. Friderici-Guilielmi. Тоже съ темно-карминовыми цвѣтами и бѣлою, у основанія губою.

E. pseudopidendrum. Тоже. Тепличное растеніе, съ зеленоватыми цвѣтами и ярко-оранжево-красною нижнею губою.

E. turialve. Съ очень мелкими цвѣтами.

731. *Epilobium angustifolium*. *Кипрей*. *Иванъ-Чай*. Изъ семейства *Quagrarіæ*. Дикорастущее. Цвѣты темно-розовые, иногда бѣлые. Листья употребляются на поддѣлку чая, изъ нихъ дѣлаютъ такъ называемый *Копорскій чай*.

Другой видъ: *E. hirsutum fol. variegatis*. Многолѣтнее садовое растеніе.

732. *Epimidium*. *Горянка*. Многолѣтнее, садовое растеніе, требующее на зиму покрывки, разводится преимущественно въ горшкахъ и цвѣтетъ въ Апрѣлѣ.

Виды: *E. allinium*. *E. diphyllum*. *E. grandiflorum*. *E. lilacinum*. *E. l. majus*. *E. macranthum*—изъ Японіи. *E. Musschianum*. *E. pinnatum*. *E. versicolor*. *E. violaceum*. *E. v. majus*.

E. rubrum. *Красная Горянка*. Любитъ глинистую, дерновую землю, перемѣшанную съ черноземомъ. Размножается дѣленіемъ корней. Будучи рано поставлено въ оранжереѣ,

цвѣтеть въ Февралѣ и Мартѣ. Наружные листочки цвѣтка красные, внутренніе — желтоватые.

- 733. Epiphyllum.** Тепличное растеніе изъ породы кактусовъ. Выносить комнатную культуру. Его розовые, малиновые или оранжевые цвѣты распускаются въ Ноябрь и Декабрь. Размножается черенками, требуетъ землю, составленную изъ дерновой, лиственной и песку. Растеніе это можно прививать на стебли *Peireskia* и *Cereus*.

Виды: *T. truncatum*. *E. Altensteinii*. *E. Cocineus*. *E. auranciacum*.

- 734. Episcia chontalensis.** (*Cyrtodeira chontalensis*). Изъ семейства Геснерій. Тепличное растеніе, съ листьями ярко-изумрудными по срединѣ и бѣлыми цвѣтами, похожими на цвѣты Ахименесъ.

Другой видъ: *E. bicolor*. Цвѣты малиновые по краямъ, розовые снаружи, желтоватые внутри. Требуется той же культуры, что и Глоксинія.

- 735. Equisetum.** *Хвощъ*. Дикорастущее.

Виды: *E. arvense*. *Пестушки*.

E. hiemale. *Щетъ*.

E. limosum. *Хвощевникъ*.

E. pratense. *Пестовникъ полевой*.

- 736. Eranthemum.** Изъ семейства Акантовыхъ. Тепличное растеніе.

Виды: *E. Sanguinolentum*. Листья съ ярко-красными полосами, по всѣмъ нервамъ. Требуется зимою теплаго и сухаго воздуха.

E. igneum. Листъ росписанъ широкими оранжевыми полосами по нервамъ. Цвѣты небольшіе, желтые.

E. coccineum. Оранжевое растеніе, съ красными цвѣтами и желтыми тычинками. Требуется хорошей земли и частаго опрыскиванія во время роста. Весьма легко размножается черенками, отрѣзаемыми на сочлененіи, также сѣменами. Послѣ того какъ отцвѣтеть, каждый годъ растеніе слегка обрѣзывается. Растеніе содержится въ большой чистотѣ и освобождается отъ нападающей на него кашенили, также

другихъ настькомыхъ, посредствомъ частаго обмыванія листь-евъ.

E. nervosum Цвѣты синіе съ лиловымъ; распускается въ Ноябрь.

E. flavum. *Желтая Бархерія.* Цвѣтетъ около Февраля, но при этомъ необходимо, чтобы лѣтомъ это растеніе стояло на воздухѣ.

E. cinnabarinum ocellatum. Тепличное, полукустарное растеніе, съ цвѣтами темно-карминовыми и бѣлымъ глазкомъ.

737. Eria extingtoria. Маленькая Орхидея, съ бѣловатымъ, пушистымъ цвѣткомъ съ розовыми пятнышками на нижней губѣ.

738. Erica. *Верескъ.* Семейство **Ericaceæ.** Вѣчно зеленый кустарникъ, имѣющій до 200 породъ, изъ которыхъ нѣкоторыя дико произрастаютъ въ лѣсахъ Европы, а другія составляютъ у насъ оранжерейное растеніе.

Вотъ нѣкоторыя изъ породъ дикорастущихъ:

E. arborea. *В. древообразный,* съ сѣроватыми цвѣтами, употребляется на метлы.

E. tetralix. *В. болотный.* Растетъ на низменныхъ и болотистыхъ мѣстахъ.

E. vulgaris. *В. обыкновенный.* Произрастаетъ всюду, на сухихъ и песчаныхъ мѣстахъ.

E. scoparia. *В. винниковатый.* Растетъ на югѣ Европы, на песчаной и тощей почвѣ.

E. cinerea. *В. пепелистый.* Вѣтви и листья покрыты волосками, придающими ему сѣрый видъ.

E. ciliaris. *В. отороченный.*

E. mediteranea. Растетъ по берегамъ Средиземнаго моря.

E. multiflora. *В. многоцвѣтный.*

E. herbacea. *В. травянистый.*

E. vagans. *В. вѣтвистый.*

E. purpurescens. *В. красноватый.*

E. aristata. *В. щетинистый,* съ карминовыми цвѣтами, имѣющими черное кольцо въ зѣвѣ и бѣлымъ сгибомъ.

Оранжерейные виды растенія бываютъ съ мягкими игольчатыми листьями и красивыми бѣлыми, розовыми, малиновыми, желтоватыми или красными цвѣтами. Зимой требуетъ чрезвычайно-равномѣрной поливки, чтобы не залить и не за-

сушить земли, такъ какъ растеніе погибнетъ въ томъ и другомъ случаѣ. Размножается черенками и сѣменамъ; требуетъ вересковую землю, съ примѣсю половинной пропорціи дерновой, пополамъ съ листовенной. Лѣтомъ бережется отъ вѣтра и знойныхъ лучей солнца. Послѣ того какъ отцвѣтетъ, верескъ ежегодно пересаживаютъ въ другіе, но отнюдь не гораздо болѣе просторные горшки, такъ какъ пересадка эта дѣлается собственно для обновленія земли. Многіе виды вереска цвѣтутъ зимою.

E. cavendishiana. Съ желтыми цвѣтами, распускающимися въ Іюнѣ и Іулѣ.

E. elegans var concolor. Съ розовыми цвѣтами.

E. hartnello-hiemalis. Цвѣтки красные съ бѣлыми головками.

E. carnea. Выдерживаетъ зиму на воздухѣ, съ красными или бѣлыми цвѣтами. Можетъ быть доведенъ въ теплицѣ до весьма ранняго цвѣтенія.

E. Turnbahii. Замѣчательная разновидность, цвѣтетъ въ Августѣ и Сентябрѣ, съ длинными карминово-красными цвѣтами.

Виды: **E. Albertii**. **E. baccans**. **E. Blaeria**. **E. Blaeria purpurea**. **E. breviflora**. **E. concinna**. **E. costata superba**. **E. cupressina**. **E. floribunda**. **E. gracilis**. **E. intermedia**. **E. Lambertiana rosea**. **E. mammosa**. **E. melanthera**. **E. nigrita**. **E. Pattersoni**. **E. Pettiepiana**. **E. Pluckenetii**. **E. pubescens major**. **E. rubens**. **E. sebana**. **E. sebana lutea**. **E. tubiflora**. **E. Westphalingia**.

Вообще уходъ за верескомъ очень затруднителенъ. Садовникъ *Классенъ* предлагаетъ слѣдующій способъ содержать его въ холодной оранжерей.

Разводить черенками. Для этого укоренившійся черенокъ сажать въ вершковый горшокъ съ вересковою землею, причемъ, если она недостаточно песчана, то столько подбавить бѣлаго песку, чтобы смѣсь сдѣлалась сѣраго цвѣта. Вскорѣ послѣ пересадки, когда растеніе укоренится, прищипываютъ его, чтобы кустилось и держать его первый мѣсяцъ въ ящикѣ, вкопаннымъ въ песокъ, причемъ часто опрыскивать; черезъ мѣсяцъ провѣтривать ящикъ, отрывая его по утрамъ и вечерамъ на часъ. Для поддержанія влажности въ ящикѣ, ста-

вать въ немъ плошки съ водою, но отнюдь не поливать растенія, хотя бы оно поблекло.

Въ концѣ Августа растеніе переносятъ въ зимнее помѣщеніе и держатъ въ равномерной температурѣ, градусахъ при 6 по Р., непременно въ сухомъ мѣстѣ, какъ можно ближе къ окнамъ. Главное въ это время—поливка: отъ излишней—оно сгніетъ, отъ недостаточной—высохнутъ корни.

Самое опасное для вереска время—это весна, когда солнечные лучи отвѣсно падаютъ въ теплицу, а потому, въ ясные дни, какъ самое растеніе, такъ и мѣсто около него, опрыскивается около полудня; въ оранжереѣ же непременно поддерживаютъ равномерную температуру, отъ 4 до 6°, затапливая печь вскорѣ послѣ полудня. Въ концѣ Апрѣля поливка и опрыскиваніе усиливаются, оранжерея начинаетъ слегка притѣняться и весьма осторожно провѣтривается. Въ это время растеніе находится въ полномъ развитіи, а потому, когда молодые побѣги выростутъ на $\frac{3}{4}$ вершка, ихъ прищипываютъ раза три-четыре. въ этотъ періодъ. Въ началѣ Іюня растеніе опять ставится въ ящикъ и горшокъ зарывается въ песокъ; спустя нѣсколько дней его провѣтриваютъ, а по утрамъ опрыскиваютъ, чтобы песокъ былъ постоянно влажнымъ. Около половины Іюня, послѣдній разъ сощипываютъ вершины молодыхъ побѣговъ и когда совершенно созрѣетъ, растеніе пересаживаютъ въ болѣе сильную землю, прибавляя къ вышепомянутой смѣси, нѣсколько древесной земли; затѣмъ растеніе опять ставятъ въ ящикъ. Послѣ пересадки, въ продолженіи недѣли, ящикъ остается закрытымъ.

Послѣдующею затѣмъ зимою, за верескомъ имѣется тотъ же уходъ, только около половины Іюля, вновь прибавляютъ въ приготовленную для пересадки землю, нѣкоторую часть древесной земли и восьмой процентъ костяной муки.

На 3-й годъ нѣкоторыя породы вересковъ уже цвѣтутъ. Отцвѣтшія растенія подрѣзываютъ и подвергаютъ такому же уходу, какъ и не цвѣтшія. Когда же растеніе послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, такъ разрастется, что не помѣщается въ ящикъ, то его ставятъ лѣтомъ на мѣсто, защищенное отъ сквознаго вѣтра, солнца и сильнаго дождя, но въ совершенно свободный воздухъ.

739. *Erigeron alpinum*. *Еригеронъ альпійскій. Мелколепестникъ*. Изъ семейства *Synantherea*. Многолѣтнее, садовое растеніе. Отцвѣтаетъ въ началѣ лѣта.

Другіе виды: *E. glabellum*. Съ цвѣтами, похожими на астру, лиловыми, съ желтымъ кругомъ. Любитъ легкую землю.

Дикорастущіе виды: *E. draebachensis*. *Горлянка*.

E. canadensis. *Шелмооска*. Съ мелкими цвѣтами.

E. acris. *Пушки*.

740. *Erinus alpinus*. Съ свѣтлопурпуровымъ цвѣткомъ: разводится постоянно въ горшкахъ, а также и сѣянцы, осенью пересаживаемые въ горшки. Будучи содержимо въ оранжереѣ, цвѣтетъ въ Февралѣ или Мартѣ.

741. *Eriocnema*. Тепличное растеніе, изъ семейства Черноустыхъ. Требуется легкой дерновой, очень питательной земли, съ нѣкоторою примѣсью хорошо перепрѣвшаго перегноя; лѣтомъ часто опрыскивается и хорошо провѣтривается.

Виды: *E. marmorata*. Имѣетъ овальные, темно-зеленые листья, нижняя ихъ поверхность съ красно-пурпуровымъ отливомъ, верхняя—съ большими бѣлыми пятнами.

E. aenea. Листья, темно-зеленые, лоснящіеся, съ металлическимъ отливомъ.

742. *Eriococcus gracilis*. Кустарникъ, изъ семейства Молочаевъ, съ маленькими, нѣжными, розовыми цвѣтами.

743. *Eriophorum vaginatum*. *Пушица*. Изъ семейства Суреевъ. Дикорастущее. Сѣмена его покрыты пухомъ, отчего и получило названіе (*erion*—шерсть, *phoreo*—нести).

744. *Eriostemon*. Изъ семейства *Diosmea*. Оранжерейный, вѣчно-зеленый кустарникъ съ бѣлыми цвѣтами, имѣющими пушистыя тычинки. Распускается въ Февралѣ; требуетъ того же ухода, что и акація.

Виды: *E. intermedium*. Съ бѣлыми цвѣтами и желтыми тычинками. Легко размножается черенками

E. linifolium. *E. nerifolium*. *E. myoporoides*.

745. *Erodium cicutarium*. Изъ семейства *Geraniaceae*. *Грабелки*. Дикорастущее.

Другіе виды: **E. serotium**. *Листникъ поздній*. Съ розовыми цвѣтами, многолѣтнее, садовое, грунтовое растеніе.

E. alpinum. *Альпійскій гераній*. Грунтовое растеніе съ фіолетовыми цвѣтами, испещренными пурпуровыми жилками; разводится въ тѣнистыхъ мѣстахъ.

E. gruinum. Однолѣтнее растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ. Фіолетовый цвѣтокъ распускается въ Іюлѣ. Изъ сѣменъ его приготовляются *шпрометры*.

746. **Eryngium alpinum**. *Синеголовникъ альпійскій*. Съ синими цвѣтами, разводится въ садахъ, какъ многолѣтнее растеніе и зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

Другіе виды: **E. amethystinum**. Съ синеватыми цвѣтами. **E. giganteum**.

Дикорастущіе виды: **E. planum**. *Чертополохъ*. **E. campestre**. *Адамова голова*. *Переполошная*.

747. **Erysinum Peroffskianum**. Однолѣтнее, лекарственное растеніе изъ Средней Азіи; вырастаетъ до 2^{1/2} футъ въ вышину, съ темно-оранжевыми цвѣтами; сѣется въ Маѣ, прямо въ грунтъ, бордюромъ. Помогаетъ въ горловыхъ болѣзняхъ.

Другіе виды: **E. cheiranthoides**. *Нарыжная*. Дикорастущее.

E. leptostyllum. *Суръница*. Дикорастущее, двухлѣтнее, медоносное растеніе. Цвѣтетъ въ срединѣ лѣта. Существуютъ нѣкоторые, многолѣтніе виды этого растенія съ душистыми бѣлыми, лиловыми, желтыми или оранжевыми цвѣтами. Размножается посѣвомъ въ Мартѣ. Содержится при самой умѣренной поливкѣ. Можетъ расти въ комнатѣ. Земля для этого растенія должна быть составлена на половину изъ лиственной смѣшанной со второю половиною смѣси изъ дерновой, навозной и песку—всѣхъ поровну.

Виды многолѣтняго Еризинума. **C. orientale** и **C. odoratum**.

748. **Erythraea**. *Золототысячникъ*. Изъ семейства **Gentianae**. Однолѣтнее растеніе, съ красными цвѣтами.

Другой видъ: **E. centaurium**. Дикорастущее. Ярво-розовые цвѣты. Горькія верхушки вѣтвей растенія имѣютъ лекарственные свойства.

749. Erythronium dens canis Бессъ. *Кандыкъ. Собачій зубъ.*

Изъ семейства **Liliaceæ**. Дикорастущее, луковичное растеніе, рано распускающееся цвѣткомъ, снаружи ярко-розовымъ, внутри бѣлымъ. Листья широкіе, ярко-зеленые съ темными пятнами. Разновидности этого растенія бываютъ съ цвѣтами бѣлыми, пурпуровыми и розовыми, съ коричневыми пятнами, а также изкрасна-фіолетовые. Для ранняго цвѣтенія разводится въ оранжереѣ.

Другіе виды: **E. americanum**. Сѣверо-американское растеніе, также какъ и **E. giganteum**. **E. grandiflorum**. **E. nuttalianum**. Бессъ *Нутталл*. Многолѣтнее сѣверо-американское растеніе, съ золотисто-желтыми цвѣтами. Любитъ глинисто-дерновую землю, пополамъ съ торфяною и полузатѣненное мѣстоположеніе. Размножается сѣменами.

E. sibiricum. **E. lanceolatum**.

750. Erythrina. Оранжевое дерево, кустарникъ или травянистое растеніе съ пунцовыми цвѣтами, можетъ расти въ комнатѣ; зимою теряетъ листъ; содержится въ сухомъ мѣстѣ при 4—5° Р.; поливается весьма умеренно; размножается сѣменами, отростками и черенками, требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой, съ примѣсью хорошаго перегноя изъ парниковъ. Въ началѣ Апрѣля, растеніе пересаживается въ означенную землю и ставятъ для выгонки въ теплицу, оставляя на растеніи не болѣе 10 побѣговъ; срубанные побѣги, съ нѣкоторою частью старой древесины идутъ на черенки, которые сажаютъ въ песчаную, вересковую землю и ставятъ въ теплицу. Растеніе держать въ оранжереѣ пока не зацвѣтетъ, а тогда вносить въ комнату или сажаютъ въ грунтъ.

Виды: **E. herbacea**.

E. Crista-galli. *Пышій гребень*. Съ красно-пурпуровыми цвѣтами, можетъ расти въ грунтѣ, но зимою содержится въ оранжереѣ. Требуется сильной поливки въ періодъ полнаго роста. Осенью его вынимаютъ изъ грунта и сажаютъ въ горшки. Размножается въ началѣ весны, молодыми побѣгами, которые нѣсколько разъ пересаживаются, по мѣрѣ развитія.

E. speciosa.

E. castra.

E. corallodendron.

E. compacta. Одинъ изъ лучшихъ видовъ, съ кораллово-красными цвѣтами.

- 751. Escalonia.** Изъ семейства **Saxifragæ.** Красивый оранже-рейный кустарникъ, можетъ расти въ комнатѣ; съ бѣлыми или розовыми цвѣтами; размножается стѣнами, черенками и отводками; требуетъ дерновую землю, съ примѣсью такого же количества вересковой, пополамъ съ листовенной, зимою содер-жится сухо.

Виды: **E. floribunda.**

E. organensis.

E. macrantha съ малиновыми цвѣтами.

E. rubra.

E. grandiflora.

- 752. Eschscholtzia californica.** *Эшольция калифорнійская.* Одно-летнее растение въ 2 фута вышины, имѣетъ сизый цвѣтъ, яркіе золотисто-желтые цвѣты, въ видѣ колокола, цвѣтетъ только при солнцѣ; сѣется въ началѣ Мая въ грунтъ или въ началѣ Апрѣля въ горшки; на почву не прихотливо, поса-жается на солнечную сторону.

Другіе виды: **E. calif. alba.** *Э. бѣлая.*

E. cal. crocea striata. *Э. оранжевая.* Съ темно-оранже-выми цвѣтами.

E. cal. denticulata aurea. Съ бѣлыми цвѣтами.

E. cal. rosea. *Э. розовая.*

E. tenuifolia. Яркіе свѣтло-желтые цвѣты; сѣется въ Ап-рѣль въ горшки съ неудобренною землею, по всходѣ перено-сится въ свѣтлое мѣсто холодной оранжереи; въ концѣ Мая высаживается въ грунтъ, въ неудобренную глинистую землю, смѣшанную съ пескомъ и съ листовенною землею.

E. alba rosea. Съ бѣлыми цвѣтами; снаружи отливающими лиловымъ.

- 753. Espartogras, lygeum spurtum.** *Орѣшная трава.* Днѣо растетъ на западныхъ берегахъ Средиземнаго моря, а также въ Алжирѣ. Изъ этой травы выдѣлываютъ писчую бумагу. Собирается съ Апрѣля до Іюня, причѣмъ не должна быть слишкомъ зелена и перезрѣла.

754. Eucalyptus globulus. Тропическое дерево огромныхъ размѣровъ. Его стали разводить въ южной Европѣ. Содержится въ оранжереѣ.

755. Eucharidium concinnum. Однолѣтнее, некрасивое, грунтовое растеніе.

Другой видъ: **E. grandiflorum.** Грунтовое, но содержится и въ оранжереѣ, съ ярко-красными цвѣтами, распускающимися зимою.

756. Eucharis amazonica. Изъ семейства Амариллисовъ. Тепличное, луковичное растеніе, съ чисто бѣлыми цвѣтами, которые распускаются даже зимою. На лѣто высаживаютъ съ горшкомъ, на открытое, солнечное мѣсто.

Другіе виды: **E. candida.** Съ бѣлыми цвѣтами.

E. grandiflora. Съ большимъ бѣлымъ цвѣткомъ.

757. Eucnide bartonoides. Маленькое однолѣтнее растеніе, съ яркими желтыми цвѣтами, разводится только въ горшкахъ, подъ рамами и не иначе, какъ при хорошемъ солнечномъ освѣщеніи.

758. Eucodonia. Eucodonopsis naegelioides. Изъ семейства Геснерій. Тепличное растеніе, съ цвѣтами формою такими же, какъ и у Геснеріи—розовыми, внутри бѣлыми, испещренными малиновыми пятнышками. Требуется той же культуры, что и Геснерія.

Другой видъ: **E. lilacinella.** Бѣлые цвѣты, расписанные лиловымъ.

759. Euconis punctata. Оранжерейное растеніе.

Другой видъ: **E. striata.** Цвѣтокъ представляетъ собою густой и плотный колосъ.

760. Eugeneissona. Эйейсона. Родъ пальмъ. Безствольное растеніе, извѣстнее у Малайцевъ подъ именемъ „Бертамъ“. Все покрыто колючками. Единственный представитель этого рода: **E. tristis.**

761. Eugenia. Деревце изъ семейства Миртовыхъ, такъ названо въ честь принца Евгенія Савойскаго, покровителя цвѣтовод-

ства. Нѣкоторые виды этого растенія принадлежать къ тепличнымъ, другіе къ оранжерейнымъ растеніямъ. Можетъ существовать и въ комнатѣ. Размножается черенками. Зимой поливается весьма умеренно. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей вересковой, лиственной и дерновой.

Тепличные виды: *E. australis*. *E. pitando*. *E. ternatifolia*.

Оранжерейный видъ: *E. Australis*.

E. ugni. Фруктовый кустарникъ, вывезенный изъ Чили. Ягоды его весьма вкусныя и ароматическія, похожи на вишни, употребляются въ пищу. Кустъ величиною съ смородиновый. Содержится зимою въ оранжереѣ, а на лѣто высаживается на солнечное мѣсто, къ стѣнѣ, по которой развязывается въ шпалеру.

E. micheli. Бразильское дерево; вишнеподобныя ягоды его употребляются въ пищу и для выдѣлки вина.

E. mexicana. Фруктовый кустарникъ съ довольно мелкимъ плодомъ.

762. *Eulophia helleborina*. Орхидея, съ буроватыми цвѣтами, имѣющими блѣдно-розовую нижнюю губу.

763. *Eupatorium cannabinum*. *Сыдачь. Посконникъ.* Изъ семейства *Synanthereae*. Дикорастущее. Разводится въ саду на солнечномъ мѣстѣ, также держится въ горшкахъ для ранней выгонки; будучи взято для выгонки, уже съ почками, оно содержится въ оранжереѣ.

Другіе виды: *E. riparium*. *Посконникъ.* Съ бѣлыми цвѣтами, содержится въ сырой теплицѣ, распускается очень рано.

E. Aya-rapa. *Душистый посконникъ.* Кустарникъ, съ ароматическими листьями. Этому растенію приписываютъ разнообразныя лекарственныя свойства.

E. glabellum. *E. odoratum*. *E. chilensa*. *E. conspicuum*. *E. glechonophyllum*. Грунтовое, кустарное растеніе.

764. *Euphrasia officinalis*. Изъ семейства *Scrophularineae*. *Очная помощь. Очанка аптечная.* Дикорастущее, однолѣтнее, медоносное растеніе. Цвѣтетъ въ Августѣ; цвѣты бѣлые или

лиловые. Считалось лучшимъ средствомъ отъ слѣпоты, отчего и получило названіе. (*Euphraino*—просвѣтлять).

- 765. *Euphorbia marginata*.** Изъ семейства *Euphorbiaceae* Молочаевыхъ. Однолѣтнее, грунтовое растеніе, съ сребристо-бѣлыми цвѣтами; употребляется въ декорационныхъ группахъ; высѣвается въ Апрѣлѣ, въ парникъ.

Другіе виды: *Euphorbia*. *Молочай*. Тепличное и вмѣстѣ комнатное деревце, кустарникъ или травянистое растеніе, съ бѣлымъ, ѣдкимъ сокомъ. Нѣкоторые виды покрыты колючками. Имѣетъ алые или желтые цвѣты, вредные пчеламъ. Размножается сѣменами и черенками; требуетъ легкую, песчанисто-дерновую землю. Лѣтомъ поливается сильно, зимою—мало. Для ранняго цвѣтенія наиболѣе пригодно:

E. fulgens. Съ огненно-красными цвѣтами покрытое шипами. Чтобы заставить его цвѣсти очень рано, его содержать лѣтомъ, въ теченіи двѣхъ мѣсяцевъ, на солнцѣ, а потомъ сажаютъ въ вересковую землю, смѣшанную съ глиною.

E. caput-Medusae. *E. Cyparissias*.

E. splendens. (*Breoni*), *Блестящій молочайникъ*. Любитъ вересковую землю; даетъ алые цвѣты, которые показываются въ Ноябрѣ; стебель покрытъ колючками.

E. punica. *E. pulcherimma*. *E. poinsettia*. *E. jacquiniaeflora*. *E. Zattyris*. *E. nercifolia*. *E. procumbens*. *E. Salicifolia*.

Дикорастущіе виды: *E. heliscopia*. *Солнцеглядъ*.

E. peplus. *Молочай крупнолистный*.

E. Alpina. *Бѣлый мужикъ-корень*.

E. gtacilis. *Кура*.

E. esula. *Молоканка*.

E. litescens. *Сердечное коренье*.

E. palustris. *Молочай болотный*. *Чистотѣлъ*. Растетъ по болотамъ.

V. pallasii. *Торну*.

V. procera. *Одалой*.

V. virgata. *Раминовое зелье*. *М. лозный*.

- 766. *Euphoria*.** Тропическое дерево, съ весьма вкусными плодами, похожими на землянику. Можетъ расти въ комнатѣ. Размно-

жается сѣменами и отводками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: *E. Li—Tchi.*

E. Longana. Лонгинное дерево. Изъ Китая. Мякоть плодовъ его ѣдятъ.

E. Nempheium.

767. *Eurya japonica fol. variegat.* Оранжевое растение, съ крупными цвѣтами.

768. *Euryale ferox.* Изъ семейства *Nymphaeaceae*. Покрыто колючками. Фиолетовый цвѣтокъ. Требуетъ той же культуры, что и *Victoria regia*, только сажается въ корзину и съ нею опускается въ воду.

769. *Burybia nitida.* Вѣтвистый, оранжевый кустарникъ, цвѣтетъ въ Апрѣль и Маѣ; любитъ смѣсь лиственной земли съ глинистою; размножается черенками; сильно прищипывается, чтобы лучше кустилось и сильнѣе цвѣло на слѣдующую весну.

770. *Eustoma exaltatum.* Однолѣтнее растение съ лиловыми цвѣтами. Содержится въ тучной землѣ въ теплицѣ. Высѣвается въ концѣ лѣта, чтобы цвѣло въ концѣ весны; посѣвъ поливается весьма умеренно.

771. *Eutada scandens.* Стручья этого растения достигаютъ 8 футовъ величины; въ нихъ заключаются трердые, гладкія, бураго цвѣта, круглыя сѣмена, толщиною въ $\frac{3}{4}$ дюйма и шириною дюйма въ 2. Изъ этихъ сѣменъ выдѣлываютъ разные вещества.

772. *Eutaxia.* Оранжевое растение, съ желтыми и желто-бурыми, весьма нѣжными цвѣтами; распускается въ Февралѣ.

Виды: *B. myrtifolia. E. Baxteri. E. pungens.*

773. *Euterpe.* Родъ Пальмъ. Тепличное растение. Увядшіе листья его отваливаются. Размножается сѣменами. Изъ этой пальмы добывается напитокъ, извѣстный въ Бразиліи подъ именемъ *Assau.*

Виды: *E. oleraceae. E. edulis. E. sylvestris. E. montana.*

774. *Eutria divaricata.* Однолѣтнее растение съ синимъ цвѣткомъ, высѣвается прямо въ грунтъ, распускается въ Іюль.

775. Eutoca multiflora. Однолѣтнее растеніе, достигающее фута въ вышину, съ блѣдно-синими цвѣтами; даетъ множество сѣменъ, отчего и получило названіе (*Eutocos*—плодоносный). Сѣется въ Апрѣлѣ въ плошки, въ неудобренную землю; послѣ всхода переносится въ холодную оранжерею, а въ концѣ Мая высаживается на солнечное мѣсто, въ грунтъ, на глинисто-песчанистую землю.

Другіе виды: *E. Ortgiesiana*, съ голубыми цвѣтами.

E. viscida. Достигаетъ двухъ футовъ. Съ темно-лазуревыми цвѣтами. На почву не прихотливо. Сѣется въ Апрѣлѣ въ парникъ. Цвѣтетъ съ Іюня до Августа.

E. Wrangeliana. Высаживается въ грунтъ въ Маѣ, бордюрное растеніе, съ ярко-синими цвѣтами.

E. lilacina. Съ лиловыми цвѣтами.

776. Ehasum. Изъ семейства *Gentianeae*. Многолѣтнее, травянистое растеніе, съ красивыми цвѣтами, синими или лиловыми. Можетъ расти въ комнатѣ; размножается сѣменами или отростками; зимою поливается весьма умеренно; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей вересковой, лиственной и дерновой.

Виды: *E. macranthum.* Съ темно-синими цвѣтами въ серединѣ желтыми.

E. Zeylanicum. Цвѣты снаружи голубые, внутри синіе съ темными пятнами и желтыми тычинками и пестиками.

E. tetragonum.

777. Evelina caravata. Тепличная Орхидея цвѣты розовые съ желтымъ волосомъ.

778. Evolvulus purpureo-caeruleus. Маленькое тепличное растеніе со множествомъ мелкихъ синихъ цвѣтовъ, бѣлыхъ въ серединѣ, съ пятью пурпуровыми полосками, выходящими изъ центра. Любитъ плотную землю, напримѣръ дерновую съ вересковою. Лѣтомъ высаживается въ грунтъ и сильно поливается, зимою же поливается въ крайнемъ только случаѣ. Размножается сѣменами, черенками же съ большимъ трудомъ, причемъ ихъ выдерживаютъ подъ стекляннымъ колпакомъ.

779. Evonymus. *Берескледъ.* Изъ семейства *Celastraceae*. Длительнорастущій вѣстарникъ, разводимый для украшеній садовъ и

парковъ. Размножается посѣвомъ сѣмень—осенью, черенками и корневыми отпрысками. Любитъ хорошую нѣсколько влажную почву.

Виды: *E. americanus*. *Б. американскій*. Сохраняетъ листья всю зиму; размножается черенками, на которые употребляются осенью молодыя вѣтки. Содержится въ оранжереѣ.

E. europaeus. *Жигалокъ. Б. европейскій*. Большой кустарникъ съ блѣдно-зелеными съ розовымъ цвѣтами, на тоненькихъ черенкахъ и ядовитыми плодами. Всѣ части этого растенія имѣютъ рвотное свойство, а древесина употребляется въ токарствѣ, и какъ дающая лучший уголь для рисованія.

E. e. fructo albo. *E. e. fructo coccineo*. *Е. Hamiltonianus*. *E. angustifolius*. *E. latifolius*. *Б. широколистный*.

E. verrucosus. *Б. бородавчатый*. Цвѣты сѣроватые съ темно-краснымъ; стволъ покрытъ черноватыми железками или бородавочками.

E. atropurpureus. *Б. темно-красный*. Почти четвероугольныя вѣтви, съ зелеными по нимъ полосками; цвѣты блѣдно-красные.

Оранжерейные виды: *E. fimbriatus fol. variegatus*.

E. radicans fol. ros. variegatus.

E. japonicus fol. variegatus. Цвѣты его имѣютъ запахъ померанцевыхъ.

E. j. var. gracilis. (*E. radicans. E. gracilis*). Съ серебристо-бѣлыми расписными листьями, на весьма тонкихъ, пониклыхъ вѣтвяхъ. Высаженное на лѣто въ грунтъ, пригибается къ землѣ; зимуетъ въ оранжереѣ; размножается черенками.

780. *Fabiana imbricata*. *Желтоватая черепицеобразная Фабiana*. Оранжерейное деревце, съ мясистыми листьями и бѣлыми цвѣтами распускающимися весною. Любитъ вересковую землю.

781. *Fabiana esculentum*. *Греча*. Однолѣтнее, медоносное растеніе, разводимое для сѣменя, которыя употребляются въ пищу, въ видѣ крупы или муки. Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ.

Другой видъ: *F. tataricum*. *Дикуща*. Дикорастущее.

782. *Fagraea obovata*. Изъ семейства *Loganiaceae*. Теплолюбивое

растение, съ большими бѣлыми цвѣтами. Круглый годъ содержится въ теплицѣ, во влажномъ воздухѣ.

Другой видъ: *F. lanceolata*.

783. *Fagus*. *Букъ*. Изъ семейства *Cupuliferae*. Дикорастущее въ южныхъ мѣстностяхъ, большихъ размѣровъ, прекрасное и весьма полезное дерево. Разводится для украшенія парковъ. Въ древнія времена его орѣшки употреблялись въ пищу, отчего дерево это и получило свое названіе. (*Phado*—ѣсть).

Виды: *F. sylvatica*. Обыкновенный *Букъ*. *Б. лѣсной*. Единственная порода, растущая въ Европѣ. Размножается сѣменами. Любитъ землю глинистую въ смѣси съ черноземомъ и пескомъ. Также любитъ известковую почву, но вообще сыроватую. Сладкіе орѣхи его даютъ употребляемое въ пищу масло.

F. atropurpurea. У насъ можетъ разводиться только въ кадкахъ; имѣетъ темнокрасныя листья и корни.

F. sylvestris americana. *Бѣлый букъ*.

F. ferruginea. *Б. желѣзистый*. Съ красною древесиною.

Три послѣдніе вида растутъ въ Америкѣ.

784. *Falcaria carvifolia*. *Анисъ*. Однолѣтнее растение, изъ семейства Зонтичныхъ, разводится на поляхъ и огородахъ; имѣетъ лекарственныя свойства; сѣмена его съ ароматическимъ запахомъ употребляются какъ пряность и для выдѣлки эфирнаго масла.

785. *Farfugium grande*. Изъ семейства *Compositae*. Цвѣты ничтожные, но сердцеобразныя листья, испещренные бѣлыми и желтоватыми пятнами, очень красивы. Любитъ полутѣнь и сырое мѣсто. Размножается дѣленіемъ корней. Можетъ расти на воздухѣ.

786. *Fedra cornu-caprae*. Однолѣтнее, низенькое растение, съ бѣлыми ил красными цвѣтами; высѣвается прямо въ грунтъ. Другой видъ: *F. Algerica*.

787. *Felicia cotuloides*. (*Aster tenellus*). Маленькое, однолѣтнее растение, съ голубыми цвѣтками; выводится въ умѣренномъ парникѣ и потомъ разсаживается въ цвѣтникъ, въ глинисто-дерновую землю.

Другой видъ: *F. tenella*. (*F. affinis*). Съ голубыми цвѣтами.

788. *Ferraria pavonia*. Оранжевое растение.

789. *Feuzlia dianthiflora* или *Gilia dianthiflora*. Травянистое, весьма нѣжное, маленькое кустовое растеніе, покрывается цвѣтами бѣлыми съ темно-фіолетовымъ и блѣдно-розовымъ. Въ началѣ осени высѣвается въ старый парникъ и потомъ высаживается въ плошки въ смѣсь равныхъ частей садовой, вересковой и лиственной земли. Ставится въ оранжереѣ ближе къ свѣту; требуетъ сильнаго провѣтриванія, безъ чего гибнетъ. Въ Мартѣ разсаживается въ горшки, по одиночкѣ и въ Апрѣлѣ пересаживается вновь въ 5-ти-вершковыя горшки. Держится въ оранжереѣ и цвѣтетъ въ Мартѣ.

790. *Ficaria ranunculoides*. Жабникъ. Чистотѣль. Дикорастущее, многолѣтнее растеніе. Листья употребляются какъ салатъ и имѣютъ свойство очищать кровь.

791. *Ficus*. (*Urostigma*). Изъ семейства *Moraceae*. Тепличное и вмѣстѣ комнатное дерево, съ бѣлымъ, молочнымъ сокомъ и лоснящимися листьями, у нѣкоторыхъ, большими овальными, у другихъ сердцевидными, продолговатыми, иногда съ бѣлыми жилками. Размножается черенками и отводками. Требуется земля составленную изъ дерновой, лиственной, и вересковой. Зимой мало поливается.

Виды: *F. princeps*. *F. Neumanii*.

F. venustum. *F. Sub panduraeforme*.

F. religiosum. Изъ него добывается лакъ.

F. elasticum. Одно изъ любимѣйшихъ растений, лицъ, занимающихся комнатнымъ цвѣтоводствомъ. Изъ него добывается гумми-эластикъ. Съ большими продолговато-овальными, толстыми, кожистыми, блестящими листьями.

F. bengalense. *F. Cooperi*. *F. ferrugineum*. *F. nymphaeifolia*. *F. stipulatum*. *F. Suringari*. *F. carricum*. *Фига*. *Фиговое дерево*. *Винная ягода*. *Инжиръ*—по-кавказски. Оранжевое растеніе, можетъ существовать въ комнатѣ. На зиму сбрасываетъ листь и тогда содержится почти сухо. Иметъ своеобразныя формы, пятиконечный листь и даетъ плодъ извѣстный подъ именемъ Винныхъ ягодъ. Размножается черен-

ками и отростками отъ корня. Требуется дерновую землю, пополамъ съ листовною, съ примѣсю небольшого количества вересковой и песку.

F. elegans. Оранжерейное, тепличное растение, съ бархатистымъ стеблемъ и листьями, величиною фута въ 2, снизу серебристо-бѣлыми.

F. lanceolata. Кустарное растение, съ узкими листьями; отлично растетъ въ комнатѣ.

Оранжерейные виды:

F. australis. F. citrifolia. F. cordata. F. infectoria. F. lentiniginosa. F. nitida. F. macrophylla. F. magnoliefolia.

792. Filago. *Блушникъ. Жабникъ.* Изъ семейства **Synanthreae**. Низкая, дикорастущая трава, покрытая волосками, какъ бы бѣлымъ хлопкомъ, отчего и получила свое названіе. (**Filum**—нить, волокно).

793. Fittonia gigantea. *Громадная Фиттонія.* Изъ семейства **Acanthaceae**. Тепличное, декоративное растение, съ листьями, имѣющими красивые, желто-красные разводы и жилки и съ маленькими, желтыми цвѣтами. Быстро и легко размножается черенками. Требуется землю вересковую пополамъ съ глинисто-дерновою.

Можетъ содержаться въ комнатѣ. Лѣтомъ содержится въ затѣненномъ мѣстѣ теплицы.

Другіе виды: **F. argyoneura.** Листья изящно расписаны бѣлыми жилками.

F. gigantea. F. pearcei.

794. Fitz-Roya. Хвойное растение; размножается черенками, на которые рѣжутъ боковые побѣги.

795. Flemingia congesta. Оранжерейное растение.

Другой видъ: **F. semialata.**

796. Foeniculum officinale. *Фенхель или Волохскій укропъ.* Двухлѣтнее медоносное растение. Выбѣленные стебли употребляются какъ салатъ; ботва—какъ зелень; сѣмена—въ аптекахъ и какъ пряность. Высѣвается въ Апрѣлѣ, въ раз-

садникъ и потомъ разсаживается. Цвѣтеть съ Іюня по Августъ. Въ первый годъ, при наступленіи морозовъ, срѣзываютъ растеніе и покрываютъ корни опилками, землею и опавшими листьями. На весну будущаго года, выросшіе стебли покрываютъ землею и тѣмъ ихъ выбѣливаютъ.

797. Forsythia. Изъ семейства Oleaceae. Китайскій кустарникъ, съ золотисто-желтыми цвѣтами. Разводится для украшенія садовъ. На зиму вынимается изъ грунта и сохраняется въ подвалѣ или простѣнѣ оранжереи; распускается раннею весною. Размножается весьма легко черенками, безъ посредства теплички.

Другой видъ: *F. suspensa*. Желтые цвѣты, расписанные зеленымъ.

798. Fragaria. *Земляника.* Многолѣтнее травянистое растеніе, ягоды котораго употребляются въ пищу, съ цвѣтовъ въ Маѣ и Іюнѣ, пчелы берутъ взятки. Растетъ въ дикомъ состояніи; разводится на огородахъ, въ парникахъ и теплицахъ. Почву требуетъ нѣсколько влажную, питательную, но суглинистую, способную удерживать влажность. Мѣсто для земляники должно быть обращенное на востокъ, т. е. нѣсколько затѣненное, преимущественно такое, которое освѣщалось бы дополуденнымъ солнцемъ.

Земляника можетъ разводиться тремя способами: а) дѣленіемъ корней, б) сѣменами и в) отдѣленіемъ и посадкою даваемыхъ ею побѣговъ или усовъ.

Первый изъ этихъ способовъ почти не употребляется, потому что разводимая этимъ способомъ земляника очень мельчаетъ.

Земляника, разводимая сѣменами, даетъ новыя разности, съ этою преимущественно цѣлю и сѣютъ ее. Посѣвъ производится въ Февралѣ, въ холодной оранжерей или въ Мартѣ въ горшки съ дерновою землею, которые ставятъ въ оранжерею. Когда растеніе даетъ второй, листокъ его разсаживаютъ, приучаютъ исподволь къ воздуху и въ Маѣ пересаживаютъ на гряды откуда слѣдующею весною пересаживаютъ на предназначенное для него мѣсто.

Третій изъ вышеупомянутыхъ, есть главнѣйшій способъ размноженія земляники.

Земляника даетъ побѣги весною, преимущественно въ Іюнѣ и Іюлѣ; подѣ эти побѣги или усы, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ образуются на нихъ завязь будущаго растенія, ставятся небольшіе горшки съ землею, въ которой усы прикрѣпляются вилочкою; недѣли черезъ три послѣ того новыя растеніица окоренятся, тогда усы перерѣзываютъ между новымъ и старымъ растеніями и такимъ образомъ имѣютъ въ Іюлѣ или Августѣ растеніе, вполне годное для немедленной пересадки въ грунтъ. Для посадки новыхъ отводковъ земляники, гряды готовятся съ осени; при самой посадкѣ, ихъ только разрыхляютъ и очищаютъ отъ сорныхъ травъ. На грядѣ, шириною въ полтора аршина, сажаютъ землянику въ три ряда, въ полуаршинѣ другъ отъ друга и землю вокругъ кустиковъ обкладываютъ мохомъ, предварительно хорошенько его просушивъ, отчего уничтожаются находящіеся въ немъ улитки и насекомыя, при посадкѣ корень растенія расправляется во всѣ стороны. На зиму земляника покрывается или листомъ, или легкимъ слоемъ перепрѣвшаго навоза, но такъ, чтобы середина кустика не была закрыта навозомъ. Весною листъ или навозъ съ кустовъ земляники снимается и вкапывается тутъ же въ землю, которая вновь покрывается мхомъ, когда растеніе начнетъ зацвѣтать, въ предохраненіе земляники отъ грязи и для приданія ей надлежащаго вида, а также для поддержанія равномерной влаги въ почвѣ. Все лѣто гряды держать въ чистотѣ; у растеній, отъ которыхъ хотятъ имѣть плоды, обрѣзаютъ усы, а у предназначенныхъ къ разведенію посредствомъ отводковъ или усовъ—цѣточные ножки; причемъ принято за правило усы для разведенія оставлять у земляники только на третій годъ ея существованія.

Такого же ухода земляника требуетъ и въ послѣдующіе годы. На третій годъ она обильно даетъ лучшія ягоды. Послѣ трехъ лѣтъ роста, т. е. на четвертый годъ осенью, ее выбрасываютъ и потому, въ виду этого обстоятельства, всегда надлежитъ имѣть запасъ молодыхъ отводковъ, для періодическаго обновленія грядъ.

Весною всѣ старыя листья земляники обрѣзываются; въ сухое время она требуетъ частой поливки, а до разцвѣта и осенью послѣ уборки, на нее отлично дѣйствуетъ поливка жидкимъ удобреніемъ.

Есть разные способы ранней выгонки земляники:

1) Годовалыя растенія высаживаютъ въ Августѣ изъ грунта въ горшки, съ землею, составленною изъ двухъ частей лиственной, части глинистой и части перепрѣвшей—навозной. Горшки ставятъ въ тѣнь. Когда морозы дойдутъ градусовъ до 3-хъ горшки ставятъ въ защиту отъ дождя, а когда морозы усилятся, горшки переносятъ въ холодную оранжерею или подвалы, тутъ ихъ держатъ сухо, а если и поливаютъ то такъ, чтобы только не погибли; затѣмъ растеніе приставляютъ къ росту тремя способами:

а) Ранняя пристановка дѣлается въ Декабрѣ. Для этого ставятъ горшки поближе къ рамамъ, въ оранжереѣ или овощной тепличкѣ. Температуру, въ которой держатъ растеніе, постепенно повышаютъ отъ 7 до 12° Р. При этомъ, чѣмъ теплѣе держатъ растеніе, тѣмъ сильнѣе его поливаютъ, а въ ясные дни, подъ вечеръ, опрыскиваютъ, когда же зацвѣтетъ, то въ теплые часы дня провѣтриваютъ.

б) Средняя пристановка дѣлается въ Мартѣ, въ парникѣ, съ насыпанными въ него опилками, въ которыя врываютъ растеніе такъ, чтобы оно было какъ можно ближе къ стекламъ, но не касаясь ихъ; постоянно поливаютъ, чтобы горшки никогда не высыхали. Когда растеніе станетъ подростать, его осаживаютъ ниже, когда же оно разросется и начнетъ тѣснить другъ друга, часть растений переносятъ въ другой парникъ; поливаютъ растеніе сильнѣе когда тепло, не затѣняютъ, но много провѣтриваютъ.

в) Поздняя пристановка, ускоряющая развитіе ягодъ мѣсяцемъ раньше противъ воздушнаго, дѣлается въ холодномъ парникѣ, въ который растеніе ставится въ горшкахъ съ осени. При наступленіи сильныхъ морозовъ растеніе закрываютъ мохомъ, на парникъ накладываютъ доски и заваливаютъ снѣгомъ. Въ половинѣ Марта снѣгъ съ досокъ счищаютъ, парникъ обкладываютъ навозомъ и покрываютъ рамами; чтобы согрѣть растеніе, навозъ возобновляютъ а горшки зарываютъ на $\frac{1}{4}$ аршина въ землю.

2) Слѣдующій способъ ранней выгонки земляники предлагается Люкасомъ (Огородничество, пер. Капновскаго, Москва 1861 г.)

Въ Юлѣ или Августѣ, сажаютъ въ горшки съ плодородною глинисто-песчаною землею, годовалые сѣменные кустики земляники, преимущественно *мѣсной* или сильные отводки *виригинской* земляники; растеніямъ этимъ даютъ укорениться въ тѣнистомъ мѣстѣ, а черезъ 14 дней выставляютъ на солнце гдѣ и держатъ ихъ до зимы. Затѣмъ растеніе ставятъ въ подвалъ или въ старые парники, гдѣ и держатъ до половины Февраля, тогда ихъ зарываютъ въ неслишкомъ теплые парники, поближе къ рамамъ, въ половинѣ Марта земляникѣ должно зацвѣсти. Въ это время горшкамъ не даютъ просыхать и парники хорошо провѣтриваютъ. Когда завяжутся плоды, горшки переносятъ въ новый, болѣе теплый парникъ, гдѣ при надлежащемъ уходѣ, въ половинѣ Апрѣля получаютъ зрѣлыя ягоды.

3) Рего (Руководство къ изученію садоводства и огородничества, 1866 г.) предлагаетъ слѣдующій способъ ранней выгонки клубники (тоже что земляники).

Ранней выгонкѣ подвергаютъ 2-хъ-лѣтніе кусты клубники. Молодые растенія, разведенныя раннимъ лѣтомъ отъ усовъ, пересаживаютъ на особую гряду, размѣщая ихъ на 4 вершка другъ отъ друга и выращиваютъ здѣсь до ранней осени будущаго года, очищая лѣтомъ отъ сорныхъ травъ, обрывая усы и цвѣты, а на зиму покрывая навозомъ. Рано осенью эту клубнику, пересадивъ въ горшки, ставятъ на 10 дней въ парникъ и потомъ сохраняютъ зимою въ подвалѣ.

Въ теплицѣ эти растенія приставляютъ въ началѣ Февраля, а безъ теплицы въ концѣ мѣсяца. Приставляя растеніе, очищаютъ его отъ гнилыхъ листьевъ и стеблей, землю въ горшкахъ покрываютъ снѣгомъ и температуру постепенно увеличиваютъ до 10° Р. Горшки ставятъ ближе къ свѣту и даютъ имъ больше воздуха; если же появится лиственная вошь очищаютъ перомъ и кисточкою, но отнюдь не окуриваютъ табакомъ. Отбѣгаютъ растенія только во время цвѣтенія, уменьшая при этомъ теплоту до 8° Р., но зато давая больше свѣжаго воздуха; послѣ цвѣтенія температуру вновь увеличиваютъ до 16° Р., а растеніе поливаютъ навозною жижею съ водою. Цвѣточные стебли привязываютъ къ колышкамъ. До цвѣтенія растеніе часто опрыскиваютъ теплою водою, во время цвѣта только землю содержать влажною, но растеніе не опрыскиваютъ. Ягоды будутъ черезъ 3 мѣсяца послѣ пристановки.

Для ранней же выгонки, клубнику разводят и на грядахъ слѣдующимъ образомъ. Гряду съ крѣпкою двухлѣтнею клубникою, разведенною на хорошей тучной землѣ; осенью обставляютъ досками. Когда земля замерзнетъ на нѣсколько вершковъ, растеніе покрываютъ еловыми вѣтками, а по мѣрѣ увеличенія мороза листьями и снѣгомъ и обкладываютъ гряду навозомъ. Здѣсь растеніе должно прозимовать такъ, чтобы земля на грядѣ и вокругъ нея не слишкомъ глубоко промерзла. Весною когда уже солнце начнетъ сильно грѣть, гряду обкладываютъ свѣжимъ конскимъ навозомъ и надъ досками кладутъ парниковыя рамы, покрывая ихъ на ночь ставнями и щитами. Такимъ способомъ клубника получится тремя недѣлями раньше разводимой на грядахъ.

4) Нѣкимъ Гергесомъ, предлагается совершенно особый способъ разведенія земляники на тощей почвѣ:

Для новой гряды выкапывается потребное пространство, фута въ $1\frac{1}{2}$ глубины; на выровненное дно кладется толстый слой коровьяго навоза, на него другой слой листы, а сверху наваливается земля. Землянику сажаютъ на эту гряду въ Августѣ, а еще лучше весною; даютъ расти, не обрѣзывая усовъ, пока она густо закроетъ всю гряду и держать ее въ такомъ видѣ до 8 лѣтъ, т. е. до-тѣхъ-поръ, пока малоурожайность, слабый ростъ и вымерзаніе кустовъ, не укажутъ на необходимость пересадки растенія. При этомъ рано весною посыпается земля вокругъ кустовъ роговыми обрѣзками и наблюдается, чтобы по вечерамъ, при продолжительной засухѣ во время цвѣтенія, до созрѣванія ягодъ, земляника достаточно поливалась.

Наиболѣе пригодною для ранней пристановки считается *мыслинная земляника* **Reine de fraise**.

Затѣмъ, слѣдуя Мауреру, описавшему различные сорта земляники (въ сочиненіи своемъ „**Beerenobst unserer Garten 1858**“) по извѣстному англійскому садоводу Барнэ,—называютъ семь главнѣйшихъ сортовъ земляники, а именно:

1) **Fragaria Virginiana**. *Алая земляника*. Имѣетъ листья почти гладкіе, темно-зеленныя, весьма тонкіе, острозубчатые, кисловатые, безъ аромата. Къ этому классу причисляются самыя ранніе сорта. Лучшіе изъ нихъ:

a) **Scharlotte Strawberry**. Ягода шаровидная, пурпуровая.

б) **Roseberry Strawberry.** Ягода коническая, темно-красная.

в) **Knight's large scarlet Strawberry.** Кругловатая ягода, кошенилевого цвѣта, съ бѣлымъ мясомъ, цвѣтетъ позже другихъ сортовъ этого класса.

2) **E. nigra.** *З. черная.* Маленькіе, кудрявые, свѣтло-зеленые листья; ягоды коническія, темно-бурья, почти черныя, очень ароматическія; сорта самые нѣжные на зиму требуютъ покрывки; листья остаются на зиму; кусты сильно разрастаются; цвѣтутъ поздно. Изъ этого класса болѣе замѣчательны:

а) **Downton.** *З. Доунтонская.* Ягоды большія, яйцевидныя, весьма темныя, съ мясомъ темнымъ, темно-краснымъ; листья на темно-красныхъ стебелькахъ, большіе, эллиптическіе, свѣтло-зеленые.

б) **Elton's seedling.** *З. Эльтонская.* Большая, яйцевидная, темно-красная сочная ягода; листья темно-зеленые, яйцевидные, нѣсколько волосистые.

3) **F. grandiflora.** *З. Ананасная.* Листья темно-зеленые, гладкіе, съ крѣпкими тупыми зубчиками по краямъ; большая, бѣловатая, сладкая ягода; требуетъ болѣе тяжелой почвы и солнечнаго мѣста. Лучшіе сорта:

1) **Rostock strawberry.** Ананасная, большая, круглая ягода съ твердымъ, свѣтло-краснымъ мясомъ, съ маленькими овальными листьями. Очень плодovита.

II) **Chinesse strawberry.** *З. Китайская.* Крѣпкая, сжатая ягода; блестящіе выпуклые листья.

III) **Dutch strawberry.** *З. Голандская.* Большая, круглая, блестящая ягода; маленькій, блестящій, темно-зеленый листъ.

IV) **White Carolina strawberry.** *З. Бѣлая Каролинская.* Ягода круглая, бѣловатая или чисто-бѣлая, большіе, темно-зеленые, плоскіе, блестящіе листья.

4) **F. Chilensis.** *З. Хилійская.* Съ острыми волосистыми листьями; большія, бѣловатая ягода; сильно разрастается, предпочитаетъ сухую почву; постоянно надлежитъ обрывать усы и вырѣзывать часть листьевъ. Лучшіе сорта:

аа) *Собственно Хилійская.* **Chili straw.** Ягода неправильной, яйцевидной формы, буроватая; мясо кисловатое, твердое, почти бѣлое; созреваетъ поздно.

6) *Jelcow l'hili straw*. 3. *Хилійская желтая*. Такая же ягода, какъ у предыдущей, но желтоватая, съ желтымъ мясомъ.

5) *F. elatior*. *Высокостебельная клубника*. Ягоды средней величины, свѣтло-красныя въ точкахъ; листья большіе, темно-зеленые, кудрявые, требуютъ низменной, влажной мѣстности. Лучшие сорта:

аа) *Common Hautbois*. *Обыкновенная мускусовая или малиновая клубника*. Коническая ягода, съ бѣлымъ, водянистымъ мясомъ, малиноваго запаха; самая высокорослая.

bb) *Globe Hautbois*. *Шаровидная, мускусовая клубника*. Очена плодовая, съ маленькими шаровидными ягодами, мясо зеленоватое, листья продолговатые, волосистые.

6) *F. collina*. *F. viridis*. 3. *Зеленая*. Маленькіе кусты съ свѣтло-зелеными листьями; шаровидныя, свѣтлыя ягоды; похожа на лѣсную и любитъ тѣнистое мѣсто и влажную почву. Сорта ея:

А. *Кавказская*. Мелкія, круглыя, зеленоватыя ягоды, превосходнаго вкуса.

Б. *Пенсильванская*. Личевидныя, мелкія, водянистыя ягоды.

В. *Шведскія*. *F. pratensis*.

Г. *Французская*. *F. bifera*.

Д. *Нѣмецкая*. *F. heterophylla*.

Три послѣдніе сорта, по маловажности, почти вовсе не разводятся.

и 7) *F. semperflorens*. *F. vesca*.

Лѣсная или Альпійская клубника.

Мелкія, шаровидныя, бѣловатыя ягоды, испещренныя точками; кусты преимущественно безъ усомъ; плодовая; любитъ легкую почву и тѣнистое мѣсто.

Сорты ея:

А. Собственно *F. semperflorens* мѣсячная клубника, даетъ красноватыя ягоды все лѣто.

В. Тоже *fructo alba*, *бѣлая*. Ягоды продолговатыя, совершенно бѣлыя, при хорошемъ уходѣ, ягоды бываютъ очень крупны. Кусты безъ усомъ.

Люкас признаетъ слѣдующіе сорта земляники, наиболѣе заслуживающими разведенія, какъ самыя лучшіе и плодороднѣйшіе.

1) *Ранніе:*

Аяксъ. Очень крупная ягода, которыхъ идетъ 9 на фунтъ.
Кремонъ. Екселенсъ (Le roi).

La constance. Нью-Седдлингъ. (Miamma). Princesse Royal очень ранній сортъ, нѣсколько кисловатый.

2) *Средніе:*

M. garri. Belle bordelaise. Surpize. Леопольдъ. Ранній сортъ. Ярко красная ароматическая ягода. *Triomphe. Prolific. (Haut bois). Ananas perpetuel.*

3) *Поздніе:*

Пиктонъ Седлингъ. Fertil d'Anger. Голафъ (Кидлея). Королевская.

Новѣйшіе садоводы и сѣменоторговцы указываютъ также, какъ на лучшіе, новѣйшіе сорта клубники, на слѣдующіе: *Ambrosia*—очень крупная и сочная. *Beauty of England. Biicton Pine.* Крупная, очень плодородная, ягода бѣлая.

Biicton new Pine. British queen. Boule d'or. Carniola magna. Duk of Brabant. Eliza. (Myatt). Весьма крупная и плодородная.

Duc de Malakoff. Чрезвычайно крупная, пурпуровая, ранняя и очень вкусная.

Exellente. Красная, круглая ягода, очень плодородный сортъ. *Huntboym monstrueuse. Imperatrice Eugenie.*

La reine. Очень длинная ягода, розовато-бѣлая, очень вкусная.
Monstrueuse de Robine. Очень крупная.

Nec plus ultra. Почти черная, очень твердая, крупная.

Prince imperial. Royal Victoria. Swaistone Seedling. Очень крупная ягода. *Sir Harry Orange,* и многіе другіе.

F. Collina. Клубника. Отличается отъ земляники болѣе пушистыми листьями и не столь сочными, какъ земляника, но болѣе ароматическими ягодами. Культура ея та же, что и земляники, только сажается на мѣсто болѣе открытое, въ почву болѣе рыхлую, и для лучшаго плодоношенія требуетъ болѣе удобренія.

799. Franciscana. Изъ семейства *Scrophulariaceae*. Тепличное растеніе, прекрасно и обильно цвѣтетъ въ комнатѣ. Любитъ глинисто-дерновую землю и свѣтлое мѣсто. На дно горшка

кладется много черешковъ, чтобы не застывалась вода. Размножается черенками.

Виды: **F. acuminata**. Маленькій кустикъ съ зеленовато-коричневою корою; на верхушкѣ вѣтви распускается букетъ прекрасныхъ, фіолетовыхъ цвѣтовъ, все дѣлающихся свѣтлѣе и наконецъ переходящихъ въ бѣлый цвѣтъ.

F. confertiflora. **F. hydrangeaeformis**. **F. Horreana**. **F. eximia**. Очень хорошо цвѣтетъ зимою, свѣтлофіолетовыми цвѣтами, которые постепенно блѣднѣютъ и дѣлаются совершенно бѣлыми. **F. Calycina**.

800. Francoa appendiculata. Многолѣтнее растеніе, на лѣто высаживается въ грунтъ, а зимою собирается въ подвалъ или оранжерею.

Другіе виды: **F. ramosa**.

F. sonchifolia. Оранжевое растеніе.

801. Fraxinus. Ясень. Изъ семейства **Obineae**. Прекрасное, дикорастущее, въ болѣе теплыхъ мѣстностяхъ дерево, разводимое въ садахъ и паркахъ. Цвѣтетъ въ началѣ Мая; съ цвѣтовъ его пчелы берутъ взятку. Имѣетъ разнообразное примѣненіе въ столярствѣ. Размножается посѣвомъ, посадкою, отпрысками и прививкою.

Виды: **F. americana alba**. Бѣлый Американскій ясень. Прекрасное дерево переноситъ наши зимы.

F. angustifolia. **F. aucubaefolia**. Листья покрыты желтыми пятнами.

F. cinerea. **F. coarctata**. **F. carolina**. Я. Каролинскій.

F. crispa. Невысокій кустарникъ.

F. excelsior. Я. обыкновенный. Падубъ. Одно изъ наиболее полезныхъ деревьевъ.

F. imbricaria. **F. paniculata**. **F. scolopendra**. **F. periptera**. Я. крылатый.

F. exelsia aurea. Я. золотистый. Съ золотисто-желтою корою. Очень чувствительное дерево.

F. e. verrucosa. Тоже, боится морозовъ.

F. juglandifolia. Я. зеленющій. Американская порода.

F. leutiscifolia. Я. Алескій. Въ Европѣ разводится только въ садахъ.

F. nana. Я. низкорослый.

F. ornus. Я. цвѣтушій — манный. Растетъ преимущественно въ Италіи, съ него собираютъ такъ называемую манну.

F. pendula. Я. висячій. Съ пониклыми вѣтвями. Переносить нашу зиму.

F. rotundifolia. Я. круглолистный.

F. sambucifolia. Я. бузинолистный. Американская порода; листья, если ихъ потерѣть, издають запахъ бузины.

F. scolopendrum. **F. simplicifolia.**

F. oxyphylla. Паясень.

F. mandschurica. Растетъ въ Уссурійскомъ краѣ.

F. viridis. Я. зеленый.

F. parvifolia. Я. мелколистный. Низкорослое дерево. Сѣверо-американская порода, у насъ разводится въ садахъ.

F. tomentosa. Я. пушистый. Американская порода; нижняя поверхность листьевъ — пушистая.

F. quadrangulata. Я. синій. Я. четвероугольный. Американская порода.

802. Frenella. Изящное, шаровидное, хвойное растеніе, размножается черенками.

Болѣе красивые виды:

F. triquetra. (*Cupressus australis*).

F. robusta. **F. Hugellii.**

803. Fritillaria pudica. Стыдливая фриттилярія. Рябчикъ.

Изъ семейства *Liliaceae*. Маленькое, луковичное, грунтовое растеніе съ темнорозоватымъ цвѣткомъ; распускается раннею весною.

Другіе виды: **F. meleagris.** Рябчикъ. Цвѣтокъ похожъ на опрокинутый тюльпанъ, покрытый черными и желтыми полосками, расположенными какъ рисунокъ шахматной доски, отчего и получило свое названіе (*fritillus* — шахматная доска). Имѣетъ до 50 разновидностей. Подвергается ранней выгонкѣ и для того луковички вынимаются изъ грунта, въ Августѣ, сажаются въ горшочки штукъ по пяти, до наступленія морозовъ держать вкопанными съ горшками, въ землю и потомъ переносить въ оранжерею или погребъ. Развитія своего, цвѣтокъ

долженъ достигать въ теплицѣ, приче́мъ распускается въ Февралѣ.

F. Kamtschatscensis. *Камчатская сарана.* Цвѣты почти черные. Въ Камчаткѣ ѣдятъ эту луковицу.

F. Imperialis. *Венечникъ Царскій.* Многолѣтнее грунтовое, садовое растение. Для ранней выгонки, большія луковицы этого растенія сажаютъ въ горшки по одиночкѣ и закапываютъ въ землю; съ наступленіемъ морозовъ вносятъ въ холодную оранжерею или подвалъ. Когда на растеніи появятся почки его ставятъ въ свѣтлое мѣсто оранжереи или въ комнату, въ тепло же ставятъ передъ самымъ раскрытіемъ цвѣтка. Пересаживается растеніе одинъ разъ въ три—четыре года.

F. lutea. Можетъ цвѣсти ранѣе всѣхъ другихъ сортовъ.

804. Fuchsia. *Фуксія.* Изъ семейства *Oenotherae*. Оранжерейное деревцо или кустовое растеніе, съ прекрасными, висячими цвѣтами, простыми или махровыми. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается черенками; зимою теряетъ листь и содержится въ подвалѣ, холодной комнатѣ, или оранжерей, сзади другихъ растеній, почти сухо. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Лѣтомъ служитъ украшеніемъ клумбъ. Для усиленія его роста и цвѣта, изрѣдка поливается растворомъ столярнаго клея или навозною жижею.

Нѣкоторые сорта Фуксіи, напримѣръ **F. fulgens**, **F. coscinopea**, могутъ быть доведены до цвѣта очень раннею весною, а именно — въ Мартѣ и Апрѣлѣ. Для этого съ Августа почти вовсе прекращаютъ поливку растенія, срѣзаютъ его вѣтви до половины и держатъ его въ холодномъ мѣстѣ, сухо, до конца Ноября, потомъ, въ Декабрѣ, пересаживаютъ ихъ въ свѣжую, питательную, навозную землю, обрызываютъ засохшія вѣтки до свѣжаго дерева, ставятъ въ теплицу на сильно освѣщенное мѣсто, или въ теплый парникъ, умеренно поливаютъ и часто вспрыскиваютъ. Если горшки стоятъ тѣсно, то Фуксіи, время отъ времени поворачиваютъ разными сторонами къ свѣту, чтобы растеніе равномерно, со всѣхъ сторонъ, было покрыто листьями и цвѣтами. Едва цвѣточные бутонны начнутъ окрашиваться, Фуксіи переносятъ въ холодную оранжерею. Растенія эти, тотчасъ послѣ того какъ

отцвѣтутъ, высаживаются въ грунтъ, гдѣ и продолжаютъ опять цвѣсти все лѣто. Буде же Фуксіи желаютъ оставить цвѣтущими въ горшкахъ, то ихъ только вновь пересаживаютъ.

Чтобы продолжить цвѣтеніе Фуксій съ осени, молодыя, крѣпкія растенія пересаживаютъ, вторично, въ Августѣ, держать до наступленія холодныхъ утренниковъ на воздухъ и затѣмъ переносить въ оранжерею, гдѣ они долго продолжаютъ цвѣсти, при температурѣ 8° Р.

Вообще лучшимъ уходомъ за Фуксіями считается слѣдующій:

Въ половинѣ Февраля пересаживаютъ молодыя растенія, въ горшки нѣсколько большаго размѣра, чѣмъ тѣ, въ которыхъ онѣ доселѣ сидѣли; поврежденные корни тщательно отдѣляются; земля дается, составленная изъ 1 части дерновой, 1 части лиственной и 1 части песку. Держать на свѣтломъ мѣстѣ въ оранжерей при 10—12 гр. Р. Побѣги, развивающіеся отъ корня, отщипываютъ, равно какъ и показывающіеся первое время въ узлахъ листьевъ. Черезъ 3 недѣли растеніе вновь пересаживается въ нѣсколько большіе горшки. Боковые побѣги уже не срѣзаются, а черезъ 4 недѣли растеніе опять пересаживаютъ въ такую же землю, какъ и прежде, но съ примѣсью нѣкоторой части коровьяго навоза.

Черезъ 6 недѣль растеніе пересаживается вновь въ горшки на 2 вершка шире прежнихъ. На дно горшка кладется толстый слой черепковъ, слой торфяника и слой роговыхъ стружекъ. Первые почки, на вершинѣ растенія, обрываютъ, чтобы не останавливать роста растенія, но когда вѣтки достаточно окрѣпли, почки уже не срываютъ и растеніе понемногу приучаютъ къ воздуху. Около половины Іюля растеніе поливается растворомъ гуано или куриного помета.

Нѣкоторыя виды Фуксій, какъ напримѣръ: *Glory*, *Lady of the Lake*, *Waterlily*, *Carinata*, очень бываютъ красивы, выведенные въ подвѣсныхъ корзинахъ.

E. macrantha съ весьма длинными розовыми цвѣтами. Оранжерейное растеніе, осенью выносятся на воздухъ, размножается черенками.

F. miniata. Съ длинными красными цвѣтами.

Виды Фуксій имѣютъ множество разновидностей; изъ нихъ болѣе обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія, изъ существующихъ у насъ въ продажѣ:

A) Съ простыми цвѣтами.

Aeidalie. Тѣлеснаго цвѣта, вѣнчикъ пурпуровый.

Aurora superba. Свѣтло-пунцовая, вѣнчикъ оранжевый.

Charles Huber. Бѣлая, вѣнчикъ серизовый.

Erecta. Тѣлеснаго цвѣта, вѣнчикъ лиловый.

Evangeline. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ, пурпуровый, испещренный фіолетовымъ.

Fée de Rhin. Бѣлая, вѣнчикъ розово-фіолетовый.

Emperor. Темнокоралловаго цвѣта, вѣнчикъ фіолетовый.

Francois de Vos. Серизовый, вѣнчикъ фіолетовый съ красными разводами.

Fürst Schwarzenberg. Карминаваго цвѣта, вѣнчикъ серизово-корминовый.

Gloire de Nees. Тѣлеснаго цвѣта, вѣнчикъ розовый и бѣлый.

Gouverneur Baker. Свѣтло-коралловаго цвѣта, вѣнчикъ серизово-фіолетовый.

Lady Heysterbury. Блѣдно-розовая, вѣнчикъ пурпуровый.

La Traviata. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ лилово-розовый.

M-me Wagner. Бѣлая, вѣнчикъ розовый, въ краяхъ темнѣе.

Marvellous. Коралло-карминаваго цвѣта, вѣнчикъ фіолетово-розовый.

Presid. Paillard. Свѣтло-карминаваго цвѣта, вѣнчикъ карминово-лиловый.

Prince Regent. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ кроваво-красный.

Reviver. Свѣтло-коралловаго цвѣта, вѣнчикъ серизово-фіолетовый.

Roderick Dhu. Карминаваго цвѣта, вѣнчикъ ярко-розово-лиловый.

Rose of Castille. Тѣлеснаго цвѣта, вѣнчикъ красно-фіолетовый.

Tricolore. Тѣлеснаго цвѣта, вѣнчикъ фіолетово-розовый.

Venus de Medicis. Розовая, вѣнчикъ свѣтло-фіолетовый.

F. Splendens. Цвѣты красные съ зеленымъ.

F. spectabilis. Съ пунцовыми цвѣтами.

F. sessiliflora. Съ опушенными вѣтвями, кустарникъ съ ярко-краснымъ стеблемъ и маленькими пурпуровыми трубеами цвѣтовъ и крово-красными лепестками.

Фукси съ махровыми цвѣтами.

Agamemnon. Карминоваго цвѣта, вѣнчикъ фіолетовый и красный.

Empereur de Fuchsias. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ бѣлый.

Erzherzogin Marie Therese. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ фіолетовый съ красными полосками.

F. Nigricans. Цвѣты темно-фіолетовые внутри, и малиновые снаружи.

F. Corymbiflora alba. Бѣлая, длинная, вѣнчикъ пурпуровый.

Francois Desbois. Пурпуровая, вѣнчикъ амарантовый.

Hercules. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ темносиній.

Globosa multiflora. Карминоваго цвѣта, вѣнчикъ темно-голубой.

Goliath. Карминоваго цвѣта, вѣнчикъ голубой.

Gustav Heitz. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ фіолетовый съ красными полосками.

La gloire. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ лиловый.

Louis Ingelrest. Серизоваго цвѣта, вѣнчикъ тѣлеснаго цвѣта.

Queen Victoria. Малиновый цвѣтокъ, вѣнчикъ бѣлый.

Prince Albert. Малиновый цвѣтокъ, вѣнчикъ синій.

Lord Clyde. Цвѣтокъ красный, вѣнчикъ розовый съ голубыми полосками и пятнами.

M-me Cornelisen.

Marie Cornelisen. } Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ бѣлый.

Majestica.

M-me Cambier. Карминоваго цвѣта, вѣнчикъ бѣлый.

M-me Vander Oувeland. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ фіолетовый.

Serratipetala. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ темно-фіолетовый.

Seratifolia. Листья на розовыхъ черенкахъ, розовый нервъ во всю длину лицевой стороны листа. Большие махровые цвѣты съ зелеными кончиками наружныхъ лепестковъ.

Souvenir de la Reine. Вѣнчикъ красный. Основаніе цвѣта пурпуровое, кончики бѣлые съ зеленымъ.

Souvenir. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ фіолетовый, съ красными полосками.

Schwan. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ бѣлый.

F. venusta. Съ длинными крупными пунцовыми цвѣтами съ зелеными на кончикахъ наружными цвѣточными лепестками.

Souvenir de Gendbrügge. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ фіолетово-голубой.

Spiritus infernalis. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ голубой съ красными полосками.

Surpasse vainqueur de Puebla. Коралловаго цвѣта, вѣнчикъ бѣлый съ красными струйками.

Willh. Stelzner. Пурпуроваго цвѣта, вѣнчикъ фіолетово-амарантовый.

F. arborescens var. syringeflora. Цвѣты розовые кистью, какъ цвѣты сирени. Зимой держится въ просторномъ сосудѣ въ теплицѣ, гдѣ будетъ цвѣсть зимою; на лѣто высаживается въ грунтъ, въ тучную глубоко перекопанную землю; требуетъ сильной въ это время поливки; размножается черенками, на которые рѣжутъ вѣтки у сочлененій.

F. solferino. Цвѣтовъ пурпуровый, вѣнчикъ весьма широкій и махровый темно-фіолетоваго цвѣта.

805. Fumaria officinalis. *Кокорышъ. Полевая рута. Дымянка колосистая.* Многолѣтнее садовое растеніе (см. *Corydalis*).

Другіе виды: **F. spicata.**

F. nobilis.

F. bulbosa. *Луковичная.*

Дымянка. Грунтовое, садовое растеніе, съ бѣлыми или пурпуровыми цвѣтами; любитъ тѣнистое мѣсто.

806. Funkia coerulea ovata (Hemerocallis japonica coerulea foliis albu marginatis). *Японскіе, пестролистныя птышки.* Долголѣтнее растеніе, зимующее въ грунту, гдѣ на зиму хорошо покрывается листьями. Маленькіе цвѣтки съ бѣлыми и лиловыми полосками; темнозеленые листья, достигающіе величины фута, имѣютъ бѣлыя коймы. Любитъ хорошую почву и полузатѣненное мѣсто, размножается дѣленіемъ корней.

Другіе виды: **F. lancifolia**, съ фіолетовыми цвѣтами; листья меньше, чѣмъ у предыдущаго вида и не такъ яркиспещрены.

F. cucullata. Тоже съ лиловыми цвѣтами.

F. indulata. Съ совершенно бѣлыми листьями, окаймлен-

ными зеленою полоскою по краямъ; имѣть синіе цвѣты; на зиму требуетъ сильной покрывки.

F. subcordata. Съ сизыми листьями и свѣтлоголубыми цвѣтами. Зимой требуетъ надежной покрывки.

F. ovata. *S. albo marginata*. *S. Sieboldii*. *S. japonica*. Съ синими цвѣтами.

F. lancifolia alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

F. grandiflora. Съ большими, бѣлоснѣжными, ароматическими цвѣтами. При его посадкѣ подъ растеніемъ нѣсколько дренируется земля, такъ какъ *Функия* не любитъ застоя воды у корней, поэтому же растеніе осенью вовсе не поливается. Размноженіе легко производится осенью или раннею весною раздѣленіемъ корневища.

807. *Gaillardia pulchella*. Изъ семейства *Compositae*. Однолѣтнее растеніе, достигающее двухъ футовъ, съ желтыми, пурпуровыми, болѣе или менѣе свѣтлыми, или бѣлыми цвѣтами. Высѣвается въ Мартъ въ плошки, ставится въ умѣренной теплицѣ; всходы разсаживаются, а потомъ въ концѣ Мая, высаживаются въ грунтъ, на солнечное мѣсто, цвѣтеть все лѣто. Если его посѣять въ Іюль, прозимуетъ въ оранжереѣ. Требуется рыхлой, питательной земли.

Другіе виды: *G. picta*. Однолѣтнее растеніе, содержится въ оранжереѣ, съ красными или малиновыми цвѣтами—съ желтою опушкою, цвѣтеть все лѣто.

G. grandiflora. Съ весьма большимъ цвѣткомъ; цвѣтокъ этотъ въ серединѣ совершенно темный, далѣе краеснооранжевый и къ краямъ свѣтло-оранжевый.

G. aristata. *Гайлардія остистая*. Многолѣтне садовое растеніе, также какъ и слѣдующіе три вида: *G. bicolor*. *Г. двуцвѣтная*. *G. lanceolata*. *Г. узколистная* и *G. Richardsoni*.

G. bossclaria. *G. marginata*. *G. coccinea*. *G. Smeathmanni*. *G. Buffolor*. *G. magnifica*.

808. *Gagea lutea*. Изъ семейства *Liliaceae*. Съ желтыми цвѣтами.

809 *Galactodendron utile*. *Молочное дерево*. Тропическое дерево. Изъ подрѣзаннаго ствола его, вытекаетъ сокъ въ видѣ коровьяго молока, употребляемый въ пищу.

810. *Galanthus nivalis*. *Подснежникъ*. Изъ семейства *Amarillideae*. Многолѣтнее, грунтовое, луковичное садовое растеніе, съ бѣлыми цвѣтами, отчего и получило свое названіе (*Gala* — молоко, *Anthous* — цвѣтокъ), на югѣ Россіи растетъ въ дикомъ состояніи по червоульсю. При содержаніи въ грунтѣ надлежитъ, каждыя три года, пересаживать луковицу, какъ только завянетъ ея листь. Любитъ питательную землю. Цвѣтеть въ Февралѣ, прямо изъ-подъ снѣга, но въ теплой мѣстности можетъ цвѣсти въ Январѣ, не любитъ высокой температуры.
811. *Galathea pacifica*. Тепличное растеніе. Имѣетъ широкій листь, похожій на листь Маранты, ярко-зеленый снаружи, испещренный болѣе свѣтлыми жилками и каштановый съ изнанки.
812. *Galatella Meyendorffii*. Многолѣтнее, съ блѣдно-голубыми цвѣтами, довольствуется всякою почвою.
813. *Galega orientalis*. *Козлятникъ восточный*. Многолѣтнее садовое растеніе.
Другой видъ: *G. officinalis*. *Козьякъ*. *К.* обыкновенный. Тоже, съ голубыми или бѣлыми цвѣтами — колосомъ. Цвѣтеть въ Іюнѣ или Іюлѣ, въ грунтѣ. На почву неприхотливо. Увѣряютъ что коровы и козы, питаясь этимъ растеніемъ, даютъ болѣе молока, отчего оно и получило свое названіе (*Gala* — молоко).
814. *Galeobdolon luteum fol. variegat.* (*Galeobsis galeobdolon*). Изъ семейства *Labiatae*. *Зеленчукъ*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтеть съ половины Мая до срединѣ Іюня. Издастъ запахъ, напоминающій запахъ хорека, отчего и получило названіе (*Gale* — хорекъ. *Udolos* — вонь). Видъ: *G. luteum*. *Зеленчукъ желтый*. Цвѣты желтые съ бурными пятнами на нижней губѣ.
815. *Galinsogea trilobata*. Однолѣтнее растеніе высѣвается прямо въ грунтъ. Желтоватый цвѣтокъ распускается въ Іюлѣ.
816. *Galium palustre*. *Подмаренникъ*. Изъ семейства *Stellatae*. Дикорастущее, многолѣтнее растеніе, корень его употребляется какъ красивое вещество.

Другіе виды: *G. uliginosum*. *Повелица*. Съ бѣлыми цвѣтами.

G. Saturejaefolium. *Кициль—Буялг*.

G. boreale. *Матура*. *Цвѣты бѣлые.

G. Aparine. *Дерябка*. *Цѣпкій Подмаренникъ*.

G. mollugo. *Мякій Подмаренникъ*. Красный корень его замѣняетъ Марену.

G. rubioides. *Подмаренникъ*. Съ бѣлыми цвѣтами.

G. verum. *Подмаренникъ настоящий*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ среди лѣта. Желтые цвѣты его служатъ для окраски въ желтый цвѣтъ.

817. *Galphimia*. Съ желтыми цвѣтами, распускается въ теплицѣ, въ началѣ зимы.

Виды: *G. glauca*. *G. hirsuta*. *G. mollis*.

818. *Garcinia*. Семейство *Garciniæ* — Гуммигутовые. Красивое Американское дерево, съ розовыми или малиновыми цвѣтами, похожими на розу; можетъ расти въ комнатѣ; размножается сѣменами и черенками; требуетъ землю, составленную изъ дерновой пополамъ съ листовною и съ примѣсью небольшого количества вересковой.

Виды: *G. Mangostana*. Даетъ вкусные плоды, лучшіе изъ всѣхъ азіатскихъ плодовъ, формою похожіе на яблоки.

G. gambogia. Даетъ желтый, смолистый сокъ, извѣстный въ числѣ желтыхъ красокъ, подъ именемъ „Гумми-Гута“.

819. *Gardenia*. Изъ семейства *Rubiaceæ*. Тепличное и вмѣстѣ комнатное кустовое растеніе, съ большими бѣлыми, полумахровыми или махровыми душистыми цвѣтами, иногда съ розовыми полосками, размножается черенками, которые сажаются въ смѣсь бѣлаго песку съ вересковою землею, въ маленький горшокъ, покрытый стеклянныи колпакомъ и поставленный въ жаркую тепличку. Молодое растеніе требуетъ частой пересадки. Растеніе любитъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и листовной; любитъ влажный воздухъ, но требуетъ чтобы горшокъ, въ которомъ оно сидитъ, былъ хорошо дренированъ черепками.

Существуетъ другой способъ ухода за этимъ растеніемъ, а именно: на зиму его ставятъ въ оранжерею въ 6° Р., въ

Мартъ пересаживаютъ въ смѣсь четырехъ частей дерновой земли съ одною частію лиственной и шестю частью песку, причѣмъ величину горшка соразмѣряютъ съ величиною корневыхъ пишекъ. Растеніе ставятъ въ теплицу, зарывъ до краевъ горшка въ древесныя опилки, гдѣ должна постоянно сохраняться умѣренная теплота.

Виды: *G. florida*. Съ большими, бѣлыми, въ послѣдствіи нѣсколько желтѣющими, весьма душистыми цвѣтами. Чтобы цвѣла ее надо выгонять въ штабѣ, а вести кустарникомъ и держать въ сильномъ теплѣ и влажности. Во время цвѣтенія ее надо переносить въ оранжерею, чтобы цвѣты ея долѣе сохранялись, не желтѣли и не вали.

G. globosa. Съ бѣлыми цвѣтами и довольно узкими листьями.

G. florida flore pleno. Съ большими бѣлыми махровыми душистыми цвѣтами.

G. Stanleyana. Большой бѣлый цвѣтокъ, на фіолетовой ножкѣ, внутри испещренный лиловыми и зелеными черточками и полосками.

G. devoniana. Формою цвѣтокъ похожъ на цвѣтокъ предыдущаго вида.

G. amoena. Цвѣты бѣлые, съ розовыми полосками на оборотѣ.

G. malleifera. Съ большимъ бѣлымъ цвѣткомъ. Можетъ образовать довольно большой кустарникъ.

G. citriodora. Съ мелкими, желтоватыми цвѣтами.

G. lucida. *G. latifolia*. *G. Thunbergia*.

820. *Gardoquia. Hookeri.* *Гордоквія пунцовая*. Травянистый кустарникъ, съ красными цвѣтами. Распускается въ Ноябрь.

Другой видъ: *G. betonicaefolia*. Съ фіолетовыми цвѣтами. Распускается въ Августѣ.

821. *Garrya Macfidiana*. Оранжерейное растеніе.

822. *Gastronema sanguineum flammeum*. Изъ семейства Амариллисовъ. Оранжерейное, луковичное, низкорослое растеніе, съ краснокарминовыми цвѣтами и ярко-желтыми пыльниками.

Другой видъ: *G. clavatum*. Цвѣтокъ бѣлый, съ малиновою полоскою на каждомъ лепесткѣ. Листья шнуровидные.

823. *Gaura Lindleyana*. Оранжевое растение.

Другие виды: *G. Lindheimeria*. Однолетнее растение; высевается прежде в парник, потом пересаживается в грунт; дает белые цветы.

G. biennis. Двухлетнее грунтовое растение, с розовыми цветами; зимует на открытом воздухе.

824. *Gaussia*. Род Пальм. Достигает размера дерева. Имеет гладкий стебель. Листья сверху зеленые, снизу синеватые. Размножается семенами.

Известен один только вид этого растения: *G. princeps*. (*G. ghiesbreghtii orendoxa*).

825. *Geissomeria longiflora*. Кустарник с огне-красными цветами; требует частой обрезки, цветет в Октябре и Ноябре. Тотчас после того как отцветет, кустарник обрезывается, корни очищаются от земли и заворачиваются в мох; когда корни дадут новые побеги, их сажают в горшки.

826. *Geissorhiza grandis*. Многолетнее, оранжевое растение, с цветами желто-соломенного цвета, с карминовой полоской в центре.

827. *Gelasine azurea*. Луковичное растение из семейства *Iridaceae*. С темносиними, испещренными, у центра, белыми и черными черточками, цветком. Содержится в холодном парнике до прекращения морозов. Требует тучного компоста, возобновляемого каждые два—три года. Размножается семенами или молодыми луковицами.

828. *Genetyllis macrostegya*. Из семейства *Myrtaceae*. Оранжевое растение, с темно-пунцовыми цветами.

Другой вид: *G. tulipifera*. Желтые, с красными узорами цветы, похожи на опрокинутые тюльпаны.

829. *Genipa americana*. Бразильское растение с вкусными плодами.

830. *Genista*. Дрок. Из семейства *Papilionaceae*. Дикорастущий, медоносный кустарник, с желтыми цветами, разводится

въ садахъ и паркахъ; изъ него добывается краска. Размножается посѣвомъ осенью, дѣленіемъ кустовъ и отпрысками.

Виды: *G. pilosa plena*. Д. волосистый махровый. Небольшой, стелющійся кустарникъ, съ желтыми, махровыми цвѣтами.

G. scoraria. Д. въичный. Принимается на всякой почвѣ; содержится и въ оранжереѣ.

G. abdida. Съ бѣлыми цвѣтами; на зиму требуетъ защиты.

G. juncea. Д. Испанскій. Кустарникъ съ желтыми цвѣтами; растетъ на безплодныхъ, сухихъ мѣстахъ.

G. tinctoria. Д. Красильный. Съ желтыми цвѣтами. Вѣтви и цвѣты употребляются для краски въ желтый цвѣтъ.

G. sagittalis. Д. Крылатый. Малорослый кустарникъ, съ желтыми цвѣтами.

G. germanica. Д. Германскій и *G. anglica*. Д. Англійскій. Кустарники едва достигающіе 2-хъ футъ.

Оранжерейные виды: *G. Canariensis*. *G. Candicans*. *G. florida*. Могутъ расти и въ грунту, при надежной покрывкѣ.

831. Genoma. Тепличная Пальма, требуетъ одной культуры съ прочими Пальмами. Размножается сѣменами.

Виды: *G. fenestralis*. *G. Ghiesbreghtiana*. *G. magnifica*.

832. Gentiana. Горечавка. Семейство *Gentianaceae*. Многолѣтнее, дикорастущее и грунтовое садовое растеніе.

Виды: *G. asclepiades*. Г. горная. Цвѣтетъ осенью, до конца Сентября; съ бѣлыми и синеватыми, полосатыми, цвѣтами.

G. adscendens. Г. Сибирская.

G. punctata. Г. Пятнистая.

G. semptemxida. Г. Семипраздънная. Цвѣты синіе внутри, желтые у центра.

G. lutea. Г. желтая. Дикорастущее въ лѣсахъ лекарственное растеніе.

G. acaulis (aevalis). Г. безстебельная. Съ синеватыми цвѣтами, распускающимися въ началѣ весны. Осенью высаживается въ горшки, содержится въ теплицѣ и цвѣтетъ, начиная съ Февраля; размножается сѣменами и дѣленіемъ.

G. cruciata. Лихоманникъ. Многолѣтнее растеніе, съ синими цвѣтами; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

G. hybrida. Тоже съ бѣлыми цвѣтами.

G. macrophylla. *Звѣрбой крестовой*. Многолѣтнее растеніе, съ свѣтлосиними цвѣтами, зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

G. pneumonanthe. *Морскіе колокольчики*. Темнолазоревые цвѣты.

G. bavarica. Съ темно-синими цвѣтами. Лѣтомъ надлежитъ защищать отъ прямыхъ лучей солнца, зимою — отъ излишней сырости, чтобы не загнили корни. Землю требуетъ вересковую, смѣшанную съ листовною и пескомъ. Обыкновенно это растеніе разводятъ въ маленькихъ горшкахъ, чтобы во время постоянныхъ и сильныхъ дождей, предохранить можно было растеніе отъ гнилости.

G. fortunea. Съ синими цвѣтами, испещренными бѣлыми точками.

Дикорастущіе виды: *G. barbata*. *Дикдѣ*.

G. amarella. *Стародубка*.

G. campestris. *Змѣевникъ*.

G. decumbens. *Звѣрбой*.

833. *Geonoma*. Родъ Пальмъ. Нѣкоторые виды вовсе не имѣютъ стволовъ; у нѣкоторыхъ видовъ листья не болѣе фута; нѣкоторые же имѣютъ листья 6 и болѣе футовъ. Размножается сѣменами.

Виды: *G. Seemanni*. Низкорослая тепличная пальма, замѣчательная, въ молодомъ возрастѣ характеромъ листьевъ: пластинки листьевъ двулопастныя и лопасти эти представляютъ собою видъ рыбьихъ хвостовъ.

G. pomila. *G. Speciosa*. *G. Shottiana*. Съ прямымъ стволомъ.

834. *Geranium pratense*. *Журавлиникъ Луговой*. *Луговая Герань*. Семейство *Geraniaceae*. Получило названіе отъ имени Аиста — *Geranos*, по сходству плодниковъ съ клювомъ этой птицы. Многолѣтнее дикорастущее и садовое растеніе.

Другіе виды: *G. p. flore pleno*. *Ж. Махровый*.

G. p. Striatum. *Ж. полосатый*.

G. Sanguineum. *Ж. красный*.

G. macrorhizon. *G. anemonoides. fol. varieg.* Требуется сильной покрывки на зиму.

G. canariense. Тоже.

G. Sylvaticum. Болотникъ.

- 835. *Gerardia quercifolia.*** *Герардія дуболистная.* Красивое, многолѣтнее растеніе, съ колокольчатыми, большими, ярко желтыми цвѣтами.

Другой видъ: *G. pedicularia.* *Герардія. Медовая трава.* Многолѣтнее растеніе, ниже предыдущаго, но сильнѣе его вѣтвится, съ мелкими, желто-лимонными цвѣтами. Оба вида любятъ рыхлую землю; размножается сѣменами.

- 836. *Gerontegia.*** Маленькое, травянистое растеніе; даетъ, въ свѣтломъ мѣстѣ теплицы, множество бѣленькихъ цвѣточковъ. Весною разводится изъ черенковъ; пересаживается въ горшки или грунтъ и потомъ, въ Сентябрѣ, вновь высаживается въ горшки, либо оставляется въ грунту до морозовъ. Старыя растенія лѣтомъ срѣзываются. Требуется легкая, питательная почва, состоящая изъ песчанистой лиственной или лѣсной земли, смѣшанной съ вересковою или торфяною.

- 837. *Gesnera elongata.*** Кустарникъ съ оранжево-красными, бархатистыми цвѣтами, распускающимися отъ Ноября до весны. Послѣ того какъ отцвѣтетъ тотчасъ срѣзывается.

- 838. *Gesneria.*** Семейство *Gesneriaceae.* Тепличное, корневое, травянистое растеніе. Цвѣтетъ и въ комнатѣ. Пушистые, точно бархатные, овально заостренные или сердцевидные листья, у нѣкоторыхъ видовъ съ малиновыми жилками и разводами. Цвѣты душистые; малиновые, бѣлые, красные, разныхъ оттѣнковъ. Размножается дѣленіемъ луковицъ, листьями, т. е. черенками. На черенки употребляются листья: ихъ сажаютъ или цѣльные или разрѣзываютъ предварительно на части и каждую сажаютъ особо. Зимой корневая бульба содержится въ сухой землѣ. Лѣтомъ растеніе требуетъ сильной поливки. Землю любитъ вересковую пополамъ съ лиственною.

Виды: *G. Gardneri.* Маленькіе пунцовые цвѣты.

G. Cinnabarina. Огненно-красные цвѣты.

G. Chromatella. Желтые цвѣты.

G. Cymosa. Цвѣты бѣлые, съ розовыми и желтыми тѣнями.

G. Lindleyana. Цвѣты снаружи розовые съ желтымъ, внутри желтые, испещренные малиновыми крапинками.

G. punctatissima. Цвѣты снаружи розовые съ желтымъ, въ серединѣ розовато-желтые, испещренные малиновыми пятнышками.

G. Leopoldii. Цвѣты ярко-красные, листья, съ изнанки, малиновые.

G. Gereltiana. Цвѣты испещренные пунцовымъ и желтымъ.

G. lobulata. Огненно-красные цвѣты.

G. (naegellia) Sceptre cerise. Съ большою группою серизовыхъ, испещренныхъ цвѣтовъ, на высокомъ стеблѣ. Листья весьма красивые, впадающіе въ темно-фіолетовый цвѣтъ, съ зеленою каймою.

G. Donkellaria. *G. purpurea*. *G. Douglasii*. *G. Bigrandularia conspicua*. *G. B. citrina amarantina*. *G. eucadonia naegiloides*. *G. e. lilacinella*. *G. e. Ehrenbergii*. *G. tubiflora alba*. *G. magnifica*. *G. maerantha*. *G. Zebrina*. *G. albiflora*. *G. bulbosa*. *G. caracasana*. *G. Cooperi*. *G. faucialis*. *G. gracilis*. *G. lateritia*. *G. longifolia*. *G. spicata*. *G. souttoni*.

839. *Geum coccineum*. *Гравилотъ алый*. Изъ семейства *Rosaceae*. Многолѣтнее, грунтовое садовое растеніе, съ красными цвѣтами.

Другіе виды: *G. montanum*. *Г. Горный*.

G. urbanum. *Вышникъ*. *Б. Городской*.

Дикорастущая трава, съ желтыми, стоячими, цвѣтами. Корень имѣетъ лекарственныя свойства.

G. strictum. *Баранки*. Дикорастущее.

G. rivale. *Собакиха*. *Г. прирѣчный*. Со свѣщенными, красноватыми цвѣтами.

G. splendens. Оранжевое растеніе.

840. *Gilia* (*Leptosiphon*). Изъ семейства *polemoniaceae*. Однолѣтнее, низкорослое растеніе, съ яркими цвѣтами. Высѣвается въ началѣ Апрѣля въ горшки, или въ концѣ мѣсяца, прямо въ грунтъ, въ песчанистую, черноземную, пережъпанную съ глиною землю. Не терпитъ навоза.

Виды: *G. lutea*. (*Z. lutea*. *Z. aureus*. *Z. hybrida*).

Лучшій изъ видовъ этого растенія имѣетъ лежащій, расходящійся во всѣ стороны стебель; цвѣты ярко-желтые, оранжевые, или переходящіе въ красноватый.

G. coronopifolia var. *Carneo—lutea*. Цвѣты желтые съ розовымъ. Размножается сѣменами; разсаживается какъ только взойдетъ и выдерживается зиму въ оранжереѣ, причемъ ему необходимо давать много свѣжаго воздуха. Весною растеніе срѣзываютъ, оставляя не болѣе въ футъ величины, тогда оно даетъ новыя побѣги и разцвѣтаетъ въ Іюлѣ.

G. Cutea var. *rosea*. *Желтая Гилія*. Съ розовыми цвѣтами. Маленькое, красивое, однолѣтнее растеніе, высѣвается въ началѣ Апрѣля, въ плошки, въ теплицѣ. Разсаживается въ маленькіе горшки и въ концѣ Мая высаживается въ грунтъ, въ рыхлую, песчанистую землю, на солнечное мѣсто; употребляется для бордюровъ.

G. androsacea. (*Z. androsaceus*). Нѣжно-тѣлеснаго цвѣта.

G. a. album. Съ бѣлыми цвѣтами.

G. californica. Съ розовыми цвѣтами.

G. Denciflora. Съ свѣтло-красными цвѣтами.

G. capitata. Съ голубыми цвѣтами. Высѣвается въ Апрѣлѣ прямо въ грунтъ.

G. s. alba. Тоже съ бѣлыми цвѣтами.

G. achillefolia. (*G. multicaulis*). Съ темно-синими цвѣтами. Высѣвается въ Мартѣ въ горшки или парникъ, либо въ Апрѣлѣ прямо въ грунтъ.

G. tricolor. Съ прямымъ стеблемъ; съ свѣтло-голубыми цвѣтами, имѣющими желтый зѣвъ. Бордюрное растеніе.

G. Dianthoides. (*Sentia dianthiflora*). Маленькое деревное растеніе, съ розоватыми цвѣтами.

G. laciniata. Бордюрное растеніе.

G. linifolia. *Гилія съ цвѣтами льна*. Бордюрное растеніе, высѣвается тотчасъ по оттаяніи земли, въ рыхлую садовую почву, даетъ обильныя, бѣлыя цвѣты, напоминающіе цвѣтокъ льна.

G. nivalis. *G. splendens*. (*Tricolor rosea*). Тоже съ бѣлыми цвѣтами.

G. heterophylla. Оранжерейное растеніе.

841. *Gladiolus*. *Шпажникъ*. *Гладиолусъ*. Изъ семейства *Irideae*. Луковичное растеніе, съ большими цвѣтами сидящими на стеблѣ другъ надъ другомъ, въ видѣ колоса, которые бываютъ бѣлыя, розовыя, алыя и пестрыя.

Культура этого растения слѣдующая: въ Мартѣ сажаютъ луковицы въ трехъ-вершковыя горшки, въ смѣсь дерновой земли съ навозною и съ незначительною прибавкою песку; горшокъ ставится въ темное мѣсто, безъ поливки, лишь бы земля была сыровата. Въ Апрѣлѣ луковицы тронутся въ ростъ, тогда ихъ слѣдуетъ полить, (лучше настоемъ коровьяго навоза) и поставить ближе къ свѣту, въ оранжереѣ, приучая постепенно къ воздуху, а потомъ перенести въ холодный парникъ; при недостаткѣ свѣта и въ теплѣ вытянется и дастъ блѣдныя листья. Въ началѣ Юня, Гладіолусъ сажаетъ въ грунтъ группами, отнюдь не въ глинистую почву, въ ямки, въ которыя подкидываются горсти по двѣ хорошо перепрѣвшаго коровьяго навоза. Требуется ежедневной поливки во время цвѣтенія. Осенью, когда листья начнутъ желтѣть, луковицы вынимаются изъ грунта, отрѣзается стебель, въ разстояніи вершка или двухъ отъ луковицы и она высушивается въ комнатѣ; затѣмъ, завернувъ каждую луковицу отдѣльно въ бумагу, сохраняютъ ихъ въ холодномъ, сухомъ мѣстѣ. Вынимая луковицу изъ земли, надлежитъ беречь крошечныя луковки—онѣ зацвѣтутъ на третій годъ.

Существуетъ въ продажѣ множество разновидностей Гладіолуса. Перечислимъ главнѣйшія:

Achille,—розовый съ бѣлыми полосами въ серединѣ.

Adamson,—крупный цвѣтокъ розовый, амарантовый и карминовый.

Ad. Broignar,—розовый съ оранжевыми полосами и краснымъ отливомъ.

Agathe,—большой цвѣтокъ розовый, кармино-оранжевый съ желтыми крапинами.

Alexandre,—ярко-красный.

Armide,—крупный бѣлый цвѣтокъ съ розовымъ отливомъ и крапинами.

Anais,—бѣлый, лиловатый цвѣтокъ, испещренный крапинами.

Antonius,—серизовый съ карминовымъ и бѣлымъ.

Archimede,—ярко-карминовый, середина оттѣнена желтымъ.

Argus,—пламенно-красный съ бѣлою серединою.

Aristide,—оранжево-пурпуровый, середина желтая.

Belle Gabrièle, — лилово-розовый, съ легкимъ ярко-розовымъ отливомъ.

Bérénice, — розовый, съ пурпуровыми разводами.

Bernard de Pallisy, — серизовый съ розовыми разводами по бѣлому фону.

Berthe Rabourdin, — бѣлый, испещренный розовымъ съ карминовыми полосками.

Bijou, — вишнево-оранжевый, съ ярко-красными полосками.

Buffon, — ярко-красный.

Calendulacens, — ярко-пурпуровый съ желтою серединою.

Calypso, — съ розовыми полосками, испещренный карминовымъ.

Canari, — ярко-желтый съ розовыми полосками.

Cardinal, — алый, испещренный фиолетовымъ.

Cerès, — чисто бѣлый, испещренный лилово-розовымъ.

Charles Dickens, — розовый шамуа, съ розово-карминовыми полосками.

Cherubini, — бѣлый, съ легкимъ фиолетово-карминовымъ оттѣнкомъ.

Circée, — розовый, впадающій въ лиловый съ карминовымъ оттѣнкомъ.

Comte de Morny, — темный, розово-вишневый, испещренный бѣлымъ, съ фиолетовыми полосами.

Cuvier, — темно-амарантовый, съ пурпуровымъ.

Daphné, — мѣдно-красный, съ кормозинными полосками.

De Candolle, — свѣтло-вишневый, съ краснымъ отливомъ и розовыми полосками.

Delicatissima, — бѣлый, съ кармино-лиловыми краями и полосками.

Diane, — тѣлеснаго цвѣта, испещренная кармозиннымъ по бѣлому фону.

Don Juan, — темно-карминоваго цвѣта, съ темно-красными полосками и желтою серединою.

D-r Lindley, — нѣжно-розовый цвѣтокъ, оттѣненный розовымъ, съ вишневымъ отливомъ.

D-r. Marjolin, — розовый съ карминовыми полосками.

Duc de Malakoff, — оранжево-пламенно-красный, съ бѣло-желтою серединою.

Edith,—нѣжно-розовый, отороченный темно-розовымъ, середина бѣловатая.

Eldorado,—чисто желтый, внутреннія части покрыты красными черточками.

Elisabeth,—большіе темно-розовые цвѣтки, съ пурпуровыми крапинками и полосками.

Etendart,—бѣлый съ лиловымъ и голубовато-фіолетовымъ.

Endulia,—бѣлый съ фіолетовымъ, съ внутренней стороны бѣлыя черточки.

Eugène Scribe,—нѣжно-розовый съ красно-коралловымъ.

Euridica,—чисто бѣлый съ розовымъ и ярко-карминовымъ.

Fanny Roujet,—кирпично-розовый съ лиловою серединою.

Fénélon,—нѣжно-розовый, съ фіолетовымъ и карминовымъ.

Flore,—бѣлый съ розовымъ оттѣнкомъ, съ большимъ ярко-розовымъ пятномъ.

Galathée,—свѣтло-желтый, съ болѣе свѣтлыми краями и розово-лиловыми черточками.

Galilée,—ярко-розовый, съ темно-кармозиновымъ.

Gil Blas,—свѣтло-кирпично-красный, съ вишневыми пятнами.

Goliath,—мѣдно-розовый, съ темно-пурпуровыми черточками и розовою серединою.

Henriette,—бѣлый, испещренный лиловымъ.

Homère,—свѣтло-амарантовый съ пурпуровымъ.

Horace,—пурпуровый съ большими бѣлыми пятнами.

Impératrice,—бѣлый съ небольшими розово-карминовыми краями.

Impératrice Eugénie,—бѣлый съ фіолетовымъ и лиловымъ.

Isabelle,—чисто-бѣлый, съ широкими пятнами фіолетово-карминовыми.

James Carter,—блестяще-оранжево-красный съ бѣлыми пятнами.

James Wath,—блестяще-красный, середина бѣлая, съ нѣжно-розовыми полосками.

Janire,—абрикосоваго цвѣта, съ красными краями.

Jenny Lind,—нѣжно-розовый съ вишневымъ.

La candeur,—очень крупный бѣлый цвѣтокъ, съ мелкими карминовыми полосками.

La favorite,—розовый съ карминовымъ, внутреннія части
ярко-желтыя.

La fiancée,—чисто-бѣлый, съ маленькими блѣдно-фіолето-
выми пятнами.

La quintique,—ярко-оранжевый.

Lady Franclin,—бѣлый съ розовымъ и карминовыми чер-
точками.

Le Dante,—темно-розовый, съ большими бѣлыми пятнами.

Le Poussin,—свѣтло-красный, на бѣломъ фонѣ и съ бѣ-
лыми пятнами.

Lélia,—розовый съ лиловыми пятнами.

Linné,—вишнево-оранжевый съ желтоватыми пятнами.

Lord Byron,—пурпуровый съ бѣлыми полосами и пят-
нами.

Lord Raglan,—лиловый съ кармазиннымъ.

M-me Adele Souchet,—бѣлый съ карминовымъ.

M-me Basseville,—розовый съ пурпуровыми пятнами, на
бѣломъ полѣ.

M-me Desportes,—чисто-бѣлый съ небольшими фіолето-
выми полосками.

M-me Dombrain,—фіолетово-карминный, съ пурпуровымъ.

M-me Leseble,—чисто-бѣлый, съ широкими, розово-фіо-
летовыми пятнами.

Malvina,—нѣжно-розовый съ краснымъ.

• **Maréchal Vaillant**,—пурпуровый съ большими бѣлыми
пятнами.

Marie,—бѣлый съ темно-карминовыми пятнами.

Maria Stuart,—бѣло-розовый съ вишневымъ.

Mathilde de Landevoisin,—бѣлый съ легкими кармино-
выми черточками.

Mazarin,—красный съ фіолетовыми полосками.

Mazepa,—розово-оранжевый съ желтыми и съ красными
черточками.

Meyerbeer,—красно-темно-оранжевый съ амарантовыми
пятнами.

Michel Angelo,—кармазино-пурпуровый съ бѣлыми пят-
нами.

Milton,—бѣлый съ легко-розовымъ и краснымъ.

Molière, — красно-вишневый, съ большими чисто-бѣлыми пятнами.

M-r Legouvé, — огненно-красный, съ бѣлыми полосами и пятнами.

M-r Vinchon, — свѣтло-красный, съ свѣтло-розовыми пятнами.

Montaigne, — пламенно-красный.

Mozart, — ярко-розовый съ фіолетовымъ отливомъ съ кармозиннымъ и большимъ чисто-бѣлымъ пятномъ.

Napoleon III, — пурпуровый съ бѣлыми полосами въ серединѣ.

Nemesis, — ярко-розовый, съ бѣлыми полосами, кармозинными краями и желтою серединою.

Neptune, — свѣтло-пурпуровый съ розовою серединою.

Newton, — кармозинный съ широкими бѣлыми полосами.

Ninon de Lenclos, — розовый съ темно-розовыми пятнами и полосами.

Nöemi, — свѣтло-лилово-розовый.

Norma, — бѣлый съ лиловымъ.

Ophir, — темно-желтый съ пурпуровыми пятнами.

Oracle, — пурпуровый, съ гранатовыми черточками, середина свѣтлая.

Orphée, — розово-карминовый, середина блѣднѣе, съ пурпуровыми крапинами.

Oscar, — ярко-вишневый, съ бѣлыми пятнами.

Othello, — свѣтло-оранжево-красный.

Pallas, — красный, къ краямъ темнѣе, середина желтоватая.

Régase, — тѣлеснаго цвѣта, изжелта, съ розово-карминовыми черточками.

Pellonia, — розовый, отороченный краснымъ.

Rénélope, — бѣлый телесно-желтоватый, съ карминовыми черточками.

Periclès, — очень крупный, свѣтло-розовый цвѣтокъ, съ пурпуровыми черточками и бѣлыми крапинками.

Peter Lawson, — лилово-розовый или фіолетовый съ бѣлыми пятнами.

Picciola, — розово-карминовый съ бѣлыми пятнами.

Prémice de Montrouge, — блистательно-красный.

Princesse Alice, — нѣжно-лиловый, съ розовымъ отливомъ и большими бѣлыми пятнами.

Princesse of Wales, — бѣло-розовый, съ темно-карминовыми пятнами.

Princesse Mathilde, — нѣжно-розовый, съ темно-розовыми черточками

Racine, — вишнево-фіолетовый, съ бѣлыми полосами и бѣлою серединою.

Rebecca, — мѣдно-розовый, съ бѣлыми пятнами.

Reine Victoria, — чисто бѣлый, съ фіолетово-карминовыми пятнами.

Rembrandt, — темно-пурпуровый.

Robert Fortuna, — большой красно-карминовый и фіолетовый цвѣтокъ съ бѣлыми полосками.

Romulus, — красный, съ бѣлыми пятнами и полосами.

Rosea perfecta, — красный, розово-фіолетовый, съ бѣлыми полосами.

Rosa Bonheur, — большой бѣлый съ фіолетовымъ отливомъ и съ бѣлыми крапинками.

Rossini, — амарантово-темно-красный, съ бѣлыми полосами и пятнами.

Semiramis, — кармино-розовый на бѣломъ фонѣ.

Schakespeare, — бѣлый съ легкими розовыми разводами.

Schiller, — сѣрно-желтый съ красно-карминовыми пятнами.

Sir Joseph Paxton, — красно-оранжевый, съ карминно-красными черточками и бѣлымъ фономъ.

Sir Wil. Hooser, — свѣтло-вишневый, съ розово-карминовыми пятнами по бѣлому фону.

Stella, — по бѣлому фону желтые и розовые разводы, середина свѣтлѣе.

Stephenson, — вишнево-карминовый съ бѣлыми полосками.

Sultane, — ярко-розовый, атласистый съ пурпурными крапинками по бѣлому полю.

Sulphide, — бѣлый съ карминовыми полосками и большими пурпуровыми пятнами.

Thos. Methven, — фіолетовый съ розовыми разводами, середина свѣтлѣе.

Thomas Moore, — розово-карминовый, по бѣлому фону карминовыя пятна.

Thunberg, — ярко-вишнево-оранжевый, съ большими бѣлыми пятнами.

Ulysse, — превосходный, розовый, атласистый.

Van Dyk, — красно-амарантовый съ бѣлыми полосами.

Vesta, — бѣлый, съ кармино-фіолетовыми пятнами и желтою серединою.

Virgile, — пламенно-красный.

Walter Scott, — ярко-розовый съ бѣлыми, серизово-карминовыми черточками.

Кромѣ этихъ разностей, встрѣчаемыхъ въ продажѣ и у нашихъ торговцевъ, въ извѣстный торговый домъ Вильморена Андрие, въ Парижѣ поступили для продажи, нѣкоторыя новыя разности Гладіолусовъ, у насъ еще не встрѣчаемыя, а именно:

Angèle, — съ бѣлыми цвѣтами.

Anna, — большой, вишнево-оранжевый цвѣтокъ съ бѣлымъ полемъ и карминовыми полосками.

Armide, — крупныя бѣлыя цвѣты, съ розовымъ отливомъ и крапинками.

Canova, — очень крупныя цвѣтки, съ карминовыми крапинками.

Cleopatra, — большіе лиловые цвѣтки съ фіолетовымъ отливомъ и пурпуровыми полосками.

Donna Maria, — темно-фіолетовыя цвѣты съ фіолетовыми и карминовыми крапинками и бѣлыми полосами.

Elegans, — свѣтло-вишневый, оранжевый съ бѣлыми крапинками.

Hortense, — блѣдно-розовый, съ крупными карминовыми полосками.

Humboldt, — красно-вишневый съ фіолетовымъ отливомъ, но бѣлому полю фіолетовыя крапинки.

Irma, — ярко-карминовый съ фіолетовымъ отливомъ и бѣлыми полосками.

Lacépède, — очень большой, красно-вишневый цвѣтокъ съ фіолетовымъ.

Laure, — красно-оранжевый, нѣжный, съ карминовымъ отливомъ и бѣлыми крапинками.

Livingstone, — вишнево-пурпуровый цвѣтокъ съ фіолетовыми крапинками и металлическимъ отливомъ.

Marthe,—бѣлый съ розовыми черточками и карминовыми крапинками.

Picturata,—розово-лиловый, съ карминовыми крапинками по желтому полю.

Rubis,—кармино-вишневый и бѣлый съ розовыми крапинками и бѣлыми черточками.

Spectabilis,—нѣжно-розовый съ вишневымъ ободочкомъ и пурпуровыми крапинками по бѣлому полю.

Gladiolus imbricatus,—*Кочетки*. Дикорастущее.

G. Saundersii,—съ узкими длинными листьями и красными цвѣтами, бѣлыми въ нижней половинѣ. Садовое растеніе.

G. ringens,—цвѣты голубые у основанія снаружи и сѣро-желтоватые, съ синими полосками внутри.

842. Glaucium corniculatum. Однолѣтнее растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ, красный цвѣтокъ распускается въ Іюлѣ.

Другіе виды: **G. phoeniceum**. **G. tricolor** трехцвѣтный.

G. flavum. Съ желтыми цвѣтами.

G. fulvum. Съ бурыми цвѣтами.

G. violaceum. Съ фіолетовыми цвѣтами.

Два послѣдніе вида высѣваются предварительно въ парникъ.

G. guteum. Двухлѣтнее растеніе, съ свѣтло-желтыми цвѣтами; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

843. Glechoma hederacea. *Будра*. *Кошачья мята*. Многолѣтнее растеніе, съ лиловыми, почти синими цвѣтами; вѣнчикъ цвѣтка въ темно-лиловыхъ пятнышкахъ. Растетъ дико на влажныхъ мѣстахъ въ тѣни. Медоносное и лекарственное растеніе изъ семейства **Labiatae**.

844. Gleditschia caspia. *Іерусалимскій тернъ*. *Бобовникъ*. Деревце, разводимое для украшенія садовъ и парковъ. Любитъ тучную почву.

Другіе виды: **G. brachycarpa**. *Гледичія шольчатая*.

G. tracanthos. Мякоть стручковъ этого растенія употребляется въ лекарство.

G. inermis. *Г. безоружная*.

G. macroacantha. *Гледичія съ большими шлами*.

G. sinensis. *Бобовникъ*. *Оранжевый вустарникъ*.

845. Globularia uvularia. Оранжевое растение, производящее шаровидные головки, отчего и получило название (*Globus* — шаръ).

846. Gioneria jasminiflora. Тепличное, кустарное растение съ листьями бѣлыми, пушистыми снизу, и съ бѣлыми цвѣтами.

847. Gloriosa plantii. Низкорослое, тепличное растение, съ красивыми цвѣтами.

Другой видъ: *G. superba*. Оранжевое растение.

848. Gloxinia. Глоксинія. Тепличное, корневое травянистое растение, цвѣтущее и въ комнатѣ. Листья овально-заостренные, либо зубчатые: пушистые, у нѣкоторыхъ видовъ совершенно какъ-бы бархатные прелестнаго рисунка, съ отливами. Цвѣты бѣлые, розовые, лиловые, малиновые, алые, пестрые, съ пятнами другихъ колеровъ и полосатые. Размножается посѣвомъ сѣменъ въ Мартѣ, причемъ цвѣтеть на слѣдующій годъ, отростками луковичныхъ корней и черенками. На черенки употребляются листья; ихъ сажаютъ или цѣльные, или разрѣзаютъ на части и каждую сажаютъ особю. Также растилаютъ листъ по песку въ тепличкѣ и укрѣпивъ его колышками, перерѣзываютъ въ мѣстахъ соединенія, самыя крупныя жилки, отчего у каждаго разрѣза образуется новое растеньице. Зимую содержится совершенно сухо, причемъ обрѣзываются стебли лишь растение увянетъ, лѣтомъ требуетъ сильной поливки. Земля для Глоксиніи составляется изъ вересковой пополамъ съ листовною. Искусственнымъ опыленіемъ получено множество разновидностей этого растенія.

Глоксиніи по росту и положенію цвѣтовъ раздѣляются на:

- 1) имѣющія стебель;
- 2) неимѣющія стебля,
- и 3) съ цвѣтами раструбомъ, поднятыми вверхъ.

I. Глоксиніи, имѣющія стебель:

Piramidalis. Maculata, sceptrum. Maculata rosea chiritiformis. Caulescens. Discolor. Hirsuta. Hybrida. Macrophylla. Macrophylla rubra.

Speciosa Teichleri. Прелестный розовый цвѣтокъ съ синими полосами.

Speciosa fufiana. Цвѣтокъ бѣлый снаружи — фіолетовый внутри.

S. p. candida. *R. p. insignis*. *S. p. Feischlerii*.

II. Глоксинія, неимѣющія стебля:

Adèle. Бѣлая. Горлышки испещрены лиловымъ.

Adelina Patti. Бѣлая, съ вишневымъ горлышкомъ.

Alice, темно-фіолетовая, горлышко бѣложелтое.

Bergeronette, свѣтло-розовая, горлышко бѣлое.

Blue Bell, темно-голубая, горлышко фіолетовое.

Comtesse of Derbentwater, кирпично-розовая, горлышко карминовое.

Duchesse of Rothsay, бѣлая, горлышко кармазиновое.

Esperance, розовая, съ отливомъ кирпичнаго цвѣта, середка бѣлая.

Georgine, бѣлая испещренная розовымъ.

Gloire de Versailles, бѣлая съ фіолетовою серединою.

Hélène, бѣлая съ голубыми, мраморовидными разводами.

Ida, горло сливочно-бѣлое, съ голубыми тѣнями, края изящно расписаны лиловымъ.

II *Propheta*, голубая съ палевыми краями и бѣлою серединою.

Imperiale blanche, бѣлая съ вишневою серединою.

Indianella, бѣлая въ серединѣ слегка розписана фіолетовымъ.

Indienne, свѣтло-голубая, впадающая въ лиловое, бѣлая середина.

La charmante, лиловая.

Lady Agnes Jork, свѣтло-фіолетовая съ бѣлымъ.

Lady Amelie Villiers, вишневая съ бѣлыми жилами.

Lavinia, мѣдно-розовая, съ фіолетово-кармозиннымъ горлышкомъ.

Léon Vandervee, карминовая съ бѣлыми краями.

Louise, кошенилеваго цвѣта съ лиловыми краями.

Lucie, внутри бѣлая края темно-фіолетовые.

Lydia, темно-фіолетовая съ бѣлою серединою.

Mina, вишневая съ бѣлыми краями, снаружи бѣлая.

Miranda, свѣтло-розовая съ бѣлымъ горломъ.

M-r Baltet, розовая съ палевыми краями и карминоваго цвѣта горлышкомъ.

Prince Kung, розовая, горлышко ярко-карминовое.

Rève d'or, фиолетовая, горлышко совершенно темное.

Rose et cochenille, розово-кошенилевое, горлышко бѣлое.

Said Pascha, темно-голубая, горлышко темно-фиолетовое.

Sarah, ярко-розовая съ бѣлыми разводами.

Suzanne, голубая, оттѣненная темно-фиолетовымъ.

Topaze, бѣлая, испещренная розовымъ.

Valérie, лиловая, съ горлышкомъ молочно-бѣлымъ.

Viолette neigеuse, фиолетовая, внутри испещренная бѣлымъ и малиновымъ.

Vlaanderen, красно-фиолетовая съ бѣлою серединою.

III. Глоксиніи. Съ цвѣтами, поднятыми раструбомъ кверху.

Acton green, фиолетовый съ бѣлымъ, мраморовидный.

Ceintur d'Hébe, середка бѣлая, лепестки лилово-розовые съ бѣлыми краями.

Cordon céleste, середка бѣлая, края красно-фиолетовые.

Cordon lavande, бѣлая середка, изсвѣтло-фиолетовые съ разводами края.

Carl Russel, кармозинная, оторочена кирпично-краснымъ.

Estelle, фиолетовая, въ серединѣ бѣлая.

Flamme rose, бѣлая, испещрена розовымъ.

Hortense, розовая въ серединѣ бѣлая.

Julie, бѣлая, съ розовыми краями.

Lague extra, красная съ бѣлою середкою.

Lilas franc, фиолетово-лиловая, центръ бѣлый.

Pégase, лиловая, середка **vermillon**.

Reine des Gloxinias, лилово-бѣлая, горлышко фиолетовое.

Rose et Hermine, края, разрисованные розовыми разводами по бѣлому фону.

Souvenir de Henri, бѣлая, съ темно-фиолетовыми краями въ тѣнь.

Victor Lemoine, розово-фиолетовая съ свѣтлыми краями.

Voielactée, бѣлая съ фиолетовыми краями, испещренная.

Недавно выведены Глоксиніи, цвѣтокъ которыхъ имѣть ту особенность, что снабженъ двойнымъ, какъ-бы махровымъ основаніемъ.

Изъ этихъ разновидностей замѣчательны:

Gl. à double corolle.

John Gray, голубовато-лиловая.

Lady Clemorne, розовая.

849. *Glycine Apios*. Многолѣтнее садовое растеніе.

Другіе виды: *G. rubicunda*. Оранжерейное растеніе.

G. sinensis. *Глисинъ Китайскій*. Вьющійся кустарникъ, съ блѣдно-голубыми, висячими цвѣтами, разводится для украшенія стѣнъ и рѣшетокъ; цвѣтетъ въ Апрѣлѣ.

850. *Glycyrrhiza echinata* (*G. glabra*). Изъ семейства *Papilionaceae*. *Солодка*. *Солодкій вербецъ*. *Солодковый корень*. Дикорастущее, на сухомъ, открытомъ мѣстѣ, лекарственное растеніе, изъ корня котораго готовятъ такъ называемую „лакрицу“.

Другіе виды: *G. asperima*. *Калмычскій чай*.

G. glandulifera. *Лакрица*.

851. *Gnaphalium margaritaceum*. *Безсмертникъ бѣлый*. Изъ семейства *Synanthereae*. Многолѣтнее садовое растеніе.

Другіе виды; *G. uliginosum*. *Спрынь*. Дикорастущее.

G. dioecum. Цвѣты бѣлые съ розовымъ.

G. sylvaticum. *Бѣликъ пустошковый*.

G. eximium и *G. grandiflorum*. Оранжерейное растеніе.

852. *Gulidia opposifolia*. *Гнидія*. Оранжерейное растеніе, съ сѣро-зелеными листьями и бѣлыми, трубчатыми цвѣтами; любить вересковую землю; цвѣтетъ всю весну.

853. *Godetia*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ. Бѣлые, темно-красные и пестрые цвѣты, распускаются въ Іюлѣ.

Виды: *G. Drummondii*. *G. Lehmanniana*. *G. rubicunda*. *G. taraxifolia*. *G. albescens*. *G. Lindleyana*. *G. phoenicea*. *G. purpurea*. *G. Rumanzovii*. *G. tenella*. *G. tenuifolia*. *G. verosa*. *G. viminea*.

G. amoena и *G. decumbens*. Бордюрное растеніе съ бѣловатыми цвѣтами.

854. *Goethea cauliflora*. Бразильское, лекарственное растеніе.

855. *Goldfussia glomerata*. Оранжерейное растеніе, но цвѣтетъ только въ теплицѣ съ Ноября до Февраля.

856. *Gomphia Theophrasta*. Тепличное растеніе.

857. *Gomphrena globosa*. *Сухоцвѣтъ. Безсмертникъ*. Изъ семейства *Amaranthaceae*. Однолѣтнее растеніе съ красными, бѣлыми, тѣлесными, розовыми или пестрыми цвѣтами, которые срѣзываются и сушатся, служа для зимнихъ букетовъ и намогильныхъ вѣнковъ. Высѣвается въ Апрѣлѣ, въ теплицѣ, рано разсаживается въ горшки и оставляется подъ рамами до цвѣтенія. Пригодно для содержанія въ комнатѣ. Не любитъ сильной поливки, требуетъ землю, составленную изъ лиственной, пополамъ съ пескомъ съ примѣсю двухъ частей дерновой и четвертой части навозной.

Другіе виды: *G. Haageana*. Съ оранжерейными цвѣтами.

G. auranciana. Темно-желтые цвѣты.

G. Hoveana. *G. coccinea*.

G. pulchella. Розовые цвѣты съ желтыми тычинками. Оранжерейное растеніе, т. е. если воспитывается какъ многолѣтнее, но на зиму вносится въ оранжерею, а на лѣто выставляется на воздухъ.

G. alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

G. carnosa. Съ тѣлесными цвѣтами.

G. rubra. Съ красными цвѣтами.

G. H. variegata. Съ пестрыми цвѣтами.

858. *Gongora*. Орхидея, съ душистыми красными, коричневыми, желтыми и пестрыми цвѣтами; размножается раздѣленіемъ луковицъ; можетъ расти въ комнатѣ; требуетъ вересковую землю пополамъ съ лиственною. Сажается на кусокъ угля.

G. leucochilla. Цвѣты необыкновеннаго вида. коричнево-малиновые, сажается на кусокъ коры или въ скорлупу кокосоваго орѣха. Содержится въ теплицѣ.

G. odoratissima. Цвѣты коричневыя съ желтымъ.

G. portentosa. Тепличное растеніе, съ блѣдно-желтыми цвѣтами, испещренными пурпуровыми крапинками, съ ярко-желтою нижнею губою.

G. atropurpurea. *G. maculata*. *G. fulva*. *G. buffonia*.

859. *Goodia latifolia*. Съ желтыми цвѣтами, въ теплицѣ разпускающимися въ Апрѣлѣ.

860. *Goodyera discolor*. Изъ семейства **Orchidaceae**. Оранже-
рейнное растеніе съ синевато-зелеными листьями испещренными
бѣлыми жилками; бѣлый цвѣтокъ въ видѣ колоса.

Другіе виды: *G. velutina*. Темнозеленые, будто бархатные
листья, съ ярко-бѣлою, по середкѣ полоскою.

G. macrantha foliis luteo—marginatis. Листья зеле-
ные, испещренные свѣтлыми жилками; по краю листа желтая
кайма.

861. *Gordonia anomala*. Весьма похожа на простую камелію,
(не махровую), цвѣтеть въ Январѣ и Февралѣ.

862. *Gorteria rigens*. *Гортерія крупноцвѣтная*. Оранжевойное
растеніе, съ изжелта темно-красными цвѣтами. Любитъ лег-
кую, питательную землю, цвѣтеть все лѣто, распускается толь-
ко на солнцѣ.

863. *Gossypium*. *Хлопчатникъ*. Изъ семейства **Malvaceae**. Ра-
стеніе однолѣтнее и двухлѣтнее, древесное или травянистое;
съ желтымъ цвѣткомъ, изъ котораго образуется плодъ въ видѣ
пузыря, заключающій въ себѣ сѣмена, закутанныя въ бѣлый
хлопокъ, составляющій такъ называемую „хлопчатую бумагу“. o
Ростетъ въ дикомъ состояніи, разводится плантаціями суще-
ствуетъ въ садахъ и даже въ комнатѣ. Травянистые виды
хлопчатника размножаются черенками, древесные—посѣвомъ
сѣменъ въ началѣ Марта; землю требуетъ, составленную изъ
равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой.

Виды: а) Травянистаго хлопчатника; *G. latifolium*.

б) Древеснаго хлопчатника:

G. purpurescens. *G. barbadense*. *X. Западный*. Ку-
старникъ.

G. arboreum. *X. древовидный*.

G. religiosum. *X. желтый*. Полукустарникъ. Хлопокъ
его красновато-желтый.

в) Однолѣтняго хлопчатника:

G. herbaceum. *X. травянистый*.

г) Двухлѣтняго хлопчатника:

G. indicum. G. hirsutum.

864. *Grammanthes gentianoides*. Изъ семейства *Crassulaceae*.

Маленькое, однолѣтнее растеніе, съ небольшими мясистыми листьями и оранжевыми, бѣлыми, розовыми и красными цвѣтами. На раздѣлахъ вѣнчика этихъ цвѣтовъ имѣются пятна, представляющія собою форму латинской буквы V, отчего растеніе и получило свое названіе (*Gramma* — писаніе и *anthos* — цвѣтокъ). Сѣется, въ Апрѣлѣ, въ плошки, причемъ сѣмена только слегка прикрываются пескомъ, пересаживается въ исходѣ Мая, когда уже нельзя ожидать морозовъ въ грунтъ, въ глинисто-листовую землю, съ большею примѣсью песку.

Другой видъ: *G. lutea*. Съ желтыми цвѣтами.

865. *Grammatophyllum speciosum*. Тепличная Орхидея, съ большимъ желтымъ цвѣткомъ, испещреннымъ коричневыми пятнами.

866. *Graptophyllum aureo—variegatum*. Тепличное растеніе.

Другой видъ; *G. mediauratum*. Тепличное полукустарное растеніе, съ ярко-зелеными листьями, имѣющими по срединѣ, широкую желтую полосу, либо пятно.

867. *Gratiola officinalis*. Лихорадочная трава. *Благодать. Божія милость. Авранъ аптечный*. Изъ семейства *Scrophularineae*. Дикорастущее, медоносное и лекарственное растеніе, съ бѣлыми цвѣтами, имѣетъ рвотное и слабительное свойства, поэтому народомъ употребляется противъ лихорадки. Любитъ сухое, тѣнистое мѣсто. Избытокъ того растенія на лугахъ весьма вреденъ скоту.

868. *Gravesia guttata*. (*Bertolonia guttata*). Съ небольшими бѣлыми цвѣтами и розовыми крапинками.

869. *Greyia sutherlandi*. Изъ семейства *Saxifraga anomala*. Оранжевое растеніе съ колосомъ ярко-пунцовыхъ цвѣтовъ. Въ дикомъ состояніи растеніе это образуетъ небольшое дерево или кустарникъ.

870. *Grevillea intricata*. Изъ семейства *Protenaceæ*. Оранжевый кустарникъ, съ маленькими, желтыми цвѣтами.

Другіе виды: *G. macrostylis*. Австралійскій кустарникъ, съ букетомъ оранжево-красныхъ цвѣтовъ и овальными листьями. Содержится въ холодной оранжереѣ.

G. alpestris. Цвѣты малиновые съ бѣлымъ.

871. *Griffina dryades*. Тепличное, луковичное растеніе, изъ семейства *Амариллисовъ*, съ крупными синелевыми цвѣтами, у которыхъ сегменты, отъ середины до основанія, бѣлые. Бываетъ на одномъ растеніи до 13 большихъ цвѣтовъ. Любитъ землю составленную изъ чернозема пополамъ съ глиною и съ примѣсью четвертой части песку.

Другіе виды: *G. hyacinthina maxima*. Большой цвѣтовъ бѣлый съ синимъ.

G. Blumenavia. Особенно красивые цвѣты.

G. liboniana.

872. *Grindella grandiflora*. Изъ семейства *Compositæ*. Воздушное растеніе съ оранжевыми цвѣтами, похожими на красную астру. Цвѣтетъ все лѣто. Осенью погибаетъ; размножается сѣменами и черенками, которые дѣлаютъ лѣтомъ и держатъ зиму въ оранжереѣ.

873. *Grischowia hirta*. Съ темно-карминовыми цвѣтами. Съ Іюня до Сентября растеніе содержится въ черноземномъ грунтѣ, на воздухѣ, въ тѣни, и когда еще молодо, часто прищипывается, вносится въ оранжерею и зацвѣтаетъ въ Октябрѣ, — тогда ставится въ теплицу.

874. *Griselina littoralis*. Оранжевое растеніе.

875. *Guilielma*. *Гильельма*. Родъ Пальмъ. Нѣжное дерево, съ тонкимъ стволомъ, усаженнымъ черными иглами, съ листьями на болючихъ черешкахъ.

Виды: *G. speciosa*. *Персиковая пальма*. Такъ названа по плоду похожему на персикъ.

G. utilis.

876. *Guizotia oleifera*. Однолѣтнее, масляничное растеніе, изъ Абиссиніи, хорошо растетъ въ тепломъ климатѣ.

877. *Gunnera Scabra*. Изъ семейства *Gunneraceæ*. Даетъ огромный плодъ, такъ напимѣръ въ 1872 году, въ Брестѣ, вызрѣлъ, на открытомъ роздухѣ плодъ, имѣвший въсу болѣе 30 фунтовъ и въ окружности до 6 футъ; нѣкоторые листья этого растенія были длиною въ сажень. Это одно изъ самыхъ широколистныхъ, между листовыми оранжерейными растеніями. Любитъ весьма питательную почву, сильную поливку и полутѣнистую мѣстность. Зимуетъ въ холодной оранжереѣ, гдѣ въ то время содержится сухо.

Другой видъ: *G. chilensis*. Съ широкими листьями.

878. *Gunthera viscosa*. (*Gutierrezia*). Однолѣтнее растеніе.

879. *Guzmannia*. Изъ семейства *Bromeliaceæ*. Тепличное растеніе, требуетъ легкой дерновой земли, смѣшанной съ пескомъ и древеснымъ углемъ, въ кускахъ; распускается въ Ноябрь или Декабрѣ. Вообще требуетъ той же культуры, что и другія Бромеліевыя.

Виды: *G. tricolor*. Съ огненно-красными цвѣтами.

G. erythrolepis. Съ большимъ, малиновымъ цвѣткомъ.

G. spectabilis.

880. *Gymnocladus canadensis*. Оранжерейное растеніе, кора его употребляется вмѣсто мыла.

881. *Gymnogramme*. Тепличное растеніе, изъ семейства *Плоскотниковъ*. Требуется легкую листовую или торфяную землю съ пескомъ и умеренную поливку.

Виды: *G. chrysophylla*. *G. Luchiana*. *G. l'Hermierii*.

882. *Gymnostachyum*. Изъ семейства *Acanthaceæ*. Лѣтомъ содержится въ оранжереѣ, а зимою въ теплицѣ.

Видъ: *G. Verschaffeltii*. Съ свѣтло-зелеными листьями, испещренными карминно-желтыми жилками. Даетъ блѣдно-желтые цвѣты. Размножается черенками, во время жаровъ часто поливается.

883. *Gymnotrix latifolia*. Многолѣтній злакъ, разводится въ садахъ, какъ декоративное растеніе; очень красиво; достига-

еть трехъ метровъ. Любитъ рыхлую, нѣсколько навозную землю и достаточную поливку. Весьма непряхотливое растеніе.

884. *Gynerium argenteum*. Зимуетъ въ холодной оранжереѣ; весною высаживается въ грунтъ; любитъ защищенную, солнечную мѣстность и сильную поливку; размножается дѣленіемъ. Змѣеобразные изгибающіеся листья этого растенія достигаютъ 5 футъ, при полувершкѣ ширины.

885. *Gypsophylla paniculata*. *Кучерявка*. Многолѣтнее, садовое растеніе, требуетъ покрывши на зиму; любитъ мѣловую почву, отчего и получило свое названіе. (*Gypsos* — мѣль и *phileo* — любить).

Другіе виды: *G. Stewenii*. Тоже.

G. elegans. Однолѣтнее, бордюрное, весьма красивое растеніе, съ красными и бѣлыми цвѣтами, высѣвается прямо въ грунтъ; достигаетъ 1½ фута вышины; любитъ рыхлую, песчанистую землю и солнечное мѣсто.

Дикорастущіе виды:

G. muralis. *Котылекъ*. Растетъ въ хлѣбахъ.

G. gmeline. *Сарам-Гардъ*.

886. *Habranthus coccineus*. Оранжерейное растеніе.

Другіе виды: *H. pallidus*. *H. versicolor*.

887. *Habrotamnus*. Изъ семейства *Solaneae*. Оранжерейное, кустовое растеніе, съ розовыми или оранжевыми цвѣтами; размножается черенками, весною или осенью. Зимой требуетъ самой умѣренной поливки. Любитъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Способно цвѣсть зимою, если весною его обрѣжутъ и не дадутъ цвѣсть лѣтомъ. Въ Январѣ переносится въ наиболѣе прохладное мѣсто теплицы.

Виды: *H. elegans*. Съ кистью пунцовыхъ цвѣтовъ.

H. fasciculatus. Съ букетомъ пунцовыхъ цвѣтовъ.

H. aurantiacus. Съ оранжевыми цвѣтами.

H. corymbosus. Съ розовыми цвѣтами.

H. Banduxi. Эти пять видовъ признаются лучшими сортами растенія.

H. aureus. *H. roseus*. *H. warszewiczii*.

888. Haemadictyon refulgens. Из семейства Аросynaceae. Тепличное, вьющееся растение, съ пурпуровыми стеблями; съ листьями, испещренными красными жилками и съ свѣтло-зеленою полоскою по главнымъ нервамъ.

889. Haemanthus coccineus. Оранжевое луковичное растение. Луковица его величиною въ обыкновенный, но крупный, лукъ. Даетъ до 60 цвѣтковъ на одномъ стеблѣ. Цвѣты пурпуровые. Содержится въ тучной землѣ.

Другіе виды: **H. puniceus.** Тоже.

H. multiflorus. Съ шарлаховыми цвѣтами. Всегда содержится въ теплѣ, — лѣтомъ — въ тепломъ парникѣ, — зимою въ умѣренной оранжереѣ, на свѣту, при самой осторожной поливкѣ, но лишь дастъ признаки жизни — вносится въ теплицу. Каждые два—три года, отъ луковицы осторожно отдѣляютъ молодыхъ дѣтокъ, для размноженія.

Для ранней выгонки луковицъ даютъ засохнуть и держать въ оранжереѣ сухо до Октября, въ дерновой землѣ, на мѣстѣ, нагрѣваемомъ снизу.

H. deformis. Съ бѣлыми цвѣтами, имѣющими желтыя тычинки и выходящими изъ большихъ, коротенькихъ листьевъ, имѣющихъ видъ кубка.

H. tenuiflorus coccineus. Тепличное, луковичное растение, у котораго большіе, красные цвѣты появляются прежде листьевъ, въ большемъ количествѣ.

H. Cinnabarines. Съ пунцовыми цвѣтами.

890. Haematoxylon Campechianum. Тропическое дерево, даетъ такъ называемое „Кампешевое дерево“; также изъ его древесины готовится тушь.

891. Halesia lucida. Оранжевое растение.

892. Hamelia elegans. Оранжевое растение.

893. Hardenbergia. Вьющееся растение, съ красными или синеватыми цвѣтами, распускающимися въ Мартѣ или Апрѣлѣ, въ умѣренной оранжереѣ.

Виды: **H. andamanensis. H. camptoniana.**

H. cordata. H. digitata. H. Hugeliana.

H. Lindleyi. H. macrophylla. H. ovata. H. monophylla.

- 894. *Harrachia Speciosa*.** Оранжевое растение.
- 895. *Hartmania rosea*.** Однолѣтнее цвѣточное растение, предвѣрительно высадки въ грунтъ, высѣвается въ парникъ и производитъ розовые цвѣты.
- 896. *Hartvegia capensis*.** Тропическое дерево, похожее на черное.
- 897. *Hebecladus biflorus*.** Тепличное растение съ опущенными лиловыми цвѣтами. На лѣто высаживается въ грунтъ въ питательную землю; на зиму вносится въ умѣренную теплицу и содержится сухо. Передъ перенесеніемъ въ зимнее помѣщеніе, очищается отъ сухихъ листьевъ и вѣтокъ, а отчасти и обрѣзывается. Размножается сѣменами и черенками.
- 898. *Hebeclinium atrorubens*.** Тепличное растение съ душистыми цвѣтами.
Другой видъ: ***H. macrophyllum***. Тепличное растение, съ краснымъ волосистымъ стеблемъ, очень красивыми темными листьями; зимою даетъ лилово-розовые, съ тонкимъ медовымъ запахомъ, цвѣты, сидящіе букетами.
- 899. *Hebenstreitia albiflora*.** Однолѣтнее растение высѣвается въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ. Бѣлые цвѣты распускаются въ Августѣ.
Другой видъ: ***H. aurea***, съ желтоватыми цвѣтами.
- 900. *Hedera*. Плющъ.** Семейство ***Hederaceae***. Такъ названъ отъ Кельтскаго слова ***Hedra***—веревка. Оранжевое, вьющееся растение, успѣшно растетъ въ комнатѣ; зимою, требуетъ самой умѣренной поливки и довольствуется всякимъ положеніемъ, хотя лучше идетъ на свѣтломъ мѣстѣ. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей вересковой, дерновой и лиственной. Размножается черенками вѣтвей. Его срѣзываютъ съ воздушными корнями и прежде чѣмъ сажать ставятъ въ пузырекъ съ водою. Плющъ можно сажать на открытомъ воздухѣ, но на зиму его надлежитъ вносить въ подвалъ или оранжерею.
Виды: ***H. helix***. *П. обыкновенный, мелколистный.*
H. helix. fol. variegata. *П. пестролистный.*

H. Algeriensis. *II. Алжирскій* красивѣйшій сортъ, самый крупнолистный.

H. helix Hibernica. *II. крупнолистный шотландскій*.

H. canariensis. *H. c. fol. variegatis*. *H. Doneralensis*. *H. japonica argentea varieg.* *H. maculata*. *H. macrophylla*. *H. m. variegata*. *H. palmata*. *H. pensylvanica*. *H. rombea fol marginata*.

H. Roegneriana. *II. кавказскій*. Съ темнозелеными, весьма большими листьями.

H. senticosa maxima. *Гунпулхи*.

H. helix digitata. Плющъ очень красивый, мелколистный.

901. *Hedychium*. Тепличное и вмѣстѣ комнатное, корневое, травянистое растеніе, съ желтыми цвѣтами. Размножается дѣленіемъ; требуетъ землю глинисто-дерновую съ хорошо перепрѣвшимъ перегноемъ; выращивается въ парникѣ, на дубильной корѣ. Лѣтомъ отъ солнечныхъ лучей листья свертываются въ трубку и засыхаютъ.

Виды:

H. Gardnerianum. Красиво цвѣтущее.

H. angustifolium. *H. thyriforme*. *H. flavum*. *H. aurantiacum*.

H. spicatum. Имѣетъ лекарственное свойство.

H. pallidum. Цвѣты съ ванилевымъ запахомъ. Чтобы заставить цвѣсть это растеніе послѣ того какъ оно отцвѣтеть, его поливаютъ какъ можно меньше, чтобы вымерли старые побѣги и чтобы растеніе заготовило сильные, новые. Въ Январѣ или Февралѣ раздѣляютъ и разсаживаютъ клубни, въ жирную, глинистую землю въ 7—8 вершковыя горшки, причемъ побѣги легко развиваются въ теплицѣ или комнатѣ.

902. *Hedysarum*. *Чаеранъ*. Семейство *Papilionaceae*. Долголѣтнее грунтовое растеніе.

Виды: *H. sibiricum*. *Бодуй*. *Камтешникъ*. Дикорастущее.

H. Canadensis. *Чаеранъ Канадскій*. Грунтовое растеніе, разводимое въ садахъ.

H. coronaria. *Ч. Внечный*. Двухлѣтнее растеніе съ красными цвѣтами, высѣвается сперва въ горшки, потомъ высаживается въ грунтъ, а зимуетъ въ оранжереѣ.

H. elongata. *Ч. доломистый*.

Оранжерейные виды:

H. gyrans. *H. fruticosum*. *H. vespertilionis*.

903. *Heinsia tigrina*. Изъ семейства *Gesneriaceae*. Съ малиновыми цвѣтами; зѣвъ бѣлый, испещренный малиновыми крапинками. Листъ весьма большой. Требуется той же культуры что *Aphelandra aurantiaca*.

904. *Helenium tenuifolium*. (*H. Douglasii*. *H. quadridentatum*). Однолѣтнее растеніе съ золотисто-желтыми цвѣтами, не заслуживаетъ разведенія.

Другіе виды: *H. autumnale*. *Еленка осенняя*. Многолѣтнее, грунтовое, садовое растеніе.

H. commutatum. Многолѣтнее растеніе съ желтыми цвѣтами; зимуетъ на открытомъ воздухѣ, размножается дѣленіемъ корней.

905. *Helianthemum vulgare*. *Нѣжники*. Дикорастущее.

Другой видъ: *H. guttatum*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

906. *Helianthus annuus*. *Подсолнечникъ*. Изъ семейства *Synanthereae*. Однолѣтнее растеніе, разводимое въ садахъ какъ декоративное, а въ поляхъ и огородахъ собственно какъ масличное и вмѣстѣ медоносное растеніе, цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ. При разведеніи въ полѣ или на огородѣ, въ большемъ размѣрѣ, сажаютъ по два зерна въ одну ямку, на аршинъ ямка отъ ямки; когда взойдутъ оба сѣмячка, слабѣйшее растеніе выдергиваютъ и бросаютъ. Когда растеніе созрѣетъ, головку подсолнечника срѣзаютъ и, насадивъ ее на заостренный стебель того же растенія, оставляютъ ее равномѣрно и вполне дозрѣвать на солнцѣ, вѣрно карауля отъ птицъ, которыя тучами на него набрасываются. Черезъ нѣсколько дней головки окончательно собираютъ и выколачиваютъ изъ нихъ сѣмя.

Въ садахъ разводятся слѣдующіе виды:

H. argohryllus, достигаетъ вышины сажени, имѣетъ большіе цвѣтки и блестящіе, серебристые листья. Высѣваютъ въ Мартѣ въ умеренной теплицѣ; по всходѣ разсаживаютъ одиночками въ горшки; въ концѣ Мая, совершенно укрѣпившееся растеніе высаживаютъ въ грунтъ, на хорошую почву,

причемъ на дно для него приготовленной ямки, кладется конскій навозъ и растеніе сажается на кучку перегнойной земли.

H. californicus. У этого видоизмѣненія трубчатые цвѣты превращены въ ленточные.

H. californicus insignis. Весьма сильный оранжевый цвѣтокъ съ ярко-зеленою серединою. Высѣвается прямо въ грунтъ когда морозы совершенно прекратятся.

H. multiflorus. *Подсолнечникъ Многоцвѣтный.* Многолѣтнее садовое растеніе.

H. macrophyllus. Съ круглыми, большими листьями.

H. uniflorus. Съ желтыми цвѣтами, высѣвается въ Февралѣ и Мартѣ.

H. fistulosus.

H. tuberosus. *Топинамбуръ. Земляная груша.* Многолѣтнее растеніе, дающее корневые клубни, употребляемые въ пищу. На почву не прихотливо; размножается весною посредствомъ клубней, которые, впрочемъ, могутъ оставаться въ землѣ съ осени; земля ежегодно удобряется перегнившимъ навозомъ, а весною перекапывается.

907. Helichrysum bracteatum. *Безсмертникъ.* Многолѣтнее растеніе, разводимое преимущественно какъ однолѣтнее; вышиною до 3 футъ, съ маленькими сухими цвѣтами, бѣлыми, желтыми или красноватыми. Чтобы сохранять на зиму, цвѣты срѣзаютъ прежде чѣмъ распустятся. Сѣется въ парникъ, пересаживается въ горшки, по нѣскольку штукъ и въ Маѣ разсаживается въ грунтъ въ обыкновенную садовую землю на солнцѣ.

Виды: **H. bicolor.** Съ большими, золотисто-желтыми цвѣтами.

H. macranthum. Большіе, бѣлые, какъ серебро цвѣты, съ красными кончиками.

H. niveum. Съ большими, серебристо-бѣлыми цвѣтами.

H. compositum.

H. c. album. Съ бѣлыми цвѣтами.

H. c. atroroseum. H. c. roseum.

H. c. fuscum. H. nanum. *Б. Карликовый.* **H. n. album.** Тоже бѣлый. **H. n. atrococcineum. H. n. atrosanguineum. H. n. fuscum. H. n. roseum. H. leucophalum.** Съ бѣлыми цвѣтами.

H. petiolatum. Полукустарникъ, имѣетъ листья и стебли, покрытые густымъ сѣрымъ пухомъ. Растетъ въ грунтѣ, любитъ рыхлую почву и солнечное положеніе.

H. Borussorum rex. *Иммортель Короля Прусскаго.* Съ бѣлыми цвѣтами.

908. Heliconia. Семейство **Musaceae.** Красивое тепличное и вмѣстѣ комнатное растеніе съ бѣлыми цвѣтками, выходящими изъ алаго покрова и имѣющими большее сходство съ цвѣткомъ Стрелиціи; размножается отростками отъ корней и сѣменами; требуетъ землю составленную изъ торфяной, дерновой и лиственной. Весною растенію дается отдыхъ, причемъ поливается настолько лишь, чтобы не засохло. Можетъ цвѣсти зимою въ теплицѣ.

Виды: **H. Bihai.** Индійское растеніе, плоды употребляются въ пищу.

H. bicolor. Красивоцвѣтущее.

H. angustifolia. Цвѣты малиновые съ бѣлымъ.

H. psittacorum. Съ лазоревыми цвѣтами, отороченными черною каймою.

H. vinosa. Имѣетъ большіе листья, ярко-зеленые сверху, буроватые снизу.

H. humilis. H. metallica. H. brasiliensis. H. discolor. H. farinosa.

909. Heliophila pilosa. Нѣжное, однолѣтнее растеніе, съ темно-голубыми цвѣтами, сѣется въ парникъ, и когда уже нельзя ожидать морозовъ, разсаживается въ грунтъ, въ глинисто-дерновую землю, на солнечное мѣсто.

Другіе виды: **H. digitata.** Тоже.

H. arabioides. Однолѣтнее, цвѣточное, низенькое растеніе, съ синими цвѣтами, высѣвается прямо въ грунтъ.

H. gracilis. Оранжевое растеніе.

910. Heliotropium. *Гелиотропъ.* Изъ семейства **Asperifoliae.** Американское кустовое растеніе, съ весьма душистыми цвѣтами, имѣющими свойство поворачиваться по солнцу, отчего и получило свое названіе. (**Helios** — солнце и **trope** — вертѣться). Размножается сѣменами и черенками. Зимой теряетъ листь и въ это время требуетъ очень умеренной поливки.

Любитъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Чтобы цвѣлъ роскошнѣе, съ начала зимы держится въ оранжереѣ, а въ Февралѣ, переносится въ теплицу. Можетъ расти въ комнатѣ, а будучи посаженъ на лѣто въ грунтъ, цвѣтетъ несравненно лучше, чѣмъ въ горшкѣ. Ранняя выгонка Геліотропа въ цвѣтъ, производится слѣдующимъ образомъ: молодыя, крѣпкія, не бывшія въ грунту растенія, въ Августѣ пересаживаются въ умѣренный парникъ—тамъ будутъ цвѣсть еще до Рождества.

Виды: **H. Europeum**. Цвѣты бѣлые или блѣдно-лиловые.

H. Peruvianum. Синевато-лиловые цвѣты, съ превосходнымъ запахомъ.

H. Surprise. Съ темно-синими цвѣтами, воспитывается въ теплицѣ.

H. Voltairianum. **H. Triomphe de Liège**.

911. **Helipterum**. *Сухоцвѣтъ*. Маленькое, однолѣтнее растеніе, сѣется въ парникъ и потомъ пересаживается въ глинисто-дерновую землю.

Виды: **H. Sanfordi**. Лучшій видъ съ золотисто-желтыми цвѣтами.

H. Corymbiflorum. Не заслуживаетъ разведенія, также какъ и **H. Chionolepis** и **H. polyphyllum**.

912. **Helleborus niger**. *Морозникъ*. *Элеборъ*. *Чемерица*.

Изъ семейства **Ranunculaceae**. Дикорастущее и грунтовое садовое растеніе, на зиму требуетъ надежной покрывки. Даетъ большіе бѣлые или розовые цвѣты, вредные для пчелъ. Любитъ тѣнистое мѣсто. Будучи содержимо въ оранжереѣ постоянно, въ горшкѣ съ тучнымъ черноземомъ—цвѣтетъ въ Январѣ и Февралѣ; размножается сѣменами или дѣленіемъ корней—весною. Корни ядовиты и производятъ нарывы, какъ шанскія мушки.

Другіе виды: **H. abchasicus**, весьма ранній, весенній цвѣтокъ. Многолѣтнее садовое растеніе.

H. niger. Цвѣты зеленовато-бѣлые, снизу красноватые.

H. viridis. *Геллеборъ зеленый*. Многолѣтнее садовое, грунтовое растеніе; корни его имѣютъ тѣ же свойства, что **H. niger**.

H. caucasicus. H. colchicus. H. guttatus. H. atropurpureus.

913. *Hemerocalis. Красnodневникъ. Изъ семейства Liliaceae.* Многолѣтнее, корневое, травянистое растеніе, съ душистыми желтыми цвѣтами, можетъ расти въ комнатѣ; размножается дѣленіемъ корней; зимою содержится почти сухо; требуетъ вересковую землю, съ примѣсю половинной пропорціи дерновой, пополамъ съ навозною.

Виды: *H. flava. К. желтый. Волчья сарана.*

H. fulva. К. оранжевый. Чоловичій вишъ.

H. f. fol. variegatis. Съ бѣлополосатыми листьями и красно-желтыми цвѣтами.

H. graminea. К. сибирскій. Съ желтыми цвѣтами.

H. disticha. Большой, желтый цвѣтокъ, съ краснымъ пятномъ на каждомъ лепесткѣ.

H. alba. К. бѣлый.

H. coerulea. К. голубой.

H. Sieboldii. Оранжевая доломитная лилія. Съ бѣлыми цвѣтами; можетъ расти въ грунтѣ, но на зиму хорошо покрывается; цвѣтеть въ Августѣ и Сентябрѣ.

H. Middendorfi. Властоцвѣтъ. При содержаніи въ теплѣ, цвѣтеть въ Февралѣ.

H. gracilis. Воздушное, многолѣтнее растеніе, съ пестрыми листьями: бѣлыми и зелеными.

H. Dumortiere. H. japonica.

Оранжевые виды: *H. cordata.*

H. undulata. H. fol. variegatis.

914. *Hemiandra pungens.* Изъ семейства Labiatae. Оранжевое растеніе съ лилово-розовыми цвѣтами. Цвѣтеть все лѣто, причѣмъ горшокъ закапывается въ землю, въ цвѣтникѣ. Не терпитъ излишней сухости. Размножается черенками, въ Октябрѣ.

915. *Hemigraphis elegans.* Тепличное растеніе, съ маленькими, красивыми, синими цвѣтками.

916. *Hemimeris grandiflora.* Оранжевое растеніе.

Другіе виды: *H. gr. bicolor. H. speciosa. H. urticaefolia.*

917. **Hemitelia.** Тепличное растеніе, изъ семейства Папоротниковъ, требуетъ того же ухода, что и другія растенія этого же рода.

Виды: **H. Cibotium.** **H. acuminata.** **H. capensis.**

918. **Henfreyia Scandens.** Тепличное, ползучее растеніе, съ букетомъ большихъ, розовыхъ съ бѣлымъ цвѣтовъ. Во время покоя содержится въ весьма тепломъ мѣстѣ, въ тучной почвѣ, влажность въ которой поддерживается весьма умеренною поливкою, причемъ иногда обмываются листья; для спасенія отъ насѣкомыхъ. Лучше всего посадить это растеніе въ грунтъ теплицы и пустить ползти по стѣнѣ. Размножается черенками, которые держатъ подъ стекломъ, тщательно ихъ предохраняя отъ сырости.

919. **Hentleya violacea.** Тепличная Орхидея, съ большими фіолетовыми цвѣтами.

920. **Hepatica triloba.** *Вятрушка.* Дикорастущее.

Другіе виды: **H. t. flore pleno.** Съ синими, бѣлыми или красными, махровыми цвѣтами.

H. angulosa. *Печеночница.* Съ синими цвѣтами. Оба эти вида требуютъ того же ухода, что и *Пионы*, при содержаніи въ теплѣ—цвѣтутъ въ Январѣ.

921. **Heraclеum.** *Борщевникъ.* Изъ семейства **Umbelliferae.** Кустарникъ; разводится за его большіе листья, достигающіе сажени. Листья больше сохраняютъ свою свѣжесть если срѣзываютъ цвѣточный стебель. Размножается сѣменами и отростками. Любитъ тучную, глубокую и нѣсколько влажную дерновую землю.

Виды: **H. Panaces.** *Сладкая трава.*

H. Sphondylium. *Борщъ. Роженецъ.*

H. Sibiricum. *Борщовникъ.*

H. giganteum. Съ бѣлыми цвѣтами.

922. **Heritiera.** Дерево, могущее расти въ комнатѣ, съ красноватыми цвѣтами; размножается отводками и черенками; требуетъ листовенную землю пополамъ съ дерновою.

Виды: **H. litoralis.** **H. macrophylla.** **H. Splendens.**

923. **Hermannia denutata.** Оранжереинное растеніе.

924. *Hesperis matronalis*. *Ночная фиалка.* Изъ семейства *Cruciferae*. *Вечерница душистая.* Дикорастущее и грунтовое, садовое, медоносное растение, съ душистыми бѣлыми или фиолетовыми цвѣтами, издающими запахъ вечеромъ. Любитъ питательную землю; цвѣтеть все лѣто; въ холодной оранжереѣ распускается въ Апрѣль; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

925. *Heterocentrum*. Кустарникъ съ розовыми цвѣтами; размножается черенками и отростками отъ корня; можетъ расти въ комнатѣ; требуетъ листовую землю, съ примѣсью четвертой части вересковой и четвертой части дерновой.

Виды: *H. roseum*. *H. Mexicanum*. *H. glandulosum*. *H. Subtripplinervium*. *Хетероцентр троенервный.* Кустарникъ вышиною до 6 футъ, съ бѣлыми цвѣтами; содержится въ теплицѣ; любитъ смѣсь болотной земли, глины и перегноя. На лѣто растение ставятъ на воздухъ, въ защищенное, теплое мѣсто, хорошо зарывая горшокъ въ землю. До наступленія морозовъ растение вынимаютъ изъ грунта, разбиваютъ горшокъ, чтобы сохранить проросшій корень и пересаживаютъ его въ болѣе крупный горшокъ, ставятъ въ теплицу, чтобы зацвѣло осенью. Лѣтомъ содержится на открытомъ воздухѣ. Отцвѣтшія растения зимою содержатъ въ оранжерее, при 7° Р.; въ Мартѣ его пересаживаютъ. Разводится черенками во всякое время года.

926. *Heteropappus decipiens*. Многолѣтнее растение изъ Амурскаго края, съ синими цвѣтами, распускающимися въ Іюнь. Можетъ расти въ грунту.

927. *Heterotoma lobelioides*. Изъ семейства *Lobeliaceae*. Содержится въ умеренной теплицѣ. Цвѣты желтые съ краснымъ, похожіе на птичку съ опущенными крыльями. Размножается черенками.

928. *Heterotropa asaroides*. Изъ семейства *Aristolochicae*. Оранжерейное растение съ сердцобразными листьями, испещренными свѣтло-зелеными пятнами.

929. *Hexacentris*. Изъ семейства *Acanthaceae*. Очень красивое, многолѣтнее, кустовое растение, съ красными или жел-

тыми съ краснымъ цвѣтами, размножается черенками, требуетъ вересковую землю пополамъ съ дерновою и четвертою частью лиственной.

Виды: *H. coccinea*. Оранжевое растение.

H. Mysorensis. Вьющееся растение. Въ теплицѣ цвѣтетъ зимою, золотистыми или пурпуровыми колокольчиками; во время цвѣтенія требуетъ обильной поливки и прикрѣпленія къ рѣшетѣ. Размножается черенками и сѣменами.

930. *Hibiscus*. Изъ семейства *Malvaceae*. Вообще у насъ извѣстно подъ именемъ *Китайской розы*. Тепличное деревцо или кустовое растение, выносящее комнатную культуру, съ цвѣтами у однихъ видовъ простыми, у другихъ махровыми, розовыми, малиновыми, бѣлыми, красными, золотистыми, желтоватыми, пурпуровыми, иногда пестрыми или двухцвѣтными. Размножается черенками. Требуется свѣтлое помѣщеніе и глинисто-дерновую землю.

Виды: *H. Cooperi*. Съ крупными, ярко-красными цвѣтами, зимою содержится въ умѣренной оранжерей, лѣтомъ выставляется на открытый воздухъ, на солнечное мѣсто. Листья необыкновенно красивы, испещрены розовыми, зелеными и бѣлыми пятнами.

H. marmoratus. Оранжевое растение, большіе мраморовидные, розовые съ малиновыми разводами цвѣты. Легко размножается черенками.

H. moscheutos. Съ большимъ бѣлымъ, одинокимъ цвѣткомъ, внутри ярко-малиновымъ.

H. ferox. Тепличное растение. Листья и стволъ усажены волочками. Большой, желтый цвѣтокъ, похожій на цвѣтокъ Датуры. Любитъ тучную землю, часто перемежаемую и сильную поливку лѣтомъ. На лѣто высаживается въ грунтъ. Размножается черенками и сѣменами.

H. Abelsonius. Сѣмена имѣютъ врачебныя свойства.

H. Rosa sinensis lutea plena. Желтая махровая.

H. R. s. rubro plena. Красная махровая.

H. liliiflorus. Три послѣдніе вида, цвѣтутъ глубокою осенью, до зимы.

H. Syriacus. *H. Splendens*. *H. puniceus*.

Hibiscus vesicarius. Однолѣтнее растение, вышиною до 2

футъ, съ большими блѣдно-желтыми съ темно-пурпуровымъ глазкомъ цвѣтами; сбѣтся въ Апрѣлѣ, въ горшки; высаживается въ грунтъ, на солнечное мѣсто.

Разновидности предыдущаго: **H. Trionum.** (**H. armeniacus**). Цвѣты гораздо меньшаго размѣра, свѣтложелтые.

H. ternatus. **H. Humboldtii.**

Hibiscus palustris. *Кетмия болотная.* Многолѣтнее, грунтовое садовое растеніе.

Hibiscus esculentus. *Гомбо. Бамы стручья.* Однолѣтняя огородная овощъ, употребляется въ незрѣломъ видѣ; нѣкоторые сорта имѣютъ ароматическіе плоды. Сѣмена получаютъ съ растеній, выращенныхъ въ горшкахъ и содержащихся въ теплѣ.

931. **Hieratium aurantiacum.** *Сокольникъ оранжевый.* Получилъ это названіе, потому что думали, будто это растеніе изощряетъ зрѣніе хищныхъ птицъ. (**Нераж**—**Соколъ**). Долголѣтнее садовое растеніе, съ оранжевыми цвѣтами, требуетъ покрывки на зиму.

Другіе виды: **H. Lawsonii.** *С. французскій.* Многолѣтнее садовое, грунтовое растеніе.

H. pallescens. *С. желтоватый.* Тоже.

H. pratense. *Молочай полевой.* Дикорастущее.

H. pilosella. *Нечуй вътеръ.* Тоже.

932. **Higginsia ghiesbreghtii.** Изъ семейства **Rubiaceae.** Красное, тепличное, декоративное растеніе, съ маленькими, желтоватыми цвѣтками, окружающими вѣнкомъ самый стебель, ниже листьевъ. Размножается черенками, почти во всякое время года. На зиму ставится на свѣтлое мѣсто въ теплицѣ.

Другой видъ: **H. regalis.** Весьма красивый листъ, въ тѣнь свѣтло и темно-зеленый, снизу фіолетовый.

934. **Hindsia.** Кустовое, тепличное растеніе, можетъ существовать въ комнатѣ, съ красивыми синими цвѣтами; распускающимися весной, размножается черенками, которые держатъ подъ стекляннымъ колпакомъ, требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и листовенной, а также сильную поливку во время роста. Пересаживается въ

Январѣ или Февралѣ, причѣмъ на дно горшка кладется много черепковъ.

Виды: *H. violacea*. Съ синими цвѣтами. Чтобы придать растенію красивую форму, его часто прищипываютъ.

H. longiflora.

935. *Hippeastrum procerum*. Изъ семейства Амариллисовъ. Тепличное растеніе, съ фіолетово-лиловыми цвѣтами, покрытыми снаружѣ темными, красноватыми крапинами. Держится возлѣ рамъ. Требуется глубокой, большей и съ хорошимъ дренажемъ посуды, рыхлой и питательной почвы. Размножается посѣвомъ.

Другой видъ: *H. fulgidum flore pleno*. Съ пунцовыми, махровыми цвѣтами.

936. *Hippomane Mancinella*. Индійское растеніе. Млечнымъ сокомъ его отравляютъ стрѣлы.

937. *Hippophae rhamnoides*. (*H. taurica*). *Дереза. Облѣпиха*. Дикорастущій, иглистый кустарникъ, приносящій вкусныя, висловатыя ягоды. Нижняя сторона его узкихъ листьевъ и вѣтки серебристо-бѣлыя. Въ саду любитъ песчаную почву, выносить всякіе морозы. Размножается сѣменами, корневыми отпрысками, черенками и отводками.

Другіе виды: *H. salicifolia* Очень нѣжный кустарникъ, зимы не выносить въ открытомъ грунтѣ.

H. Canadensis. *Млечникъ канадскій*. Съ листьями серебристаго цвѣта, размножается сѣменами, черенками и отводками. Любитъ песчаную почву.

H. salicifolia. *М. верболистный*.

H. sibirica vera, *H. sibirica argentea*. *H. rhamnoides*.

938. *Noitzia coccinea*. Кустарникъ съ красными цвѣтами; въ оранжереѣ цвѣтетъ всю зиму.

939. *Hoteia japonica*. *Японская тавола*. Многолѣтнее растеніе, съ бѣлыми цвѣточками; посредствомъ содержанія въ теплѣ доводится до цвѣтенія около новаго года. Выдерживаетъ зиму въ грунтѣ безъ крыши. Любитъ питательную землю. Сырой мѣстности не выносить. Размножается дѣленіемъ куста.

940. *Hortensia opulifolia*. Японская гортензія. Можетъ расти въ грунту, но на зиму хорошо укрывается. Цвѣтетъ все лѣто, красными цвѣтами. Имѣетъ крупныя листья.

941. *Новеа*. Маленькій кустарникъ; цвѣтетъ въ Февралѣ синими, фіолетовыми, красноватыми цвѣтами.

Виды: *Н. longifolia*. *Н. celsii*. *Н. purpurea*. *Н. elliptica*. *Н. lanceolata*.

942. *Howardia caracasensis*. Изъ семейства *Rubiaceae*. Тепличное растеніе, съ розовыми цвѣтами и розовыми около нихъ листьями.

943. *Ноуа*. Изъ семейства *Asclepiadaceae*. Тепличное, вьющееся растеніе, съ душистыми цвѣтами, какъ бы сдѣланными изъ воску; размножается черенками, которые сажаются въ землю съ кусочкомъ коры растенія, отъ котораго берется черенокъ. Хорошо растетъ въ комнатѣ; зимою поливается весьма умеренно; требуетъ листовую землю, пополамъ съ дерновою и съ примѣсью незначительнаго количества песку.

Виды: *Н. carnosa centrostemma*. Такъ называемое „Восковое дерево“.

Н. Imperialis. Съ огромными фіолетовыми, внутри бѣлыми цвѣтами. Требуется большой теплоты, — землю, составленную изъ чернозема, лиственной земли и измелченныхъ древесныхъ гнилушекъ. Размножается черенками въ тепличкѣ.

Н. bella. Цвѣты бѣлые, какъ бы восковые, съ малиновою звѣздочкою внутри.

Н. coriacea. Съ желтыми цвѣтами.

Н. purpureofusca. Цвѣты свѣтло-лиловые съ темно-пурпуровымъ вѣнчикомъ.

Н. variegata. Цвѣты розовые; листья съ желтоватою или оранжевою каймою.

Н. cinamonifolia. Цвѣты лимоннаго цвѣта, съ малиновыми головками.

Н. fraterna. Большой листъ и малиновый, съ желтымъ вѣнчикомъ цвѣтокъ.

Н. australis. Тепличное, цѣпкое растеніе, съ непадающимъ листомъ и бѣлыми цвѣтами.

H. carnosae fol. variegatis. *H. campanulatae*. *H. coriacea*. *H. mollis*. *H. pendula*. *H. pottsii*. *H. rotundifolia*. *H. sieboldii*.

944. Humata Tyermanii. Низкорослое тепличное растение, съ корневищемъ, покрытымъ сребристыми чешуйками.

945. Humea elegans. Двухлѣтнее растение, съ красно-бурными цвѣтами на цвѣточномъ стержнѣ, достигающемъ нѣсколькихъ футовъ. Высѣвается въ Маѣ въ горшки, лѣто и зиму содержится въ холодной оранжереѣ и весною высаживается въ грунтъ.

946. Humulus lupulus. Хмель. Изъ семейства *Urticeae*. Дикорастущее, вьющееся, многолѣтнее растение; разводится для украшенія садовъ и ради его цвѣточныхъ шишекъ, имѣющихъ особое, наркотическое свойство. Шишки эти употребляются при изготовленіи пива, браги, портеру и нѣкоторыхъ другихъ напитковъ. Молодые побѣги его употребляются какъ салатъ. Размножается отпрысками корней и отводками.

947. Hura crepitans. Ядовитое, тропическое растение.

948. Hyacinthus. Гиацинтъ. Изъ семейства *Liliaceae*. Луковичное растение съ весьма красивыми, душистыми цвѣтами. Имѣетъ множество разновидностей можетъ расти въ комнатѣ, въ грунтъ, въ оранжереѣ и теплицѣ. Посредствомъ особаго ухода, даетъ весьма ранній цвѣтъ. Размножается семѣнами и отростками луковицъ. Вообще требуетъ особенной культуры, приемы которой весьма разнообразны. Укажемъ на нѣкоторые.

Вообще для гиацинтовъ составляется земля изъ лиственной, съ примѣсью такого же количества дерновой, по поламъ съ пескомъ.

Для болѣе успѣшной выгонки гиацинта, въ особенности для лучшаго развитія его стебля, примѣниваютъ, къ приготовленной для него, землѣ, на десять гарнцевъ ея, четверть лота *Kali natrium* — Селитры, или поваренную соль въ довольно сильныхъ дозахъ; либо обливаютъ горшки солянымъ растворомъ; особенно если при посадкѣ луковицъ, окажется земля не довольно влажною.

Въ началѣ Октября луковицы гиацинтовъ сажаютъ въ горшки,

причемъ на дно горшка кладутъ рядъ битыхъ черепковъ, потомъ насыпаютъ немного крупнаго рѣчнаго песку, кладутъ землю и опять насыпаютъ немного такого же песку, въ который сажаютъ луковицу, обсыпая ее пескомъ и на вершокъ покрываютъ землею, уминая ее у стѣнокъ горшка. Луковицы, такимъ способомъ посаженныя или ставятъ на сырой песокъ въ подвалѣ, холодную комнату или къ задней стѣнѣ оранжереи, заваливая ихъ сверху на четверть, сыроватымъ пескомъ; либо копаютъ канаву въ грунту, глубиною четверти въ три, ставятъ на дно канавы горшки съ гiацинтами, заваливаютъ землею и покрываютъ на поларшина свѣжимъ навозомъ, увеличивая эту покрывку съ усиленіемъ морозовъ. Песокъ, на которомъ стоятъ гiацинты въ подвалѣ, въ оранжереѣ или комнатѣ, изрѣдка увлажняется. Ставятся также гiацинты въ порожній парникъ, гдѣ они сохраняются подъ землею, которою ихъ надлежитъ покрыть на 6—12 дюймовъ, до сильныхъ морозовъ. Другіе зарываютъ гiацинты въ погребѣ, въ песокъ, которымъ покрываютъ ихъ дюймовъ на шесть, причемъ, если песокъ, на который ставятъ гiацинты—сухъ, то его предварительно сильно поливаютъ.

Недѣль черезъ шесть послѣ посадки гiацинтовъ ихъ вынимаютъ и ставятъ въ комнату, на окна, покрывая вылезающее изъ земли растеніе колпакомъ изъ синей, сахарной бумаги или изъ жести, либо просто опрокинутымъ цвѣточнымъ горшкомъ. Затѣмъ гiацинты начинаютъ сильно поливать на поддонъ, а изрѣдка и сверху, къ краямъ горшка, стараясь не мочить самую луковицу, а для того дѣлая вокругъ луковицы нѣкоторое возвышеніе изъ земли. Когда цвѣточная почка подымется надъ землею и начнетъ принимать свой надлежащій видъ,—колпакъ, покрывающій растеніе, снимаютъ и даютъ растенію какъ можно больше свѣта, пока оно не распустится совершенно, тогда его предохраняютъ отъ солнца, чтобы оно дольше цвѣло; съ этою же цѣлью его утромъ и вечеромъ обрызгиваютъ водою.

Другой способъ выращивать гiацинты, это сажать ихъ въ вазочки, (въ видѣ бокала) съ водою. Для этого выбирается сосудъ такой ширины вверху, чтобы луковица гiацинта въ него нѣсколько входила; сосудъ наливается водою, въ него сажается луковица такъ, чтобы своимъ корнемъ касалась воды и ставится въ темное,

холодное мѣсто. Луковица пустить корни и когда цвѣточный стебель выйдетъ вершка на два, растеніе ставится въ комнату на окно. Въ сосудахъ съ водою вырастаются только самые лучшіе, одинокіе сорта.

Гіацинты могутъ быть выращиваемы тѣмъ же порядкомъ, что и въ землѣ, будучи посажены въ сырой мохъ.

Простые Гіацинты цвѣтутъ раньше махровыхъ и бываютъ душистѣе ихъ; ранѣе же всѣхъ прочихъ цвѣтутъ такъ называемые *Парижскіе* (*Hyacinthus orientalis praecox*), мелкими, рѣдкими, но душистыми цвѣтами.

Луковицы обыкновенно выписываютъ осенью отъ сѣмено-торговцевъ. Получивъ луковицы, ихъ до посадки, надо держать нѣсколько дней въ сухой теплой комнатѣ, чтобы онѣ обсохли; но тѣ, у которыхъ уже появились корешки, надлежитъ посадить тотчасъ-же; если при луковицахъ сохранились маленькія дѣтки, то ихъ слѣдуетъ осторожно отдѣлить, не повреждая плевъ главной луковицы.

Выгоняѣ надлежитъ подвергать только вполне здоровую луковицу, т. е. крѣпкую, съ гладкою кожицею, съ здоровымъ корневымъ вѣнчикомъ и твердую въ томъ мѣстѣ, гдѣ образуется почка.

Гіацинты лучше разводить въ горшкахъ, которые дѣлаются выше своей ширины; самые напримѣръ, удобные для этого горшки, имѣющіе въ вышину 5 дюймовъ и отъ 3 до 4 дюймовъ ширины.

Горшекъ долженъ быть хорошо выжженъ, иначе онъ раскисаетъ во время нахожденія въ землѣ и разламывается при выниманіи, отчего гіацинтъ пропадаетъ, потому что онъ не терпитъ пересадки.

Желая имѣть Гіацинты въ цвѣту къ Рождеству, надлежитъ пускать въ гонку самые ранніе сорта гіацинтовъ, которые и зарываются въ землѣ отдѣльно, въ послѣднихъ числахъ Октября, а приставляются только тѣ, у которыхъ уже образовались надежные ростки и корни.

Пристанавливая Гіацинты, слѣдуетъ сперва полить ихъ обильно теплою водою.

Когда Гіацинтъ зацвѣтетъ, его надо ставить въ холодную комнату, гдѣ онъ будетъ цвѣсть до 6 недѣль, въ теплой же комнатѣ онъ отцвѣтаетъ въ 2 недѣли.

Когда Гіацинтъ отцвѣтаетъ, сначала его поливку уменьшаютъ, а потомъ вовсе прекращаютъ. Весною луковицу вынимаютъ, не повреждая корня и зарываютъ въ сухомъ мѣстѣ, въ землю или песокъ; сухія луковичи очищаютъ отъ побочныхъ луковочекъ и сухихъ пленокъ и осенью сажаютъ въ грунтъ, гдѣ онѣ хорошо цвѣтутъ на слѣдующій годъ или черезъ годъ; но тѣ луковичи, которыя выгонялись въ водѣ къ второй посадкѣ уже не годны.

Въ торговлѣ извѣстно окло 200 названій различныхъ разновидностей Гіацинтовъ, раздѣляемыхъ на нѣсколько группъ.

Махровые Гіацинты: Черные (темно-синіе); синіе, голубые; бѣлые; бѣлые съ розовымъ; розовые; красные; желтые; фіолетовые.

Одинокіе Гіацинты: тѣхъ же цвѣтовъ.

949. Hydrangea. Изъ семейства **Saxifragaceae**. Оранжевое, кустовое растеніе, съ бѣлыми и розовыми цвѣтами. Размножается черенками; можетъ расти въ комнатѣ; зимою теряетъ листь и въ это время содержится сухо, при 3° Р. Требуется тучную глинистую землю съ пескомъ или землю, составленную изъ равныхъ частей вересковой, дерновой и лиственной—отъ навозной же земли, не цвѣтеть и даже гибнетъ. Лѣтомъ служить украшеніемъ садовъ и клумбъ; но вообще ставится на затѣненномъ мѣстѣ. Пригодно для ранней выгонки; можетъ цвѣсти въ Январѣ и Февралѣ. Чтобы заставить это растеніе цвѣсти такъ рано, берутъ крѣпкій экземпляръ, съ развитыми почками и ставятъ въ тѣнистое мѣсто теплицы. Когда Гидрангеа пойдетъ въ ростъ, ежедневно ее поливаютъ, а когда у ней образуются цвѣты, даютъ ей свѣжаго воздуха и ставятъ къ свѣту. Осенью, растеніе, предназначенное къ выгонкѣ, держать сухо. Обыкновенно Гидрангею пересаживаютъ въ Мартѣ и ставятъ на снѣгъ, начинаютъ поливать и приучаютъ къ воздуху.

Виды: **H. Hortensis.** *Гортензіа.* Чтобы придать его цвѣтку синій цвѣтъ, землю его поливаютъ растворомъ желѣзнаго купороса.

H. H. foliis variegatis. *Гортензіа* съ пестрыми листьями
H. japonica rosalba. Съ ярко-розовыми, расписанными тем-

ными полосками, цвѣтами. Бываетъ разновидность этого растенія, съ бѣлыми цвѣтами.

H. stellata plena. H. s. prolifera. Съ свѣтло-розовыми цвѣтами, въ середкѣ зелеными.

H. Thunbergia. Съ голубыми или розовыми цвѣтами.

H. japonica fol. argenteo variegatis. Японская Гортензія, съ росписными бѣлыми листьями; разводится черенками раннею весною. Цвѣты бѣлые съ фіолетовымъ.

H. pubescens. Съ зонтикомъ бѣлыхъ цвѣтовъ и весьма изящными листьями, на малиновыхъ черенкахъ, съ малиною жилкою во всю длину листа снаружи и такими же жилками снизу. Размножается черенками. Содержится въ оранжереѣ и на лѣто выставляется на воздухъ.

H. Imperat. Eugenie. H. Lindleyana. H. Otaksa. H. paniculata grandiflora.

950. *Hyllia prasiatha.* Замѣчательный тепличный кустарникъ, живущій на другихъ деревьяхъ съ зеленоватыми цвѣтами: требуетъ притѣненія и довольно сильной влажности.

951. *Hymenae courbaril.* Южно-американское растеніе, изъ него добывается американскій *копалъ*.

Другой видъ *H. involucrata var. flore pleno.* Съ розовыми цвѣтами; на лѣто высаживается въ грунтъ въ вересковую землю, въ затѣненное отъ солнца мѣсто; требуетъ сильной поливки; на зиму вносится въ оранжерею.

952. *Hymenodium crinitum.* Изъ семей. *Filices.* Тепличное растеніе, съ необыкновеннаго вида широкими, большими, зелеными листьями, отороченными бахромою коричневыхъ волосковъ.

953. *Hyophorbe.* Родъ Пальмъ. Дерево средней величины, съ гладкимъ стволомъ и бѣлыми цвѣтами.

Виды: *H. indica (Areca lutescens)* со стволомъ оранжеваго цвѣта.

H. Amaricaulis. (A. speciosa).

H. Verschaffeltii (Areca verschaffeltii). Весьма распространенное растеніе. Пальма эта вообще размножается только отдѣленіемъ дѣтенокъ, ихъ слѣдуетъ отнимать не ранѣ

какъ образуютъ хотя одинъ корешокъ и отводокъ поставить въ парничекъ.

954. *Nyoscyamus niger*. *Бьялена*. Изъ семейства. *Solanaceae*. Дикорастущее, многолѣтнее, ядовитое растеніе, разводится, какъ имѣющее нѣкоторыя лекарственныя свойства, посѣвомъ осенью прямо въ грунтъ.

Другіе виды: *N. orientalis*. *Бьялена восточная*. Многолѣтнее, грунтовое, садовое растеніе.

N. aureus. Двухлѣтнее растеніе, съ желтыми цвѣтами, высѣвается прямо на гряды и зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

955. *Nyospathe*. Родъ Пальмъ. Небольшое, тростниковое растеніе, съ прямымъ, гладкимъ стволомъ.

Виды: *N. elegans*. *N. pubigera*. Размножается сѣменами.

956. *Hypericum ascyron*. *Плакунъ*. *Луговой Звѣробой*, Семейства *Hypericineae*. Дикорастущее и садовое, долголѣтнее растеніе.

Другіе виды: *N. perforatum*. *Звѣробой*. *Заячья кровца*. Небольшой кустарникъ съ цвѣтами непріятнаго запаха; размножается сѣменами и дѣленіемъ куста; на зиму, пригнутый къ землѣ нѣсколько прикрывается.

N. quadrangulum. *Звѣробой*. Дикорастущее.

N. pyramidatum. *З. пирамидальный*. Многолѣтнее, грунтовое, садовое растеніе.

N. virginicum. *З. Виргинскій*. Тоже.

N. chinense. Содержится въ оранжереѣ.

N. elegans. Многолѣтнее растеніе, съ желтыми цвѣтами; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

N. hircinum. *N. Calicinum*.

957. *Nyphaene*. Родъ Пальмъ. Нѣкоторые виды имѣютъ вѣвистый стволъ, размножается сѣменами.

Виды: *N. thebaica*. *Египетское инбирное дерево*, плодъ котораго и наружностью и вкусомъ похожъ на инбирный пряникъ (*Gingerbread*).

N. crinita. Стволъ не вѣтвится, также какъ и *N. venricos*, *N. coriacea*.

958. *Nypocyrtia scabrida*. Тепличное растеніе, съ пунцовыми цвѣтами. Сажаютъ въ корзины, подобно Орхидеямъ; размножается черенками.

Другой видъ: *H. leucostoma*. Съ желтыми цвѣтами.

959. *Hypoxis stellata*. Семейство. *Hypoxideae*. Оранжевое растение съ цвѣтами бѣлыми, въ серединѣ фиолетовыми. Требуется той-же культуры, что и *Ixias*.

960. *Hyprobromus alatus*. Африканское дерево, идетъ на цѣнные подѣлки.

961. *Hyssopus officinalis*. *Иссопъ аптечный*. Изъ семейства. *Labiatae*. Многолѣтнее растение. Любитъ рыхлую почву. Разводится сѣменами осенью и дѣленіемъ корней весною. Молодые листья и побѣги зелеными употребляются какъ салатъ и сухими въ аптекахъ, какъ имѣющіе лекарственные свойства, при чемъ предназначаемые для лекарства побѣги и листья срѣзываются прежде чѣмъ растение разцвѣтетъ. Даетъ цвѣты синіе или блѣдно-розовые.

Другой видъ: *H. angustifolius*. *И. узколиственный*. Дикорастущій, медоносный кустарникъ, цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

962. *Icacaranda digitaliflora*. Съ крупными, лиловыми цвѣтами; все лѣто содержится въ оранжереѣ, при обильномъ доступѣ воздуха и свѣта; съ конца Октября до Мая держится въ теплицѣ. Размножается черенками, причемъ листья черенка до половины обрѣзываются.

963. *Iambosa*. *Ямбозовое дерево*. Изъ семейства *Myrtaceae*. Оранжевое растение съ бѣлыми и красными цвѣтами; зимою поливается очень умеренно; можетъ расти въ комнатѣ; размножается черенками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: *I. vulgaris*. Тропическое растение; ароматные плоды употребляются въ пищу.

I. Malaccensis. *Ямбовое дерево*. Красные плоды его величиною съ яблоко пахнутъ розою и употребляются въ пищу. Группы большихъ, розовыхъ цвѣтовъ, сидятъ у самого стебля.

I. Korthalsi. *Ямбоза Кортальса*. Декораціонный, тепличный кустарникъ; сохраняетъ зелень зимою, имѣетъ бѣлые цвѣты; любитъ рыхлую, глинисто-дерновую землю, въ которой примѣшивается третья часть листовъ или вересковой; размножается черенками.

964. *Iatropa multifida*. Изъ семейства. **Euphorbiaceae.** Южно-американское растеніе, имѣющее лекарственныя свойства.

Другіе виды: ***I. glauca*.** Тропическое растеніе. ***I. lanipha*.** Корень употребляется въ пищу жареный, подъ именемъ „сладкой кассавы“.

965. *Iberis amara*. *Иберисъ.* Однолѣтнее бордюрное растеніе, съ бѣлыми цвѣтами, находится у насъ и въ дикомъ состояніи, высѣвается прямо въ грунтъ.

Другіе виды: ***I. umbellata*.** Съ бѣлыми и розовыми цвѣтами, высѣваются раннею весною прямо въ грунтъ.

I. u. superba*.** ***I. u. nana rubra*.** ***I. u. nana purpurea*.** ***I. u. var. purpurea*.** Съ темно-пурпуровыми цвѣтами. ***I. u. carnea*.** ***I. coronaria*.** ***I. lagscae*.** (I. pectinata***). Съ бѣлыми цвѣтами.

***I. frutescens*.** Оранжевое растеніе.

***I. sempervirens*.** *Гръчникъ. Ръзуха.* Съ бѣлыми цвѣтами, въ теплицѣ зацвѣтаетъ въ Январѣ.

***I. lusitanica*.** Съ бѣлыми цвѣтами.

966. *Iessenia*. Родъ Пальмъ, у насъ въ оражереяхъ еще не встрѣчающійся.

Виды: ***I. polycarpa*.** Изъ Новой Гренады. ***I. oligocarpa*.**

967. *Iguanura*. Родъ Пальмъ. Принадлежитъ къ тростниковымъ породамъ, имѣющимъ перисто-разсѣченные листья.

Виды: ***I. remotiflora*.** ***I. leucocarpa*.**

968. Пех. *Падубъ. Острокрыль. Дикій Тернъ.* Семейства **Ericaceae.** Дикорастущій кустарникъ, съ колючими листьями.

Виды: ***I. cornuta*.** Съ красными ягодами. Любитъ тѣнь и песчанистую землю.

***I. cassine*.** Американское дерево. Листья употребляются какъ чай.

***I. vomitaria*.** Изъ листьевъ его туземцы Америки готовятъ опьяняющій напитокъ.

***I. Macoucoua*.** Американское дерево.

***I. paraguayens*.** Сушеные листья имѣютъ огромное употребленіе въ качествѣ чая въ Америкѣ, подъ именемъ *Мате* или *Парагвайскаго чая*.

***I. aquifolium*.** *Вязождъ.* Кустарникъ, любитъ защищен-

ную мѣстность зимою, съ всегда блестящими зелеными листьями. Любитъ невоздѣланную, хрящеватую, гористую мѣстность. У насъ дико растетъ на Южномъ Кавказѣ. При разведеніи требуетъ умѣренной почвы и отѣненной мѣстности, размножается сѣменами, черенками и прививкою.

I. ораха. I. ferax. I. angustifolium.

I. angustifolium aliata aureo marginata. Листья зеленые съ бѣлымъ.

969. Plaiera canarinoides. Изъ семейства Loaseae. Оранжевое растение, съ темно-оранжевыми, испещренными болѣе темными черточками—цвѣтками, въ видѣ понизлыхъ колокольчиковъ, съ красивыми листьями. Высѣвается осенью, въ Маѣ разсаживается въ плошки и по окончаніи морозовъ пересаживается въ цвѣтникъ. Также размножается черенками.

970. Plidium. Очень красивое оранжевое дерево, съ желтоватыми или коричневыми, звѣздовидными цвѣтами, съ сильнымъ анисовымъ запахомъ. Можетъ содержаться и въ комнатѣ, размножается черенками и сѣменами. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей вересковой, дерновой и лиственной.

Виды: **I. anisatum. I. floridanum. I. religiosum. I. parviflorum.**

971. Incarvillea sinensis. Прекрасное, двухлѣтнее, травянистое растение, съ бѣло-розовыми цвѣтами; можетъ расти и въ комнатѣ; размножается сѣменами; требуетъ листовую землю, пополамъ съ дерновою и съ примѣсю четвертой части песку.

972. Indigofera argentea. *Индиго.* Оранжевое растение изъ семейства papilionaceae.

Другіе виды: **I. spinosa. I. tinctoria.** *Индиго Красильное.* Полукустарникъ, съ перистыми листьями и голубыми цвѣтами. Изъ него добывается, въ Китаѣ и Индіи, синяя, кубовая краска.

973. Inga. Изъ семейства Leguminosae. Очень красивое американское дерево, съ воздушными легкими листьями, похожими на листья акаціи, — бѣлыми и ярко-малиновыми цвѣтами — кистью или, лучше сказать, въ видѣ раскрытаго вѣера. Можетъ расти въ комнатѣ, но обыкновенно содержится въ теплицѣ зимою, а

лѣтомъ въ оранжереѣ. Размножается черенками; требуетъ листовую землю, пополамъ съ вересковою; пересаживается въ Январѣ, причемъ на дно горшка кладется много черепковъ.

Виды: *Inga dulcis*. Даетъ сладкіе стручки, употребляемые въ пищу.

I. pulcherrima. Будучи посажено черенкомъ, весьма скоро образуетъ корни. Часто покрывается бѣлыми насѣкомыми, отъ которыхъ одно спасеніе: часто очищать растеніе щеткою.

I. ferruginea. Съ малиновыми цвѣтами въ видѣ распушеннаго вѣера.

974. *Inula helenium*. *Девясилъ настоящий*. Изъ семейства *Synanthreae*. Дикорастущее, многолѣтнее, грунтовое, садовое растеніе, цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ; корни его, собираемые осенью, употребляются какъ лекарство для животныхъ и варятся въ сахарѣ, какъ лакомство. Любитъ мягкую, глинистую, влажную почву. Размножается весною посѣвомъ и дѣленіемъ корней.

Дикорастущіе виды: *I. dysenterica*.

I. britanica. *Золотушникъ*.

I. conyza. *Богатинка*.

I. hirta. *Варажя*.

I. oculis. Christi. *Ръзакъ*.

I. gallicina. *Сердечная*.

975. *Imantophyllum miniathum*. *Кливія Суриковая*. Изъ семейства Амариллисовъ. Луковичноерастеніе, съ красными цвѣтами и изящными листьями. Ухажъза этимъ растеніемъ тотъ же, что и за Амариллисами, причемъ дается растенію краткій періодъ покоя, съ Февраля по Апрѣль. Поливка его въ этотъ періодъ времени если и уменьшается, то однако не до того, что бы засохли его листья.

Другой видъ *I. cyrtanthiflorum*. Содержится въ умѣренной теплицѣ. Производитъ буветъ красно-оранжевыхъ цвѣтовъ.

976. *Impatiens balsamina*. (*Hortesis*) *Балзаминъ*. Семейство *Balsaminaceae*. Однолѣтнее растеніе не пользующееся большимъ уваженіемъ русской, порядочной, публики. Мясистый стебель этого растенія такъ нѣженъ и прозраченъ, что по немъ можно изучать движеніе соковъ растенія. Коренной видъ имѣетъ простые, красные цвѣты, но въ настоящее время разведено

множество махровыхъ и полумахровыхъ разновидностей, колеровъ самыхъ разнообразныхъ сочетаній. Высѣвается въ парникъ или въ горшки и высаживается въ цвѣтнѣхъ, когда уже нельзя ждать морозовъ, на солнечное мѣсто, въ рыхлую питательную землю и поливается жидкимъ удобреніемъ.

Въ продажѣ извѣстны, *махровые*, бальзамины разныхъ цвѣтовъ, а именно: тѣлеснаго цвѣта, перловаго, шарлаховаго, лиловаго, пурпуровые, бѣлые — всѣ разныхъ оттѣнковъ и пестрые, въ которыхъ названные цвѣта смѣшаны между собою. Также разнообразны: *низкіе*, *махровые бальзамины* и *розовцѣтныя*, но въ особенности хороши *камелевые бальзамины*, представляющіе въ своемъ цвѣтѣ, удивительное сочетаніе красокъ пышность и махровость.

Виды: *I. glanduligera*. Стебель достигаетъ 6 футовъ, съ развѣтвленіями отъ самаго низа, съ большими, пурпуровыми цвѣтами. Сажается отдѣльно на газонѣ. Сѣмена высѣваются въ Мартѣ, въ оранжереѣ; когда взойдутъ, разсаживаются по одиночкѣ въ горшки и въ началѣ Іюня пересаживаются въ грунтъ, въ сильно удобренную землю, на мѣсто, защищенное отъ вѣтра. Разновидности его: *I. tricornis* и *I. longicornis*, — послѣдній не заслуживаетъ разведенія.

Существуютъ многолѣтніе виды бальзамина, а именно:

I. Ierdonea. (*I. Ierdoniana*). Съ оранжево-красными цвѣтами, распускающимися во влажной теплицѣ, даже на молодыхъ растеніяхъ.

I. platipetala. Съ изящными розовыми цвѣтами, весьма быстро размножается черенками. Вслѣдствіе быстрого размноженія этого тепличнаго растенія, его можно имѣть въ цвѣту весь годъ. Для этого содержать въ теплицѣ только молодые растенія, даютъ имъ тучную землю и сильную поливку во время лѣта.

I. repens. Съ крупными, желтыми цвѣтами, сидящими по одиночкѣ на стеблѣ растенія. Въ Маѣ черенки, сохраненные въ оранжереѣ зимою, высаживаются въ грунтъ на открытый воздухъ, гдѣ и развиваются.

I. hooqeriana. Цвѣты бѣлые. Нижняя часть цвѣтка испещрена малиновымъ.

I. arondiflora. Многолѣтній бальзаминъ, размножается черенками и отростками. Черенки сажаются въ дюймовые горш-

ки, наполненные до половины черепками, на нихъ насыпаютъ грубоволокнистой вересковой земли, а сверху ея чистый песокъ. Черенки вырѣзываютъ изъ мясистыхъ утолщенныхъ междоузлій и сажаютъ въ песокъ наклонно, такимъ образомъ, чтобы только вершина, и то немного, выходила изъ песка, а нижній конецъ приходился бы къ краю горшка, это потому, что корни растенія развиваются на всемъ протяженіи междоузлій. Черезъ 6 недѣль черенки пересаживаются въ горшки.

977. Imbricaria maxima. Тропическое растеніе, съ очень вкусными плодами, имѣющими видъ апельсиновъ.

978. Imperatoria ostruthium. *Потомонъ аптечный. Царскій корень.* Дикорастущее въ Швейцарскихъ горахъ лекарственное растеніе.

979. Iochroma tubulosum. Прекрасный кустарникъ, обыкновенно содержится въ умѣренной оранжереѣ, но на лѣто его можно высаживать въ грунтъ, откуда надлежитъ вынимать въ концѣ Сентября. Требуется тучную землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой и вересковой съ нѣкоторою примѣсью совершенно перепрѣвшаго навоза. Послѣ того, какъ отцвѣтетъ его обрѣзываютъ. Размножается черенками въ половинѣ Августа, которые держатся подъ стекляннымъ колпакомъ.

Другіе виды: **I. Warscewiczii.** Съ понижеными фіолетовыми цвѣтами. Легко размножается черенками.

I. coccineum. Съ красными цвѣтами.

980. Ionesia. Изъ семейства **Leguminosae.** Тепличное дерево, съ лоснящимися листьями и большими букетами алыхъ цвѣтовъ. Размножается отводками и черенками. Требуется землю, составленную изъ дерновой и листовенной, съ нѣкоторою примѣсью песку.

Виды: **I. Asoca.** Превосходный, большой букетъ огненно-красныхъ цвѣтовъ, съ длинными, розовыми тычинками и пестиками. **I. Javanica.**

981. Ionopsidium acaule. Маленькое, бордюрное, однолѣтнее, дерновое растеніе, почти не имѣетъ стеблей; съ свѣтло-лиловыми цвѣтами; сѣется, въ Апрѣль, въ горшки и потомъ раз-

саживается въ цвѣтникъ. Получило свое названіе по сѣдству съ фіалкою. (*Ionopsis* — фіалковый).

982. *Iossinia Lamarkii*. Изъ семейства *Myrtaceae*. Содержится въ умѣренной теплицѣ. Съ прекрасными, почти круглыми листьями, плотностью похожими на листь *Ficus elastica* и бѣлыми съ желтымъ тычинками—цвѣтками. Требуется той же культуры что и *Eugenia*.

983. *Ipomea (Pharbitis hispida. Convolvulus major)*. Семейство *Convolvulaceae*. *Ипомея. Крученые панычи*. Вьющееся однолѣтнее растеніе, достигающее двухъ сажень; съ бѣлыми, фіолетовыми, пурпуровыми, синими, голубыми, малиновыми и пестрыми цвѣтами. Сѣется въ Мартѣ, прямо въ грунтъ, въ парникъ или теплицу; разсаживается въ горшки и оставляется до конца Мая, пока не образуетъ крѣпкихъ экземпляровъ, затѣмъ разсаживается на солнечное мѣсто, около бесѣдокъ, заборовъ и тому подобнаго, въ рыхлую, питательную землю. Цвѣты раскрываются только въ свѣтлую погоду и преимущественно по утрамъ. Въ торговлѣ извѣстно очень много видоизмѣненій этого растенія, напримѣръ:

I. Nil. Съ голубыми цвѣтами.

I. lutea. Съ желтыми цвѣтами.

I. quamoclit. Съ маленькими, суриково-красными цвѣтами. Какъ растеніе совершенно южное, у насъ цвѣтетъ очень рѣдко.

I. bonanox. Съ лиловыми цвѣтами.

I. purpurea. I. purpurea alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

I. p. striata. Съ пестрыми цвѣтами.

I. p. azurea. С небесно-голубыми цвѣтами.

I. p. rosea. I. p. atrosanguinea. I. p. incarnata. I. p. cermesina. I. p. lilacina. I. p. Michauxi. I. p. ex India. I. p. tricolor. I. horsfalliae. Розовая, съ темно-малиновыми цвѣтами.

I. marmorata. Мраморовидные цвѣты.

I. violacea vera. I. limbata. I. coccinea. I. hederacea. superba. I. atrovioleacea. I. lilacina. I. limbata elegantissima. Существуетъ тепличная Ипомея. Это травянистое или древесное, вьющееся растеніе, можетъ воспитываться и въ комнатѣ. Воронкообразные цвѣты бѣлые, розовые, малиновые

и синіе размножается сѣменами, черенками и отводками. Требуется рыхлой, но питательной земли. Зимой корни этого растения содержатся довольно сухо. Въ теплицѣ Ипомею эту пускаютъ вдоль рамъ или по шпаламъ.

Виды тепличной Ипомеи.

I. rubro-coerulea. Съ темно-голубыми цвѣтами.

I. thyrianthina. Большой цвѣтокъ темно-малиноваго цвѣта, съ болѣе свѣтлымъ отливомъ, содержится въ умѣренной теплицѣ или еще лучше—въ оранжереѣ. Лѣтомъ можетъ расти въ грунтъ. Зимой содержится сухо. Размножается черенками и сѣменами.

I. Aitonii. I. Horsfalliae. I. insignis. I. Leari. I. Lindleyi. I. vitifolia. I. atro purpurea. I. triloba. I. pentaphylla. I. Indica.

984. Ipomopsis elegans. Красивое, двухлѣтнее растеніе, трудно разводимое въ нашемъ климатѣ; имѣетъ ярко-красные цвѣты съ бѣлыми пятнами.

Другой видъ: **I. coronopifolia.** Съ красными цвѣтами, сѣмена этого растения высѣваются въ Маѣ или Іюнѣ, въ песчаную землю; всходы переносятся въ парникъ; когда подрастутъ, разсаживаютъ въ горшки и будучи приучены къ воздуху, высаживаются, съ горшкомъ въ цвѣтникъ. Зимой содержится въ оранжереѣ, а весною высаживается въ грунтъ. Требуется умѣренную поливку.

985. Iresine. Полукустарниковые, Бразильскіе Амаранты. Изъ семейства **Amarantaceae.** Зимой содержится въ теплицѣ. Весною быстро размножается черенками и высаживается въ грунтъ, причемъ стебли его пригибаются къ землѣ. Имѣетъ пушистыя вѣтви отчего и получило свое названіе (*eiros*.—шерсть).

Виды: **I. Herbsti (Achirantes verschaaffelti),** съ черно-красными листьями.

I. Herbsti fol. aureo reticulatis. Имѣетъ зеленые листья, съ золотистыми жилками.

I. Lindeni. Темно-зеленые листья, съ ярко-малиновыми жилками, на такихъ же черенкахъ и стебляхъ.

986. Iriartea. Родъ пальмъ тропической Америки. Имѣетъ стебель, не касающійся земли, но (въ дикомъ состояніи), отстоя-

щій отъ ней аршина на три, будучи поднять выдавшимися кореньями, какъ бы подпорками. Можетъ расти въ комнатѣ. Требуется тепличной культуры, общей для другихъ пальмъ. Размножается сѣменами.

Виды: *I. praemorsa*. *I. exorrhiza*. *I. ventricosa*. *I. Andicola*. *I. cornuta*. *I. phaescarpa*.

987. *Iris*. Изъ семейства *Irideae*. *Косатикъ*, *Ирисъ*. Многолѣтнее, корневое травянистое растеніе, съ длинными ножеобразными листьями и красивыми бѣлыми, желтыми, синими и лиловыми цвѣтами, изъ которыхъ нѣкоторые душистые. Разводится въ грунту. Можетъ расти и въ комнатѣ. Размножается дѣленіемъ корней и сѣменами. Зимой корни его содержатся въ чуть влажной землѣ и даже въ грунту, при надежной крышкѣ. Землю требуетъ составленную изъ ровныхъ частей дерновой, вересковой и торфяной, впрочемъ на землю не прихотливо.

Виды: *I. Persica*. Душистые цвѣты на короткомъ стеблѣ, фіолетовые съ бѣлымъ и оранжевымъ.

I. Xiphium. *И. Испанскій*. Иногда даетъ махровые цвѣты.

I. germanica. *Пролѣска*. *И. Германскій*.

I. sibirica. *И Сибирскій*. *Бубеньчики*. Съ темно-синими цвѣтами.

I. s. alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

I. aphylla. *К. безлистный*.

I. biflora. *К. двуцвѣтный*.

I. graminea. *К. пыреевидный*. Съ бѣлыми и пурпуровыми цвѣтами.

I. güldenstaedtiana. *К. Гильденштедта*.

I. florentina. *К. флорентійскій*. Лекарственное растеніе.

I. hungarica. *К. Венгерскій*. Съ синими цвѣтами.

I. lutescens. *К. желтый*.

I. pseudo caros. *К. водяной*.

I. pumila. *К. низкій*. Цвѣтетъ весь Май синими цвѣтами.

I. p. coeruleo. Тоже, съ голубыми цвѣтами.

I. p. violaceo. Тоже, съ фіолетовыми цвѣтами.

I. sambucina. *И. бузинообразный*.

I. xurphioides. *И. Англійскій*. Имѣетъ множество разновидностей.

I. reticulata. Маленькое растеніе, лепестки цвѣтка его съ

края фіолетовые, а по срединѣ желтые, съ темными жилками. Цвѣтетъ самую раннею весною. Можетъ подвергаться ранней выгонѣ. Вообще нѣкоторые виды Косатика, а именно: *persica*, *pumila*, *xuphioides*, *xiphium*, *reticulata*, способны для ранней выгонки въ цвѣтъ. Для этого разсаживаютъ по одному Ирису въ небольшой горшокъ, умеренно поливаютъ и ставятъ въ холодную оранжерею. Въ концѣ Января, растеніе ставятъ къ окну въ теплицѣ, гдѣ оно и разцвѣтаетъ въ Апрѣлѣ, но при этомъ надо имѣть въ виду что растеніе это не терпитъ нагрѣванія снизу.

I. Susiana. *Траурная млія*. Большіе цвѣты бархатистаго вида, темно-фіолетово-бурые, съ пурпуровымъ отливомъ. Любитъ глинистую, но отнюдь не навозную землю и содержится въ оранжереѣ у окна.

I. pavonica. (*Ferraria tricuspis*). Съ бѣлыми листьями, испещренными синими пятнами.

I. tuberosa. Съ бархатистыми, пурпурово-фіолетовыми цвѣтами, безъ искусственной выгонки распускается въ Апрѣлѣ.

I. alata. Съ голубыми и желтыми цвѣтами, отличается раннимъ цвѣтеніемъ.

Существуютъ виды касатика, растущіе въ дикомъ состояніи и не разводимые въ садахъ:

I. biglumis. *Пискульникъ*.

I. flavissima. *Волній огурецъ*.

Дикорастущее многолѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ въ Маѣ.

I. rhutenica. *Кошатникъ. Русскій косатикъ*. Медоносное растеніе, цвѣтетъ весною пахучими, фіолетовыми цвѣтами.

I. iberica. *К. испанскій*. Весьма красивое растеніе, вышиною не болѣе четверти аршина, съ единственнымъ, но весьма крупнымъ цвѣткомъ, нижняя часть котораго лиловая, а верхняя бѣлая, та и другая испещрена лиловыми полосками. На Кавказѣ растетъ на открытомъ воздухѣ, но у насъ не выдерживаетъ грунтовой культуры и содержится въ горшкахъ. Для этого берутъ плоскіе горшки, наполняютъ ихъ смѣсью глинисто-дерновой земли, съ большимъ количествомъ песку и нѣкоторою частью перегноя и торфа. Въ каждый горшокъ сажаютъ столько корневищъ, сколько можетъ помѣститься. Зимой держать растеніе въ мѣстѣ, защищенномъ отъ

мороза; въ Февралѣ, когда оно пойдетъ въ ростъ, горшки переносятъ на свѣтлое мѣсто оранжереи, до цвѣтенія поливаютъ лишь просохнетъ земля, въ Маѣ поливку уменьшаютъ постепенно, потомъ прекращаютъ вовсе, а въ Сентябрѣ или Октябрѣ, старую землю отряхаютъ съ корневищъ и сажаютъ ихъ въ свѣжую.

I. chinensis. Очень красивое, мелкорастущее, болотное растеніе, съ блѣдно-голубыми, съ желтыми разводами, цвѣтами.

Въ акваріѣ помѣщается на камняхъ такъ, чтобы только корни могли доставать до воды. Размножается дѣленіемъ; растеніе постоянно зеленое и лѣтомъ сильно цвѣтеть.

I. tectorum. *Косатакъ кровельный.* Съ мясистымъ, клубневиднымъ корневищемъ. Получилъ названіе *Кровельный* оттого, что въ Японіи растетъ большими клубами на соломенныхъ крышахъ. У насъ воспитывается въ горшкахъ, любитъ глинистую землю, зимою держится въ оранжерей и вовсе не поливается; весною же требуетъ сильной поливки.

988. **Isatis tinctoria.** *Вайда красильная. Синячникъ.* Изъ семейства *Cruciferae*. Дикорастущее, двухлѣтнее медоносное растеніе. Цвѣтеть съ Апрѣля по Іюнь; разводится на поляхъ для получения синей краски.

989. **Ismene disticha.** Оранжерейное растеніе.

990. **Isolepis pygmaea.** Мелкорастущее, болотное растеніе; маленькое, постоянно зеленое, употребляется для убранства каменныхъ группъ въ акваріѣ, группъ едва выдающихся изъ воды.

Другой видъ: **I. savina.** Сходенъ съ предыдущимъ.

991. **Isoloma pictum.** Изъ семейства Геснерій. На малиновомъ, покрытомъ волосками стеблѣ оранжево-желтые цвѣты и листья съ изнанки прекраснаго малиноваго цвѣта. Требуется той же культуры, что и Геснерія.

Другой видъ: **I. Trianaei.** Съ пунцовыми цвѣтами.

992. **Isotoma axillaris.** Однолѣтнее растеніе съ голубыми цвѣтами; требуетъ землю, составленную изъ глинистой, дерновой и торфяной; сѣется въ Мартѣ, въ горшки въ теплицѣ; всхо-

ды, до появленія на нихъ цвѣточныхъ почекъ, оставляются подъ рамами, потомъ высаживаются въ цвѣтникъ на солнечное мѣсто или оставляются цвѣсти въ горшкахъ.

Другіе виды. *I. petraea*. Съ бѣлыми цвѣтами, требуетъ того же ухода.

I. longiflora. Оранжевое растение.

993. *Isotypus rosiflorus*. Тепличное растение.

994. *Iubea*. Родъ пальмъ.

Видъ *I. spectabilis*. Красивая американская пальма, съ длинными перистыми листьями, можетъ расти въ комнатѣ; размножается сѣменами; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

995. *Iussia*. *Юкка*. Оранжевое дерево, можетъ существовать въ комнатѣ; листья съ колючими концами иногда полосатые — зеленые съ бѣлымъ; цвѣты бѣлые и желтоватые, въ видѣ колокольчика; размножается сѣменами, черенками и отростками, которые сажаются въ песокъ, въ парникъ. У высокорослыхъ растений, для размноженія отрѣзаютъ вершину и сажаютъ въ парникъ до укорененія. Требуется земля, составленную изъ двухъ частей лиственной, одной дерновой, одной части вересковой и немного песку.

996. *Iuglans*. *Орѣшина*. Изъ семейства *Iuglandae*. Дерево или кустарникъ, разводимые для украшенія садовъ и парковъ. Размножается сѣменами; до посѣва наружная кожистая шелуха снимается, но скорлупа не раскалывается; орѣхъ опускается глубиною на дюймъ въ сильную землю, осенью, если сѣмена получены зимою, то ихъ держать въ песокъ, при температурѣ до 5° холода по Р.

Виды: *I. americana nigra*. Черный орѣшникъ. Американская орѣшина. Нашего климата не выносить въ грунтъ.

I. regia prematuriens. Грецкій орѣхъ. Требуется тщательной покрывки на зиму, но въ южныхъ нашихъ губерніяхъ растетъ превосходно; размножается преимущественно сѣменами.

I. mandschurica. Коцо. Манджурскій орѣхъ. Коцимта. Изъ Амурскаго края; нашего климата не выносить.

I. pterocarpa. I. caucasica. *Кавказскій орѣхъ.* Даетъ маленькіе орѣхи; нашего климата не выносятъ.

I. cinerea. *Сѣрый орѣшникъ. Волошскій орѣхъ.* Растетъ деревомъ.

I. olivaeformis. *Орѣшина оливкообразная.* Американское дерево, любитъ сырую мѣстность; производитъ цилиндрическіе орѣхи, съ четырьмя углами.

I. amara. *Орѣшина горькая.*

I. aquatica. *О. болотная.* Съ небольшими игловатыми, красными орѣхами.

I. tomentosa. *О. пушистая.* Съ душистыми листьями.

I. squamosa. *О. чешуйчатая.* Стволъ его имѣетъ видъ покрытаго чешуею; даетъ самые вкусные орѣхи изъ всѣхъ другихъ породъ.

I. laciniosa. *О. разрывная.* Кора ствола имѣетъ сходство съ предыдущей породой, но плоды его не такъ хороши.

I. porcina. *О. свиная.* Одно изъ самыхъ большихъ американскихъ деревьевъ. Мелкіе орѣхи этого дерева не поступаютъ въ продажу, а служатъ пищею для свиней.

I. myristicaeformis. *О. съ острыми плодами.* Орѣхи его имѣютъ весьма толстую скорлупу.

997. Iuncus bufonius. *Литникъ.* Изъ семейства *Juncaceae*. Дико растетъ по сырымъ мѣстамъ. Изъ этого растенія были свиты первыя веревки, въ память чего оно и получило свое названіе. (*Iungo*—соединить).

998. Juniperus communis. *Можжевельникъ.* Изъ семейства *Cupressineae*. Дикорастущій, хвойный кустарникъ, разводимый для украшенія парковъ, цвѣтетъ въ Апрѣлѣ и Маѣ; съ цвѣтовъ его пчелы берутъ взятку. Размножается черенками, на которые употребляются боковые побѣги. Изъ этого вуста можно образовать деревцо, посредствомъ подрѣзки. Любитъ сухую и легкую почву.

Другіе виды: **I. sabina.** *Казацкій можжевельникъ.* Дикорастущій, небольшой кустарникъ, размножается дѣленіемъ вуста и черенками; молодые побѣги его, съ листьями, имѣютъ сильное лекарственное свойство.

I. sabina fol. variegatis.

I. bacciformis. Требуетъ на зиму надежной покрывки.

I. devurica. Каменный верескъ.

I. excelsa stricta. Своими плотно сидящими стеблями образуетъ, какъ бы цилиндрическую пирамиду; имѣетъ весьма красивые, сребристые листья.

I. cracovia. I. repanda. I. suecica. I. tamariscifolia. I. depressa. I. echinoformis. I. excelsa. I. excelsa glauca. I. squamata.

Нѣкоторые виды можжевельника разводятся у насъ, только въ оранжереяхъ, а именно:

I. chinensis. I. chinensis aurea. Пестролистный кустарникъ. Листья его испещрены золотисто-желтыми цвѣтами.

I. phoenicea. Изъ Малой Азіи. Даетъ смолу, извѣстную подъ именемъ „Арабскаго ладона“.

I. virginiana. *Виргинскій кедръ.* Пирамидальное дерево, съ красноватою корою; растетъ на сухой почвѣ, въ защищенной мѣстности. Дерево употребляется на обдѣлку карандашей.

I. oxycedrus. Пирамидальное деревцо, съ короткою хвоею. Ягоды, корень и древесина, употребляются въ лекарство.

I. drupacea. Красивый, густой кустъ.

I. Bermudiana. Съ густыми, ярко-зелеными листьями.

I. flaccida. Небольшое деревцо, съ висячими вѣтвями.

I. hemisphaerica. Небольшой, почти шарообразный кустарникъ.

I. Lucia. Пирамидальное деревцо, съ голубовато-зелеными листьями.

I. candicans. I. dioecia. I. maritima. I. oblonga pendula. I. religiosa. I. macrocarpa. I. nepalensis.

999. *Iurinea pollichii.* *Порнъ-трава.* Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ въ Іюль.

Другой видъ: *I. arachnoides.*

1000. *Iusticia. (Adathoda).* *Юстичія.* Оранжерейное и вмѣстѣ комнатное, кустовое, превосходно цвѣтущее растеніе, съ бѣлыми, розовыми или алыми цвѣтами. Размножается черенками; почва ему дается изъ хорошаго перепрѣвшаго перегноя; часто прищипываютъ, чтобы растеніе было гуще, зимою иногда теряетъ листь, тогда мало поливается; въ комнатѣ ставится на югъ и юго-востокъ.

Виды: *I. coccinea*. *I. picta*. *I. ramosissima*. *I. rosea*.

I. velutina. Съ красными цвѣтами; цвѣтеть почти весь годъ.

I. Adathoda. Индійское орѣховое дерево. Съ бѣлыми цвѣтами; лѣтомъ сильно поливается; цвѣтеть въ Юнѣ и Юлѣ.

I. Speciosa. (*Peristrophe speciosa*). Цвѣтеть съ Ноября до Января, многочисленными розовыми цвѣтами; лѣтомъ ставится въ грунтъ, на воздухъ.

I. carnea. *I. carnea superba velutina*. Съ большими розовыми цвѣтами, украшаетъ оранжерею съ Августа до Ноября.

I. oblongata. Съ одиночно стоящими свѣтло-пурпуровыми цвѣтами.

I. venusta. Лиловые цвѣты съ синими краями.

I. ventriculosa. Съ лиловыми цвѣтами.

1001. *Ixia*. Маленькое луковичное растеніе, изъ семейства Ирисовыхъ, съ душистыми оранжевыми, бѣлыми, розовыми, или лиловыми, очень красивыми цвѣтами; можетъ расти въ комнатѣ; размножается сѣменами и отростками луковицъ; зимою луковицы его содержатся совершенно сухо; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и песку, а также притѣненія во время развитія.

Виды: *I. erecta*.

I. maculata. Съ зеленоватыми цвѣтами.

I. longiflora.

I. cinamomea, и много происшедшихъ отъ ея сѣменъ, разновидностей.

I. aristata. Оранжевейное растеніе.

I. pavonia. Тоже.

I. crocata. Цвѣтеть въ Маѣ и Юнѣ. Луковицы сажаются въ Сентябрѣ. Землю требуетъ, составленную изъ равныхъ частей листовой, дерновой и торфяной, съ пескомъ. При посадкѣ земля должна быть умеренно влажною; зимою также весьма мало поливается; когда пойдетъ въ ростъ вносится въ оранжерею.

I. patens. *Kermesina*. Розовая поникшая *Иксія*. Лѣ-

томъ растеніе требуетъ покоя, а потому ставится въ защищенное отъ дождя мѣсто и вовсе не поливается.

Позднею осенью луковичы пересаживаются въ одинъ горшокъ, по нѣскольку штукъ вмѣстѣ, въ смѣсь лиственной земли, песку и глины. Луковичы сажаются не глубоко, ставятся въ холодную оранжерею, зимою поливаются и провѣтриваются въ хорошую погоду, а когда зацѣтутъ — нѣсколько притѣняются.

1002. Ixora. Красивое тепличное и вмѣстѣ комнатное кустовое растеніе, съ лоснящимися листьями, оранжевыми, ярко-красными, розовыми и бѣлыми цвѣтами, посвященными малабарскому божеству *Iswara*, въ честь котораго и названо. Требуетъ внимательнаго ухода; мало поливается; земля ему дается смѣшанная изъ дерновой, лиственной и вересковой; размножается черенками; въ комнатѣ ставится на юго-востокъ, способно цвѣсти зимою; лѣтомъ его должно держать на окнѣ — на припекѣ.

Виды: *I. coccinea*. *Пунцовая Икзора*. Съ пунцовыми цвѣтами. Корни его дѣйствуютъ какъ испанская мушка.

I. incarnata. *I. javanica*.

I. salicifolia. Съ букетомъ розово-оранжевыхъ цвѣтовъ.

I. Bandhuca. Индійскій красиво-цвѣтущій кустарникъ.

I. grandiflora.

I. purpurea. s. *japonica*. *I. Lobii*.

I. amabilis. Тепличный кустарникъ, высаживаемый на лѣто въ грунтъ, съ темно-зелеными листьями и темно-зеленоватыми цвѣтами.

I. coleii. Тоже, съ большими шаровидными кистями бѣлыхъ цвѣтовъ.

I. odorata. Съ огромнымъ букетомъ бѣлыхъ на пунцовыхъ ножкахъ, чрезвычайно ароматическихъ цвѣтовъ. Размножается черенками, которые по твердости древесины скоро принимаются, любятъ большую опрятность, а потому листья его часто обмываются и растеніе тщательно очищается отъ насѣкомыхъ.

I. griffithii. Желто-оранжевые цвѣты зонтикомъ. Цвѣтеть нѣсколько разъ въ годъ.

1003. Iaequemontia coelistis. Изъ семейства *Convolvulaceae*. Вьющееся тепличное растеніе, съ голубыми цвѣтами. Размножается черенками.

1004. Iacquinia. Кустарникъ, съ красивыми бѣлыми или оранжевыми цвѣтами; размножается черенками; требуетъ вересковую землю съ примѣсью половинной пропорціи дерновой и половинной лиственной.

Виды: *I. arborea*. *I. aurantiaca*. *I. ruscifolia*.

1005. Iasminium. Жасминъ. Семейство *Jasmineae*. Тепличное и вмѣстѣ комнатное, кустовое вьющееся растеніе, съ цвѣтами простыми или махровыми, бѣлыми и желтыми; большею частью (особенно бѣлые)—душистыми. Размножается черенками и отводками; требуетъ землю, составленную изъ лиственной съ примѣсью половины дерновой и половины вересковой; зимою мало поливается; но съ листьевъ слѣдуетъ смывать пыль, а лѣтомъ надлежитъ часто опрыскивать. Въ комнатѣ держится на южной сторонѣ.

Виды съ бѣлыми цвѣтами.

I. officinale. Жасминъ аптечный. Кустарникъ, дикорастущій за Кавказомъ, съ весьма душистыми цвѣтами, съ которыхъ пчелы берутъ взяткъ.

I. grandiflorum. *I. azoricum*.

I. Sambac. Душистый бѣлый Жасминъ. Съ весьма душистыми большими, махровыми, бѣлыми съ желтоватымъ отѣнкомъ цвѣтами, напоминающими розу. Содержится въ теплицѣ, въ сильной, но не слишкомъ легкой дерновой землѣ, на шпалерной подставкѣ; размножается черенками, которые сажаютъ въ теплыя гряды.

Разновидности *I. Sambac*'а:

I. Sambac flore pleno—махровый.

I. S. Duc de Toscan. Тоже; лучший сортъ.

I. S. Duchesse d'Orleans. Тоже.

I. S. pubescens. *I. S. gracile*. *I. S. glaucum*.

Виды Жасмина съ желтыми цвѣтами, могутъ содержаться зимою и въ холодной оранжереѣ.

I. odoratissimum. *J. fruticans*.

I. nudiflorum. Съ ярко-желтыми цвѣтами. Будучи еще

безъ листьевъ размножается черенками; послѣ ранняго цвѣтенія его вѣтви должны быть сильно обрѣзаны.

1006. *Kæchearia rupestris*. Съ цвѣтами въ серединѣ красными, желтыми и испятнанными, снаружи красными.

1007. *Kæmpferia galangæ*. Изъ семейства *Zinziberaceæ*. Оранжерейное растеніе.

Другой видъ: *K. rotundia*. Тепличное растеніе. Цвѣтокъ похожъ на цвѣтокъ Ириса. Верхніе лепестки бѣлые, нижніе фіолетовые въ крапинкахъ. Во время покоя держать сухо. Землю возобновляютъ каждые 2 года, весною, при этомъ растеніе размножается дѣленіемъ корневища. Идетъ въ ростъ въ началѣ лѣта и кончаетъ цвѣтеніе весною.

1008. *Kalmia latifolia*. Кустарное, оранжерейное растеніе, съ бѣлыми или красными цвѣтами. Своевременно внесенное въ теплицу будетъ цвѣсть въ Мартѣ или Апрѣлѣ.

1009. *Kaulfussia amebloides*. (*Charicis heterophylla*). Маленькое, красивое, однолѣтнее растеніе, съ голубыми и бѣлыми цвѣтами, которые можно сберегать на зиму для букетовъ. Высѣвается въ парникъ и по всходѣ пересаживается на солнечное мѣсто, въ глинисто-дерновую землю.

Другой видъ: *K. a. flore rosea*.

1010. *Kennedya*. Оранжерейное растеніе. Цвѣтетъ отъ Марта до Апрѣля.

Виды: *K. glycina coccinea*. *K. Maryattæ*. *K. prostrata*. *K. rubicunda*. *K. comptoniana*. *K. longifolia*. *K. monophylla*. *K. affinis*. *K. eximia*. *K. inophylla*. *K. nigricans*. *K. ovata*. *K. sieberiana*. *K. splendens*.

1011. *Kentia*. Родъ Пальмъ. Ни что иное какъ Пальма Арека, — съ гладкимъ стволомъ. Размножается сѣменами.

Виды: *K. exorrhiza*. Производитъ воздушные корни.

K. Baueri. Не требуетъ высокой температуры.

K. elegans. *K. olivæformis*. *K. sapida*. *K. procera*.

1012. *Kerria japonica*. Оранжерейное растеніе, которое можно на лѣто высаживать въ грунтъ.

1013. *Kitaibelia vitifolia*. *Китайбелія виноградолистная*. Многолѣтнее, грунтовое, садовое растеніе.

1014. *Klugia Notoniana*. Изъ семейства *cyrtandraceae*. Тепличное растеніе. Цвѣтетъ почти весь годъ, но преимущественно зимою, ярко-синими цвѣтами. Разводится черенками, которые послѣ того какъ примутся, пересаживаютъ въ рыхлую, питательную землю съ пескомъ и иногда поливается жидкимъ удобреніемъ.

1015. *Koeleria cristata*. *Тонконогъ*. *Песчаный пырей*. Дикорастущее.

Другой видъ: *K. ignorata*, съ яркими темно-красными цвѣтами; цвѣтетъ всю зиму съ Октября.

1016. *Koellensteinia ionoptera*. Тепличная Орхидея, съ кистями мелкихъ, бѣлыхъ съ фіолетовымъ цвѣтовъ и нижнею густою, испещренною фіолетовыми полосками.

1017. *Koellenteria paniculata*. Кустарникъ зиму содержится въ подвалѣ или въ оранжереѣ, на лѣто высаживается въ грунтъ.

1018. *Kohleria rupestris*. Тепличное, многолѣтнее растеніе, съ пушистымъ стеблемъ и пучками красныхъ цвѣтовъ.

Другой видъ: *K. lanata*. Съ крупными цвѣтами, разводится также какъ и Ахименесъ.

1019. *Koniga maritima* (*Alyssum maritimum*). Маленькій, густой, дикорастущій на берегахъ Средиземнаго моря полукустарникъ, съ лежащими стеблями, свѣтло-зелеными, росписанными бѣлымъ, листьями и бѣлыми цвѣтами. Размножается черенками.

1020. *Korthalsia*. Родъ Пальмъ. Тепличное растеніе съ блиновидными листиками. Размножается сѣменами.

Виды: *K. Lobbiana*. *K. robusta*. *K. debilis*.

1021. *Kunthia montana*. Родъ Пальмъ. Изъ Новой Гренады, гдѣ называется: *cana de la vivera*, т. е. *змѣиная пальма*, потому что сокъ этого растенія считается противоядіемъ отъ укушенія змѣи—онъ употребляется и внутрь и какъ наружное средство. Изъ стеблей этой Пальмы Индіи дѣлаютъ трубки, изъ

которыхъ стрѣляютъ отравленными стрѣлами. Это растеніе въ Европѣ до-сихъ-поръ не разводится.

1022. Lachenalia. Изъ семейства **Liliaceae**. Луковичное растеніе, съ пунцовыми цвѣтами и желтымъ вѣнчикомъ. Цвѣтеть въ концѣ зимы; для этого въ Сентябрѣ, сажаютъ по нѣскольку луковокъ въ маленький горшокъ, въ легкую, питательную землю. Посаженные луковички держать въ тѣни и изрѣдка поливають. Когда-же они пойдутъ въ ростъ, ихъ ставятъ въ оранжерею и начинаютъ сильно поливать когда уже разовьются листья и цвѣточные стебли. Когда цвѣтокъ распустится его вносятъ въ теплицу или комнату. Растеніе гибнетъ, если ему дадутъ теплоту снизу. Послѣ того какъ Лашеналія увянетъ, ее держать сухо.

Другой видъ: **L. luteola**. Цвѣты расположены на стеблѣ суланомъ, — верхніе — оранжево-желтые, — нижніе — свѣтло-желтые съ зеленымъ.

1023. Lactuca Sativa. *Салатъ латукъ.* Изъ семейства **Synanthegaeae**. Весьма разнообразное, всѣмъ извѣстное растеніе, употребляемое въ пищу, разводимое на грядкахъ, въ парникахъ и теплицѣ, преимущественно для ранняго употребленія.

Существуютъ различные виды салата; каждый изъ нихъ рассмотримъ отдѣльно. **А. Качанный салатъ.** Разводимый на открытомъ воздухѣ, требуетъ рыхлой, черноземной, не свѣже унавоженной, нѣсколько влажной земли и открытаго мѣста на солнцѣ. Сѣется съ Марта по Іюль, каждые двѣ недѣли, сухимъ сѣменемъ; но чтобы имѣть салатъ скорѣе, его первоначально сѣютъ въ плошки, въ теплицѣ или въ парникѣ и потомъ высаживаютъ въ грунтъ, когда уже нельзя ожидать болѣе морозовъ. Въ Августѣ его кусты сажаютъ изъ грунта, по 2 по 3, въ горшокъ и держать въ оранжерей для употребленія даже до Января. Посадивъ салатную расаду въ холодный парникъ, со стеклянными рамами въ Сентябрѣ, можно выдержать свѣжій салатъ до Декабря.

Имѣется много сортовъ салата въ продажѣ, а именно:

Большой желтый Аравійскій.

Б. ж. берлинскій.

Б. ж. Азіатскій, отличный сортъ.

Б. ж. Вестъ-Индскій — самый нѣжный.

Б. ж. Императорскій. Б. ж. Голландскій. Б. ж. Шведскій. Б. ж. Княжескій свѣтлый. Б. ж. Кн. Красноватый. Форель. Форель пестрый. Ф. крово-красный. Перпиньинскій прочный. Ульмскій. Швейцарскій большой.

Б. Латукъ или Шнитъ-Салатъ. Его начинаютъ сѣять въ гряды въ Мартѣ и также періодически подсѣвають, чтобы всегда имѣть свѣжій; впрочемъ онъ требуетъ той-же культуры на грядкахъ, что и предыдущій видъ.

Латукъ годенъ для выгонки въ теплицѣ и въ теплыхъ парникахъ, гдѣ онъ поспѣваетъ черезъ мѣсяцъ послѣ посѣва. Лучшій сортъ этого салата—*желтый*.

В. Римскій или биндъ-Салатъ. Сѣютъ въ Юнѣ прямо въ грунтъ и ухаживаютъ какъ за кочаннымъ; когда-же онъ достаточно разовьется, то его связываютъ мочалкою, отчего средніе листья его дѣлаются бѣлѣе, нѣжнѣе и вкуснѣе. Лучшіе сорта его: *желтый, красный и пестрый*.

Для ранней выгонки, въ парникѣ, кромѣ вышеупомянутаго Латука, преимущественно сѣется *каменно-кочанный салатъ*, лучше другихъ видовъ удающійся и вкуснѣе прочихъ сортовъ, также:

Ранній парниковый желтый. Р. п. зеленый. Р. п. Bruine geel. Ранній мелкій, англійскій, красный, Bellegard.

Высѣянный въ парникъ салатъ, по всходѣ разсаживается, на четверть одинъ отъ другаго; часто поливается; когда даетъ четыре листика его осаживаютъ въ землю, чтобы дѣлался полнѣе и сочнѣе.

Г. Зимній, кочанный салатъ, лучшими сортами котораго надо признать: *коричневый и желтый*—особенно нѣжный; его сѣютъ въ грунтъ въ концѣ Августа; когда станетъ подростать, разсаживаютъ въ маленькія бороздки, проведенныя на грядѣ съ востока на западъ, земля у которыхъ бываетъ отброшена на южную сторону и которыя прикрываются еловыми или сосновыми вѣтвями, либо соломой, положенною по хворосту свѣрхъ бороздокъ.

Вообще салатъ надлежитъ охранять отъ личинокъ майскаго жука, которыя его уничтожаютъ, а потому, какъ только замѣчаютъ, что салатъ вянетъ, тотчасъ осматриваютъ корешокъ его и убиваютъ гнѣздящихся подъ нимъ червячковъ, чтобы они не испортили другихъ растений.

Lactuca virosa. *Салатъ ядовитый*. Дикорастущее, однолѣтнее, лекарственное растеніе; разводится посѣвомъ весною или осенью въ тучную почву.

1024. *Laelia*. Очень красивое тепличное растеніе изъ семейства Орхидей, цвѣтетъ и въ комнатѣ. Продолговатые, жесткіе листья; цвѣты розовые, желтые, красные, лиловые; требуетъ обыкновенной культуры эпифитныхъ Орхидей; размножается дѣленіемъ корней; сажается на кускѣ угля.

Виды: *L. praestans*. Съ большими, малиновыми цвѣтами.

L. acuminata. Съ прекрасными, лиловыми цвѣтами. Сажается на кускѣ дерева, въ которому прикрѣпляется свинцовою проволокою. Можетъ воспитываться и въ горшкѣ, наполненномъ неразмельченными кусками вересковой земли.

L. rubescens. Цвѣтокъ бѣлый, нижняя губа съ желтымъ и темно-малиновымъ.

L. purpurata. Большой цвѣтокъ, бѣлый съ малиновою, испещренною темными полосками, нижнею губою.

L. purpurata rosea. Розовая разновидность пурпуровой Лэліи. Тепличная Орхидея, требующая зимою тепла 12° Р.

L. anceps. Съ розовыми цвѣтами.

L. anceps Dawsoni. Съ бѣлыми цвѣтами; гребешекъ и губа желтые, и верхняя часть цвѣтка карминовая съ бѣлою каймою.

L. superbians. Большіе, розово-фіолетовые цвѣты, съ малиновымъ.

L. Perinii. *L. cinnabarina*. *L. autumnalis*. *L. grandiflora*.

1025. *Lagenaria vulgaris*. *Горлянка*. *Бутылочная тыква*. Однолѣтнее, лазящее, тыквенное растеніе, достигающее значительной длины стебля, съ бѣлыми распускающимися въ Іюнѣ цвѣтами и съ плодомъ въ видѣ бутылки, совершенно почти пустой и весьма твердой, что дало возможность степнымъ жителямъ употреблять этотъ овощъ вмѣсто сосудовъ для носки съ собою на работу воды, молока и другихъ жидкостей. Сѣется въ Мартѣ въ теплицѣ или горшкѣ, въ Іюнѣ, когда достигнетъ порядочной вышины, высаживается въ грунтъ, гдѣ нибудь около стѣны. Съ цвѣтовъ Горлянки пчелы берутъ взятокъ. Еще есть

разновидность этой тыквы: *Горлянка-булавная* (*Potiron Mas-sue. Kürbis Keulen*).

1026. *Lagerstroemia*. Весьма красивое деревце, съ розовыми цвѣтами; размножается черенками; требуетъ дерновую землю пополамъ съ торфяной и четвертою частью лиственной; можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: *L. Indica. L. Reginae*.

1027. *Lagetta lintearia*. Тепличное растеніе съ весьма большими листьями; можетъ расти и въ комнатѣ.

1028. *Lagurus ovatus*. Однолѣтній злакъ, достигающій вышины фута, на вершинѣ имѣетъ густую, пушистую метелку; употребляется въ букетахъ изъ свѣжихъ и изъ сухихъ цвѣтовъ; въ послѣднемъ случаѣ его красятъ; требуетъ песчанистой почвы и теплаго, защищеннаго мѣста.

1029. *Lantana. Лантана*. Оранжевое кустарное растеніе, съ успѣхомъ разводится въ комнатахъ; въ началѣ зимы держится въ оранжереѣ, потомъ переносится въ теплицу; зимою постепенно сбрасываетъ листь, замѣняя его новымъ. Листья и цвѣты имѣютъ сильный запахъ, особенно когда ихъ потерѣтъ; цвѣты бываютъ бѣловатые, розовые, желтые, оранжевые, ярко-пунцовые и даже разныхъ колеровъ въ одной группѣ цвѣтковъ. Размножается сѣменами и черенками. Зимою поливается весьма умѣренно, требуетъ землю, составленную изъ лиственной пополамъ съ дернисто-песчаною. Чтобы имѣть это растеніе въ цвѣту до Рождества, въ Іюлѣ срѣзаютъ всѣ появляющіеся на немъ цвѣты, ставятъ его въ холодный парникъ и осенью, съ почками, переносятъ въ теплицу.

Виды: *L. Brasiliensis. L. multiflora. L. mutabilis. L. aculeata. L. geroldtiana. L. leucantha. L. odorata. L. salvifolia. L. trifolia. L. violacea.*

L. camara. Съ пестрыми цвѣтами.

L. nive. Лѣтомъ высаживается на открытый воздухъ; зимою теряетъ листья; зиму содержится въ оранжереѣ при 8—10° Р., поливается такъ умѣренно, чтобы только не засохло. Когда у этого растенія пойдутъ новые побѣги, его пересаживаютъ, причемъ обрѣзываютъ старое растеніе, а молодые побѣги употребляютъ для черенковъ, которые цвѣтутъ въ тотъ

же годъ, если ихъ разсадивъ зрѣть въ теплый парникъ. Въ Юнѣ растеніе пересаживается и нѣсколько разъ прищипывается.

1030. *Lamium*. *Бѣлая яснотка*. Изъ семейства **Labiataeae**. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе. Цвѣты имѣютъ лекарственное свойство. Цвѣтеть съ Мая.

Виды: *L. album*. *Глухая бѣлая крапива*.

L. amplexicaule. *Сосунка*.

L. galeobdolon. *Волибная крапива*.

L. purpureum. *Курчя слѣпота*.

1031. *Lapogeria*. Изъ семейства **Smilacaeae**. Оранжевое очень красивое, вьющееся американское растеніе съ большими бѣлыми или розовыми цвѣтами, можетъ расти въ комнатѣ; размножается черенками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей, лиственной, дерновой и вересковой. Цвѣтеть поздно осенью.

Виды: *L. alba*. Цвѣты бѣлые, съ розовымъ оттѣнкомъ.

L. rosea. Большіе темно-розовые цвѣты, внутри испещрены бѣлыми черточками.

L. rosea, var. albiflora. Вьющееся растеніе, съ похожимъ на бѣлую лилію цвѣткомъ, молочно-бѣлаго цвѣта съ сѣро-желтымъ отливомъ. Любитъ легкую землю изъ хорошо перегнившихъ листьевъ или вересковую съ примѣсью $\frac{1}{3}$ хорошо перегорѣлаго навоза. Требуется частой поливки и широкую, глубокую посуду съ хорошимъ дренажемъ. Размножается черенками; содержится въ оранжереѣ.

1032. *Lappa-major*. *Дьдовникъ*. Изъ семейства **Synanthereaeae**. Дикорастущее; употребляется въ пищу какъ корнеплодная овощь.

Другіе виды: *L. edulis*. *Дьдовникъ съдобный*. То же.

L. tomentosa. *Лопухъ*. Дикорастущее.

1033. *Larix*. *Лиственница*. Изъ семейства **Abietineaeae**. Дикорастущее въ сѣверномъ климатѣ дерево; нѣкоторые виды его содержатся въ нашихъ оранжереяхъ.

Виды: *L. europaea*. *Л. Европейская*. Иглы опадаютъ осенью. Растетъ на сѣверѣ Россіи и на горахъ Европы кромѣ Пириней. Размножается посѣвомъ.

L. dahurica. *Л. даурская*. Въ природѣ низкорослое дерево.

L. decidua. Обыкновенная лиственница, съ опущенными вѣтвями.

L. sibirica. *Л. Сибирская*.

L. Japonica. *Л. Японская*.

L. leptolepis. *Л. япончешуйчатая*.

L. Griffithi. *Л. Гриффисова*; растетъ на Гималаѣ.

1034. *Lasiandra*. Семейство *Melastomaceae*. Красивый, американскій кустарникъ, съ синими, пурпуровыми или лиловыми цвѣтами съ пушистыми тычинками; размножается черенками; требуетъ вересковую землю, съ примѣсю такой же части дерновой, пополамъ съ лиственной. Тепличное растеніе, но выдерживаетъ и комнатную культуру.

Виды: *L. coerulea*. *L. petiolata*. *L. argentea*.

L. macrohilon.

L. elegans. Съ фіолетовыми цвѣтами.

L. fontanesiana. Кустарникъ футовъ въ 5 высоты, нижняя сторона листьевъ, съ сребристо-блестящими полосками, даетъ великолѣпные фіолетовые цвѣты. Цвѣтетъ весь Сентябрь. Любитъ рыхлую, лиственную или вересковую землю, съ нѣкоторою частью глинистой. Размножается черенками. Чтобы растеніе сильнѣе кустилось его необходимо часто прищипывать.

1035. *Lasthenia californica*. Однолѣтнее растеніе высѣвается прямо въ грунтъ; желтый цвѣтокъ распускается въ Іюнѣ.

Другіе виды. *L. glabrata*.

L. canescens. Однолѣтнее растеніе, все покрытое бѣлымъ пушкомъ.

1036. *Latania*. Родъ очень красивой, широколистной оранжереиной пальмы, требуетъ той же культуры, что и прочія пальмы.

Виды: *L. borbonica*. Съ темно-зелеными листьями; зимою требуетъ не болѣе 5 — 8° Р., а потому хорошо растетъ въ оранжереѣ; размножается сѣменами.

L. commersoni. Имѣетъ листья съ красною каймою.

L. rubra. Съ темно-красными листьями.

L. Verschaffeltii. *L. glaucophylla*.

L. Ienkensonii. Съ свѣтлозелеными листьями.

1037. *Lathraea squammaria*. *Петровъ крестъ*.

Чешуйникъ. Изъ семейства *scrophularineae*. Растетъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ. По понятіямъ нашего народа, предохраняетъ отъ злаго духа, корень его будто бы изображаетъ собою крестъ, а потому его выкапываютъ изъ земли не желѣзомъ, а голыми руками.

1038. *Lathyrus latifolius*. *Гороховникъ широколистный*. Многолѣтнее садовое растеніе.

Другіе виды: *L. albus*. *L. roseus*. *L. Turneri*.

L. pratensis. *Визиль*. Употребляется какъ превосходная кормовая трава. Дукорастущее.

L. sylvestris. *Г. дикій*. Чина лѣсная. Тоже.

L. grandiflorus. *Г. большой*.

L. tuberosus. *Гороховникъ шишковатый*. *Мышки*. *Земляные орехи*. Дикорастущее, многолѣтнее растеніе, употребляемое въ пищу. Разводится на огородахъ. Шишки его высаживаются въ грунтъ осенью. Морозовъ не боится. Будучи разведено—уже не выводится.

L. odcratus. *Горошекъ душистый*. Однолѣтнее, медоносное, цѣпляющееся растеніе, съ душистыми, бѣлыми, розовыми, красными, фіолетовыми или пестрыми цвѣтами. Сѣется въ Мартѣ или Апрѣлѣ, штукъ по 5, въ горшокъ и потомъ высаживается въ грунтъ, но можетъ быть сажаемо и прямо въ грунтъ. На почву не прихотливо.

Разновидности его: *L. angulatus*. *L. articulatus*. *L. azureus*. Самый красивый сортъ. *L. speciosus*. *L. tingitanus*. *L. Magellanicus*. *L. Mexicanus*. *L. Cicer*. *L. Elimenum*.

1039. *Laurus*. *Лавръ*. Изъ семейства *Laurineae*. Оранжевое дерево, имѣетъ нѣкоторые тепличные виды; вообще хорошо растетъ въ комнатѣ.

Виды: *L. nobilis*. *Л. обыкновенный*. Оранжевое дерево. Размножается сѣменами, отростками и черенками. Любитъ дерновую землю пополамъ съ листовною и съ небольшою примѣсью песку. Все лѣто, отъ совершеннаго прекращенія морозовъ до осени его можно держать въ саду, на открытомъ воздухѣ.

L. camphora. *Камфарный лавръ*. (См. *Camphora*).

- L. dulcis*. Тепличное растеніе.
L. persea. (См. *persea*).
*L. sasafra*s. (См. *sasafra*s).
L. Cinamomum. (См. *Cinamomum*).

1040. *Lavandula spica*. Лаванда колосная. Изъ семейства *Labiatae*. Дикорастущее, ароматическое, многолѣтнее, медоносное и лекарственное растеніе. Цвѣтетъ все лѣто. На почву не прихотливо. Размножается преимущественно дѣленіемъ корней весною. Употребляется для окуриванія въ видахъ уничтоженія моли и какъ лекарственное растеніе.

Другіе виды: *L. vera*. Оранжерейное растеніе. Даетъ Лавендуловое масло.

L. dentata. Ушанная трава. Дикорастущее.

1041. *Lavatera trimestris*. Изъ семейства *Malvaceae*. Роскошное однолѣтнее растеніе, вышиною до 2½ футовъ, съ большими бѣлыми или розовыми цвѣтами. Цвѣтетъ съ Іюля до осени. Сѣется въ Апрѣлѣ прямо въ грунтъ. Довольствуется всякою землею.

Другіе виды: *L. maritima*. Оранжерейное растеніе съ большими, бѣлыми, въ серединѣ темно-фіолетовыми цвѣтами.

L. arborea и *L. olbia*—тоже оранжерейныя растенія.

L. annua alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

L. annua rosea. Съ розовыми цвѣтами.

L. hybrida. Три послѣдніе однолѣтніе вида.

L. thuringiaca. Собачья рожь. Проскурникъ. Дикорастущее, медоносное, многолѣтнее цвѣточное растеніе, высѣвается въ началѣ Марта, въ плошки, разсаживается въ гряды и на слѣдующій годъ пересаживается въ грунтъ. Цвѣтетъ все лѣто.

1042. *Lesa*. Красивый кустъ. Можетъ расти въ комнатѣ. Даетъ бѣлые, желтые или красные цвѣты. Размножается черенками. Зимой теряетъ листь. Требуется земля, составленную изъ двухъ частей вересковой, одной части дерновой и одной лиственной.

Виды: *L. sambucina*. *L. robusta*. *L. crispa*. *L. lucida*.

1043. *Lechenaultia*. Небольшой оранжерейный кустарникъ, изъ семейства вересковыхъ, съ красными цвѣтами. Цвѣтетъ позд-

нею осенью и вторично въ Февралѣ. Содержится въ свѣтомъ мѣстѣ оранжереи. Требуется вересковую землю. Размножается сѣменами и черенками.

Виды: *L. arcuata*. Цвѣты желтые съ темно-оранжевымъ. Цвѣтетъ среди зимы. Размножается черенками въ Маѣ и Юнѣ, когда еще ростки его не одеревенѣли, на лѣто высаживается въ грунтъ.

L. splendens. Цвѣты пунцовые съ желтымъ. На одномъ растеніи, въ одно время бываетъ до 300 цвѣтовъ. Лѣтомъ держится въ тѣни, при достаточной поливкѣ. Зимой ставится ближе къ окнамъ.

L. formosa. *L. multiflora*. *L. stricta*.

L. biloba. Въ началѣ Марта должны уже быть приготовлены молодые, сильные экземпляры, ихъ сажаютъ въ горшки и ставятъ ближе къ свѣту, въ оранжереѣ, въ температуру до 14° Р. Когда растение сильно пойдетъ въ ростъ, болѣе длинные вѣтви его прищипываютъ. Въ концѣ Юня растение вновь пересаживаютъ съ половины Августа, когда растение получить настоящій красивый видъ, начинаютъ готовить его къ зимѣ, постепенно приучая его къ воздуху, причемъ съ начала ставятъ его въ холодную, открытую оранжерею, потомъ недѣли на три ставятъ его на воздухъ и наконецъ подъ рамы, которыя снимаютъ въ хорошую погоду. Остальное время зимы растение содержать въ сухой, холодной оранжереѣ.

1044. *Lecythis ollaria*. Горшечникъ. Семейство *Lecynthineae*.

Американское растеніе. Лыко его употребляется на обивку сигаръ, а плоды вмѣсто посуды. Плоды эти бываютъ величиною съ человѣческую голову и имѣютъ форму горшка съ крышкою.

1045. *Ledum palustre*. Багунь. Багульникъ. Дикорастущій по болотамъ кустарникъ, съ душистыми и красивыми, но вредными для пчелъ цвѣтами. Изъ семейства *Ericaceae*.

Другой видъ: *L. sieboldii*. Оранжерейное растеніе.

1046. *Leianthus longifolius*. Тепличное растеніе. Желтые цвѣты похожи на цвѣты не махровой фуксіи. Во все время роста содержится въ теплицѣ, гдѣ ему дается много свѣта и воздуха. Въ горшкѣ устраивается сильный дренажъ, но зем-

ля содержится постоянно въ нѣкоторой влажности. Лѣтомъ выставляется на воздухъ, въ затѣненное мѣсто, что укрѣпляетъ растеніе. Въ концѣ Сентября вносится въ теплицу. Размножается черенками въ концѣ весны, на что рѣжутъ его молодые побѣги. Старое растеніе оставляютъ не болѣе двухъ—трехъ лѣтъ и замѣняютъ молодыми.

Другой видъ: *L. umbellatus*. Съ большимъ букетомъ зеленыхъ цвѣтовъ, изъ которыхъ выходятъ длинныя, желтыя тычинки. Любитъ тучную, навозную нѣсколько сыроватую землю, но зимою почти вовсе не поливается. Требуется много свѣту. Размножается дѣленіемъ корней и черенками.

1047. *Leontice altaica*. Низкорослое, горное растеніе съ желтыми цвѣтами.

1048. *Leonorus cardiaca*. *Глухая крапива*. *Львиный хвостъ*. *Дикая мелисса*. *Грипомъ*. Дикорастущее, медоносное и лекарственное однолѣтнее растеніе; цвѣтеть съ Іюня до Сентября.

Другой видъ: *L. lanatus*. *Благовонная трава*. Дикорастущее.

1049. *Leontodon hastilis*. (*L. teraxacum*). *Кумбаба*. *Молочай*. Изъ семейства *Synanthereae*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтеть съ Апрѣля до Октября.

1050. *Leopoldinia*. Родъ пальмъ. Растетъ на берегахъ Амазонки и Рио-Негро. Размножается сѣменами. Это прекрасное растеніе имѣетъ 4 вида:

L. Piassaba. Даетъ волокно «Пиассабу», изъ котораго дѣлаютъ вѣнички и метлы.

L. Pulchra. Листья употребляютъ для украшенія домовъ, въ торжественныхъ случаяхъ.

L. insignis. *L. major*. Изъ одного корневища вырастаетъ группа стволовъ.

1051. *Lepidium sativum*. *Крессъ-салатъ*. Изъ семейства *Crucifereae*. *Жеруха огородная*. Дикорастущее, медоносное, однолѣтнее растеніе. Разводится въ теплицахъ и огородахъ, для зелени, употребляемой въ пищу, какъ салатъ. Сѣмя его идетъ

на масло. Въ Февралѣ или Мартѣ, сѣютъ крессъ-салатъ по краямъ парниковъ въ ящики или на войлокъ, положенный на доску и покрытый марли. Посѣянный такимъ способомъ крессъ вырастаетъ въ нѣсколько дней и состригается, ножницами, у корня. Въ Апрѣлѣ сѣется въ грунтъ, гдѣ обыкновенно сильно страдаетъ отъ земляной блохи, отъ которой спасаютъ растеніе частымъ опрыскиваніемъ. Съ одной и той же гряды, срѣзываютъ крессъ до 3-хъ разъ; цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Другіе виды: *Ключевой крессъ-салатъ*. Разводится по дну канавки, нарочно проводимой изъ ручья или ключа. Канавка эта должна быть глубиною и шириною въ $\frac{3}{4}$ аршина; по дну ея должна постоянно пробираться вода. На дно канавки накладываютъ, вершка на два иловатой земли, и въ нее, въ Маѣ, сѣютъ салатъ. Когда онъ взойдетъ, пускаютъ воду и наблюдаютъ, чтобы зелень всегда была ею покрыта, въ противномъ случаѣ салатъ дѣлается твердъ, горекъ, и затѣмъ не годенъ къ употребленію.

Дикорастущіе: *L. latifolium*. *Хрѣнница*. *L. ruderale*. *Клоповникъ*. Листьями его лечатся отъ лихорадки.

1052. *Leptosiphon androsacens*. Однолѣтнее, бордюрное растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ. Цвѣты бываютъ бѣлые, лиловые и розовые, съ желтыми узорами.

1053. *Leschenoltia*. *Красивая леэенольція*. Очень нѣжное, теплолюбивое, кустовое растеніе съ пунцовыми, желтыми или синими цвѣтами; требуетъ много свѣта и равномерной поливки; размножается черенками; любитъ землю, составленную изъ равныхъ частей вересковой, дерновой, лиственной и песку.

Виды: *L. formosa*. *L. grandiflora*. *L. multiflora* и *L. splendens*.

1054. *Leucadendron argenteum*. Оранжевое растеніе.

1055. *Leuceria senecioides*. Однолѣтнее растеніе, не заслуживающее разведенія.

1056. *Leucojum vernum*. *Мартовъ цвѣтъ*. Изъ семейства Амариллисовъ. Луковичное растеніе съ бѣлымъ цвѣткомъ, имѣющимъ зеленые кончики и видъ колокольчика. Распускается въ Февралѣ или Мартѣ, прежде развитія листьевъ,

Другой видъ: *L. aestivum*. Цвѣты крупнѣе предыдущаго. Въ дикомъ состояніи цвѣтетъ въ Маѣ, но искусственно его заставляютъ цвѣсть въ Февралѣ или Мартѣ. Для этого его подвергаютъ такому же уходу, какъ и Нарциссъ, но ставятъ тепло въ Февралѣ, причемъ онъ зацвѣтаетъ черезъ двѣ недѣли.

1057. *Leucopsidium arkansanum*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

1058. *Leucesteria formosa*. Оранжевое растеніе.

1059. *Liatris scariosa*. Оранжевое растеніе.

1060. *Libocedrus*. Оранжевое, хвойное дерево; разводится черенками, съ большимъ, впрочемъ, трудомъ.

Виды: *L. chilensis*. Весьма красивое дерево, съ листьями, имѣющими сребристую полосу, на обѣихъ сторонахъ.

L. Doniana. Прекрасное, но медленно растущее дерево, съ расплюснутыми сучьями.

L. Crayana.

1061. *Libonia floribunda*. Оранжевое, кустарное растеніе, одно изъ самыхъ пригодныхъ для зимняго цвѣтенія. Обыкновенно оно даетъ, въ Мартѣ, множество красивыхъ, внизу желтыхъ цвѣтовъ; но будучи поставлено въ Ноябрь въ теплицѣ къ окну, двухлѣтнимъ, обильно цвѣтетъ съ новаго года, до Апрѣля. Держится въ сырости; ежедневно опрыскивается, иначе его листья опадаютъ. Размножается черенками, весной посаженными въ грунтъ, на солнечное мѣсто. Если Либонію содержать въ горшкѣ, то ее два раза въ лѣто пересаживаютъ, въ глинистую землю.

1062. *Licuala*. Родъ пальмъ. Имѣетъ гладкій стебель, съ колючими листовыми черешками; размножается сѣменами.

Виды: *L. pellata*. Имѣетъ почти круглые листья, идетъ на приготовленіе шляпъ.

L. acutifida. Изъ него выдѣлываютъ пенановыя трости.

L. elegans. *L. gracilis*. *L. horrida*. *L. nana*. *L. pumila*. *L. Rumphii*. *L. spinosa*. *L. amplifrons*.

1063. *Liebegia speciosa*. Изъ семейства Геснерій. Цвѣты лиловые снаружи и бѣлые внутри. Тепличное растеніе. Любитъ тучную землю, составленную изъ чернозема и компоста, которую весь періодъ роста растенія должно содержать въ нѣкоторой влажности. Размножается черенками, для которыхъ вѣтки срѣзываются на колѣнѣ и держатся или въ тепличкѣ, или подъ стекляннымъ колпакомъ; также размножается отростками отъ корня. Цвѣтетъ въ Январѣ.

1064. *Ligusticum livisticum*. (*Livisticum officinale*). Зора обыкновенная. Любистникъ. Дикорастущее лекарственное растеніе; любитъ влажное, тѣнистое мѣсто.

1065. *Ligustrum vulgare*. Бирючина. Жостъ. Крушина. Изъ семейства *Oleineae*. Кустарникъ съ бѣлыми, душистыми цвѣтами, разводимый въ садахъ и паркахъ. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ. Съ цвѣтовъ его пчелы берутъ взятокъ; на немъ же появляются мухи, извѣстныя подъ именемъ—*итанскихъ*. Сокъ его ягодъ служить для подкраски винъ и вообще для окраски въ черный и синій цвѣтъ. Размножается отпрысками, отводками и посѣвомъ сѣменъ, тотчасъ послѣ того какъ онѣ созрѣютъ.

Другіе виды: *L. foliosum*.

L. foliosum fol. aureis variegat. Съ желто-пестрымъ листомъ.

L. f. f. albis variegat. Съ бѣлыми на листьяхъ разводами.

1066. *Liliaceae Nemerocalideae*. *Анантъ*. Садовое растеніе съ красивыми цвѣтами, съ мыса Доброй Надежды.

1067. *Liliorrhiza lanceolata*. Маленькое луковичное растеніе, можетъ содержаться на воздухѣ; даетъ красивые бѣлые, колокольчатые цвѣты.

1068. *Lilium*. *Лилія*. *Сарана*. Луковица, производящая весьма разнообразныя цвѣты: бѣлые, желтые, розовые, оранжевые, пунцовые, иногда испещренные крапинками или полосками. (Семейство *Liliaceae*).

Различные виды *Лилий*—различнымъ образомъ выращиваются и содержатся, но всѣ размножаются отростками луко-

вицы и для содержанія ихъ примѣняются слѣдующія общія правила.

Луковицы Лиліи боятся избытка влажности, при томъ на нихъ сильно нападаетъ слизень, а потому для составленія коллекцій Лилій лучше выращивать ихъ въ горшкахъ, причемъ уходъ за ними можетъ быть тщательнѣе. Въ горшкахъ Лиліи выращиваются слѣдующимъ образомъ. Въ концѣ Октября или началѣ Ноября, луковицы Лилій сажаютъ въ большіе горшки, наполненные смѣсью вересковой земли съ листовою, а еще лучше сажать ихъ въ смѣсь, составленную изъ равныхъ частей вересковой и дерновой земли съ примѣсью $\frac{1}{3}$ листовой и $\frac{1}{3}$ вполне перепрѣлаго, соломистаго навоза. Разумѣется на дно горшка кладется слой черепковъ, а подъ самую луковицу подсыпается немного чистаго рѣчнаго песку. Горшокъ долженъ быть выше своей ширины. Луковица сажается въ землю на полтора вершка глубины и ставится въ холодное, сухое мѣсто оранжереи, либо закапывается съ горшкомъ въ канаву на открытомъ воздухѣ, покрывается землею четверти на полторы и заваливается свѣжимъ навозомъ четверти на три; или наконецъ горшки съ луковицами ставятся въ холодный подвалъ. При посадкѣ луковицы не поливаются, также не поливается земля, но въ ней поддерживается нѣкоторая степень влажности, чтобы луковица не засохла, посредствомъ умеренной поливки между горшками. По временамъ луковицы надлежитъ осматривать и лишь только онѣ дадутъ ростки ихъ приставляютъ къ свѣту и начинаютъ поливать. Затѣмъ Лиліи всего лучше держать въ оранжереѣ, гдѣ до 8° Р., но за неимѣніемъ оранжереи ихъ можно держать въ комнатѣ на окнѣ. Выростающій стебель луковицы привязывается къ палочкѣ. Отъ появляющихся на лиліи насѣкомыхъ, губельно на нее дѣйствующихъ, внимательно и часто очищаютъ растеніе и освѣжаютъ его вольнымъ воздухомъ. Въ концѣ Сентября Лилія отцвѣтаетъ, листья и стебель ея желтѣютъ, причемъ поливка постепенно уменьшается до совершеннаго прекращенія, чтобы дать высохнуть стеблю растенія, затѣмъ луковицы съ горшками ставятся въ сухое мѣсто. Въ Октябрѣ луковицы вынимаются изъ земли, причемъ здоровые корни ея оставляются неприкосновенными и сажаются въ новую землю для выгонки къ будущему году. Лилія, будучи поставлена въ тепло въ Январѣ, зацвѣтаетъ въ началѣ Марта.

При содержаніи въ грунтѣ Лиліи рѣдкой, или вообще которой очень дорожать, надлежитъ ее покрывать опробованнымъ цвѣточнымъ горшкомъ, съ заткнутымъ отверстіемъ, чтобы не проникала въ него вода. Лиліи Европейскія, Кавказскія, Сибирскія, большинство Сѣверо-Американскихъ и многія Японскія, выдерживаютъ зиму въ грунтѣ.

Для улучшенія Лиліи, ее нѣсколько разъ поливаютъ жидкимъ удобреніемъ, начиная эту поливку съ того времени, какъ корни луковичы оплетутъ комъ и продолжая, пока цвѣточные почки будутъ совсѣмъ готовы распуститься.

Нѣкоторыя Лиліи какъ напримѣръ: **Candidum**, **Thomsonianum** начинаютъ расти еще осенью; ростъ такихъ не останавливаютъ, а для того, они поливаются и зимою.

Лиліи не любятъ чтобы земля, въ которой они сидятъ пропекалась солнцемъ, а потому ее облаживаютъ мхомъ или устраиваютъ надъ растеніемъ, съ полуденной стороны особый драичный шпалерникъ вышиною въ сажень.

Лиліи раздѣляются на слѣдующіе виды, имѣющіе множество разновидностей.

I. Европейская Лилія.

Разновидности ея: **L. carniolicum**. Красно-сुरиковый цвѣтокъ съ многочисленными, буро-пурпуровыми черточками при основаніи.

L. albanicum. Весьма рѣдая Лилія.

L. croceum. Оранжевый цвѣтокъ, испещренный чернымъ.

L. pyrenaicum. Желто-зеленоватые цвѣты, съ черно-красными пятнышками внутри, непріятно пахнутъ псиною.

L. candidum. Цвѣты необыкновенной бѣлизны.

L. bulbiferum. Лилія луковичная съ ярко-оранжевыми цвѣтами; въ углахъ ее листьевъ вырастаетъ родъ луковичекъ, которыми растеніе можетъ размножаться.

L. pomponium. Съ очень узкими, острыми листьями; цвѣты пурпуровые.

L. Martagon. Цвѣты пурпуровые, имѣющіе видъ чалмы; испещрены черными пятнышками. Достигаетъ полной красоты и силы только въ грунтѣ.

L. chalcedonicum.

II. Лилии Азіятской Россіи.

L. avenaceum. Цвѣты пунцовые, иногда оранжевые, съ нѣсколькими крапинками.

L. pulchellum. Съ одинаковыми, ярко-суриковыми цвѣтами, внутри испещрены болѣе темными точками. Любитъ глинисто-дерновую землю; можетъ размножаться сѣменами, высѣваемыми осенью въ горшки, причемъ она всходитъ только осенью и разсаживается на гряды рыхлой, хорошей земли.

L. Spectabile. *Льная Сарана.* Растетъ на открытомъ воздухѣ, съ ярко-красными цвѣтами, которые держатся прямо; будучи разводимо въ садахъ, даетъ темно-оранжевые цвѣты. Требуется той же культуры, что и предыдущая разновидность.

L. tenuifolium. *Л. тонколистная. Сарана полевая.* Съ красными цвѣтами.

L. Szovitsianum. Душистые цвѣты, желтые съ красноватыми крапинками внутри. Самый красивый видъ растетъ преимущественно на Кавказѣ.

L. monadelphum. Цвѣты желтые съ красными крапинками.

L. ponticum. Похожа на предыдущую, но въ половину меньше ее, съ чисто-желтыми цвѣтами.

L. pumilum. Съ мелкими, понижеными, пунцовыми цвѣтами.

L. Buschianum. Съ однимъ красивымъ, стоячимъ, пахучимъ, пунсовымъ цвѣткомъ, съ черными крапинками внутри.

III. Китайскія Лилии.

L. concolor. Съ крупными, ярко-суриковаго цвѣта цвѣтами.

L. Sinicum. Съ ярко-оранжевыми цвѣтами.

L. Browni. Великолѣпная бѣлая Лилия, обратная сторона цвѣтка—бурого цвѣта, вследствие множества красно-буроватыхъ черточекъ по зеленой поверхности; цвѣтокъ имѣетъ трубчатую и волокольчатую форму. Переноситъ наши зимы въ грунтъ, при нѣкоторой покрывкѣ.

L. pseudotigrinum. Достигаетъ высоты болѣе 3 футъ, цвѣты красные съ темно-бурыми крапинками внутри; въ углахъ его листьевъ луковочекъ не образуется.

IV. Японскія Лиліи.

L. Speciosum. *Корейская лилія.*

L. callosum. Съ необыкновенными красными цвѣтами, испещренными черными точками, луковичы употребляются Японцами въ пищу.

L. Thunbergianum. Съ однимъ, двумя и рѣдко тремя цвѣтками, различныхъ колеровъ, отъ ярко-оранжеваго до нѣжно-абрикосоваго, съ нѣсколькими крапинками въ центрѣ цвѣтка. Луковичы употребляются въ пищу Японцами.

L. T. venustum. Цвѣты абрикосово-оранжевые, безъ крапинокъ внутри.

L. T. aureum. Свѣтло-желто-оранжевый, почти золотистый цвѣтокъ.

L. T. fulgens var. Staminosum. Красновато-оранжевые цвѣты съ продолговатыми, темно-бурыми крапинками внутри, полумахровые, вслѣдствіе превращенія тычинокъ въ лепестки.

L. eximium. Большіе цвѣты внутри чисто-бѣлые, а снаружи темноватые, съ сильнымъ померанцевымъ запахомъ.

L. longiflorum. Наружная часть цвѣтка имѣетъ фіолетовый отливъ, блѣднѣющій отъ солнца, внутри свѣжно-бѣлый.

L. coridion. Очень рѣдкое растеніе. Цвѣтокъ одиночный, желтый или свѣтло-оранжевый внутри, болѣе блѣдный въ серединѣ и къ наружѣ, съ продолговатыми, темно-оранжевыми крапинками.

L. Porthencion. *Лилія днѣзъ.* Очень рѣдкое растеніе. Цвѣты желтые съ красно-оранжевымъ, нѣсколько буроватымъ отблескомъ.

L. alternans. На каждомъ стеблѣ вырастаетъ до 15 цвѣтковъ, у которыхъ около—цвѣтъ темно-оранжевый съ желтыми пятнами и бурыми черточками, у основанія листовъ.

L. tigrinum. *Л. пестрая.* Достигаетъ трехъ аршинъ вышины. Красивые, очень большіе цвѣты, расположены макушечными кистями, на длинныхъ, пушистыхъ ножкахъ, красно-вишневые, отливающіе оранжевымъ, внутри испещрены мно-

жествомя овалныхъ, темныхъ, буро-красныхъ, почти черныхъ крапинокъ, а въ срединѣ усажены сосочками или бородавочками.

L. t. erectum. L. t. Splendens. На одномъ стеблѣ бываетъ до 25 пунцовыхъ, съ черными крапинками, цвѣтковь, расположенныхъ пирамидою; размножается бульбами, образующимися на стеблѣ.

L. t. flore pleno. Съ махровыми весьма красивыми цвѣтами.

L. odorum. Бѣлые, душистые цвѣты съ фіолетовыми крапинками; на зиму требуетъ надежной защиты и въ это время боится сырости.

L. testaceum. Съ желтыми, душистыми цвѣтами, на зиму требуетъ надежной покрывки, а потому преимущественно разводится въ горшкахъ; трогается въ ростъ очень рано.

L. isabellinum. Разновидность предыдущей, съ блѣдно-оранжевыми, болѣе мелкими, цвѣтами и болѣе тонкимъ стеблемъ.

L. auratum. Съ огромными, бѣлыми цвѣтами, имѣющими въ серединѣ ярко-желтую широкую полосу, усѣянную большими бурими, выступающими крапинками.

L. auratum rubro vittatum. Разновидность предыдущей, съ красною полосою и крупными крапинками.

L. auratum matchless. Тоже, безъ крапинокъ.

L. a. virginale—совершенно бѣлая.

L. Fortunei. Съ желто-оранжевымъ цвѣткомъ, съ бурими крапинками.

L. Wittei. Съ душистыми цвѣтами съ такою-же желтою полосою въ срединѣ, какъ у **L. auratum**, но безъ крапинокъ.

L. Leichtlini. Очень красивая лилія, даетъ одинъ цвѣтокъ, пониклый, висячій, желтый, испещренный большими, овальными крапинками.

L. Maximowiczii. Съ ярко-оранжево-краснымъ цвѣткомъ, внизу съ темно-пурпуровыми крапинками; выносить въ грунтъ петербургскій климатъ.

L. Wilsoni. Съ цвѣтами красно-кирпичнаго цвѣта и большими, чернобурими, многочисленными пятнами.

L. haematochroum. Темно-крово-краснаго цвѣта цвѣтокъ, имѣетъ болѣе 4 дюйма въ діаметрѣ.

V. Остъ-Индскія Лиліи.

L. giganteum. Wall. Самая большая изъ извѣстныхъ Лилій, иногда вырастаетъ выше 1½ саж.; душистые цвѣты зеленовато-бѣлые, съ красно-пурпуровою буроватою полоскою и тремя параллельными полосками.

L. cordifolium. Съ сердцобразными листьями и большими, бѣлыми съ лиловымъ, цвѣтами.

L. Wallichianum. Достигаетъ трехъ аршинъ, желтовато-бѣлые очень большіе цвѣты, ароматичные.

L. nepalense. Даетъ одинъ цвѣтокъ, желто-зеленоватый, съ розовымъ отливомъ, внутри ярко-розово-пурпуровый.

L. thomsonianum. Луковица этой лиліи отличается отъ другихъ луковичъ — она яйцевидная, почти продолговатая. Трогается въ ростъ очень рано, а именно въ первой половинѣ Августа даетъ уже корни и листья показываются съ осени. Цвѣты розовые или фіолетовые, съ бѣлыми тычинками и красными пыльниками.

L. polyphyllum. Съ бѣлыми цвѣтами.

L. tubiflorum. Замѣчательно красивая Лилія, съ большими бѣлыми цвѣтами, имѣющими длинныя трубки и довольно раскрытое горлышко.

L. triceps. *Трехлобая Лилія.* Съ бѣлымъ цвѣткомъ, получила свое названіе отъ того, что столбикъ цвѣтка раздуть при концѣ и раздѣленъ на три короткія и толстыя доли, ованчивающіяся, каждая рыльцемъ.

L. nanum. Съ маленькимъ, бѣлымъ опущеннымъ цвѣткомъ, все растеніе не бываетъ выше трехъ вершковъ.

L. neilgergicum. Даетъ одинъ, очень большой, душистый, свѣтло-желтый цвѣтокъ.

L. punctatum. Даетъ до 10-ти, ярко-желтыхъ съ пурпуровыми крапинками, душистыхъ цвѣтовъ.

VI. Сѣверо-американскія Лиліи.

L. canadense. Части, находящіяся въ землѣ, отличаются отъ таковыхъ же частей Европейскихъ породъ, а именно: луковичы ихъ соединяются съ корневищемъ и ежегодно на по-

слѣднемъ продолженіи корневища вырастаетъ новая луковица, отъ которой вырастаетъ новый стволъ. Вырастаетъ аршина на полтора въ вышину; имѣетъ до 5-ти цвѣтковь, образующихъ - родъ зонтика; бываютъ желтые разныхъ оттѣнковь, красно-оранжевые и ярко-красные, снаружи покрытые красно-бурыми крапинками. Ея разновидности признаются.

L. canadense flavum. Ярко-желтый цвѣтокъ.

L. floribus rubicundus. Красно-оранжевая.

L. l. puberulum. Желто-оранжевая съ бурными крапинками.

L. superbum. Душистые цвѣты отъ желтаго цвѣта до краснаго, различныхъ оттѣнковь.

L. pardinum. Цвѣты въ средней части оранжевые, съ крупными, рѣдкими, красно-бурыми пятнами,—къ окружности ярко-красные.

L. parvum. Цвѣты у основанія желто-оранжевые, а къ верху болѣе красные.

L. Waschingtonianum. Достигаетъ 10 футъ вышины, съ весьма душистыми цвѣтами, принимающими розовый оттѣнокъ. Можетъ хорошо расти въ грунту и въ горшкахъ. Сажается въ рыхлую, листовную землю, къ которой примѣшана глинистая, на довольно свѣтлое мѣсто; на зиму, сидящее въ грунту растеніе, покрывается толстымъ слоемъ листа.

L. Humboldtii. Оранжевые цвѣты, испещренные многочисленными крапинками.

L. Californicum. Половина цвѣтка желтая съ бурными крапинками, а другая половина—красная.

L. Columbianum. Вышиною до 2-хъ футъ; имѣетъ цвѣты отороченные желто-оранжевыми лепестками, испещренными темнобурными крапинками. Любитъ питательную, нѣсколько влажную почву.

L. Koezli. Съ узкими листьями; даетъ на вершинѣ стебля не болѣе двухъ цвѣтковь, испещренныхъ пурпуровыми пятнами. Хорошо растетъ въ грунту, на зиму покрывается толстымъ слоемъ листа; не любитъ пересадки, а потому не вынимается изъ земли по 5 лѣтъ.

1069. *Limadolum Tankervilliae*. Оранжевое растеніе.

1070. *Limnantheum Douglasii*. Болотный Дуласовъ цвѣтъ.
Изъ семейства *Ientianeae*.

Однолѣтнее растеніе съ лежащими, сочными стеблями, желтыми цвѣтами, испещренными по краямъ бѣлымъ. Сѣется въ грунтъ, въ концѣ Апрѣля; довольствуется всякою землею; листочки его употребляются въ пищу, какъ крессъ-салатъ; требуетъ весьма влажнаго мѣста, а потому разводится на берегахъ прудовъ и другихъ водныхъ бассейновъ; если содержится въ горшкѣ, то на поддонѣ его постоянно должна быть вода.

Другіе виды: *L. Wrangeli*.

L. rosea. Съ блѣдно-розовыми цвѣтами.

L. Humboldtianum. Съ цвѣткомъ бѣлымъ, по серединѣ желтая звѣздочка; листь красивый, почти круглый.

1071. *Limncharis Humboldtii*. Изъ семейства Кувшинниковыхъ. Плавающіе стебли, съ овальными листьями и красивыми, желтыми, довольно большими цвѣтами. Весьма пригодно для теплаго акваріума, въ которомъ оно, будучи посажено на самое дно, цвѣтетъ весьма красиво лѣтомъ *).

1072. *Limonia citrifolia*. Оранжевое растеніе.

Другіе виды: *L. trifoliata*. Плоды употребляются въ пищу.

L. monophylla. Имѣетъ лечебныя свойства.

1073. *Linaria bipartita*. (*L. versicolor*. *L. reticulata*. *L. orchidiflora*). Изъ семейства *Scrophularineae* *Линянка*. *Собачка*. Однолѣтнее растеніе вышиною въ 2 $\frac{1}{2}$ фута, съ цвѣтами фіолетовыми, желтоватыми и полосатыми. Требуется легкую, песчанистую землю. Сѣется въ Апрѣлѣ, въ плошки, въ оранжевъ или въ Маѣ прямо въ грунтъ, изъ горшковъ раз-

*) Вообще семейство Кувшинниковыхъ, требуетъ слѣдующей культуры: корневище этихъ растеній, во время зимы сберегается въ сухомъ илѣ; затѣмъ въ Мартѣ сажаются въ горшки и ставятся въ воду, такъ, чтобы надъ растеніемъ было отъ 2 до 3-хъ вершковъ воды; въ такомъ положеніи растеніе переносится въ парникъ, на солнце. Когда у растенія разовьются листья, его переносятъ въ акварій, гдѣ вода должна постоянно содержать въ себѣ 20° тепла по Р.

саживается въ цвѣтникѣ, на солнечное мѣсто. Листья растенія похожи на листья льна, отчего и получило свое названіе. (*Linum*—ленъ).

Виды: *L. bipartita alba*. *L. b. splendens*. *L. triornitophora*. Очень красивое растеніе съ вѣтвистымъ стеблемъ, вышиною до 2-хъ съ половиною футъ; съ большими фіолетовыми или розовыми цвѣтами, съ желтою шпорою каждый. Сѣется въ Апрѣлѣ въ плошки; въ тепломъ климатѣ зимуетъ на воздухѣ, будучи посажено въ легкую, песчанистую землю.

L. triornitophora carnea. *L. supina*. *L. Melanantha*. *L. tristis*. *L. Perezii*. *L. pyrenaica*. Маленькое растеніе, съ лежачими стеблями, сизо-зелеными листьями и желтыми, либо темно-фіолетовыми вѣтами, съ черно-бурыми разводами.

L. triphylla. Цвѣты свѣтло-желтые съ фіолетовымъ.

Многолѣтніе виды:

L. alba. Съ бѣлыми цвѣтами, растетъ въ грунту, но можетъ содержаться и въ комнатѣ.

L. purpurea. Съ красновато-синими цвѣтами.

L. genistaefolia. Ленникъ дроколистный.

L. vulgaris. Ленникъ обыкновенный. Дикій ленъ. Выдолжникъ. Грунтовое, садовое растеніе.

1074. *Lindheimeria texana*. Однолѣтнее растеніе, вышиною до 2-хъ футъ, съ желтыми цвѣтами. Не заслуживаетъ разведенія.

1075. *Lindleya mespiloides*. Оранжевое растеніе, съ бѣлыми цвѣтами. Можетъ расти въ грунту при весьма надежной покрышкѣ на зиму. Любитъ сильную землю; всегда, особенно зимою, содержится довольно сухо. Размножается черенками.

1076. *Linnaea borealis*. Волосняникъ Линнея. Лѣсной чай. Изъ семейства *Caprifoliaceae*. Маленькій полукустарникъ, съ нѣжными, бѣлыми цвѣтами, растетъ въ еловыхъ лѣсахъ, гдѣ вѣтви его пускаютъ свои корни въ мохъ. Въ Швеціи и Норвегіи его листья употребляются какъ потогонное.

1077. *Linum grandiflorum rubrum*. Ленъ красный. Семейство *Lineae*. Такъ названъ отъ кельтскаго слова *Lin* — волокно. Очень красивое, однолѣтнее растеніе, вышиною до 1 фута,

развѣтвленное съ основанія, съ ярко-красными цвѣтами, открытыми только въ солнечную погоду, цвѣтеть все лѣто. Сѣется въ Мартѣ въ плошки, непременно въ холодной оранжереѣ или въ Апрѣлѣ прямо въ грунтъ, въ питательную, рыхлую, глинисто-песчаную почву, на солнечное мѣсто.

Другіе виды: *L. decumbens*. Алжирское растеніе, не такъ красиво, какъ предыдущее.

L. Dauricum. *L. Mexicanum*. *L. Sibiricum*. Эти три вида съ синими или желтыми цвѣтами.

L. catharticum. *Кукушкинъ ленъ*. *Слабительный ленъ*. Дикорастущее.

Существуютъ многолѣтніе виды *Linum*, разводимые посадкою корней, таковы:

L. perenne. *Ленъ многолѣтній*. Съ голубыми цвѣтами; на почву не прихотливъ, цвѣтеть въ Іюлѣ.

L. campanulatum. Низенькое растеніе, съ узкими листьями и многочисленными, желто-оранжевыми цвѣтами.

L. salsoloides. Низенькое растеніе, съ розовыми цвѣтами, имѣющими темный глазокъ.

L. Lewisii.

L. tetragynum. Оранжевое растеніе.

L. usitatissimum. *Ленъ прядильный*. Однолѣтнее растеніе, съ голубыми цвѣтами, разводится на поляхъ для получения волокна изъ стебля и масла изъ сѣмени; съ цвѣтовъ его пчелы берутъ въ Іюнѣ и до начала Августа взятковъ.

1078. *Lippia purpurea*. Оранжевое растеніе.

1079: *Liquidambar*. *Ликвидамбаръ*. Оранжевое деревцо.

Виды: *L. styraciflua*. *Л. Американскій*. Дерево дикорастущее въ Южной Америкѣ. Листья его нѣсколько похожи на кленовые, издають при треніи пріятный запахъ. Посредствомъ надрѣзовъ коры изъ этого дерева добывается перуанская амбра. Размножается черенками.

L. orientalis. *Л. Восточный*. Размножается черенками; выдерживаетъ зиму на открытомъ воздухѣ, но впрочемъ, при весьма тщательной покрышкѣ.

1080. *Liriodendron tulipifera*. *Тюльпанное дерево*. Дерево, высаживаемое на лѣто въ грунтъ, а зимою, сохраняемое въ про-

стѣнѣхъ. Въ дикомъ состояніи достигаетъ 100 футъ высоты; съ крупными, душистыми цвѣтами; размножается черенками, отводками и преимущественно посѣвомъ сѣменъ, весною или осенью. Любитъ вересковую землю и сильную поливку, преимущественно въ молодости.

1081. *Lisianthus oerstedii*. Изъ семейства *Gentianeae*. Тепличное, двухлѣтнее растеніе, съ четырехграннымъ стеблемъ и желто-зелеными, съ бѣлыми кончиками цвѣтами.

Другіе виды: *L. pulcher*. Ярко-красные цвѣты съ желтыми тычинками и пестикомъ. Оранжевое растеніе. Содержится въ торфяной землѣ, въ горшкѣ съ очень хорошимъ водостокомъ.

L. princeps. Съ большимъ оранжево-краснымъ цвѣткомъ, формою, напоминающимъ бутылку.

1082. *Lithospermum arvense*. *Воробьиное сѣмя*. Многолѣтнее растеніе.

Другіе виды: *L. dauricum*. *Воробейникъ*. Съ синими цвѣтами.

L. pulchrum. Садовое растеніе, требуетъ покрывки на зиму; съ голубыми или фіолетовыми цвѣтами.

L. rubro—coeruleum. Цвѣтокъ пурпуровый съ синимъ. Растеніе это до того, какъ зацвѣтетъ въ Февралѣ, содержится тепло, потомъ его переносятъ въ оранжерею, съ тѣмъ, чтобы дать цвѣтамъ вполне окраситься.

L. rosmarinifolium. Травянистый кустарникъ, съ Января до Мая даетъ синіе цвѣты.

L. Gastoni. Многолѣтнее растеніе, произрастающее въ грунту, на открытомъ воздухѣ; съ короткимъ стеблемъ, съ цвѣтами темно-синими съ бѣлымъ глазомъ и пурпуровыми полосками.

L. petraeum. Съ ярко-голубыми маленькими цвѣтами; растетъ на открытомъ воздухѣ.

1083. *Litsaca glauca*. Тропическое растеніе; изъ плодовъ его добывается растительный воскъ.

1084. *Littonia modesta*. Изъ семейства *Liliaceae*. Содержится въ умеренной теплицѣ. Ползучее растеніе, съ оранжевыми цвѣтами. Требуетъ той же культуры, что и *Methonico*.

1085. *Liwistonia altissima*. Тепличная пальма. Размножается сѣменами.

Другіе виды: *L. chinensis*. Стволъ и основанія имѣетъ въ окружности до двухъ аршинъ.

L. australis. Оранжевая пальма съ прекрасными листьями.

1086. *Loasa lateritia*. Семейство *Loaseae*. Однолѣтнее, вьющееся растение, успешно разводится только въ очень тепломъ климатѣ; можетъ расти въ комнатѣ. Высѣвается сперва въ парникъ, рассаживается въ горшки и держится въ парникѣ; когда же нельзя болѣе ждать морозовъ, пересаживается въ грунтъ. Вообще требуетъ мало поливки. Листья Лоазы покрыты жгучими волосами, какъ у крапивы; цвѣты бѣлые, желтые и оранжевые; землю любитъ листовенную, съ примѣсью одной части дерновой, нѣкотораго количества песку и навозной земли.

Другіе виды: *L. schlimiana*. Оранжевое растение, цвѣты зеленые съ желтыми и оранжевыми полосками.

L. alba. *L. lateriata*. *L. grandiflora*. *L. picta*. Цвѣты бѣлые съ желтымъ и малиновымъ весьма оригинальной формы и очень красивые.

L. aurantice. Оранжевое растение.

L. lateritia.

1087. *Lobelia*. Однолѣтнее, бордюрное растение, сѣется въ парникъ и потомъ рассаживается въ грунтъ, цвѣтетъ все лѣто; одни цвѣтки смѣняють другіе.

Виды: *L. densa multiflora*. *L. crinoides speciosa*. *L. e. Prinz. Albert*. *L. erinus*, высѣвается въ Мартъ въ оранжерею или въ Апрель, въ парникъ; пересаживается въ рыхлую, песчанистую, питательную землю; пригодно и для зимней культуры, ставится въ маленькихъ горшкахъ въ сухое мѣсто оранжереи и распускается въ Мартъ и Апрель.

L. e. alba бѣлая. *L. e. compacta alba*. *L. e. marginata*. *L. e. ramosoides*, съ темно-фіолетовыми цвѣтами.

L. Gracilis erecta, со свѣтло-голубыми цвѣтами.

L. g. e. bicolor. Низенькое растение, съ небесно-голубыми цвѣтами.

L. g. rosea. L. grandiflora oculata. L. y. superba съ голубыми цвѣтами. *L. g. Duneliana. L. g. Paxtoni. L. speciosa cermesina. L. triquestra. L. erinoides. L. decumbens. L. bicolor hirsuta. L. pubescens. L. campanulata. L. erecta speciosa. L. gracilis. L. erecta. L. bicolor grandiflora atrocoerulea.* Красивѣе всѣхъ другихъ видовъ.

L. heterophylla. Цвѣты темно-лазуревые, съ бѣлымъ глазкомъ или бѣлые; высѣваются въ парникъ въ концѣ Марта разсаживается въ маленькіе горшки и держится въ парникѣ, пока нельзя уже будетъ ждать морозовъ, тогда высаживается въ глинисто-дерновую землю; тутъ ему дѣлается маленький трельяжъ, по которому вьются его стебли; но въ дождливое и холодное лѣто растеніе это не получаетъ надлежащаго развитія, а потому въ подобное время его лучше держать въ оранжереѣ.

Нѣкоторые виды Лобелии—многолѣтнее, какъ напр.

L. ramosa. L. r. alba. L. r. rosea. L. cardinalis. L. pyramidalis.

L. bicolor. Маленькое растеніе, образующее густой кустарникъ; размножается посѣвомъ въ Апрѣлѣ, дѣленіемъ корней и черенками; зимою сохраняется въ оранжереѣ при самой умѣренной поливкѣ; но легче разводится какъ однолѣтнее растеніе.

1088. *Locheria magnifica.* Изъ семейства Геснерій. Оранжерейное растеніе съ пунцовыми, испещренными черными полосками, цвѣтами.

1089. *Lodoicea.* Родъ пальмъ. Весьма рѣдкое въ Европѣ растеніе. Прежде полагали, что это растеніе подводное, т. е. растущее на днѣ океана, такъ какъ мѣсто нахожденія его не было извѣстно, а между тѣмъ его плоды, весьма дорого цѣнимые находили въ морскихъ волнахъ. Размножается сѣменами.

Видъ его: *L. sechellarum.*

1090. *Loelia.* Орхидея, съ весьма красивыми, большими розовыми, желтыми, красными или лиловыми цвѣтами; размножается дѣ-

лениемъ корней; сажается на кускѣ угля; требуетъ листовенную землю съ примѣсъю половинной пропорціи вересковой.

Виды: *L. anser.* *L. cinnabarina.* *L. superbians.*

1091. *Loeselia coccinea* (*Hoitzia coccinea*). *Красная Лезелія.*

Кустарное садовое растеніе, достигающее 2½ аршинъ. На землю не прихотливо; требуетъ только рыхлой и питательной почвы. Должно зимовать въ свѣтломъ помѣщеніи, въ температурѣ 5—7° Р. У насъ лучше держать въ горшкахъ, такъ какъ зацвѣтаетъ только въ Августѣ. Весною выносятся въ цвѣтникъ на свѣтлое мѣсто. Изрѣдко поливается жидкимъ удобрениемъ. Размножается черенками въ тепломъ парникѣ, съ весны до Августа.

1092. *Lomaria falcata*. Древковатый, тепличный папоротникъ.

1093. *Lomatophyllum saundersii*. Тепличное растеніе съ сочными листьями, по краямъ усаженными красновато-бурыми шипами.

1094. *Lonas inodora*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

1095. *Lonicera*. *Жимолость татарская*. Семейство *Caprifoliaceae*. Садовый кустарникъ, быстро растущій и въ дикомъ состояніи, достигая 10 фут., съ душистыми цвѣтами, раскрывающимися въ Іюль. Въ дикомъ состояніи имѣетъ блѣдно-розовые цвѣты. Съ цвѣтовъ пчелы берутъ взатокъ; на листьяхъ держатся шпанскія мухи. Размножается черенками и сѣменами, пролежавшими зиму въ пескѣ, въ холодѣ. Черенки дѣлаютъ послѣ опаденія листьевъ, для чего берутъ лѣтніе побѣги рѣжутъ на куски съ 3—5-ю глазками каждый, срѣзая непосредственно подъ глазкомъ, сажаютъ въ разрыхленную землю до втораго сверху глазка. На почву не прихотливо. Нѣжные сорта на зиму закрываютъ листомъ или сберегаютъ въ подвалѣ, въ пучкахъ, и сажаютъ раннею весною.

Виды: *L. tatarica* var. *alba*; имѣетъ цвѣты, снаружи розовые, внутри бѣлые.

L. t. rubra.

L. var. rosea. Цвѣты снаружи розовые, внутри тѣлесные.

L. v. pulcherima. Цвѣты снаружи темно-розовые, внутри свѣтло-розовые.

L. v. splendens. Цвѣтки снаружи и внутри пурпурово-розовые, съ лепестками, отороченными бѣлымъ.

L. periclymenum. *Жидкая Пипоротъ душистая.* Съ душистыми цвѣтами. Его вьющіеся вѣтви осенью пригибаются къ землѣ и на зиму покрываются листомъ.

L. v. micrantha. Маленькіе, бѣлые цвѣточки, отливающие розовымъ.

L. brachypoda aureo reticulata. Съ пестрымъ золото-желтымъ листомъ, зимою сохраняется въ простѣлкахъ оранжевен или подвалѣ.

L. canadensis. Съ синеватыми листьями.

L. xylosteum. *Ж. волшебная. Ж. кустарная.* Съ пепельною корою и бѣлыми цвѣтами.

L. caucasica. *Тугопустунъ.* Растеніе Кавказскаго края.

L. elliiata. L. discolor.

L. chrysantha. Съ золотистыми цвѣтами.

L. coerulea. *Готовикъ. Ж. голубая* даетъ плоды въ зрѣломъ состояніи совершенно голубаго цвѣта, выноситъ суровыя зимы.

L. Ladebourni. *Ж. Ладбуръ.* Нижняя сторона листьевъ густо усажена волосками.

L. nigra. *Ж. Черная.* Съ черными ягодами.

L. pyrenaica *Ж. Пиринейская.* Съ бирюзоваго цвѣта листьями и бѣлыми цвѣтами.

L. villosa. *Ж. Шерстистая.*

L. alpigena. *Ж. горная. Альпійская.* Съ краснымъ цвѣтомъ переноситъ самыя суровыя зимы безъ покрывки; даетъ красныя, величиною съ вишню, ягоды противнаго вкуса, имѣющія свойства рвотнаго.

L. Maximowiczii. Съ темно-фіолетово-пурпуровыми цвѣтами. Тоже.

L. orientalis. Лѣтніе побѣги сине-зеленые даетъ красно-фіолетовые цвѣты. Переноситъ зиму подъ защитою деревьевъ.

L. Caprifolium. *Каприфолія. Шефъ флем.* Вьющійся кустарникъ, похожъ на *periclymenum*, съ душистыми цвѣтами и красными ягодами; на зиму покрывается листомъ.

L. Ruprechtiana. Съ блѣдно-желтыми цвѣтами.

L. brownii. Цвѣты огненно-красные, съ желтыми тычинками и пестиками.

L. sempervirens. Ж. *Виргинская*. Цвѣты съ красно-киповарною трубкою, внутри съ правильною, золотисто-желтою каймою.

L. flava. Съ золотисто-желтыми цвѣтами.

L. parviflora. Съ маленькими желтогато-пурпуровыми цвѣтами.

L. pubescens. Вьющійся кустарникъ съ золотисто-желтыми цвѣтами, переносить зиму безъ прикрыши.

L. Douglasi. Съ золотисто-желтыми цвѣтами растетъ дико, въ сѣверо-западной Америкѣ.

L. media. Ж. *Красноцвѣтная*. Сѣверо-американское растение.

L. periclymenum aureum. Вьющійся кустарникъ, съ листьями, испещренными желтыми и бѣлыми крапинками.

L. japonica. Оранжевое растение.

1096. *Lopezia* (*L. mexicana*. *L. hirsuta*). Изъ семейства *Ocnotheraceae*. Однолѣтнее растение вышиною до полутора аршинъ, съ нѣжными красными цвѣтами.

Другіе виды: *L. miniata* *L. miniata alba*. Маленькое оранжевое и вмѣстѣ комнатное растение съ цвѣтами бѣлыми или кирпичнаго цвѣта, раскрытыми всю зиму до Мая. Растение это очень хорошо для букетовъ; чтобы имѣть его въ цвѣту зимою, черенки Лопеции срѣзаютъ съ Іюля до Сентября, отщипываютъ кончики молодыхъ растений и оставляютъ ихъ на воздухѣ, когда же наступятъ морозы, переставляютъ горшки съ Лопеціей въ парникъ, продолжая отщипывать кончики растений до тѣхъ-поръ, пока оно не сдѣлается кустистымъ. Цвѣты распускаются въ теплицѣ или комнатѣ, начиная съ Ноября, однако въ теплицу растенія вносятся не всѣ вдругъ, такъ какъ онѣ тянутся въ теплѣ, а только въ томъ количествѣ, какое желаютъ имѣть въ цвѣту.

L. coronata. Съ красными цвѣтами, вмѣшивается предвѣрительно въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ.

L. macrophylla. Съ малиновыми цвѣтами.

1097. *Lophospermum Hendersonii*. Изъ семейства *Scrophulariaceae*. Вьющееся оранжевое растение, бываетъ покрыто все лѣто розовыми цвѣтами.

Другіе виды: *L. Scandens*. Оранжерейное растеніе, съ малиновыми цвѣтами; легко размножается черенками.

L. erubescens. Многолѣтнее растеніе, съ пурпуровыми цвѣтами; растетъ на воздухѣ, но зимою сохраняется въ оранжереѣ.

1098. *Lothos glaberrima* (*L. californica*). Маленькое, бордюрное, однолѣтнее растеніе, съ желтыми цвѣтами, высѣвается раннею весною прямо въ грунтъ.

1099. *Lotus jacobaeus*. Изъ семейства *Papilionaceae*. Многолѣтнее растеніе, съ цвѣтами кофейнаго цвѣта; высѣвается въ Мартѣ, въ теплицѣ или въ Апрѣлѣ, въ парникъ; высаживается въ горшки, держится подъ рамами, пока совершенно прекратятся морозы, затѣмъ высаживается въ грунтъ, на солнечное мѣсто; разводится и для теплицы, но зимою содержится въ оранжереѣ.

Другіе виды: *L. tetranogolobus*. Высѣвается прямо въ грунтъ; красивый цвѣтокъ его распускается въ Іюнѣ.

L. corniculatus. *Лататный горшокъ. Лядвенецъ рогатый*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтетъ съ Іюня до Августа.

L. lanatus. Оранжерейное растеніе.

1100. *Luculia*. Красивое, оранжерейное, кустовое растеніе, съ душистыми бѣлыми или розовыми цвѣтами; можетъ расти въ комнатѣ, размножается черенками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Лѣтомъ растеніе держать на вольномъ воздухѣ, въ тѣнистомъ мѣстѣ. Желая продлить его цвѣтеніе до Декабря, когда растеніе отцвѣтетъ, его, мѣсяца три держать сухо, затѣмъ срѣзываютъ, пересаживаютъ и для выгонки ставятъ въ парникъ; но воспитанное такимъ способомъ растеніе не достигаетъ надлежащаго вида и потому не имѣетъ полной красоты; чтобы ее достигнуть одинъ прошлогодній стебель срѣзаютъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ земли, (а всѣ прочіе срѣзываютъ вове), отъ этого стебель даетъ нѣсколько побѣговъ. Такъ повторяютъ обрѣзку втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ, отчего образуется одинъ красивый стволъ съ нѣсколькими развѣтвленіями, которыя покроются цвѣтами.

Другой видъ: *L. pinseana*. Съ снѣжно-бѣлыми цвѣтами.

1101. *Lucuma*. Деревцо съ бѣлыми цвѣтами и вкуснымъ плодомъ, похожимъ на персикъ. Размножается сѣменами и черенками. Требуется земля составленная пополамъ изъ дерновой и лиственной съ небольшою примѣсью песку. Можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: *L. deliciosa*. *L. mommosa*. *L. calicifolia*.

1102. *Ludovia lancefolia*. Изъ семейства *Pandaneae Cyclanthæ*.

* Тепличное растеніе, съ довольно узкими листьями, похожими на листья Драцены и также какъ у ней расположенными. Изъ основанія ствола пускаетъ воздушные корни, которые врастаютъ въ землю и даютъ отростки, которыми и размножается растеніе.

1103. *Luffa*. Бьющееся растеніе, изъ семейства Тыквъ; разводится только въ весьма тепломъ климатѣ.

1104. *Lunaria annua*. Двухлѣтнее растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ; фіолетовый цвѣтокъ распускается въ Іюнѣ; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

Другой видъ: *L. biennis*. Тоже съ бѣлыми цвѣтами.

1105. *Lupinus*. Изъ семейства *Leguminosae*. По преимуществу однолѣтнее растеніе, но многіе виды являются многолѣтними растеніями. Высѣвается въ Маѣ, въ грунтъ, или въ Апрѣлѣ въ плошки, которыя ставятся въ парникъ; когда взойдетъ и укрѣпится, пересаживается въ грунтъ, на солнечное мѣсто, въ хорошую, садовую землю. Многолѣтніе виды также размножаются дѣленіемъ корней, сохраняемыхъ зимою, посаженными въ горшки, при умеренной поливѣ. *Лупинусъ* очень истощаетъ почву, въ намекъ на это хищническое свойство и названіе его произведено отъ слова *lupus*—волкъ.

Виды однолѣтнихъ Лупинусовъ:

L. afinis. *L. albus coccinea*. *L. Dunetti elegans*. *L. dunetti atroviolaceus*. Фіолетово-пурпуровые цвѣты, съ желтыми и бѣлыми пятнами.

L. Hartwegii. (*L. guatemaliensis*). Все растеніе покрыто длинными волосками; даетъ голубые цвѣты длинною кистью,

цвѣтетъ все лѣто. Высѣвается сперва въ парникъ, а потомъ пересаживается въ грунтъ.

L. H. albus. L. H. persicus. L. H. ruber.

L. h. roseus. Съ розовыми цвѣтами.

L. Hibridus atrococcineus. L. h. insignis. L. h. superbus.

L. luteus nanus. Не болѣе фута вышиною пригоденъ для бордюра; съ желтыми цвѣтами.

L. l. n. flore sulphurea (L. Menziesii). Съ желтыми цвѣтами.

L. n. leucospermus. L. Meritzianus.

L. mutabilis. Вышиною до 3 фута. Даетъ очень душистые, голубые цвѣты, въ серединѣ желтые.

L. m. cuikschantzii. Тоже, но цвѣты бѣлые.

L. m. roseus. L. tricolor mutabilis. L. nanus.

L. n. albus. L. pubescens. (L. aridas). Вышиною въ 2 фута, цвѣтокъ бѣлый съ фіолетовымъ.

L. elegans. Цвѣты въ началѣ голубые, потомъ дѣлаются темно-синими и достигаютъ 3-хъ фута.

L. bicolor. Растеніе немного выше фута, съ голубыми цвѣтами.

L. subcarnosus. Темно-лазуревые цвѣты, съ бѣлыми пятнами у основанія.

L. varius (hirsutus). Съ голубыми или пурпуровыми цвѣтами.

L. menziesii. Съ желтыми цвѣтами. Слѣдующіе три вида не заслуживаютъ разведенія: *L. v. angustifolius. L. varius hirsutissimus. L. termis.*

Многочитныя виды Lupinus:

L. flavescens. Л. желтоватый.

L. grandiflorus. Л. великоцвѣтный.

L. Marschalianus. Л. Маршаловъ.

L. Mexicanus. Л. Мексиканскій.

L. nootkatensis. Л. Нутканскій.

L. perennis. Л. Многолѣтній.

L. polyphyllus. Л. Многолиственный.

L. p. albiflorus. Л. Многолист. бѣлый.

L. p. azureus. Л. М. синий.

L. p. roseus. Л. М. розовый.

- L. p. elegans. L. p. hybridus. L. p. striatus.*
L. p. violaceus. Л. М. фиолетовый.
L. rivularis. Л. бережный.
L. tomentosus. Л. душистый.

1106. *Luzula multiflora.* Кукушкины слезки. Ожика. Изъ семейства *Juncaceae*. Дикорастущее.

Другіе виды: *L. sylvestris fol. elegans marginatis.*
Многолѣтнее садовое растеніе, требующее покрывки на зиму.
L. pilosa. Растетъ въ лѣсахъ.

1107. *Lycaste.* Очень красивое, тепличное растеніе, изъ семейства Орхидей; цвѣтетъ и въ комнатѣ. Довольно длинныя листья; большіе бѣлые розовые или желтые цвѣты. Требуется той же культуры, что и другія эпифитныя Орхидеи; размножается дѣленіемъ корней; сажается на кусокъ угля.

Виды: *L. Skinneri.* Красивѣйшій видъ. Большіе, бѣлые цвѣты, съ малиновымъ испещреннымъ зѣвомъ.

L. languella. Съ бѣлыми цвѣтами.

L. macrophylla. L. gigantea. L. aromatica. L. tetragona. L. cruenta. L. grandiflora.

1108. *Lychnis.* Дрема. Горичица. Изъ семейства *Cariophyllaceae. Sileneae.* Многолѣтнее, корневое растеніе, съ бѣлыми, розовыми, оранжевыми или ярко-красными цвѣтами; нѣкоторые его виды растутъ дико въ нашихъ лѣсахъ; размножается посѣвомъ сѣмянъ въ Мартѣ и дѣленіемъ корней; требуетъ двѣ части лиственной земли съ примѣсю одной части дерновой, и одной части навозной съ пескомъ.

Виды: *L. chalcidonica rubra.* Зорки.

Барская спѣсь. Съ пурпуровыми цвѣтами.

L. grandiflora. Съ оранжевыми цвѣтами.

L. senno flore striato. Съ огненно-красными цвѣтами, расписанными бѣлыми полосками.

L. chalcidonica alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

L. c. carnea. Съ цвѣтами тѣлеснаго цвѣта.

L. fulgens. Горичица блестящій. На зиму требуетъ покрывки.

L. Bungleana. L. coelirosa. L. sibirica.

L. sieboldii. Съ бѣлыми цвѣтами.

L. coronaria. *Г. отъечный*. Красный, махровый цвѣтокъ.

L. c. alba. Бѣлый, махровый цвѣтокъ.

L. dioica plena. *Г. вечерній*. Зимой корни его должно держать въ подвалѣ или въ оранжереѣ.

L. Naageana. Пунцовый цвѣтокъ различныхъ оттѣнковъ; на зиму покрывается листомъ.

L. h. carnea. *L. h. aurantiaca*. *L. h. coccinea*.

L. h. rubra. *L. h. gigantea*. На зиму требуетъ покрывки.

L. h. g. alba. *L. h. g. brunea*. *L. h. g. carnea*. *L. h. g. coccinea*. *L. h. g. lilacina*. *L. h. g. rubra*.

L. speciosa. Многолѣтнее растеніе, съ многочисленными стеблями и крупными, суриковыми цвѣтами.

L. fl. cuculi. *Горичать кукушкинъ*. Дикорастущее, медоносное, двухлѣтнее растеніе, цвѣтетъ съ Мая по Іюль.

109. *Lycium*. *Заманиха*. *Новый Живоблотъ*. *Ткенна*. Дикорастущій, колючій кустарникъ, разводимый въ садахъ, съ цвѣтами, похожими на цвѣты жасмина.

Виды: *L. fuchsioides*. Съ ярко-оранжевыми цвѣтами, внутри золотистыми, растетъ въ грунту, но въ европейскихъ садахъ еще не разведено.

L. barbarum. *Придорожная иголка* — южная.

L. obovatum. *Придорожная иголка* — крулолистная.

L. europæum. *Ткенна европейская*. Съ блѣдно-красными цвѣтами, пригоденъ для изгородей.

L. ruthenicum. *Т. сибирская*. Дико растетъ въ Сибири, съ лилово-красными цвѣтами.

110. *Lycopersicum Humboldtii*. Однолѣтнее, цвѣточное растеніе, высѣвается въ парникъ или въ горшки и потомъ пересаживается въ грунтъ. Плоды его имѣютъ возбуждающее свойство.

Другой видъ: *L. pyriforme*.

111. *Lycopodium*. (*Selaginella*). *Плауны*. Стелющееся, тепличное растеніе; семейство Плауновыхъ. Можетъ расти и въ комнатѣ. Прекрасно держится въ оранжереѣ; имѣетъ стебли и вѣтви, покрытые сплошными, маленькими листочками и корешками. Размножается черенками. Зимой мало поливается.

Виды: *L. selago*. *Баранецъ*. *Зеленика*.

L. cuspidatum. L. apus. L. stellatum. L. arborescens. L. caesium. L. umbratum.

L. stoloniferum.

L. dichotomum. Низенькое, тепличное растеніе, съ многочисленными стеблями, усаженными длинными листьями.

L. mandiocanum. Тепличное растеніе съ прямыми, красными стеблями, усаженными, остроконечными длинными листьями.

L. taxifolium. Тепличное растеніе, съ толстыми стеблями и болѣе широкими, чѣмъ у предыдущихъ видовъ листьями.

L. annotinum. Баранецъ. L. clavatum. Дербяба. Оба лекарственныя растенія.

L. complanatum. Зеленика.

III2. *Lycopus. Ликонъ.* Изъ семейства *Labiatae*. Дикорастущее.

Видъ его: *L. europæus. Болотная крапива.* Цвѣты бѣлые, съ красными внутри крапинками. Растетъ въ сырыхъ мѣстахъ.

III3. *Lycoris aurea.* Изъ семейства *Amaryllidaceae*. Тепличное растеніе, съ большими желтыми цвѣтами. Чтобы оно цвѣло рано осенью, растеніе сажаютъ въ тучную землю, очистивъ его отъ старыхъ корней, и оставляютъ его развѣивать свои листья до Марта или Апрѣля, тогда его переносятъ въ оранжерею, и когда нельзя больше ждать морозовъ, пересаживаютъ на открытый воздухъ въ грунтъ.

III4. *Lysimachia verticillata. Вербейникъ Таврическій.* Изъ семейства *Primulaceae*. Многолѣтнее, грунтовое, садовое растеніе. Размножается сѣменами и черенками, на которые берутся полуодревѣлые побѣги, послѣ того какъ растеніе отцвѣтеть.

L. nummularia. Луговой чай. Дикорастущее, многолѣтнее и грунтовое садовое растеніе, съ свѣтло-зелеными листьями, лежащими стеблями и золотисто-желтыми цвѣтами.

L. punctata. Съ желтыми цвѣтами.

L. vulgaris. Завальная трава. Дикорастущее.

L. leschenaultia. Съ розовыми цвѣтами.

L. nutans. Оранжерейное растеніе, съ кистью пурпуровыхъ цвѣтовъ.

III5. *Lytrum salicaria.* Семейство *Lythrariae*. *Плакунъ. Дербенникъ обыкновенный. Подберезникъ.* Многолѣтнее грунтовое,

съ темно-красными цвѣтами садовое растеніе, зимуетъ на открытомъ воздухѣ. Отваръ листьевъ этого растенія употребляется противъ поноса.

Другіе виды: *L. roseum*. Съ розовыми цвѣтами.

L. pubescens. Д. пушистый. Съ розово-фіолетовыми цвѣтами.

L. superbum.

1116. *Livistona*. Родъ пальмъ, съ древеснымъ стволомъ. Вѣерообразные листья, съ игловатыми черенками, имѣющими при основаніи волокна. Употребляется на крыши, циновки и шляпы. Размножается сѣменами.

Виды: *L. humilis*. *L. inermis*. *L. chinensis*. *L. rotundifolia*. *L. Ienkinsii*. *L. olivaeformis*.

1117. *Machaeranthera tanacetifolia*. (*Aster tanacetifolium*).

Однолѣтнее, садовое растеніе съ голубыми цвѣтами. Требуется такого же ухода, какъ *Helehrysium*.

1118. *Mackaya bella*. Прекрасный, тепличный кустарникъ, съ бѣлыми цвѣтами и съ темно-розовыми жилками.

1119. *Macleania*. Кустовое растеніе съ красными или желтыми цвѣтами; можетъ расти въ комнатѣ; размножается черенками; зимою поливается крайне умеренно; требуетъ землю, составленную изъ разныхъ частей дерновой, лиственной и песку, съ примѣсью такого же, какъ и вся означенная смѣсь, количество вересковой земли.

Виды: *M. cordata* Пунцовые цвѣты съ желтыми краешками.

M. floribunda. *M. coccinea*. *M. insignis*.

1120. *Maclura tricuspidata*. Кустарникъ съ колючими вѣтвями. У насъ на югѣ служить для живыхъ изгородей.

1121. *Macrosamia corallipes*. Оранжевое растеніе имѣетъ перистые, закрученные листья и цвѣты шишкою.

Другой видъ: *M. pulchra*. Тепличное растеніе, съ очень узкими листьями, при основаніи бѣлыми.

1122. *Madaria elegans*. (*M. corymbosa*. *Madia elegans*). Однолѣтнее садовое растеніе, достигающее трехъ футовъ, съ желтыми цвѣтами.

1123. *Mahernia odorata*. *Магернія* (анаграмма *Германіи*). Оранжевое растение.

Другіе виды: *M. pinnata*. Съ желтыми, душистыми цвѣтами; распускается въ оранжереѣ и въ комнатѣ, на одніѣ, гдѣ цвѣтеть всю зиму.

M. incisa. Съ красными цвѣтами, распускается въ началѣ зимы и вторично цвѣтеть весною.

1124. *Mahonia*. *Маонія*. Дерево, разводимое для украшенія садовъ; на зиму требуетъ надежной крыши.

1125. *Magnolia*. *Магнолія*. *Тюльпанное дерево*. Семейство *Magnoliaceae*. Оранжевое дерево съ душистыми цвѣтами бѣлыми, розовыми или свѣтло-коричневыми. Размножается сѣменами, отводками и черенками. Требуется земля, составленная изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Нѣкоторые виды хорошо растутъ въ комнатахъ. Можетъ быть подвергнуто ранней выгонкѣ. Для этого берутъ яркіе экземпляры, способные цвѣсти, сажаютъ въ тучную, смѣшанную съ вересковою землю, не срѣзываютъ вѣтвей и даютъ развиваться въ холодной оранжереѣ. Магнолія, выдержанная такимъ способомъ, распускается около Марта.

Виды: *M. grandiflora*. *M. крупноцвѣтнал.* Съ большими бѣлыми, душистыми цвѣтами.

M. Campbelvi. Съ весьма большими цвѣтами, розовыми внутри и малиновыми снаружи.

M. lennei. (*Purpureo Iulan*). Съ большими розовыми цвѣтами.

M. Iulan. *M. acuminata*. *M. glauca*. *M. obovata*.

Виды, вполне пригодныя для комнатной культуры: *M. pumila*. *M. fuscata*. *M. fragrantissima*.

1126. *Malachra fasciata*. Оранжевое растение.

1127. *Malcolmia maritima*. Однолѣтнее цвѣточное растение.

1128. *Malope trifida*. *Дуравка*. Однолѣтнее садовое растение, достигающее 2 футовъ, съ цвѣтами въ видѣ простыхъ Мальвъ: бѣлыми, розовыми, малиновыми, темно-красными. Очень благодарное растение. Сѣется, въ Апрѣлѣ, прямо въ грунтъ. На почвѣ не прихотливо.

Другіе виды: *M. grandiflora*. Съ большими темно-красными цвѣтами.

M. alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

1129. *Malortica*. Родъ пальмъ. Заклѣчиваетъ три вида: изъ лѣсистыхъ горъ центральной Америки. Самыя маленькія изъ пальмъ, достигающія только 6 дюймовъ.

Виды: *M. gracilis*. *M. simplex*. *M. latisecta*. Виды эти размножаются дѣтками, которыя тогда только отдѣляются отъ растенія, когда уже образуютъ хотя одинъ корешокъ. Такой отводокъ ставится въ теплый парникъ, на время, пока пойдетъ въ ростъ.

1130. *Malpighia puniceifolia*. Оранжевое растеніе, имѣетъ лекарственныя свойства.

1131. *Malus floribunda*. Оранжевое дерево. Цвѣты малиновые съ бѣлымъ; ими такъ бываетъ покрыто дерево, что изъ-за нихъ не видать листьевъ.

1132. *Malva*. *Мальва*. Семейство *Malvaceae*. Садовое растеніе, бываетъ *однолѣтнее* и *многолѣтнее*.

Однолѣтнія Мальвы размножаются посѣвомъ сѣменъ; требуютъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и нѣкотораго количества песку; бываютъ съ бѣлыми, розовыми или лиловыми цвѣтами.

Виды: *M. Mauritiana*. Достигаетъ 5 футовъ, съ красными цвѣтами, высѣвается въ Апрѣль, прямо въ грунтъ, въ рыхлую землю.

M. veruviana. *M. rosea*. *M. alba*.

M. crispa. *Скулочникъ*. Дикорастущее

M. rotundifolia. *Проскурка*. *M. круглолистная*. Дикорастущее, медоносное растеніе.

Многолѣтнія Мальвы разводятся посѣвомъ и размножаются дѣленіемъ корней, которые, если зимою сохраняются въ подвалѣ, требуютъ нѣкоторой поливки. Мальвы, остающіяся въ грунтѣ на зиму, надлежитъ слегка прикрывать листомъ; но при этомъ необходимо наблюдать за своевременнымъ снятіемъ таковой покрывки, весною, съ тѣмъ, чтобы растеніе не сопрѣло.

Многолѣтніе Мальвы требуютъ такую же землю, какъ и

однолѣтнія, только съ примѣсю небольшого количества невозной земли.

Виды: *M. elegans*. *M. alcea*. *M. Brasiliensis*. *M. Moschata*. *M. мускатная*.

M. aurantiaco—rubra. Съ ярко-оранжевыми цвѣтами.

M. capensis. *M. Miniata*. *M. Mullei*.

Всѣ три вида содержатся въ оранжереѣ.

M. zebrina. Цвѣты красные, съ бѣлыми полосками.

M. sylvatris. *Дзундзиверъ*. Дикорастущее.

1133. *Mamillaria*. Порода Кактуса. Имѣетъ видъ шара и состоитъ изъ полукруглыхъ бугорковъ, покрытыхъ колючками, съ большими бѣлыми, желтыми или малиновыми цвѣтами. Размножается отростками, вырастающими на бокахъ стебля. Зимую содержится совершенно сухо. Требуется земля, составленную изъ дерновой и лиственной, съ примѣсю незначительнаго количества песку. На дно горшка кладется толстый слой черенковъ. Можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: *M. peacockii*. Оранжерейное растеніе, представляется полушаровидною массою, покрытою волосками и иглами.

M. coronaria. Бываетъ вышиною до 5 футовъ, съ ярко-красными цвѣтами.

M. longimamma. *M. Humboldtii*. *M. spinosissima*.

1134. *Mandriola naegelia (hybrid) Roezlii*. Изъ семейства гераніей. Оранжерейное растеніе съ розовыми цвѣтами. Требуется та же культура, что и другія гераніи. Цвѣтеть лѣтомъ до Октября.

1135. *Mandragora autumnalis*. Воздушное растеніе, съ темно-лиловымъ, въ видѣ колокола цвѣткомъ, издающимъ непріятный запахъ. На зиму требуетъ надежной покрывки. Любитъ глубоко перекопанную почву и легкую землю, а равно постоянной очистки отъ сорныхъ травъ. Размножается сѣменами, которыя сѣютъ тотчасъ послѣ того, какъ они созрѣютъ; по всхождѣ растеньица рассаживаются. Растеніе это весьма вредно дѣйствуетъ на скотъ, если попадетъ въ его стойла, отчего и получило свое названіе. (*Mandra* — хлѣвъ и *agauros* — смертельный),

1136. *Manettia cordifolia*. Вьющееся оранжерейное растение, съ красными съ желтымъ цвѣтами; распускается въ Декабрѣ и Январѣ; зимою весьма мало поливается. Требуется тучную землю и очень хорошій дренажъ. Развязывается на трельяжъ. Цвѣтетъ всю зиму. Размножается черенками, на которые рѣжутъ молодыя вѣточки.

Другіе виды: *M. coerulea*.

M. bicolor. *Манеція двухцвѣтная*.

M. miniata. Съ пунцовыми цвѣтами.

1137. *Manicaria*. Родъ пальмъ. Имѣетъ стволъ гладкій, древесный, съ угловатыми початками. Въ изобиліи растетъ на берегахъ рѣкъ. Похожъ на Чинарѣ. Размножается сѣменами.

Виды: *M. plukenetii*. *M. saccifera*.

1138. *Manihot Aipi*. Тропическое растение, изъ котораго добывается мука, употребляемая подъ именемъ „Кассава“.

Другой видъ: *M. utilisima*.

1139. *Manulea violacea*. Однолѣтнее растение висѣвается прямо въ грунтъ. Фиолетовый цвѣтокъ распускается въ Іюлѣ.

1140. *Marantha*. Семейство *Maranthaceae*. Многолѣтнее теплолюбивое вмѣстѣ и комнатное корневое растение, съ чрезвычайно красивыми, широкими, темно-зелеными листьями, красно-лиловыми снизу, а сверху расписанными темными, розовыми или бѣлыми полосами и бѣлыми, будто сдѣланными перомъ черточками. Цвѣты бѣлые или лиловые съ зеленымъ. Требуется очень нѣжнаго ухода: землю рыхлую, составленную изъ $\frac{2}{5}$ листовой, $\frac{1}{5}$ перепрѣвшаго коровьяго навоза, $\frac{1}{5}$ свѣжаго торфянаго мху и $\frac{1}{5}$ угля и битыхъ черепковъ; если же въ листовой землѣ окажется мало песку, то его должно прибавить. Размножается отростками отъ корня и раздиркою корней. При пересадкѣ тщательно сберегаютъ корни растения. Лучшимъ временемъ для пересадки Маранты признается конецъ Марта или начало Апрѣля. Пересаженное растение на нѣкоторое время ставится на корье. Лѣтомъ требуетъ затѣннаго положенія. Въ концѣ Апрѣля, когда растение пойдетъ въ ростъ, надлежитъ часто поливать его жидкимъ удобрениемъ изъ коровьяго навоза. Чтобы усилить развитіе растения его вторично пересаживаютъ въ большую посуду, въ концѣ Іюня.

Съ Октября поливка уменьшается и зимою требуетъ весьма, умѣренной.

Виды: *M. arrecta*. Небольшіе темно-зеленые листья, съ нижней стороны пурпуровые.

M. bellula. По темно-зеленому листу идетъ жилка, отороченная розовато-бѣлыми волосками; нижняя поверхность листа пурпуровая.

M. Lisciana. Глянцевитые листья на длинныхъ черешкахъ; средняя жилка листа и края обведены сребристо-бѣлою полоскою.

M. Mokojana. По срединѣ листа идетъ сѣровато-молочнаго цвѣта полоса, а по ней темно-зеленныя пятна.

M. pruinata. Темно-зеленые листья, имѣютъ красноватый исподъ.

M. seemani. Изумрудно-зеленные листья, съ бѣлою срединною жилкою, нижняя сторона листа красная.

M. Zebrina. Лучше другихъ видовъ идетъ въ комнатѣ.

M. Regalis. Листья великолѣпно расписаны малиновыми полосками.

M. arundinacea. Изъ корневища этого растенія выдѣляется мука, извѣстная подъ именемъ *арорума*.

M. roseo—picta. Великолѣпный листъ: кругомъ его, нѣсколько отступя отъ края и по середкѣ, идетъ ярко-малиновая полоса.

M. foliis albo pictis. Листья темно-фіолетовые снизу, испещрены бѣлыми полосками снаружи.

M. striata. Листья испещрены бѣлыми и зелеными пятнами и разводами.

M. Warscewiczii. Посреди листа идетъ красивая, свѣтлая полоса.

M. illustris. По всему листу, нѣсколько отступя отъ края, идетъ красивая волнистая бѣлая, съ свѣтло-зеленымъ и розовымъ—полоса.

M. Lindeni. Маленькое растеніе не выше 4 дюймовъ. Нижняя сторона листьевъ фіолетовая, на верхней сторонѣ темно-зеленныя полоски.

M. Majestica koch. Достигаетъ 6 футъ.

M. Mazelli. Съ двумя широкими, сѣрыми полосами, по округлымъ, глянцевитымъ листьямъ.

M. pacifica. Съ бархатистыми листьями, изумрудно-зелеными, съ сребристыми жилками и ярко-лососеваго цвѣта исподомъ.

M. undulata. Низкорослая. Имѣетъ на срединѣ листа узкую сребристую полосу и фіолетовый исподъ.

M. wallisii discolor. Съ ярко-зелеными, бархатистыми листьями, сѣрозелеными по краямъ и по срединѣ.

M. bicolor. *M. sanguinea*. *M. ornata*. *M. alba lineata*. *M. falcata*. *M. metallica*. *M. porteana*. *M. van den Heckii*. *M. vittata*. *M. Veitchi*. *M. Baraquini*. *M. eximia*. *M. Legrellei*. *M. splendida*. *M. variegata*. *M. virginalis*. *M. Wagneri*.

1141. *Marara*. Родъ пальмъ. Колючее растеніе. Размножается сѣменами. Извѣстны два вида этой пальмы: *M. bicuspidata*. *M. erinacea*.

1142. *Marcettia andicola*. Изъ семейства *Melastomeae*. Оранжевейное растеніе, съ розовыми цвѣтами и желтыми пыльниками. На дѣто высаживается въ грунтъ съ горшкомъ. Во время отдыха поливается весьма мало. Прищипывается — чтобы придать растенію изящную форму. Размножается черенками.

1143. *Marica coerulea*. *Марика голубая*. Оранжевейное, болотное растеніе, встрѣчающееся на мелкихъ мѣстахъ; съ свѣтло-голубыми цвѣтами при основаніи коричневыми и желтыми. Въ акваріѣ употребляется для украшенія выдающихся изъ воды каменныхъ группъ, но сажается такъ, чтобы его корни доставали до воды. Размножается дѣленіемъ.

Другіе виды: *M. humilis*. *M. Northiana*. *M. coelestis*. *M. lutea*.

1144. *Marrubium vulgare*. *Шандра*. Дикорастущее, лекарственное растеніе, разводится на влажныхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ; имѣетъ весьма горькій вкусъ, отчего и получило свое названіе. (*Marrob.* по-еврейски, — *горькій сокъ*).

1145. *Martinezia*. Родъ Пальмъ. Не бываетъ выше 8 футъ. Усажена колючками. Размножается отдѣленіемъ дѣтокъ, которыя отнимаются отъ растенія не прежде, чѣмъ образуютъ хотя

одинъ корешокъ. Отдѣленное растеніе содержитъ первое время въ разводномъ парничкѣ.

Виды: *M. Lindeniana*. Весьма красивая Американская Пальма, съ двулопастными листьями на сизыхъ черешкахъ, имѣющихъ длинныя, тонкія колючки.

M. erosa. Тепличная Пальма, съ большими, перистыми листьями, покрытыми серебристымъ пушкомъ, стволъ и листовые черешки усажены длинными, черными иглами.

M. caryotaefolia. *M. Aiphanes*.

1146. *Marthynia*. Красивое, однолѣтнее растеніе, высѣвается въ Мартѣ въ парникъ или теплицу, разсаживается въ горшки, которые ставятся въ парникъ и высаживается затѣмъ, въ началѣ Іюня, въ грунтъ; еще лучше держать его въ горшкахъ, поставивъ ихъ въ порожній парникъ, а въ дождливую погоду покрывая рогожами.

Виды: *M. poroboscidea*. Цвѣты тѣлесные, съ темными точками.

M. fragrans. Цвѣты темно-пурпуровые, съ свѣтлымъ зѣвомъ.

M. lutea. Цвѣты желтые.

M. annua. *M. cramolaria*. Оба съ свѣтло-красными цвѣтами.

M. follax. Съ темно-красными цвѣтами.

M. formosa. Оранжевое растеніе. Цвѣты красные съ желтымъ.

M. angulosa. Съ бѣлыми цвѣтами и пурпуровыми пятнышками. Цвѣтетъ въ Августѣ и Сентябрѣ. Сѣется весною. Любитъ питательную землю.

1147. *Masdevalia attenuata*. Оранжевая Орхидея, съ сѣровато-бѣлыми цвѣтами и желтою губою.

Другіе виды: *M. Harryana*. Съ ярко-фіолетовыми цвѣтами.

M. ignea. Съ ярко-красными цвѣтами.

M. Lindeni. Безъ стебля, съ одиночными, ярко-розово-фіолетовыми цвѣтами.

M. Veitchiana. Съ цвѣтомъ необыкновеннаго вида, — ярко-оранжевымъ, вырастающимъ по 2 и по 3 на стрѣлкѣ. Требуется

довольно низкой температуры и влажного воздуха; содержится близъ рамъ и во время развитія, требуетъ сильной поливки.

M. towarensis. Тоже, съ снѣжно-бѣлыми цвѣтами.

M. chimaera. Съ долями, завитыми и тонкими, какъ волосы и губою со шпорою, съ желтыми цвѣтами въ темныхъ полоскахъ.

- 1148. Massonia odorata.** Маленькое, оранжерейное, луковичное растеніе, съ букетами бѣлыхъ цвѣтовъ, имѣющихъ боричневыя тычинки и превосходный запахъ.

- 1149. Matricaria parthenium.** Красивое, садовое, многолѣтнее растеніе, съ бѣлыми цвѣтами; на зиму хорошо покрывается.

Другіе виды: **M. capensis.** Ромашка африканская махровая.

M. eximia. Цвѣтокъ махровый.

M. mandiana. Съ бѣлыми цвѣтами. Зимуетъ въ холодной оранжереѣ; размножается черенками, которые содержатся въ теплѣ и влажности. Высаживается въ грунтъ.

Виды дикорастущіе: **M. inodora, maritima.** Кокорва.

M. camomilla. Ромашка. Однолѣтнее растеніе, вредное пчеламъ, но имѣющее весьма разнообразное примѣненіе въ медицинѣ, для чего и разводится на хорошо обработанной, тучной землѣ. Высѣвается прямо на гряды весною или поздно осенью, на открытомъ, но защищенномъ отъ Сѣвера мѣстѣ.

- 1150. Mattiola fragrans.** *Матіола пахучая* или *Леской душистый*. Изъ семейства **Crucifereae**. Дикорастущее, однолѣтнее, ме-
доносное растеніе. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

- 1151. Maurandia antirrhiniflora.** Красивое, вьющееся, многолѣтнее растеніе, съ голубыми цвѣтами; высѣвается въ началѣ Марта, въ горшки, въ умеренной теплицѣ, разсаживается въ горшки тотчасъ по появленіи и ставится въ парникъ. Въ началѣ Іюня сажается въ рыхлую, питательную землю; цвѣтетъ до глубокой осени, но боится морозовъ. Для ранняго цвѣтенія высѣваютъ въ Іюлѣ и разсаженные растенія зиму держать въ оранжереѣ.

Другіе виды: **M. Barclayana.** Съ крупными голубыми, или фіолетовыми цвѣтами.

M. Scarlet. M. rubra. Съ красными цвѣтами;—разновидности предыдущей.

M. Emeryana. (M. pulchella). Съ бѣлыми и красными цвѣтами.

1152. Mauritia. Родъ Пальмъ. Съ лапчатыми листьями и чешуйчатыми плодами. Размножается сѣменами.

Видъ: **M. flexuosa.**

1153. Maxillaria. Тепличная Орхидея, съ бѣлыми или желтоватыми цвѣтами, покрытыми темными крапинками; размножается дѣленіемъ корней; сажается на кускѣ угля; требуетъ листовенную землю пополамъ съ вересковою.

Виды: **M. tricoloris.** Съ цвѣтами блѣдно-бурыми,—у основанія бѣлыми и желтыми, съ пурпуровыми крапинками на лепесткахъ.

M. vitelliana. M. picta. M. tenuifolia. M. racemosa.

1154. Maximiliana. Родъ Пальмъ. Держится въ теплицѣ; но хорошо растетъ и въ комнатѣ, будучи поставлено на Югъ или Юго-западъ. съ перистыми листьями, отъ 3 до 6 аршинъ длиною, требуетъ той же культуры что и другія пальмы; размножается сѣменами.

Виды: **M. regia.** Съ большими, перистыми листьями; молодые листья замѣняютъ капусту и называются: «*Палмовою капустою*». **M. elegans. M. insignis.** Эти три вида наиболѣе распространены въ нашихъ теплицахъ.

M. Iaquia. M. caribaea.

1155. Maximowiczia chinensis. Изъ семейства **Schizondraceae.** Грунтовое растеніе съ береговъ Амура. Даетъ розово-лиловые цвѣты, прекрасно пахнущіе и гроздіи красныхъ плодовъ, употребляемыхъ въ пищу туземцами.

1156. Mesonopsis Wallichii. Изъ семейства **Paraveraceae.** Разводится въ теплицѣ сѣменами, высѣваемыми въ плошки; когда совершенно прекратятся морозы растенійца высаживаются въ грунтъ. Любитъ легкую землю. Даетъ большіе голубые цвѣты съ желтыми тычинками и пестиками. Листья оторочены оранжевыми волосками; цвѣты похожи на Макъ отчего и получило свое названіе. (**Mekon**—Макъ, **Orsis**—подобіе).

Другой видъ: *M. simplicifolia*. Оранжерейное растеніе, съ большимъ темно-фіолетовымъ цвѣткомъ.

1157. *Medeola asparagoides*. Многолѣтнее растеніе, имѣеть врачебныя свойства, отчего и названо въ честь *Medei*—колдуньи. Зимомъ сохраняется въ оранжереѣ или подвалѣ; на лѣто высаживается въ грунтъ.

1158. *Medicago*. Изъ семейства *Papilionaceae*. Дикорастущее, однолѣтнее растеніе, разводится какъ кормовая трава.

Виды: *M. falcata*. Желтый буркунъ. Медунка серповидная. *Бурундукъ*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе, съ кистями желтыхъ цвѣтовъ, рекомендованное И. Ковалевскимъ, какъ средство отъ водобоязни. См. Москов. Вѣдомости 1860 г. № 30.

M. sativa. Луговой вязель.

M. cochleata. Сунша.

M. lupulina. Буркунчикъ. Хмелевая Люцерна. Дикорастущая, хорошая, кормовая трава.

1159. *Medinilla*. Изъ семейства *Melastomaceae*. Красивое теплолюбивое и вмѣстѣ комнатное кустовое растеніе, съ широкими, зелеными или розовыми листьями, съ выдающимися жилками, въ видѣ реберъ,—съ розовыми или бѣлыми цвѣтами—кистью. Размножается черенками. Требуется внимательной поливки, потому что, если у растенія разъ будетъ земля засушена — оно пропадетъ. Ему даютъ землю, составленную изъ двухъ частей вересковой, одной части дерновой и одной части лиственной.

Виды: *M. sieboldtii*. Цвѣты бѣлые съ розовымъ.

M. magnifica. Цвѣты розовые, въ видѣ опущенныхъ кистей, распускаются обыкновенно весною, потому что растеніе пересаживаютъ или ранѣ роста, или послѣ того, какъ оно отцвѣтеть.

M. speciosa. *M. erythrophilla*.

1160. *Megaclinium purpuratum*. Теплолюбивая Орхидея, съ мелкими цвѣтами зеленоватыми, съ пурпуровыми крапинками.

1161. *Melaleuca alba*. Изъ семейства *Myrtaceae*. Оранжерейное дерево, имѣющее главный стебель совершенно темнаго, а вѣтви свѣтлаго цвѣта.

Другіе виды: *M. sajeruti*. Изъ плодовъ его добывается лекарственное масло, извѣстное подъ именемъ «Каепутоваго».

Другіе виды: *M. Diosmaefolia*. *M. foliosa*. *M. hypericifolia*. *M. linarifolia*. *M. splendens*. *M. adiosmaefolia*.

1162. *Melampodium*. Однолѣтнее садовое растеніе, не заслуживаетъ разведенія.

1163. *Melampyrum*. *Иванъ да Марья*. Изъ семейства *Scrophularineae*.

1164. *Melastoma*. Оранжевейное кустовое растеніе, съ бѣлыми или розовыми цвѣтами. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается черенками. Требуешь вересковую землю пополамъ съ листовною и съ примѣсю четвертой части дерновой. Ягоды его ѣдятъ, причеиъ чернѣють зубы и ротъ, что и было поводомъ названія растенія. (*Melas*—черный и *Stoma*—уста).

Виды: *M. villosa*. *M. polyanthum*. *M. sanguineum*. *M. corymbosa*. *M. rubra*. *M. subtriplinervia*. *M. discolor sanguinea*. *M. robusta*. Четыре послѣдніе вида содержатся въ теплицѣ и цвѣтутъ зимою. Старыя растенія лѣтомъ срѣзываются, весною отъ нихъ дѣлаются черенки. Лѣтомъ растеніе содержится на воздухѣ.

1165. *Melia Azedorach*. Оранжевейное растеніе, имѣетъ лекарственныя свойства.

1166. *Melianthus coccineus*. Оранжевейное растеніе.

Другой видъ: *M. major*. Оранжевейное растеніе, съ большими, сѣро-зелеными листьями; требуетъ питательную почву; размножается черенками, на лѣто высаживается въ грунтъ.

1167. *Melicocca bijuga*. Индійское растеніе; ягоды и сѣмена его употребляются въ пищу.

1168. *Melilotus alba et officinalis*. *Донникъ аптечный*. Изъ семейства *Papilionaceae*. Дикорастущее, двухлѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ съ Іюня по Августъ, красновато-бѣлыми цвѣтами; идетъ на производство «*Мелилотного пластыря*».

Другіе виды: *M. coerulea*. *Гунѣба*.

1169. *Melissa officinalis*. *Маточникъ*. *Медовка*. *Мелисса аптечная*. Изъ семейства *Labiatae*. Дикорастущее, однолѣтнее,

медоносное растеніе, даетъ пчеламъ обильный взтокъ, съ Іюля до Сентября, отчего и получило свое названіе. (*Melitta* — пчела). Разводится посѣвомъ весною или дѣленіемъ корней въ Апрѣлѣ. Требуется пересадки каждые три года. Любитъ рыхлый черноземъ и тѣнь. Употребляется какъ пряная приправа къ кушаньямъ и въ лекарства, а также изъ ней выгоняютъ особый спиртъ.

Другой видъ: *M. Brownea*. Многолѣтнее садовое растеніе.

1170. *Melocactus*. Изъ породы Кактусовъ. Имѣетъ форму дыни, отчего и получилъ названіе. (*Melos* — дыня). Покрываетъ колючками; даетъ желтый, розовый или малиновый цвѣтокъ; размножается отростками, вырастающими на его бокахъ; зимою содержится сухо; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой и лиственной, съ примѣсю небольшого количества песку. Можетъ расти и въ комнатѣ.

Виды: *M. Ellemeetii*. Съ яйцевиднымъ, сплюснутымъ, десятиребернымъ стеблемъ, съ мелкими, розовыми цвѣтами.

M. depressa. *M. communis*. *M. pyramidalis*. *M. violaceus*. *M. duboisianus*. *M. curvispinus*.

1171. *Melothria*. Однолѣтнее садовое растеніе, не заслуживаетъ разведенія.

1172. *Menispermum*. *Луносымянникъ*. Вьющійся кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ. Любитъ тучную землю, влажность и защиту на зиму.

Виды: *M. canadensis*. Ползучее растеніе въ одно лѣто достигаетъ до полутора сажени, съ круглыми, зазубренными листьями. Размножается сѣменами побѣгами и дѣленіемъ корней. Зимуетъ въ грунту безъ покрышки.

M. coccijus. Оранжевое растеніе.

M. dauricum. *Бѣлый Хмель*. Дикорастущее.

1173. *Mentha piperita*. *Перечная мята*. *Англійская мята*. Изъ семейства *Labiatae*. Миеологія говоритъ, что *Mentha*, дочь Коцита, изъ ревности превращена Прозерпиною въ это растеніе, которое по этому и названо *Mentha*. Двухлѣтнее садовое растеніе, требующее покрышки на зиму. На почву не прихотливо. Въ сухое время требуетъ полива; размножается кор-

невыми отпрысками; каждые два-три года пересаживается на новое мѣсто. Кладется для запаха, въ квасъ, употребляется какъ лекарственное растеніе и изъ него добывается ароматическая вода. Для употребленія срѣзывается до появленія цвѣтовъ, обыкновенно розоватыхъ и сушится. Тотчасъ послѣ обрѣзки растенія, корень обсыпается компостомъ.

Другіе виды: *M. officinalis fol. variegatis*. Листья пестрые—зеленые съ бѣлымъ.

M. sylvatica tricolor. *Льсная мята*. Съ свѣтло-фіолетовыми цвѣтами.

M. crispa. *М. кудрявая*.

M. arvensis. *М. дикая*.

M. piperita fol. variegatis. *Пестролистная перечная мята*. Зимующее въ грунтѣ, не высокое растеніе, съ фіолетовыми цвѣтами и бѣло-узорчатыми листьями. Пригодно для бордюровъ, особенно если ее обрѣзать, причемъ она дѣлается очень густа и образуетъ какъ бы пестрый коверъ. Требуется ежегодной посадки, такъ какъ старое растеніе пропадаетъ, пуская отъ себя молодые отпрыски. Дикорастущіе виды: *M. viridis*. *М. русская*. *M. pulegium*. *Блоховникъ*.

1174. *Menyanthes trifoliata*. *Трифоль*. *Вахта болотная*. *Водяной трилистникъ*. Изъ семейства *Gentianeae*. Дикорастущее, многолѣтнее, болотное растеніе, съ свѣтло-розовыми цвѣтами; разводится какъ имѣющее лекарственныя свойства, осенью посадкою кореньевъ.

1175. *Mercurialis*. *Щиръ*. Изъ семейства *Euphorbiaceae*. Дикорастущее.

1176. *Meriania karstenii*. Изъ семейства *Melastomaceae*. *Оранжевое растеніе*, съ изящными пунцовыми цвѣтами. Зимой содержится въ теплицѣ. Любитъ хорошую землю составленную изъ лиственной, песку и глины. Послѣ цвѣтенія ему даютъ отдыхъ и держатъ въ прохладной температурѣ. Весною растеніе пересаживаютъ, причемъ отбираютъ отъ корней возможно больше старой земли, хорошо поливаютъ и часто опрыскиваютъ, пока не примется и не пойдетъ въ ростъ. Тогда его переносятъ въ оранжерею.

1177. *Meryta latifolia*. Оранжевое дерево, съ маленькими, желтыми, цвѣтами.

1178. *Mesembrianthemum*. Садовое растение, имѣющее одни виды однолѣтніе, а другіе многолѣтніе. Цвѣтетъ только утромъ и то не иначе какъ при солнцѣ. Высѣвается въ плошки, въ Апрѣлѣ, въ теплицѣ, въ очень песчаную землю и сверху присыпается пескомъ; въ Іюнѣ высаживается въ грунтъ, въ песчаную удобренную землю. Размножается сѣменами и черенками. Можетъ расти и въ комнатѣ. Зимой держится почти сухо.

Виды: *M. tricolor*. Розовый цвѣтокъ съ бѣлымъ глазкомъ.

M. tricolor album. *M. viridiflorum*, бѣлый цвѣтокъ.

M. pomeridianum. Крупные ярко-золотистые цвѣты распускаются послѣ полудня.

M. cristallinum. *Денникъ*. *Хрустальная трава*. Съ широкими листьями, на которыхъ сидятъ прозрачныя железки, въ родѣ ледяныхъ шариковъ, отчего все растение блеститъ на солнцѣ будто усыпанное хрустальнымъ бисеромъ. Молодые побѣги употребляются въ пищу какъ шпинатъ. Сѣмена высѣваются въ плошки съ песчаной землей; въ Маѣ растение разсаживаютъ; землю вокругъ растенія все лѣто разрыхляютъ и въ жаркое время сильно поливаютъ.

M. candollei. *M. capitatum*. *M. schotii*. *M. pulchellum*. *M. micans*. Цвѣтокъ красный съ оранжевымъ.

M. coccineum. Оранжевое растение.

M. conspicuum. *Денникъ*. Оранжевое растение, съ розовыми цвѣтами; любитъ вересковую землю, пополамъ съ листовою и песчаною; зимою весьма умеренно поливается; на лѣто высаживается въ грунтъ.

1179. *Mesospinidium vulcanicum*. Тепличная орхидея, съ темно-малиновыми цвѣтами и болѣе блѣднаго цвѣта губою.

1180. *Mespilus germanica*. *Чашковое дерево*. *Шипики*. Изъ семейства *Romaceae*. Кустарникъ, съ бѣлыми цвѣтами, разводимый въ садахъ. Довольствуется сухой и тощею почвою; размножается сѣменами и дѣленіемъ корней. Ягоды его употребляются въ пищу и изъ нихъ выдѣлываютъ водку.

Другіе виды: *M. germanica*. *Ш. обыкновенная*. Листья съ

изнанки шершавые; цвѣты крупные, бѣлые; плоды — съѣдобные.

M. chamaemespiles. *Кизильникъ малорослый.*

M. cotoneaster. *К. пушистый малый.* Съ красноватыми цвѣтами.

M. nigra. *К. черный.*

M. pyracantha. *Киз. иглочатый.* Съ бѣловатыми цвѣтами и красными ягодами.

M. tomentosa. *К. пушистый.*

1181. **Methonica gloriosa.** Изъ семейства **Liliaceae**. Корневое вьющееся, посредствомъ цѣпкихъ листьевъ, тепличное растеніе, съ желтыми или оранжевыми цвѣтами. Размножается отростками корней. Можетъ расти въ комнатѣ. Зимой корни его сохраняются въ сухой землѣ. Требуется земля, составленную изъ лиственной пополамъ съ дерновою и съ примѣсю восьмой части песку.

Другіе виды: **M. viresceus var. plantii.** Съ пунцовыми цвѣтами.

M. Leopoldii. Съ большими желтыми цвѣтами.

M. superba.

1182. **Motrodorea atropurpurea.** Тепличное растеніе, съ большою вѣткою малиновыхъ цвѣтовъ, похожихъ на сирень и съ прекрасными листьями. Любитъ тучный компостъ. Во время жаровъ какъ можно чаще обрыскивается, чтобы листья его всегда находились въ надлежащей чистотѣ и свѣжести. Размножается черенками, на которые рѣжутъ вѣтки у сочлененій.

1183. **Metrosideros.** Изъ семейства **Myrtaceae**. Оранжевое растеніе. Легко размножается черенками.

Виды: **M. buxifolia.** Съ небольшими, овальными листьями, похожими на листъ Мирта и желтыми цвѣтами.

M. florida. Съ пурпуровыми цвѣтами, имѣющими видъ распушеннаго зонтика.

M. albida. M. robusta. M. semperflorens. M. angustifolia. M. glauca. M. lanceolata. M. linearis. M. Laphantha. M. saligna. M. speciosa. M. stricta.

1184. *Metroxylon*. Родъ пальмъ. Стволъ древообразный. Цвѣтетъ ежегодно.

Виды: *M. filare*. *M. elatum*.

1185. *Meum athamanticum*. Разводится въ цвѣтникахъ. Растеніе образующее густые, ярко-зеленые листья и бѣлые цвѣты.

1186. *Meyenia*. Изъ семейства *Acanthaceae*. Вьющееся растеніе, съ красивыми синими цвѣтами; можетъ расти въ комнатѣ. Размножается черенками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой.

Виды: *M. erecta*. Съ фіолетовыми цвѣтами.

M. Hewtayniana

1187. *Michauxia campanuloides*. Двухлѣтнее растеніе, съ свѣтлосиними или бѣлыми цвѣтами. Высѣвается въ плошки. Пересаживается въ грунтъ, потомъ вынимается и зимою содержится въ оранжереѣ.

1188. *Micrantella lanceolata*. Съ бѣлыми цвѣтами въ видѣ кистей, длиною въ футъ. Содержится въ теплицѣ, а лѣтомъ въ полулѣтн или подъ стеклами. Размножается черенками. Лѣтомъ старое растеніе срѣзывается.

1189. *Micrococos*. Одна изъ наиболѣе выносливыхъ пальмъ. Размножается сѣменами. Обыкновенно срубаютъ дерево, чтобы добыть изъ него дорогой сиропъ, извѣстный подъ именемъ „*Miel de palmos*“.

1190. *Meeromyrtis microphylla*. Изъ семейства миртовыхъ. Оранжерейное, кустарное растеніе, съ линейными листьями и маленькими, бѣлыми цвѣтами.

1191. *Microsperma bartonioides*. Изъ семейства *Moaseae*. Воздушное, однолѣтнее растеніе, съ большими желтыми цвѣтами; сѣется прямо въ грунтъ, какъ только оттаятъ земля или въ парникъ, послѣ чего разсаживается, когда уже совершенно минуютъ морозы. Сѣмена очень тонки, а потому ихъ надлежитъ только слегка присыпать пескомъ. Требуется обыкновенной садовой земли. Цвѣтетъ съ Іюня—все лѣто.

1192. *Milia capitata*. Прекрасное, луковичное, Калифорнійское

растение, съ фиолетовыми цвѣтами. Изъ семейства *Asphodelaceae*. Содержится въ оранжереѣ.

Другіе виды: *M. porrifolia*. Листья какъ у злака. Цвѣты бѣлые съ зелеными полосками.

M. biflora. Цвѣты бѣлые, съ зелеными на оборотѣ нервами.

1193. *Miltonia*. Орхидея, съ цвѣтами бѣлыми, желтыми, красными, испещренными. Размножается дѣленіемъ корней. Сажается на кусекъ угля. Требуется листовенную землю, пополамъ съ вересковою.

Виды: *M. spectabilis*. Темно-малиновый цвѣтокъ.

M. virginalis. Съ бѣлымъ цвѣткомъ, по широкой губѣ котораго проходитъ большее, двураздѣльное, волнистое, фиолетовое пятно.

M. clowisii. *M. Karwinskii*. *M. flavescens*.

1194. *Mimosa*. Тепличное и вмѣстѣ садовое, однолѣтнее кустовое растение. Листья Мимозы имѣютъ свойство съезживаться, если до нихъ дотронуться, отчего и получило свое названіе. (*Mimos*—гримаса). Даетъ фиолетовые, розовые или бѣлые цвѣты. Сѣется въ Мартѣ или въ началѣ Апрѣля, въ теплицу или парникъ; потомъ разсаживается въ горшки и содержится въ тепломъ парникѣ, до совершеннаго прекращенія морозовъ. Также разводится черенками. Любитъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и листовенной, съ примѣсю небольшого количества песку. Можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: *M. pudica*. *Не тронь меня*. Съ фиолетовыми цвѣтами. Листья этого растенія при малѣйшемъ прикосновеніи съезживаются.

M. sensitiva. *M. kermesina*. *M. ceratonia*.

M. strigosa.

1195. *Mimulus*. Гребенникъ. Губанчикъ. Губастикъ. Изъ семейства *Scrophulariaceae*. Многолѣтнее, низенькое растение, со множествомъ разновидностей. У первоначальной формы, *M. luteus*, цвѣты желтые, а разновидности его имѣютъ желтый цвѣтокъ, съ коричневыми крапинками. Очень мелкія сѣмена этого растенія высѣваются въ Мартѣ или Апрѣлѣ, въ умеренной теплицѣ, въ плошки, на слегка прижатую землю и

посыпаются пескомъ; когда взойдутъ, разсаживаются въ маленькіе горшки, когда же укоренятся въ нихъ, пересаживаются въ грунтъ, въ рыхлую, листовую или торфяную землю, съ небольшою примѣсью глины. Цвѣтетъ большую часть лѣта. Красивѣйшіе виды сохраняютъ на зиму въ горшкахъ, въ холодной оранжереѣ, почти въ сухой землѣ. Можетъ также размножаться дѣленіемъ корней или черенками.

Виды: *M. guttatus*. *Гребенникъ пестрый*.

M. cupreus. Съ цвѣтами бронзово-оранжевыми; любитъ песчанистую рыхлую почву; разводится преимущественно какъ однолѣтнее.

M. moschatus. Съ сильнымъ мускуснымъ запахомъ и маленькими желтыми цвѣтами.

M. rigeus. Съ блѣдно-голубыми цвѣтами.

M. cardinalis. Суриково-красные цвѣты.

M. roseus superbus. Съ розовыми цвѣтами.

M. cardinalis atrosanguineus. *Г. пунцовый*.

M. luteus grandiflorus. *Г. желтый*.

M. l. jounghii. *Г. юнговъ*.

M. variegatus. *M. rivularis*. *M. lyratus*. *M. quinquevulnerus*. *M. hybridus*. *M. pardinus*. *M. tigrinus*. *M. maximus*. *M. robustus*. *M. cardinalis atroroseus*. *M. c. cupreatus*. *M. c. roseus albus*. *M. c. r. pallidus*. *M. hybridus tigrinus*. *M. h. rubinus*.

M. tilinga. Однолѣтнее растеніе съ свѣтло-желтыми цвѣтами и почти закрытымъ зѣвомъ.

Сѣмена высѣваютъ раннею весною въ плошки, въ песчанисто-черноземную землю, съ малою примѣсью глины. По чрезвычайной мелкоści сѣменъ, ихъ или только прижимаютъ къ землѣ, на которую онѣ высѣяны, или слегка забрызгиваютъ пескомъ. Посѣвъ ставится въ температуру отъ 6 до 8° Р. Лѣтомъ высаживается въ открытый грунтъ, на солнечное мѣсто, съ рыхлою, но тяжелою землею. (Регель В. О. Сад. 1870. № 2).

1196. *Mimusops Bojeri*. Плоды его употребляются въ пищу подъ именемъ „*Малабарскихъ сливъ*“ тропическое растеніе.

1197. *Mirabilis*. *Чудоцвѣтъ*. Многолѣтнее садовое растеніе; достигаетъ трехъ футовъ; имѣетъ клубневидные корни. У иныхъ

видовъ цвѣты душистые и различныхъ колеровъ: бѣлые, желтые, красные, пестрые, — раскрываются только вечеромъ и цвѣтутъ до утра. Сѣется въ Мартѣ, въ теплицѣ или парникѣ. Въ началѣ Іюля высаживается въ цвѣтникъ, на солнечное мѣсто. Также разводится корнями, которые вынимаютъ въ одно время съ георгинами и сохраняютъ зимою одинакимъ съ ними способомъ. Можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: *M. longiflora alba*. Чудоцвѣтъ длинноцвѣтный. Съ длинными, бѣлыми цвѣтами.

M. l. violacea. Тоже съ фіолетовыми цвѣтами.

M. lalappa. Ч. Яланпа. Царская борода.

M. l. alba. Ч. бѣлый.

M. l. chamois. *M. l. lilacina*. *M. l. lutea*. *M. l. rosea*. *M. l. rubra*. Ч. красный.

M. l. alba lutea Striata. Ч. полосатый, желто-бѣлый.

M. l. a. rubro Striata. Ч. полосатый, красно-бѣлый.

M. l. lutea rubro Striata.

M. l. l. rosea Striata.

M. l. folia variegatis. Ч. пестролистный.

1198. *Mitraria coccinea*. Оранжевое растеніе, съ большими пурпуровыми цвѣтами въ видѣ опущенныхъ колокольчиковъ, на длинномъ стебельѣ каждый. Размножается черенками. Можетъ расти въ комнатѣ. Зимою содержится сухо. Требуется листовую землю, пополамъ съ вересковою, и небольшою примѣсью дерновой.

1199. *Molinia coerulea fol. variegatis*. Многолѣтнее растеніе, съ бѣло-узорчатыми листьями и зелеными цвѣтами.

1200. *Momordica*. Дерябка. Изъ семейства Тыквенныхъ.

Виды: *M. balsamina*. Однолѣтнее, вьющееся садовое растеніе, съ желтыми цвѣтами; высѣвается въ парникъ; рассаживается въ горшки и пересаживается въ грунтъ, когда совершенно прекратятся морозы. Отличается красивыми плодами, величиною со сливу, которые и употребляются въ пищу.

M. mixta. Съ большими, желтыми цвѣтами, всередеѣ темно-фіолетовыми.

M. involucrata. Оранжевое, вьющееся растеніе, съ бѣлыми цвѣтами.

M. charantia. Оранжевое растение, заслуживает особенное внимание своим оригинальным, оранжево-красным плодомъ.

M. elaterium. *Ослиный оувецъ.* Единственный видъ встречаемый въ Южной Европѣ. Лекарственное растение.

1201. Monanthes muralis. Оранжевое, сочное растение, многолѣтнее, съ желтыми цвѣтами и лапчатыми листьями, плотно усаженными какъ будто черепица.

1202. Monarda coccinea. *Монарда красноцвѣтная.* Многолѣтнее садовое растение, требующее покрывки на зиму, любитъ плодородную и нѣсколько влажную почву. Размножается сѣменами и дѣленіемъ корней въ Апрѣлѣ. Каждые три года требуетъ пересадки. Цвѣты употребляются для украшенія нѣкоторыхъ блюдъ, а молодые вѣтви и листья, какъ пряность и вмѣсто чая.

Другіе виды: **M. didima.** *M. пенсильванская.* Съ темно-пунцовыми цвѣтами, любитъ питательную землю.

M. Media. *M. сѣверо-американская.* Зимуетъ въ грунту безъ покрывки, также какъ и **M. purpurea.** *M. пурпуровая.*

M. clinopodia. **M. rugosa.**

1203. Monardella undulata. Однолѣтнее растение, вышиною въ 1 футъ, съ лиловыми цвѣтами.

1204. Monocera grandiflorum. Изъ семейства **Tiliaceae.** Теплолюбивое растение; — красивые цвѣты съ бѣлымъ вѣнчикомъ. Любитъ листовенную землю; свѣтлое мѣсто; умѣренную поливку зимою. Размножается черенками.

1205. Monochoetum. Прекрасное, кустовое растение, съ красивыми, лиловыми, розовыми или пурпуровыми цвѣтами. Въ теплицѣ цвѣтетъ съ Января до Апрѣля. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается отсадкою корневыхъ побѣговъ и черенками; требуетъ вересковую землю, съ примѣсью таковаго же количества дерновой, пополамъ съ листовенной.

Виды: **M. enciferum.** **M. umbellatum.** **M. pulchrum.** **M. multiflorum.** :

1206. *Monochoria Korsakowii*. Болотное растеніе, съ мочкова-
тымъ корнемъ и голубыми цвѣтами.

1207. *Monolopia major*. (*Helenium Douglasii*). *Большая Мо-
нолопія*. Однолѣтнее растеніе, съ большими желтыми цвѣта-
ми. Высѣвается въ Мартѣ въ парникъ или плошки, а въ
Маѣ высаживается въ грунтъ на солнечное мѣсто. Любитъ
рыхлую, не слишкомъ сильно удобренную, садовую землю.
Цвѣтеть все лѣто.

1208. *Moraea bicolor*. Изъ семейства *Irideae*. Мелкорастущее
болотное растеніе, съ длинными листьями и большими жел-
тыми цвѣтами, похожими на Нарциссъ, съ темно-фіолетовымъ
пятномъ на каждомъ лепесткѣ. Употребляется на украшеніе
каменныхъ группъ выдающихся изъ акварія или находящихся
на поверхности воды, но сажается такъ чтобы корни его до-
ставали до воды. Размножается дѣленіемъ.

Другіе виды: *M. fimbriata*. Съ широкими, мечеобразными
листьями и голубыми цвѣтами, зимуетъ въ оранжереѣ, но
цвѣтеть только въ теплицѣ, съ Января.

M. edulis. Оранжерейное растеніе, съ нѣжно-фіолетовыми
цвѣтами. Требуешь той же культуры что *Ixias*.

M. coerulea. Съ листьями расположенными въ видѣ вѣ-
ра и синими, испещренными цвѣтами.

M. Northiana. Похожа на предыдущую, но цвѣты испещ-
рены краснымъ и бурымъ.

1209. *Mormodes fractiflexum*. Тепличная Орхидея. Имѣетъ
цвѣты—кистью, зеленоватые, полосатые, съ бѣлою губою, по
которой идутъ лучами пурпуровыя полосы.

1210. *Morrenia*. Родъ Пальмъ. Тепличное растеніе съ перистыми
листьями. Размножается сѣменами.

Виды: *M. Lindeniana*. Очень красивая Пальма, изъ Но-
вой Гренады.

M. fragrans. Съ душистыми цвѣтами.

M. corallocarpa. (*M. corallina*).

1211. *Morus*. *Шелковица*. *Тутовое дерево*. Семейство *Moraeae*.
Въ тепломъ климатѣ растетъ какъ дерево, въ болѣе суро-
вомъ—кустомъ. Разводится въ садахъ и паркахъ. Его листья

служать пищею шелкоичному червь. На зиму требует надежной покрывки.

Виды: *M. tatarica*. III. татарская. Ягоды употребляются въ пищу. Листьями питается шелкоичный червь.

M. alba. III. бѣлая. Съ бѣлыми ягодами. Главнѣйшая порода шелкоицы, разводится преимущественно для листьевъ, которыми питается шелкоичный червь.

M. nigra. III. черная. Разводится собственно въ теплыхъ мѣстностяхъ, преимущественно для его вкусныхъ, темныхъ, почти черныхъ ягодъ, отъ которыхъ растение и получило свое названіе. (Mor—по Кельтски—черный). Размножается сѣменами, побѣгами и черенками.

M. papyrifera dissecta. III. бумагоносная.

M. bullata. III. многолистная.

M. morretiana. III. моретовая..

M. multicaulis. Двѣ послѣднія разновидности наиболѣе разводятся.

M. rubra pensilvanica. III. красная Пенсильванская. Менѣ другихъ видовъ боится холода.

1212. *Moscharia pinnatifida*. Однолѣтнее садовое растеніе, вышиною до 2 футъ, съ бѣлыми или блѣдно-розовыми цвѣтами, высѣвается въ парникъ, потомъ высаживается въ горшки или въ грунтъ, на солнечное мѣсто, въ рыхлую садовую землю. Пахнетъ мускусомъ, отчего и получило свое названіе. (Moschos—мускусъ).

1213. *Mosdevallia attenuata*. Орхидея, съ маленькими, бѣловатыми цвѣтами, съ оранжевымъ хвостомъ.

1214. *Moussonia elegans*. Тепличное растеніе изъ семейства Геснерій, съ ярко-пунцовыми цвѣтами, желтыми внутри. На лѣто выставляется на открытый воздухъ. Любитъ листовенную землю. Размножается черенками.

1215. *Mulgedium macrorrhizum*. Многолѣтнее, воздушное растеніе, съ небольшими, но весьма красивыми, лиловыми цвѣтами. Распускается въ началѣ Сентября, на зиму закрывается ящикомъ или горшкомъ и заваливается сухимъ листомъ, такъ какъ боится сырости зимою. Любитъ тучную землю и сильную поливку лѣтомъ. Размножается сѣменами.

1216. *Muntingia calabura*. Тепличный кустарникъ или древесное растеніе, съ бѣлыми цвѣтами.

1217. *Murraja exotica*. Оранжевое дерево, съ бѣлыми, душистыми цвѣтами, похожими на померанцовые. Размножается черенками и отводками. Можетъ расти въ комнатѣ, будучи поставлено на южную сторону. Требуется земля составленная изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Древесина его желтаго цвѣта, употребляется на подѣлки.

1218. *Musa*. *Райское дерево*. Семейство **Musaceae**. Тепличное и вмѣстѣ комнатное корневое растеніе. Стебли его достигаютъ двухъ сажень вышины; листъ бываетъ до трехъ аршинъ; листья расположены букетомъ наверху стебля. Розовые или алые цвѣты висятъ кистью до двухъ аршинъ длины. Мучнистые плоды этого растенія, подъ именемъ *банановъ*, употребляются въ пищу. Большая часть видовъ размножается отпрысками являющимися у основанія и пускающими корни. Чтобы заставить растеніе дать такіе отпрыски, его осенью срѣзываютъ до основанія, отпрыски которые за симъ появятся, отдѣляются весною. Землю требуетъ смѣшанную изъ равныхъ частей листовой, дерновой и вересковой. Зимой поливается умеренно.

Виды: **M. Ensete**. *Абисинскій бананъ*. Прекраснѣйшій изъ всѣхъ банановъ. Стебель его достигаетъ 7 аршинъ въ вышину. Листья достигаютъ 8 аршинъ длины. Производитъ большой цвѣтокъ въ срединѣ кроны. Отпрысковъ не даетъ, а потому исключительно размножается сѣменами. Тотчасъ послѣ того какъ отцвѣтетъ — погибаетъ. Послѣ всхода растенія рассаживается по одиночкѣ и ставится на лѣто въ теплый парникъ. Въ первую зиму должно весьма осторожно поливать эту Музу и держать ее въ теплѣ. Въ Февралѣ пересаживается въ большіе горшки и снова ставится въ теплый парникъ. Въ пищу употребляется сердцевина растенія но не плодъ его.

M. superba. Замѣчательно своимъ коническимъ стволомъ; имѣетъ многочисленные, большіе листья.

M. Africana. Низкорослая, съ продолговатыми листьями; репки и края листьевъ — пурпуровые.

M. assamica. Низенькое, тепличное растеніе, съ узкими, пурпуровыми каемками у листьевъ.

M. sanguinea. Съ кроваво-красными прицвѣтниками и желтыми цвѣтами.

M. rosacea. Плоды въ пищу не употребляются.

M. paradysiaca. *Райское яблоко. Адамова смоква.* Даетъ множество плодовъ употребляемыхъ въ пищу подъ именемъ „банановъ“.

M. coccinea. Съ огненно-красными цвѣтами.

M. Cavendishii. *Карликовый, китайскій бананъ.*

M. vittata. Большіе, весьма красивые, листья, полосатые—зеленые съ бѣлымъ.

M. Zebrina. Съ красивыми цвѣтами, и большими листьями испещренными темными пятнами. Размножается дѣленіемъ корневища.

M. discolor. M. sinensis. M. textilln. M. sapieistium. M. Dacca. M. glauca.

1219. **Muscage.** *Виноградный иацинтъ.* Изъ семейства **Liliaceae.** Съ синими или желтоватыми цвѣтами, похожими на кисть винограда. Луковичное растеніе. Цвѣты пахнутъ мускусомъ.

Виды: **M. moschatus.** Съ желтовато-бурыми, душистыми цвѣтами.

M. racemosum. Съ голубыми цвѣтами; цвѣтеть въ Январѣ или Февралѣ.

M. pulchellum. Верхніе цвѣты голубые, нижніе почти черные. Требуется того же ухода, что и за Крокусами. Можетъ быть разводимо на открытомъ воздухѣ. Цвѣты имѣютъ ароматическій запахъ.

M. monstrosum. Съ цвѣтами аметистоваго колера. Любитъ песчаную землю; въ теплицѣ цвѣтеть съ Марта.

1220. **Musschea Wollastonii.** Изъ семейства **Campanulaceae.** Оранжевое растеніе съ многочисленными и весьма большими, оранжевыми цвѣтами. На лѣто высаживается въ грунтъ. Размножается сѣменами.

1221. **Mycoporum parviflorum.** Оранжевое растеніе съ бѣлыми цвѣтами,

1222. *Myosotis*. Незабудка. Изъ семейства *Asperifolieae*. Многолѣтнее растеніе съ темно-синими или голубыми цвѣтами. Сѣютъ въ Августѣ и сохраняютъ всходы въ холодной оранжерей, за тѣмъ въ Іюнѣ высаживается въ грунтъ. Требуется сильной поливки. Также размножается дѣленіемъ корней, которые зимою держать почти въ сухой землѣ. Любитъ землю составленную пополамъ изъ торфяной и лиственной, съ примѣсью не большого количества дерновой и песку.

Виды: *M. palustris*. Дикорастущая по болотамъ и потнымъ мѣстамъ.

M. Alpestris. Горная незабудка. Съ синими и бѣлыми цвѣтами, употребляется для ранней выгонки. Для этого молодые растеньица, съ осени, сажаютъ въ горшки и ставятъ къ окнамъ оранжерей или холодной комнаты. Постоянно снимаютъ гнилые листья и съ Января ставятъ къ окнамъ теплицы или теплой комнаты, на поддонъ съ водою.

M. rosea. *M. alba*. *M. multiflora*. *M. Azorica*. *M. suaveoleus*.

1223. *Myosotidium nobile*. Изъ семейства *Boragineae*. Очень хорошенъкое грунтовое растеніе, съ большимъ букетомъ цвѣтовъ, похожихъ формою на *незабудку*, — бѣлыхъ съ голубою середкою, сидящихъ на высокомъ стержнѣ.

1224. *Myrcia pimentoides*. Индійское растеніе. Ягоды и листья его употребляются какъ пряность, подъ именемъ: „Пимента“.

1225. *Myrica cerifera*. *Восковой кустъ*. Кустарникъ разводимый для украшенія садовъ; любитъ сухую почву; размножается сѣменами, отводками и побѣгами отъ корня.

Другіе виды: *M. gale*. *Душистый верескъ*. *Душистый восковникъ*. Кустарникъ, размножается сѣменами. Его листья съ ароматическимъ запахомъ, въ прежнее время употреблялись какъ лечебное средство. Стебли служатъ какъ дубильное вещество. Растетъ въ дикомъ состояніи; въ садахъ сажается на берегахъ прудовъ, въ торфяную землю.

M. gale femina. Любитъ влажную, тинистую почву и тѣнистую мѣстность.

M. gale mascula. Тоже.

M. caroliniana. Американское растеніе.

M. comptonia asplenifolia. Bauns. Тоже. У насъ эти два вида вымерзають въ грунту, а потому могутъ разводиться только въ оранжереѣ.

1226. Myristica moschata. Семейство **Myristiceae.** *Мускатный орѣхъ.* Тропическое дерево, съ желтоватыми цвѣтами, извѣстными въ продажѣ подъ именемъ *мускатнаго цвѣта.* Даетъ душистый орѣхъ, извѣстный какъ пряность подъ названіемъ «Мускатнаго орѣха». Размножается свѣжими сѣменами и черенками. Можетъ расти въ комнатѣ. Требуется земля составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой.

1227. Myrrhis odorata. *Испанскій кервель.* Многолѣтнее растеніе. Молодые листья употребляются для приготовленія щей. На почву не прихотливо. Сѣютъ въ Сентябрѣ. Листья имѣютъ пріятный запахъ, ихъ начинаютъ срѣзать въ Апрѣлѣ.

1228. Myrsine africana. Оранжерейное, вѣчно зеленое растеніе, съ многочисленными, но не красивыми цвѣтами.

Другіе виды: **M. variabilis.** **M. retusa.**

1229. Myrtus. *Миртъ.* Семейство **Myrtaceae.** Оранжерейное деревце, но нѣкоторые виды принадлежать къ тепличнымъ растеніямъ. Хорошо растетъ въ комнатахъ. Размножается сѣменами и черенками. Одни виды имѣютъ цвѣты бѣлые, — другіе — розовые. Требуется земля составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

Виды Мирта съ *бѣлыми* цвѣтами: **M. polita.** Съ махровыми цвѣтами. **M. communis flore pleno.** *Махровый миртъ.* Обыкновенно цвѣтеть въ Іюлѣ и Августѣ, но если его лѣтомъ держать въ тѣни и прохладѣ, то онъ зацвѣтетъ только осенью. Чтобы заставить Миртъ цвѣсть зимою, въ Іюлѣ и Августѣ его содержать сухо, пересаживаютъ и затѣмъ часто поливаютъ содержа въ теплицѣ.

У древнихъ Миртъ былъ посвященъ Венерѣ, съ того времени его цвѣты идутъ на вѣнки для невѣстъ.

M. horizontalis. **M. tenuifolia.** **M. bullata.** Цвѣты бѣлые съ желтымъ.

Виды: Мирта съ *розовыми* цвѣтами.

M. mespiloides. **M. tomentosa.** **M. orbiculata.** **M. pimenta.** Тепличное растеніе.

1230. *Naegellia*. См. *Геснерія*.

1231. *Nanodes medusae*. Тепличная Орхидея. Зѣвъ пунцовый, съ такими же кругомъ него волосками, выюющимися въ разныя стороны, чѣмъ напоминаетъ голову Медузы.

1232. *Napoleona*. Такъ названо въ честь Наполеона I. Тепличное деревце, съ большими синими, лиловыми или желтыми цвѣтами; размножается черенками; требуетъ листовенную землю пополамъ съ дерновою и съ примѣсью незначительнаго количества песку.

Виды: *N. imperialis*. Цвѣтокъ необыкновенно красивый, имѣетъ видъ ярко-голубой кокарды, въ которой по бѣловато-голубому, зубчатому вѣнку, лежить розовый бантъ съ желтою середкою.

M. Whitefeldii. Такой же цвѣтокъ малиновый съ желтымъ, по краямъ.

M. Heudelotii.

1233. *Narcissus*. *Нарциссъ*. Изъ семейства *Amarillideae*. Луковица съ душистыми бѣлыми или желтыми цвѣтами, простыми или махровыми. Можетъ зимовать въ грунту или въ подвалѣ, въ сухой землѣ. Для ранней пристановки сажаютъ съ осени въ горшки и выдерживаютъ въ холодномъ помѣщеніи, покрытыми землею или мохомъ до Декабря или Января. Въ это время ихъ приставляютъ къ свѣту, ничѣмъ не покрывая. Размножается отростками луковицъ. Когда отцвѣтутъ, даютъ имъ постепенно засыхать и осенью высаживаютъ въ питательную землю, гдѣ и зацвѣтутъ на слѣдующую весну. Однѣ и тѣже луковицы употребляются для гонки черезъ годъ или два.

Виды: *N. poeticus*. *Н. садовый*. Имѣетъ по нѣскольку цвѣтовъ на стеблѣ, бѣлыхъ съ ярко-красными краями, около внутренняго вѣнчика. Луковица и все растеніе имѣютъ вредныя свойства.

N. pseudo-narcissus. (*N. incomparabilis*). *Н. желтый, махровый*. Годится только для поздней выгонки; съ однимъ цвѣткомъ на стеблѣ; имѣетъ множество разновидностей.

N. maximus. Имѣетъ по нѣскольку красныхъ, большихъ цвѣтовъ на одномъ стеблѣ.

N. Tazetta. *Тацетъ.* Имѣетъ много разностей, съ красными, желтыми и бѣлыми цвѣтами.

N. italicus. *Марселскій нарциссъ.* Самый ранній сортъ. Полумахровый. Снаружи желтовато бѣлый, внутри желтый. Въ Августѣ его сажаютъ въ гіацинтовые горшки и закапываютъ въ землю, но покрываютъ ихъ не такимъ толстымъ слоемъ, какъ гіацинты. Въ Октябрѣ ихъ приставляютъ къ свѣту, въ теплицѣ или въ комнатѣ на окнѣ.

Тацетъ во время цвѣтенія любитъ обильную поливку и тѣнистое мѣсто.

N. concolor et floribundus. *Grand Monarque.* Разцвѣтаетъ въ Декабрѣ.

N. Trewianus. *Grand soleil d'or.* Тоже желтый.

N. Jonquilla. *Жонкиль.* Имѣетъ множество разностей. Особенно замѣчательны. *Большой золотисто-желтый.* Махровый цвѣтетъ поздно.

N. odorus. *Жонкиль маленкій, душистый.* Сажается по нѣскольку луковокъ въ горшокъ.

Простой жонкиль. Кампарель. Не ставится въ тепло раньше Рождества. Сажается по нѣскольку штукъ въ одинъ горшокъ.

1234. Nasturtium officinale. *Гулявникъ. Ръжуха. Ключевой крессъ.* Изъ семейства *Crucifereae*. Дикорастущее, многолѣтнее растеніе; употребляется какъ салатъ и для примѣси въ шпинату. Разводится на нарочно устроиваемыхъ, понимаемыхъ водою, грядкахъ.

Другіе виды: **N. amphybium.** Цвѣтетъ даже въ водѣ.

N. brachycarpum. Дикорастущее, медоносное растеніе, цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

1235. Nauemburgia trinervata. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

1236. Negundo fraxinifolium, foliis albo variegatis. Изъ семейства *Acerineae*. Дерево съ пестрыми, бѣлыми съ зеленымъ листьями, у насъ можетъ содержаться только въ оранжереѣ.

1237. Nelumbium. Семейство *Nelumboneae*. Тепличное водяное растеніе. Корневища зимою берегаются въ сыромъ илѣ. Весною ставится съ горшкомъ въ воду бассейна, на подставки или полки, такъ чтобы вода покрывала растеніе на четверть.

Виды: *N. speciosum*. *Лотосъ древнихъ*. Съ красными цвѣтами, не пловучими, а высоко стоящими надъ водою.

N. speciosum. var. caspicum. Съ огромными, бѣлыми цвѣтами и красноватымъ оттѣнкомъ. Весьма пригодно для большихъ акваріевъ, (но только лѣтомъ), гдѣ оно, будучи посажено въ грунтъ, на дно, кромѣ огромныхъ листьевъ, похожихъ на распущенный дождевой зонтикъ, даетъ большіе, великолѣпные цвѣты. Кто хочетъ, чтобы это растеніе цвѣло въ акваріѣ, тотъ его только одно и держитъ въ немъ. Для этого акваріи ставится на сильное солнце; слой земли на днѣ долженъ имѣть отъ 3 до 5 дюймовъ толщины;—слой воды надъ растеніемъ не болѣе $\frac{1}{3}$ или $\frac{1}{2}$ фута. Можно его ставить въ акваріи и въ горшкахъ, но оно въ такомъ случаѣ цвѣсть не будетъ. Горшечные экземпляры, (а также если акваріи разбирается на зиму), вынимаются изъ акваріи на зиму. Корневище растенія сберегается въ сыромъ илѣ. Въ Мартѣ ползучія корневища очищаются отъ старой земли и сажаются въ широкіе, плоскіе горшки, или на дно акваріи въ свѣжую землю. Горшки съ корневищами ставятся въ воду акваріи, такъ чтобы она покрывала землю вершка на два и все переносится въ парникъ на солнце. Когда разовьются листья, растеніе переносится въ акваріи, гдѣ вода должна быть нагрѣта до 20° R., ставится на подставки или полки, такъ чтобы вода была надъ горшкомъ, вершка на 4 или на 5.

1238. *Nemanthus ionema*. Тепличное растеніе, изъ семейства Геснерій, съ ярко-пунцовыми цвѣтами. Имѣетъ весьма слабыя вѣтви, для поддержанія которыхъ ставятъ или кусокъ гнилаго дерева или половину скорлупы кокосоваго орѣха, къ которымъ растеніе не замедлитъ прицѣпиться.

1239. *Nemesia floribunda*. Однолѣтнее, садовое растеніе вышиною въ футъ, съ маленькими бѣлыми цвѣтами. Сѣется въ парникъ, потомъ высаживается въ горшки. Сохраняется въ парникѣ до совершеннаго окончанія морозовъ, за тѣмъ пересаживается въ цвѣтникъ.

Другіе виды: *N. versicolor*. Съ голубыми цвѣтами.

N. alba. Съ бѣлыми цвѣтами. Оба эти вида не заслуживаютъ разведенія.

N. compacta alba. *N. c. bicolor*. *N. c. coerulea*.

1240. Nemophilla. Изъ семейства **Hydrophyllaceae**. Однолѣтнее бордюрное растеніе, высѣвается прямо въ грунтъ, какъ только оттаеетъ земля.

Виды: **N. atomaria**. Цвѣты бѣлые, съ черными точками.

N. cramboides. Цвѣты свѣтло-голубые.

N. cramboides alba nigra.

N. c. oculata. Цвѣты бѣлые, съ пурпуровыми пятнами.

N. discoidalis. Фиолетовые, почти черные цвѣты, съ бѣлою каймою, употребляются для украшенія искусственныхъ скалъ. Высѣвается осенью въ плошки; раннею весною высаживается на мѣсто и въ тоже время на томъ же мѣстѣ сѣется прямо въ грунтъ, чтобы такимъ образомъ имѣть это растеніе въ цвѣту все лѣто. Любитъ тучную землю и сильную поливку въ жаркое время.

N. d. argentea. N. d. elegans. N. d. marmorata. N. d. nigra. N. d. vittata.

N. insignis. Съ голубыми цвѣтами.

N. i. alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

N. i. marginata. N. i. striata.

N. maculata. Цвѣты крупные, бѣлые, съ темно-фиолетовыми или голубыми, на краяхъ, пятнами.

N. m. grandiflora. Съ синеватыми цвѣтами. **N. m. purpurea**.

N. aurita. Съ желтыми цвѣтами.

N. placelioides. Съ синими цвѣтами. Оба послѣдніе вида не заслуживаютъ разведенія.

1241. Nepenthes. Индійская Кувшинка. Семейство **Nepenthaceae**.

Тепличное травянистое, почти вьющееся растеніе, отличающееся своими листьями, у которыхъ средняя жилка удлинняется и образуетъ, что-то похожее на кружку или кувшинчикъ, съ полуоткрытою крышечкою, сосудецъ этотъ бываетъ постоянно наполненъ водою. Кувшинка эта можетъ расти, и въ саду и въ комнатѣ. Требуется волокнистой торфяной земли съ примѣсью рѣчнаго песку. Воспитывается въ Орхидейной теплицѣ, въ подвѣсныхъ корзинахъ, горшкахъ и даже въ тепломъ грунтѣ, но не иначе, какъ на рыхлой землѣ. Посаженное въ горшокъ ставится на сухой поддонъ, пока укоренится, затѣмъ поливается съ поддона, но такъ чтобы вода не застаивалась.

Зимою въ теплицѣ гдѣ растеніе это содержится, держать градусовъ 8 Р. Лѣтомъ температура увеличивается градусовъ до 25 Р.; и чѣмъ выше температура въ мѣстѣ воспитанія этого растенія тѣмъ воздухъ тамъ долженъ быть влажнѣе. Для увеличенія растительности надлежитъ прищипывать нѣкоторыя побѣги, а чтобы растеніе зацвѣло надо дать его побѣгамъ полную волю. Размножается сѣменами и черенками, на что употребляются молодые побѣги вырастающіе отъ основанія растенія; ихъ сажаютъ въ тепличку или подъ колпакъ, причемъ выбираютъ такіе побѣги, у которыхъ нижняя часть уже одервенѣла. Сѣмена сѣются лишь только вырѣжутъ, въ плоску, на рубленный мохъ, пополамъ съ торфяною землею и пескомъ. Сѣмена не закрываютъ землею, плоску съ ними ставятъ въ тепличку и даютъ тепла до 25° Р. Всходы появятся недѣлю черезъ пять; лишь образуются корни растеніе рассаживаютъ въ горшки и держатъ въ тепломъ и влажномъ воздухѣ.

Даетъ цвѣты темно-пурпуровые въ видѣ пирамиды.

Виды: *N. distillatoria*. Стебель гладкій; кувшины длиною до 6 дюймъ.

N. ampullaria. Стебель покрытъ ржавчиннымъ пушкомъ; нижніе кувшины зеленые съ пурпуровыми крапинками.

N. Vetchii. Листья снизу усѣяны красными полосками; кувшины длиною до 12 дюймовъ. Одинъ изъ самыхъ красивыхъ видовъ.

N. Rafflesiana. Нижніе кувшины до 8 дюймъ длиною, желто-зеленаго цвѣта, съ пурпуровыми пятнами.

N. phyllamphora. Кувшины цилиндрическіе до 6 дюймовъ длины.

N. sanguinea. Кувшины до 12 дюймъ длиною, темно-малиноваго цвѣта.

N. khasyana. Кувшины до 7 дюймъ длины, зеленые или красноватые, въ молодомъ возрастѣ крылатые.

N. albo marginata. Кувшины до 5 дюймъ длины, пурпуровые или испятнанные пурпуровымъ; пушистые; молодые — съ двумя крыльями.

N. gracilis. Кувшины до 4 дюймъ длины.

N. Theysmaniana. Кувшины цилиндрическіе.

N. chelsoni. Кувшины до 4 дюймъ длины, съ пурпуровыми пятнами.

N. sedeni. Кувшины до 5 дюймъ длины.

N. Dominii. Стебель пурпуровый; кувшины до 6 дюймъ длины.

N. hybrida. Кувшины длиною до 5 дюймъ, зеленые или съ нѣсколькими пурпуровыми пятнами внутри.

N. hybrida maculata. Кувшины до 5 дюймъ длины, съ пурпуровыми крапинами.

1242. *Nepeta macrantha*. Изъ семейства *Labiatae*. Многолѣтнее садовое растение, требующее покрывки на зиму.

Другіе дикорастущіе виды: *N. nuda*. (*N. panonica*). *Котовикъ голый*. Многолѣтнее, медоносное растение, цвѣтеть въ Іюль и Августъ.

N. cataria. *Кошачья трава*. *Кошачья мята*. Многолѣтнее, медоносное растение, цвѣтеть весною, цвѣты бѣлые розоватые съ красными пятнышками, на нижней губѣ.

N. lavandulaceae. *Орлиная сошка*.

N. glechoma. *Будра*.

N. colorata. *N. dulcis*. Оба многолѣтнія цвѣточныя растения. Сѣются въ Мартъ.

1243. *Nerina pudica*. Оранжевое, луковичное растение, съ бѣлыми цвѣтами.

1244. *Nerium*. *Олеандръ*. *Пуговникъ*. Тепличное дерево, изъ семейства *Aprocyneae*, съ листьями въ родѣ листьевъ вербы, съ бѣлыми или розовыми душистыми цвѣтами; размножается черенками въ песокъ или водѣ; зимою содержится сухо; можетъ расти и въ комнатѣ; требуетъ землю составленную изъ лиственной, пополамъ съ дерновой и съ небольшою примѣсью песку. Лѣтомъ, чтобы заставить цвѣсть это растение, должно держать его на солнцѣ; зимою можетъ содержаться въ подвалѣ. Считается ядовитымъ.

Виды: *N. oleander*. *Олеандръ*.

N. o. album. Съ бѣлыми цвѣтами.

N. o. atropurpureum.

N. odorum.

N. o. flore roseo plena. Съ розовыми махровыми цвѣтами.

N. o. splendens.

1245. *Nicandra physaloides*. Однолѣтнее, садовое растеніе не заслуживаетъ разведенія.

1246. *Nicotiana tabacum*. *Табакъ*. Семейство *Solanaceae*. Употребляется въ садовой культурѣ, какъ красивое однолѣтнее растеніе, съ розовыми цвѣтами. Сѣется въ плошки, причемъ сѣмена только слегка прикрываютъ пескомъ и по окончаніи морозовъ, разсаживается въ цвѣтникъ.

Виды: *N. grandiflora purpurea*. *N. longiflora*. *N. multivalvis*.

N. suaveolens. (*N. undulata*. *N. Berteriana*. *N. noctiflora*. *N. vincaeflora*). Съ красивыми, бѣлыми и душистыми цвѣтами.

N. chinensis. *N. macrophylla*.

N. glutinosa. Однолѣтнее растеніе, съ малиновыми цвѣтами.

N. nyctaginiflora. Однолѣтнее растеніе, высѣвается предварительно въ парникъ, а потомъ пересаживается въ грунтъ. Бѣлый цвѣтокъ распускается въ Іюль.

N. rustica. *Бакунъ*. *Махорка*. Простой табакъ съ желтыми цвѣтами.

N. glauca. Оранжевое растеніе, съ сѣроватыми листьями и желтоватыми цвѣтами. Это многолѣтнее растеніе на лѣто высаживается въ грунтъ.

N. arborea. Тоже оранжевое растеніе.

1247. *Nidularium*. Травянистое, тепличное растеніе; листья съ колючками, цвѣты пунцовые съ синимъ; можетъ расти въ комнатѣ; размножается отростками; при поливѣ наблюдается чтобы вода не попадала въ середину листьевъ; требуетъ листовую землю, пополамъ съ вересковою.

Виды: *N. Innocenti*. *N. Meyendorffii*. *N. fulgens*.

1248. *Nierembergia*. Семейство *Solanaceae*. Оранжевое растеніе; размножается молодыми побѣгами, сажаемыми въ песокъ весной. Когда укоренится, пересаживается въ парникъ, гдѣ прищипывается, чтобы кустилось. Въ Маѣ высаживается въ грунтъ, очень густо.

Виды: *N. angustifolia*; съ бѣлыми, а въ серединѣ лиловатыми цвѣтами.

N. calycina; съ цвѣтами бѣлыми съ желтою середкою.

N. flicaulis; съ цвѣтами бѣлыми съ свѣтло-фіолетово-голубоватою серединою.

N. intermedia; съ цвѣтами черно-пурпуровыми, по краямъ кармазинными.

N. gracilis var. *Croziana*. Кроціева нѣжная Нирмберія. Съ ярко-лиловыми цвѣтами съ золотисто-желтымъ зѣвомъ. Будучи въ Маѣ пересажено на воздухъ, цвѣтеть постоянно до морозовъ. Зимѣ переносить съ трудомъ. Сберегаютъ его въ умѣренной теплицѣ, куда ставятъ вѣршіе экземпляры, выросшіе въ маленькихъ горшкахъ и поливаютъ весьма умѣренно. Если растеніе не погибнетъ зимою, то весною начнетъ быстро развиваться, въ это время рѣжутъ молодые побѣги на черенки. У молодыхъ растеній концы вѣтвей прищипываютъ, чтобы усилить густоту вѣтвей.

1249. *Nigella*. *Нигелла*. Дѣвица въ зелени. Изъ семейства *Ranunculaceae*. Однолѣтнее садовое растеніе, съ голубыми или лиловыми цвѣтами. Высѣвается, въ Мартѣ, въ плошки или парникъ и потомъ пересаживается въ грунтъ.

Виды: *N. sativa*. Чернушка. Дикорастущее, однолѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтеть въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ. Сѣмена его употребляются какъ пряность.

N. nana. Съ синими цвѣтами.

N. Damascena. Дамасская Нигелла. Дѣвица въ зелени. Съ голубыми цвѣтами.

N. pumila. Бордюрное растеніе.

N. atropurpurea. *N. Hispanica*. *N. coarctata*. *N. Fontanesiana*. *N. arvensis*.

1250. *Niphaea albo lineata*. Изъ семейства Геснерій. Тепличное растеніе, съ превосходными, испещренными широкими бѣлыми жилками, листьями, съ группою небольшихъ бѣлыхъ цвѣтовъ. Требуется одного ухода съ Ахименесами и Глоксиніями.

Другіе виды: *N. rubida*. Съ бѣлыми цвѣтами.

N. albo lineata var. *reticulata*. Съ бѣлыми цвѣтами и листьями превосходно расписанными бѣлыми жилками.

1251. *Nolana prostrata*. Изъ семейства *Solanaceae*. Однолѣтнее, красивое, бордюрное, садовое растеніе, съ лежащими стеблями

и голубыми, росписными цвѣтами. Сѣется въ парникъ или
площи, въ Апрѣлѣ, и потомъ разсаживается въ грунтъ.

Другіе виды: *N. Atriplicifolia*. Съ синими цвѣтами.

N. Paradoxa violacea. Съ фіолетовыми цвѣтами.

N. grandiflora alba. *N. lanceolata*. *N. tenella*.

1252. *Nonnea pulla*. *Слипка*. *Ноннея темноцвѣтная*. Дикора-
стущее, медоносное растеніе, цвѣтетъ съ конца Іюня.

1253. *Nordosmia fragrans*. Съ весьма пріятнымъ запахомъ. Въ
оранжереѣ цвѣтетъ въ концѣ Декабря.

1254. *Nothoscardium aureum*. Грунтовое растеніе, изъ Кали-
форніи, съ длинными, узкими листьями и золотисто-желтыми
цвѣтами, съ зеленовато-синими пыльниками.

1255. *Nyctonthes arbor tristis*. Лекарственное, тропическое ра-
стеніе, съ душистыми цвѣтами, которые распускаются ночью
и къ утру опадаютъ.

1256. *Nycterinia*. Одни виды этого растенія однолѣтніе, другіе
многолѣтніе. Кустъ съ душистыми, бѣлыми цвѣтами; размно-
жается черенками и посѣвомъ сѣменъ въ Мартѣ, въ парникъ
или плошку; требуетъ вересковую землю, пополамъ съ дерно-
вою, и съ примѣсью четвертой части лиственной.

Виды: *N. Lychnidea*. Кустарникъ.

N. capensis. Низенькое однолѣтнее растеніе, разводимое
въ саду, съ сильно развѣтвленнымъ стеблемъ и бѣлыми, ду-
шистыми цвѣтами; хорошо разводится въ горшкахъ. Высѣ-
вается въ парникъ или площи, потомъ разсаживается въ
горшки; выдерживается въ парникѣ до превращенія морозовъ
и за тѣмъ высаживается въ грунтъ.

N. selaginoides. Отличается отъ предыдущаго, только фор-
мою листьевъ. Требуется той же культуры.

N. s. lilacina.

1257. *Nymphaea albo rosea*. *Кувшинка*. *Водяной махъ*. Семейство
Nymphaeaceae. *Блдно-розовая водяная роза*. Пригодна для
акваріумовъ, но только для большихъ, оранжерейныхъ, а въ
комнатахъ рѣдко цвѣтетъ. Корневыя шишки этого растенія
сажаютъ на дно акварія и оставляютъ тамъ на всю зиму.

Разводится сѣменами, которыя кладутъ въ плоскій сосудъ съ водою и ставятъ въ тепличный или комнатный парникъ. Молодыя растеньица пересаживаютъ въ маленькіе горшечки, погружаютъ ихъ въ воду, такъ чтобы она едва покрыла горшокъ; зимою ставится въ воду причемъ горшокъ погружается только до половины.

Другіе виды: *N. alba*. *Кувшинка бѣлая*. Дикорастущее, съ крупными бѣлыми цвѣтами.

N. coerulea. *Голубая водяная роза*. Требуется того же ухода, что и *бѣдно-розовая*.

N. dentata. *Зубчатая водяная роза*. Тепличное растеніе, съ большими бѣлыми цвѣтами, желтыми тычинками и пестиками.

N. gigantea. Съ огромнымъ синимъ цвѣткомъ въ серединѣ желтымъ.

N. rubra. Съ превосходнымъ, малиновымъ цвѣткомъ.

N. sactifolia. Большой, ярко-голубой цвѣтокъ, съ желтою середкою.

N. termalis. Большой бѣлый цвѣтокъ, внутри желтый; лепестки цвѣтка съ изнанки имѣютъ розовыя полосы.

N. ortgiesiano rubra. Цвѣтокъ малиновый съ бѣлымъ.

N. Boucheana. Съ розовыми цвѣтами.

N. blanda. Большой, желтый цвѣтокъ.

1258. *Obeliscaria pulcherrima*. Изъ семейства *Compositae*.

Получило названіе Обелискаріи, вслѣдствіе того, что внутренняя, выдавшаяся часть его вѣнчика напоминаетъ собою форму Обелиска. Цвѣтокъ весьма красивый: ярко-пурпуровыя лепестки вѣнчика, опущенные внизъ, оторочены золотисто-желтою каймою. Требуется той же культуры, что и кареопсисы, въ грунтъ, на открытомъ воздухѣ.

1259. *Ocimum basilicum*. Душистый базиликъ. *Базиликъ простой*. Семейство *Labiatae*. Однолѣтнее, садовое, ароматическое растеніе, съ бѣлыми цвѣтами и душистыми листьями;

бываетъ въ цвѣту все лѣто; сѣется въ Мартѣ въ парникъ и потомъ высаживается на гряды; разводится преимущественно крупнолистный; любитъ плодородную почву; въ сырую, холодную погоду не поливается; зелень употребляютъ преимущественно высушенную для приправы въ соусамъ и въ колбасы.

Другіе виды: *O. maximum*. *O. minimum*. *O. monochorum*. *O. polystachyum*. *O. urticaefolium*.

1260. Odontoglossum. Тепличная Орхидея, требуетъ той же культуры, что и другія эпифитныя орхидеи.

Виды: *O. bictoniense*. Съ цвѣтами въ верхней части лиловато-розовыми, а въ нижней—бѣлыми.

O. bictoniense album. Съ бѣлыми цвѣтами.

O. grande. Съ весьма большими бульбами; цвѣтокъ очень большой испещренный, коричнево-желтый; во время роста любить сильную теплоту.

O. naevium. Цвѣты бѣлые съ малиновыми крапинками.

O. citrosmum. Бѣлые цвѣты, нижняя губа лиловая съ желтымъ у основанія.

O. blunti. Съ большою кистью бѣлыхъ съ розовыми пятнами цвѣтовъ.

O. croceipturum. Съ желтыми цвѣтами, испещренными каштановыми пятнами.

O. Hallii. Похоже на предыдущую, но пятна расположены рѣже.

O. maculatum integrale. Съ свѣтло-желтыми лепестками и губою и блѣдно-коричневыми долями.

O. nevadense. Съ бѣлою бахромчатою губою и ярко-коричневыми съ желтымъ обводомъ прочими частями цвѣтка.

O. odoratum latimaculatum. Орхидея холодной оранжереи, съ желтыми цвѣтами, испещренными крупными бурными пятнами.

O. platyodon. Тепличная Орхидея съ прекрасными, желтыми цвѣтами—метелюю.

O. tripudians. Цвѣты съ желто-зелеными краями и крапинами, губа при основаніи бѣлая съ пурпуровымъ разводомъ.

O. Wallisii. Цвѣты красновато-бурные, съ желтымъ обводомъ, губа бѣлая и лепестки съ красно-бурными пятнами.

1261. Oenocarpus. *Энокарпусъ*. Родъ Пальмъ. Распространено по берегамъ Амазонки и Ориноко, представляя собою величественныя деревья, съ гладкими, колчатыми стволами. Изъ плодовъ многихъ его видовъ добываютъ масло и известный любимый напитокъ Бразиліи «Юкисе» нѣчто въ родъ вина. Размно-

жается сѣменами. Имѣетъ много видовъ, изъ которыхъ болѣе замѣчательны, принадлежа тропической Америкѣ:

O. caracasana. O. chiragua. O. minor.

1262. Oenothera. *Ослинникъ.* Семейство **Onagrarieae.** Многолѣтнее корневое растение съ бѣлыми, желтыми, розовыми или лиловыми цвѣтами; растетъ въ грунту, но можетъ существовать и въ комнатѣ; корни этого растенія зимою сохраняются при умѣренной поливкѣ; требуетъ вересковую землю съ примѣсью такого же количества дерновой, пополамъ съ пескомъ; размножается посѣвомъ сѣменъ въ Мартѣ и отростками.

Виды: *O. biennis. hirsutiss.* *Перелетъ.* Дикорастущее. Корни этого растенія въ прежнія времена бѣ послѣ употребленія вина, полагая, что они уничтожаютъ хмѣль, отчего *Oenothera* и получила свое названіе (*oinos*—вино и *thera*—поглощать).

O. chrysantha.

O. Drumondii. Маленькое растение, покрыто волосками съ желтыми или бѣлыми цвѣтами.

O. longiflora и *O. spectabilis.* Двухлѣтнія растения съ желтыми цвѣтами, зимуютъ въ оранжереѣ.

O. acaulis. (O. taraxacifolia). Съ большими бѣлыми цвѣтами, въ первое время розовыми. Оранжерейное растение. Лѣтомъ дѣлаютъ изъ него черенки, выдерживаютъ зиму въ оранжереѣ и когда совершенно минуютъ морозы — сажаютъ въ грунтъ.

O. amoena. Вышиною до $1\frac{1}{2}$ футъ съ цвѣтами розово-лиловыми, съ пурпуровымъ пятномъ по срединѣ, высѣвается прямо въ грунтъ.

O. amoeno roseo alba. Цвѣты съ свѣтло-розовыми лепестками и пурпуровымъ пятномъ.

O. a. rubicunda. Цвѣты съ ярко-розовыми лепестками.

O. a. Lehmaniana. Пурпуровые цвѣты.

O. a. hybride. Цвѣты съ свѣтло-розовыми лепестками и темно-пурпуровымъ пятномъ на каждомъ.

O. lepida. (Godetia venosa. G. insignis).

O. purpurea.

O. tenella. Всѣ три вида съ красными цвѣтами.

O. Whitneyi. Съ нѣжно-розовыми цвѣтами, съ большимъ

краснымъ пятномъ при основаніи; замѣчательно низкимъ ростомъ при крупныхъ цвѣтахъ.

O. odorata. Съ желтыми цвѣтами, получающими красный цвѣтъ при увяданіи; имѣетъ два видоизмѣненія, а именно: *O. Glaucens cens*, съ сизыми листьями и *O. Virescens*—съ зелеными листьями.

O. biennis. *Ранунцель*. *Рапотникъ*. Двухлѣтнее растеніе. Мясистый корень его употребляется въ пищу, какъ сырымъ, въ видѣ салата, такъ и варенымъ. Вкусомъ похожъ на лѣсной орѣхъ. На почву не прихотливъ. Сѣется въ Апрѣлѣ прямо на грядѣ; посѣвъ въ сухое время сильно поливается; корни могутъ зимовать въ грунту.

O. fruticosa. *O. кустарный*

O. fruticosa major.

O. frazeri. Съ желтыми цвѣтами.

O. pumila. *O. Lamarquiana*. *O. albicaulis*.

O. speciosa. *O. красивый*.

O. salicifolia. *O. верболистный*.

1263. Olea. *Оливковое дерево*. Семейство *Oleineae*. Оранжевое деревцо, можетъ расти и въ комнатѣ, съ жесткими листиками, покрытыми снизу бѣлымъ пухомъ, съ мелкими желтыми или бѣлыми цвѣтами; размножается черенками и отводками; требуетъ землю составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: *O. Europea*. *Маслина*. *Масличное дерево*. *Оливковое дерево*. Плоды этого дерева употребляются въ пищу, въ различныхъ видахъ, подъ именемъ маслинъ или оливокъ, изъ нихъ же добывается такъ называемое прованское и деревянное масло. Съ цвѣтовъ, распускающихся весною, пчелы берутъ взяткоѣ. Разводится въ южныхъ странахъ Европы.

O. Americana. Американское дерево съ съедобными ягодами и очень твердою древесиною.

O. Europaea. Обыкновенная маслина.

O. carpens.

O. ilicifolia.

O. fragrans. *Чайное дерево*. Съ душистыми цвѣтами. Чтобы заставить его чаще цвѣсти, тотчасъ послѣ того какъ оно отцвѣтетъ, уменьшаютъ его поливку и двѣ недѣли держать

почти сухо. Душистые цвѣтки его Китайцы подмѣшиваютъ въ чай.

O. rubra. Похоже на предыдущее, но листья крупнѣе и въ комнатѣ не цвѣтеть.

1264. Omphaloides linifolia. (Synoglossum linifolium). Однолѣтнее, садовое, бордюрное растение вышиною въ 1½ фута, съ бѣлыми цвѣтами; высѣвается въ Маѣ прямо въ грунтъ.

Другіе виды: **O. verna.** Садовая незабудка. Многолѣтнее садовое растение; корневище его сажается осенью въ горшокъ. Если его поставить въ тепло, то въ Декабрѣ на немъ распустится синій цвѣтокъ.

O. longiflora. Съ синими цвѣтами, распускается въ Апрѣлѣ.

1265. Oncidium. Тепличная Орхидея, можетъ цвѣсти и въ комнатѣ. Луковки его бываютъ продолговатыя, въ видѣ стеблей и плоскія, либо овальныя; цвѣты на длинныхъ стебляхъ желтые, пурпуровые, красные или пестрые съ коричневымъ. Размножается дѣленіемъ корней; сажается на кускѣ угля; впрочемъ требуетъ той же культуры, что и другія эпифитныя Орхидеи. Зимой весьма умѣренно поливается.

Виды: **O. hyphaematicum.** Кровокрасный колчанникъ. Цвѣтеть въ Октябрѣ и Ноябрѣ. Цвѣты красиваго темно-шеколаднаго цвѣта, съ зелеными пятнами и желтою бородою.

O. ornithocephalum. Птице-головый колчанникъ. Тропическая Орхидея, сажается въ сквозной горшокъ въ смѣсь изъ рубленнаго моха съ кусками торфа. Въ періодъ развитія затѣняется отъ солнца и часто обрызгивается, а зимою поливается мало и не обрызгивается.

O. aurosum. Оранжевая Орхидея. Съ золотисто-желтыми цвѣтами и красно-бурыми пятнами.

O. brachyandrum. Тепличный эпифитъ съ красными цвѣтами и желтою губою.

O. bryolophotum. Съ золотисто-желтыми цвѣтами, въ красныхъ почкахъ.

O. Insleayi. Съ большимъ цвѣткомъ, весьма похожимъ на цвѣтокъ *Odontoglossum grande*, но бульбы его меньше бульбъ этой Орхидеи. Цвѣты зеленоватые, испещрены желтымъ и коричневымъ. Сажаетъ ее преимущественно въ сворлупу

большаго кокосоваго орѣха. Содержится въ теплѣ и влагѣ во все время роста.

O. cheirophorum. Съ мелкими желто-лимонными цвѣтами и зеленоватыми долями.

O. cucullatum. Съ малиновыми цвѣтами и темными по нимъ пятнышками.

O. cucullatum. *Dayanum*. Съ чисто бѣлыми цвѣтами и фиолетовыми по нимъ пятнами.

O. exasperatum. Съ маленькими темно-каштановыми цвѣтами, у которыхъ губа желтая, съ бурыми крапинками.

O. papillo. Большой оранжево-желтый цвѣтокъ; листья испещрены съ обѣихъ сторонъ.

O. ochtodes. Съ большою метелкою желтыхъ цвѣтовъ и желтою, съ бурыми черточками, губою.

O. reliogramma. Съ метелкою блѣдно-желтыхъ цвѣтовъ, испещренныхъ темными черточками и крапинками.

O. aemulum. Колосъ красно-коричневыхъ цвѣтовъ, нижняя губа, при основаніи, желтая, съ бурими черточками и фиолетовою серединою.

O. alcicorne. Съ желтыми цвѣтами.

O. andigenum. Цвѣты желтые, съ пурпуровыми крапинками.

O. croesus. Маленькая Орхидея, съ темно-бурими цвѣтами. Нижняя губа ярео-желтая.

O. globuliferum costaricense. Цвѣты золотисто-желтые, съ красными пятнами.

O. insculptum. Буро-коричневые цвѣты, съ желтоватымъ ободкомъ.

O. superbiens. Шоколадно-бурные цвѣты кистью; лепестки ихъ желтые съ пурпуровыми черточками.

O. zebrinum. Многочисленные цвѣты, въ видѣ вѣтвистой, длинной, гнѣдой вѣсти, бѣлые съ фиолетовыми полосками и съ желтыми, мозолистыми железками на нижней губѣ.

O. flexuosum radiatum. Красивые цвѣты; нижняя губа желтая, съ буро-пурпуровымъ пятномъ и съ идущими отъ него лучами.

O. splendidum. Одинъ изъ лучшихъ видовъ. Цвѣтокъ коричневый съ свѣтло-зелеными полосками. Нижняя губа свѣтло-желтая.

O. zimminghei. Цвѣтокъ свѣтло-коричневый, съ темно-коричневыми полосками; желтая губа испещрена оранжевыми крапинками.

O. Forskalii. *O. lanceolatum*. *O. maculatum*. *O. macranthum*. *O. ciliatum*. *O. sanguineum*.

1266. Oncosperma. Родъ Пальмъ. Африканское растеніе съ иглами и красно-пурпуровыми листовыми черешками. Размножается сѣменами.

Виды: *O. van Houtteanum*. Тепличная Пальма. Красно-ватые черешки покрыты черными иглами.

O. filamentosa. На Малайскихъ островахъ ея листья употребляются въ пищу.

O. sancona. Разводится въ садахъ.

O. frigida. Растетъ весьма высоко надъ уровнемъ моря.

1266. а) Onobrychis sativa. *Эспарсетъ кормовой*. Изъ семейства *Papilionaceae*. Растеніе многолѣтнее, медоносное, дикорастущее. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ. Разводится какъ кормовая трава, отчего и получило свое названіе: *onos*—осель, *brycho*—жевать.

1266. б) Ononis. *Стальникъ*. *Воловьѣ трава*. Кустарникъ дикорастущій преимущественно въ Африкѣ и частью въ Европѣ, покрытъ шипами. Ослы очень любятъ это растеніе, отчего оно и названо. (*Onos*—осель. *Onem*—нравиться).

Виды. *O. arvensis*. *С. полевой*. Съ пурпуровыми цвѣтами.

O. spinosa. *С. колючій*. Съ пурпуровыми цвѣтами.

O. pinguis. *С. жирный*. Вѣтвистый, дикорастущій кустарникъ, съ желтыми цвѣтами.

O. fruticosa. *С. кустоватый*. Кустарникъ съ большими, красными и бѣлыми цвѣтами; любитъ сухую почву; размножается сѣменами, отводками и корневыми отпрысками; въ молодости требуетъ надежной покрывки зимою.

O. hircina. *С. высокий*. *Волчій*. *Козлятникъ вонючій*. Безъ шиповъ. Цвѣты его издаютъ непріятный запахъ. Имѣетъ лекарственныя свойства.

O. rotundifolia. Многолѣтнее растеніе съ малиновыми цвѣтами; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

O. patrix. *Хелишникъ желтый*. Дикорастущее.

O. alopecuroides. Однолѣтнее садовое растеніе; незаслуживаетъ разведенія.

1266. в) *Onopordium tauricum*. Двухлѣтнее растеніе, умирающее лишь созрѣють сѣмена; усѣяно иглами и покрыто сребристо-сѣрымъ пухомъ. Размножается сѣменами, высѣваемыми въ горшки или прямо въ грунтъ. Переносить зиму безъ крыши. Первоначально высаживается на гряды и только на второй годъ переносится въ цвѣтникъ, на предназначенное ему мѣсто.

1266. г) *Onopordon acaule*. (*O. Acanthium*). *Татарникъ*. Дикорастущее, двухлѣтнее, медоносное растеніе, составляющее сорную траву; цвѣтетъ въ Іюль и Августъ.

1266. д) *Ophioscaulon cissampeloides*. (*Passiflora marmorea*). *Африканская мана*. Красивое тепличное растеніе.

1266. е) *Ophiorogon Iaburan*. Многолѣтнее растеніе. На лѣто высаживается въ грунтъ. Зимуетъ въ подвалѣ или оранжерей. Другой видъ *O. spicata*. Тоже.

1266. *Ophrys lutea*. *Бровникъ*. Орхидея растущая на открытомъ воздухѣ, въ теплыхъ мѣстностяхъ. Цвѣтокъ въ серединѣ коричневыи, по краямъ ярко-желтый.

Другой видъ: *O. apifera*. Съ малиновыми цвѣтами.

1266. в) *Opuntia*. *Кактусъ*. См. статью „*Cactus*“.

1266. л) *Ocacia*. Родъ Пальмъ. Стройное растеніе, съ гладкимъ, кольчатымъ стволомъ и перистыми листьями.

Виды: *O. regalis*. *O. macroclados*.

1266. м) *Orbignya*. *Орбинья*. Родъ Пальмъ растетъ въ Бولیвіи.

Виды: *O. pholerata*. *O. humilis*.

1266. н) *Orchis*. *Орхисъ*. *Кукушкины слезки*. Изъ семейства *Orchideae*. Дикорастущее и разводится въ садахъ, имѣетъ лекарственныя свойства.

Виды: *O. latifolia*. *Дремликъ широколистный*

O. pyramidalis. Съ малиновыми цвѣтами расположенными букетомъ на высокомъ, стоячемъ стеблѣ.

O. morio. *Дремликъ*

O. laxiflora. *Красные султанчики*.

O. masculata. *Салепъ*.

O. militaris. *Болотный птеникъ*.

O. maculata. Настоящие кукушкины слезки. Кукушник испятнанный. Многолѣтнее садовое, грунтовое растеніе.

1266. о) *Oreodoxa.* Королевская пальма. Тепличная пальма, можетъ расти и въ комнатѣ. Свѣтлосѣрый стволъ по всей поверхности покрытъ поперечными кольцами. На грубой части ствола, будто на пьедесталѣ, вырастаетъ другой, болѣе тонкій стволъ, на этомъ другой, еще тоньше и такъ далѣе, а вершина дерева развѣтвляется во все стороны, роскошными и длинными листьями, нѣсколько похожими на финиковыя. Плоды похожи на маленькіе орѣхи, бываютъ величиною съ крупную горошину.

Виды: *O. regia.* (Великолѣпный экземпляръ этой пальмы растетъ на могилѣ Колумба).

O. oleracea. Одна изъ самыхъ высокихъ пальмъ

O. sancona. Разводится въ садахъ.

O. frigida. Растетъ весьма высоко надъ уровнемъ моря.

1267. *Oreoraphis peltatum.* Тепличное растеніе.

1268. *Origanum majorana.* Маіоранъ. Изъ семейства Labiatae.

Двухлѣтнее растеніе; любитъ хорошую, питательную, но легкую почву. Сѣется въ Мартѣ въ парникъ; сѣмена едва прикрываются землею. Въ Маѣ, когда болѣе нельзя ожидать морозовъ, растеніе разсаживается въ грунтъ. Зеленъ Маіорана употребляется какъ пряность въ колбасы, соусы и тому подобное; для этого зеленъ срѣзывается все лѣто, а остальная, передъ самымъ цвѣтомъ. Снимается и сушится на чердакѣ.

Другіе виды: *O. majoranoides.* Маіоранъ кустовой или *M. зимующій.* Многолѣтнее, грунтовое растеніе довольствуется всякою почвою; размножается сѣменами и дѣленіемъ корней. Молодые побѣги и листья употребляются какъ обыкновенный Маіоранъ, — для приправъ.

O. vulgare. Душица обыкновенная. Маткина душица. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное и лекарственное растеніе. Цвѣтетъ среди лѣта, лиловато-розовыми цвѣтами, также употребляется для изготовленія ароматныхъ подушечекъ.

1269. *Ornithogalum.* Птицемлечникъ. Изъ семейства Liliaceae.

Луковичное растеніе зимуетъ въ грунтѣ. Для ранняго цвѣтенія осенью высаживается въ горшки и содержится въ оранжереѣ, — когда же разовьется его цвѣточный стебель, переносится въ теплицу.

Виды: *O. aureum miniatum*. Съ Мыса Доброй Надежды. Цвѣтетъ въ оранжереѣ, въ Февралѣ.

O. aureum. Съ букетомъ желтыхъ цвѣтовъ. Оранжерейное растеніе. Послѣ того, какъ отцвѣтетъ, оставляется нетронутымъ въ горшѣ, но безъ поливки; когда ему идти уже въ ростъ, вынимается изъ горшка, причемъ отдѣляются его дѣтки и сажаются въ новую землю, слегка поливается и ставится въ теплое мѣсто.

O. lacteum. *O. revalutum*. *O. nutans*. *O. umbellatum*. *Пыренки*.

Виды съ бѣлыми цвѣтами: *O. montanum*. *O. arcuatum*. *O. narbonense*. Цвѣты вѣстью.

1270. *Ornus europaea*. *Поясень*. Растетъ въ Южной Европѣ. Изъ-подъ коры его течетъ сладкій сокъ засыхающій на стволѣ и употребляемый вмѣсто сахара.

1271. *Orobus vernus*. *Сочевина*. *Сочевникъ весенній*. *Сердечная трава*. Дикорастущее, медоносное растеніе, разводится какъ многолѣтнее садовое растеніе; цвѣтетъ въ Апрѣлѣ и Маѣ красными цвѣтами.

Другіе виды: *O. lathyroides*. *O. smoothii*.

O. albus. Съ бѣлыми цвѣтами.

O. niger. *Черный усладникъ*. Съ пурпуровыми цвѣтами.

O. tuberosus. Съ розовыми цвѣтами; дикорастущее, употребляемое въ пищу.

O. luteus. Съ желтыми цвѣтами.

O. atropurpureus. (*O. Fischeri*. *O. coccineus*). Однолѣтнее, садовое растеніе, съ темно-пурпуровыми цвѣтами; не имѣетъ особеннаго значенія.

1272. *Orothamnus zeyheri*. Тепличное растеніе съ большими розовыми цвѣтами, будто бы бархатными, формою похожими на цвѣты кактуса. Не выносить излишней сухости, также какъ излишней сырости. Сажается въ вересковую землю, смѣшанную съ листовною. Пересаживая, надлежитъ какъ можно осторожнѣе обращаться съ его корнями, остерегаясь ихъ поранить и только обрѣзывая совершенно острыми ножомъ, попорченныя или погибшія. Размножается черенками, на которые рѣжутся вѣточки у сочлененій. Черенокъ содержится подъ стекляннымъ колпакомъ.

1273. *Osothamnus thyrsoides*. Постоянно зеленый, маленький, оранжевый кустарникъ, съ бѣлыми цвѣтами.

1274. *Otacanthus coeruleus*. Голубой оттокантъ. Изъ семейства *Acanthaceae*. Тепличное растение, съ синими цвѣтами, распускается въ Мартѣ. Любитъ вересковую землю, пополамъ съ листовною.

1275. *Othonna crassifolia*. Изъ семейства *Compositae*. Оранжевое и травянистое растение, съ пониклыми вѣтвями и съ маленькими, желтыми цвѣтами.

Другой видъ: *O. triplinervia*. Оранжевое кустарное растение, съ мясистыми стеблями и желтыми цвѣтами.

O. pectinata. Желтый цвѣтокъ.

1276. *Ourisia coccinea*. Изъ семейства *Scrophulariaceae*. Оранжевое растение; темно-красные цвѣты его распускаются раннею весною. Каждые два года надлежитъ обновлять растение, выводя новыя отъ сѣменъ.

1277. *Oxalis rosea*. Семейство *Oxalideae*. Красивое, однолѣтнее, садовое растение, вышиною въ футъ; съ розовыми цвѣтами; сѣется въ Апрѣлѣ, въ парникъ; любитъ солнечное мѣсто и рыхлую, глинистую почву. Цвѣтетъ все лѣто.

Другіе виды: *O. tropaeoboides*. *O. valdivienensis*. *Валдивійская кислица*. Однолѣтнее растение съ желтыми цвѣтами. Цвѣтетъ все лѣто. Въ Мартѣ и Апрѣлѣ сѣмена сѣютъ въ горшки слегка посыпая пескомъ и ставятъ въ парникъ. Когда у всходовъ начнутъ развиваться листья, ихъ высаживаютъ въ горшки по нѣскольку штукъ, — ставятъ ближе къ стекламъ и потомъ, когда укоренятся, обыкновеннымъ порядкомъ — или высаживаютъ въ грунтъ или оставляютъ въ горшкахъ для комнатъ и балконовъ. На почву это растение не прихотливо.

Другіе виды: *O. versicolor*. Съ розовыми цвѣтами.

O. acetosella. *Кислецъ*. *Заячій щавель*. Дикорастущее, съ бѣлыми или розоватыми цвѣтами.

O. tetraphylla. *Кислица съedomая*. Дикорастущее, многолѣтнее растение; разнообразный корень его употребляется какъ салатъ; зимою растение сохраняется въ подвалѣ, а на лѣто высаживается въ грунтъ.

O. Caprina. На длинномъ тонкомъ стеблѣ, желтый цвѣтокъ.
O. Nennei glabrata. Тепличное, полукустарное растение, вышиною до 2 фута, съ маленькими бѣлыми цвѣтами.

O. corniculata. Разводится въ цвѣтникахъ за его черно-красные листья и золотисто-желтые цвѣты.

O. stricta var. *atropurpurea*. Съ фиолетовыми цвѣтами.

O. cruentata. *Кистича*.

Оранжевые виды: *O. carnosa*. *O. laziantra*.

1278. *Oxyanthus versicolor*. Изъ семейства *Rubiaceae*. Тепличное растение. Цвѣтетъ въ очень раннемъ возрастѣ. Цвѣты бѣлые, длинные, къ концамъ лепестковъ переходящіе въ розовые и красные. Любитъ теплоту и влажность, притѣненіе и содержаніе въ чистотѣ и опрятности.

Другой видъ: *O. tubiflorus*. Съ желтыми цвѣтами.

1279. *Oxybaphus viscosus*. (*Calyxhymenia chinensis*). Однолѣтнее садовое растение, вышиною до 3 фута, съ розовыми цвѣтами, сѣется въ Апрѣлѣ, въ грунтъ, на почву не прихотливо.

1280. *Oxycoccus palustris*. *Клюква*. Изъ семейства *Vacciniaceae*. Извѣстное растение нашихъ сѣверныхъ лѣсовъ, дающее общепотребительную ягоду.

Другіе виды: *O. macrocarpa*. *Крупноплодная или Американская клюква*. Растетъ въ болотахъ Сѣв. Америки; ягоды гораздо крупнѣе нашихъ; употребленіе ея тоже, что и нашей, разводится въ искусственныхъ болотахъ, съ лѣсною и вересковою землею, къ которой прибавляется мохъ. Лѣтомъ этому растенію надлежитъ давать полузатѣненное положеніе, зимою держать въ холодной оранжереѣ или въ холодномъ парникѣ, который отъ мороза закрывается листомъ. Растеніе это сажается въ плошки съ торфяною землею, такъ чтобы стебли легли на землѣ и могли окорениться.

1281. *Oxypetalum solanoides*. Оранжевое растение съ розовыми цвѣтами; любитъ вересковую землю, боится излишней сырости; часто очищается отъ нападающихъ на него насѣкомыхъ; зимою содержится почти совершенно сухо; размножается черенками.

1282. *Oxytropis uralensis*. Изъ семейства *Papilionaceae*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

Другой видъ: *O. myriophylla*. *Барсова кожа*. Дикорастущее.

1283. *Oxyura chrysanthemoides*. Однолѣтнее, низенькое растеніе, высквывается прямо въ грунтъ; золото-желтый цвѣтокъ, распускается въ Іюль.

1284. *Ovirandra fenestralis*. Изъ семейства *Iuncagineae*. Тепличное, водяное растеніе, съ вѣчно зелеными сквозными листьями, состоящими изъ однихъ только жилокъ. Въ комнатѣ разводится въ особомъ только акваріѣ, въ который кромѣ золотыхъ рыбокъ, недопускается другихъ животныхъ. Шишковатыя корешки сажаютъ въ плоскіе горшки, въ иловатую землю и засыпавъ сверху пѣскомъ, погружаютъ въ акваріѣ, такъ чтобы вода закрывала верхніе листья растенія. Въ теплицѣ требуетъ слабаго отѣненія, а въ акваріѣ частой перемѣны чистой и мягкой рѣчной воды; также необходимо наблюдать, чтобы въ акваріумѣ гдѣ растетъ *Ovirandra*, не заводилось водорослей и если листья ея покрываются зеленоватою массою, либо грязью, тотчасъ же обмывать ихъ мягкой губкою.

Мейеръ указываетъ на особый способъ выводить красивую *Ovirandra*. Онъ сажаетъ растеніе въ плоскую миску въ смѣсь 2-хъ частей глины и 1 части торфа, съ небольшимъ количествомъ рѣчнаго пѣску. Вода должна стоять надъ растеніемъ дюйма на 3. Температура воды сохраняется лѣтомъ въ 22° Р., а зимою въ 18° Р. Вода должна быть дождевая, чистая, листья тщательно очищаются отъ ила и водорослей.

1285. *Rachyra carolinea*. Изъ семейства *Malvaceae*. Красивое американское деревце съ большими бѣлыми или желтоватыми цвѣтами, съ альми тычинками. Виды теряющіе на зиму листья, въ этотъ періодъ ихъ существованія очень мало поливаются; размножается черенками; требуетъ вересковую землю, съ прибавкою таого же количества лиственной пополамъ съ дерновою; содержится въ умеренной теплицѣ; можетъ расти въ комнатѣ.

Виды. *P. macrocarpa*. Съ большимъ желто-оранжевымъ цвѣткомъ.

P. insignis. *P. alba*. *P. princeps*.

1286. Раeонiа. Пiонъ. Изъ семейства. *Ranunculaceae*. Нѣкоторые виды этого растенiя представляютъ собою деревце, а нѣкоторые, травянистое корневое растенiе, съ большими цвѣтами свѣтло и темно-розовыми, пунцовыми, бѣлыми или пестрыми. Древесные пiоны зимою очень мало поливаются; содержатся въ холодномъ мѣстѣ оранжереи или въ подвалѣ; впрочемъ могутъ зимовать и въ грунту, будучи хорошо закрыты; землю требуютъ составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой; цвѣтутъ и въ комнатѣ. Древоидный пiонъ вполне пригоденъ для ранней выгонки. Выгонку эту производятъ слѣдующимъ образомъ. Хорошо укоренившееся въ грунту растенiе вынимаютъ и сажаютъ въ питательную землю, въ просторный горшекъ, въ которомъ даютъ стоять съ годъ, до выгонки. Въ Октябрѣ пiонъ ставятъ въ мѣсто защищенное отъ мороза и когда пiонъ образуетъ почки, ставятъ его въ теплицу, гдѣ онъ зацвѣтетъ въ Марту. Когда растенiе отцвѣтетъ, его мало поливаютъ, чтобы не сгнили корни. Пересаживается года черезъ два или три; въ остальное время только добавляется въ горшекъ питательной земли, и засохшіе кончики вѣтвей срѣзаются.

Виды *древесныхъ пiоновъ*:

P. arborea. mutans. Лиловато-розовый.

P. rosea P. rubenscens. Темно-розовые.

P. mutans var. Rubanée de Flandre. Цвѣтокъ полосатый, малиново-фіолетовый, съ бѣлымъ.

P. papaveracea. Бѣлый.

У сѣменоторговцевъ существуютъ въ продажѣ слѣдующія разновидности древеснаго пiона.

Globosa—Bijou de chusan } Китайскіе бѣлые.
Blanche de chateau }

Carlii. Нѣжно-лиловый.

Elisabeth. Fragens maxima и *Comte de Flandre* Ярко-розовые.

Confucius. Китайскій, темно-розовый.

Regia. Donkelaarii. Нѣжно-розовый.

Edwardsii. Персикаваго цвѣта.

Ida. Тоже, розоватый.

Kocehlini. Темно-лиловый.

Léontine. Свѣтло-розовый.

Lord Macartney. Китайскій, красно-лососеваго цвѣта.

Louise Mouchelet. Очень хорошаго розоваго цвѣта.

Dr. Bowring. Orgeuil de Hong Kong. Китайскіе ярко-розовые.

Odorata rosea. Китайскій, бѣло-розовый.

Osiris. Китайскій, темно-пурпуровый.

Purpurea. Китайскій, амарантово-фіолетовый.

Reveesiana. Китайскій, пунцово-кармазиновый.

Rinzii. Розовый.

Robert fortune. Китайскій, розовый.

Rococo. Розово-фіолетовый.

Rosa mundi. Темно-тѣлеснаго цвѣта.

Ruberrima. Темно-розовый.

Salmonea. Samarang. Китайскіе, свѣтло-розовые.

Carolina d'Italie. Souvenir de M-me Knorr. Тѣлеснаго цвѣта.

Triomphe Van der Maelen. Розово-фіолетовый.

Van Houttei. Свѣтло-карминовый.

Травянистые піоны размножаются сѣменами и дѣленіемъ корней; зимуютъ въ грунтѣ съ небольшою покрывшкою, если же корни ихъ вынуты, то сохраняются въ совершенно сухой землѣ.

Виды: *P. officinalis. (Pivoine femelle).* Имѣетъ множество разновидностей.

P. tenuifolia plena. Сибирскій тонколистный піонъ. Воронежъ. Вареная трава. Махровый темно-пунцовый цвѣтокъ.

P. Hibrida. Марьинъ корень. Имѣетъ множество разновидностей.

P. triternata. Вонючій тюльпанъ.

P. intermedia. Сабачники.

P. anomala. Сердечныя ягоды.

Душистые. Махровые піоны.

P. alba plena. Бѣлый, махровый.

P. rosea. Розовый.

P. purpurea. Пурпуровый.

Aglae Adanson. Свѣтло-розовый, съ свѣтло-желтою серединою.

Antwerpiensis. Бѣлый, съ желтоватою серединою.

Coralia. Mathieu. Aug. von Geert. Темно-пурпуровые.

François. Ortegat. La Brune.

- Lamartine. La sublime. L'éblouisjante.
Maria. Pottsi nana. P. plenissima.
Cornea grandiflora. Тѣлеснаго цвѣта, съ бѣлою серединою.
Cérès. Тѣлеснаго цвѣта, середина желтоватая.
Charles Belleyme. Пурпурово-бармазинный.
Charlotte. Темно-розово-лиловатый съ палевымъ.
Claptoniensis. Алый, съ желтоватою серединою.
C-sse de Bresson. Тѣлеснаго цвѣта съ палевою серединою.
De Candolle. Лиловато-розовый, съ бѣлыми краями.
P. rubra. Pionono. Dechavigné. Красные.
Denis Helye. Серизовый съ кармозинною серединою.
Duchesse de Nemour. Розовый, середка желтоватая.
Elegans. Тѣлеснаго цвѣта, середка желтоватая.
Eug. Parmontier. Темно-пурпуровый.
Excelsa. Festiva. Бѣлые.
Faubert. Темно-красный.
Formosa. Бѣлый, желтоватая середка.
Fulgida. Розовый центифольный.
George Cuvier. Тѣлеснаго цвѣта, середка желтая.
Globosa. Тѣлеснаго цвѣта.
Humei alba. Свѣтло-тѣлеснаго цвѣта.
H. Superba. Цвѣтъ и запахъ центифольной розы.
Jos. Parmentier. Кармозинно-фіолетовый.
La chinoise. Темно-розовый.
Lacteola roseacea. Бѣлая съ желтою серединою.
Lilacina plenis. Персиковаго цвѣта съ желтою серединою.
Linnè. Темно-розовый, центифольный.
Louis Permentier. Лилово-розовый, съ палевыми краями.
Lucia. Темно-пурпуровый.
Lutescens pleniss. Желтоватый.
Lutescens variegata. Тѣлеснаго цвѣта съ желтою серединою.
M-me. Morren. Лилово-розовый, середка тѣлеснаго цвѣта.
M-me. Paternoster. Свѣтло-розовый, центифольный.
Marc Maunoir. Кармозинный, середка карминовая.
Mr. Baquié. Кармино-розово-пурпуровый.
Nivalis. Тѣлеснаго цвѣта, середка желтоватая.
Nivea plenis sima. Paraveriflora. Бѣлые.
Pottsi fol. eleg. var. Темно-пурпуровые листья съ желто-
мраморными разводами.

- Prince Charles.** Красно-лиловый.
P. d'Aremberg. Темно-красно-пурпуровый.
Professeur Morren. Лиливо-розовый.
Queen of perfection. Бѣлый.
Robinsoni. Темно-розовый, середка лиловая.
Reveesii. Свѣтло-розовый.
Roi Guillaume. Темно-розово-карминовый.
Rosea superba. Ярво-розовый.
Rubescens. Кирпично-розовый.
Sulphurea. Желтый, середина свѣтлая.
Sultane. Темно-пурпурово-фіолетовый.
Tollenti. Свѣтло-тѣлеснаго цвѣта.
Triomphe d'Enghiene. Серизовый.
Triomphe. Центифольный розовый съ бѣлыми краями.
Van geertii. Темно-розово-фіолетовый.
Victoire Modeste. Темно-розовый, середка желтоватая и бѣлая.
Vulcain. Темно-пурпуровый.
Wallneriana. Яблочнаго цвѣта, середка свѣтлая.

1287 Palafoxia texana. Однолѣтнее садовое растеніе, не заслуживающее разведенія.

1288. Palava flexuosa. Однолѣтнее, грунтовое, красивое мальвовидное растеніе, съ нарядными листьями и розовыми цвѣтками, испещренными темно-розовыми крапинками; цвѣтеть все лѣто; вышиною до 6 вершковъ; сѣется въ парникъ или теплицу, въ половинѣ въ началѣ Марта и потомъ пересаживается въ грунтъ, когда уже нельзя ожидать болѣе морозовъ.

1289. Palemonium coeruleum fol. albo variegatis. *Пестролистная синюха.* Растеніе, зимующее на воздухѣ, въ грунтъ. Любитъ торфяную землю, съ значительнымъ количествомъ перегноя и обильную поливку. На третьемъ году, до Іюля, надлежитъ срывать цвѣточные стебли подъ самый корень; на зиму растеніе подрывается сухимъ листомъ; размножается дѣленіемъ корня, производимымъ черезъ каждые три года, причемъ растеніе пересаживается въ сѣбую землю. Побѣги его, покрытые листьями, зелеными съ бѣлыми употребляется въ букеты.

1290. *Paliurus aculeatus*. (*P. australis*). *Держи-дерево*. *Тегенекъ*. *Чижникъ колючій*. Изъ семейства *Rhamnaceae*. Весьма колючій кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ и парковъ; дико растеть по горамъ Кавказа и Крыма.

1291. *Ранах*. *Жизъ-Зенъ*. Оранжерейное растеніе, имѣеть нѣкоторые виды кустовые, а нѣкоторые травянистые, корневыя; даетъ желтые и бѣлые цвѣты; размножается сѣменами и дѣленіемъ корней, сохраняемыхъ зимою довольно сухо; землю любить, смѣшанную, изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: *P. sessiliflorum*. *Ванъ-Грамура*. Кустарникъ можетъ расти на воздухѣ.

P. quinquefolium. Съ пятиконечными, рукообразными листьями. Имѣеть лекарственныя свойства.

P. trifolium. *P. horridus*. *Заманиха*. Дикорастущее въ Камчаткѣ.

P. fruticosum. Тепличное растеніе.

1292. *Pancratium speciosum*. Изъ семейства Амариллисовъ. *Красивый силовцетъ*. Тепличное, луковичное растеніе. Въ жилыхъ комнатахъ растеть лучше чѣмъ въ оранжереѣ и ежегодно цвѣтеть. Даетъ превосходные, темно-зеленыя, раскидывающіеся листья и сильно пахучіе, большіе бѣлые или желтоватыя цвѣты, которыхъ бываетъ до 15 на стеблѣ. Требуеть рыхлой, глинистой земли. Лѣтомъ его, по временамъ, поливають жидкимъ удобреніемъ и даютъ какъ можно больше свѣта; зимою поливають очень мало; растеніе это надо часто опрыскивать, пересаживать каждую весну въ большій горшокъ, но отнюдь не повреждая его корней; дѣтокъ надлежитъ отдѣлять и сажать въ особыя горшки, причемъ первое время держится сухо. Размножается также и сѣменами.

Другіе виды: *P. caribaeum*. *Морская млія*, съ бѣлыми, душистыми цвѣтами, любить преобладаніе вересковой земли, цвѣтеть два или три раза въ годъ.

P. calathinum. Съ большими бѣлыми цвѣтами.

P. amancals (ismene). Съ большими желтыми цвѣтами. Оранжерейное растеніе.

P. abasicum. *P. longiflorum*. *P. maritimum*. *P. zeylanicum*.

1293. Pandanophyllum humile. Тепличное растеніе.

1294. Pandanus. Красивое, тепличное, древеснистое растеніе, может существовать и въ комнатѣ. Стволъ этихъ деревьевъ пускаетъ отъ себя, большіе, достигающіе земли корни. Даетъ листья темно-зеленые до 3-хъ аршинъ длины, по краямъ обсаженные твердыми загнутыми назадъ колючками, въ видѣ острыхъ крючковъ; цвѣты желтые имѣютъ видъ султана; размножается сѣменами и черенками; требуетъ землю дерновую, пополамъ съ торфяною или листовною; въ комнатѣ ставится на южную сторону; нуждается въ большемъ просторѣ, такъ какъ его листья роскошно раскидываются; зимою боится влажности, а потому содержится сухо; лѣтомъ поливается гораздо болѣе. Пересадка этого растенія производится съ большою осторожностью, чтобы не повредить его корни. Любитъ болѣе глубокую, чѣмъ широкую посуду, на днѣ которой устраивается хорошій дренажъ изъ черепковъ и мелко битого кирпича. Наружные корни на лѣто обертываютъ мхомъ, который содержать умѣренно влажнымъ и удаляютъ эту обвязку лишь минутъ періодъ роста растенія. Отъ жаркихъ солнечныхъ лучей защищаются притѣненіемъ.

Виды: *P. ornatus*. Чрезвычайно красивое растеніе, отличается густотою ярко-зеленыхъ листьевъ, усаженныхъ по краямъ многочисленными совершенно бѣлыми иглами, правильно расположенными въ видѣ пилы. Содержится въ теплицѣ.

P. furcatus. Съ длинными, зелеными листьями.

P. lais. Схожее съ предыдущимъ.

P. utilis Bory de St. Vincent. Волокна листьевъ идутъ на пряжу.

P. odoratissimus verus. Съ пахучими цвѣтами.

P. aureus. Полукустарное растеніе; листья согнуты дугою, илестые, по срединѣ бѣлые, съ бронзовымъ отливомъ.

P. javanicum. Листья съ бѣлыми полосами также, какъ и *P. australis*.

P. Veitchi. Имѣетъ прекрасные, зеленые листья, съ бѣлыми, во всю ихъ длину полосами.

P. candelabrum. *P. cuspidatus*. *P. elegantissimus*. *P. reflexus*. *P. graminifolius*. *P. labyrinthicus*. *P. longifolius*. *P. nitidus*. *P. pygmaeus*. *P. vandermeerschii*.

1295. *Panicum variegatum*. Оранжевое растение из рода злаковъ.

Другіе виды: *P. plicatum*. Американское растение.

P. miliaceum. Просо.

1296. *Paraver*. *Макъ*. Семейство *Paraveraceae*. Преимущественно однолѣтнее растение, разводимое для добычи опиума и масла, а равно какъ украшеніе цвѣтниковъ, но бываетъ и многолѣтнее.

Однолѣтніе виды сѣются прямо въ грунтъ, тотчасъ послѣ того, какъ сойдѣтъ снѣгъ; когда взойдетъ — его прорѣжаютъ, чтобы росъ на вершкѣ другъ отъ друга.

Виды: *P. Rhoeas*. *Макъ самосѣйка*. Обыкновенный полевой макъ, изъ котораго образовались разводимыя въ садахъ разновидности. Дикорастущее, однолѣтнее, медоносное растение, цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ.

P. somniferum. *М. бѣлый*. Разводится для полученія масла и какъ приправа въ кушанья. Бываетъ разныхъ сортовъ. Изъ этого вида развели, въ садахъ, разнообразныя видоизмѣненія, названныя макомъ: *тоннымъ*, *перистымъ*, *ранункулевиднымъ*, *кокелико*.

P. somniferum murselli. Считается самымъ красивымъ, имѣетъ цвѣты съ бахромчатыми лепестками.

Многолѣтній макъ размножается дѣленіемъ корней; зимою корни его содержатся почти сухо; требуетъ землю, составленную пополамъ изъ дерновой и лиственной, съ небольшою прибавкою песку.

Разновидности его. *P. nudicaulis*. *М. нагостебельный*. Двухлѣтнее растение съ желтыми цвѣтами; зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

P. croceum. *М. оранжевый*. Съ оранжево-желтыми махровыми цвѣтами.

P. orientale. *М. восточный*.

P. bracteatum. *М. ярко-красный*. Съ огромными цвѣтами, самаго яркаго пунцоваго колера.

P. alpinum. *М. альпійскій*. Съ желтыми или оранжевыми цвѣтами.

P. caucasicum. *М. Кавказскій*.

P. aurantiacum.

1297. *Raphinia cristata*. Тепличная Орхидея. Большие коричневые, съ бѣлыми полосами цвѣты, съ желтою губою, выростають у основанія бульбы, а потому растение сажается въ горшокъ на нѣкоторое возвышеніе.

1298. *Pardanthus chinensis*. Изъ семейства *Irideae*. Оранжевое растение, съ огненно-красными, испещренными темными пятнами, цвѣтами, распускающимися въ Іюнь. Вслѣдствіе этой испещренности цвѣтка и получило названіе, (*pardos* — леопардъ, *anthos* — цвѣтокъ).

1299. *Parietaria officinalis*. *День и ночь. Стѣнница.* Изъ семейства Крапивныхъ — *Urticae*. Мужскія тычинки замѣчательны упругостью: они обыкновенно согнуты, но если только коснуться до нихъ — они внезапно выпрямляются и брызжутъ во всѣ стороны плодородною пылью. Растетъ въ Европѣ по развалинамъ стѣнъ, по ущельямъ и невоздѣланнымъ мѣстамъ. Получило названіе вслѣдствіе того, что преимущественно растетъ на стѣнахъ. (*Paries* — стѣна).

1300. *Parochetus communis*. Изъ семейства *Leguminosae*. Тепличное, ползучее растение съ ярко-синими цвѣтами. Держится въ подвѣсной вазѣ, изъ которой падаетъ красивыми фестонами. Растеніе возобновляютъ каждый годъ разсадкою молодыхъ побѣговъ весной. На лѣто вывѣшивается на воздухъ. Въ природѣ растетъ по берегамъ ручьевъ, отчего и получило названіе: (*para* — близъ, *ochetos* — ручей).

1301. *Parrua macrocarpa*. Красивое, дикорастущее, многолѣтнее, низкорослое растеніе. Любитъ каменистую почву, съ большими, красивыми, лиловыми цвѣтами.

1302. *Passerina fliformis*. Оранжевое растение, имѣетъ вѣтви, покрытыя мелкими, мягкими, длинными листочками, падающія какъ бы у плаучей ивы. Весьма пригодно для зимнихъ букетовъ.

Другой видъ: *P. stellari*. Мужикъ корень. Дикорастущее.

1303. *Passiflora*. *Кавалерская звезда. Дерево страстей.* Семейство *Passifloreae*. Тепличное, вьющееся растеніе, цвѣтетъ и въ комнатѣ. Листья сердцевидные или разбѣнные; большіе

цвѣты въ видѣ звѣзды — бѣлые, розовые, лиловые, малиновые съ синими или пестрыми тычинками. Размножается черенками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей вересковой, дерновой и лиственной. Любитъ частое опрыскиваніе лѣтомъ.

Виды: *P. actinia*. Великолѣнные цвѣты голубые съ темно-малиновымъ, иногда душистые.

P. coerulea. *P. princeps*. Цвѣтеть до Декабря, а иногда и до Февраля. Цвѣты бѣлые съ голубымъ, нитевиднымъ вѣнцомъ.

P. amabilis. Цвѣтокъ темно-пунцовый съ бѣлыми тычинками. Содержится въ оранжереѣ. Черенки при размноженіи растенія держатся подъ стеклянныиъ колпакомъ.

P. edulis. Даетъ съѣдобные плоды, извѣстные подъ именемъ «Гранадиллы», изъ которыхъ готовится прохладительный напитокъ.

P. tinifolia. Съ листомъ сплошнымъ, похожимъ на листъ лимона; цвѣтокъ великолѣпный, малиновый съ бѣлымъ и фиолетовымъ.

P. forma hortensis Decaisneana. Съ огромнымъ, великолѣпнымъ цвѣткомъ, малиновымъ съ голубымъ и бѣлымъ.

P. alata. *P. quadrangularis*. *P. kermesina*. *P. picturata*. *P. albida*. *P. angustifolia*. *P. capsularis*. *P. coccinea*. *P. Londonii*. *P. racemosa*. *P. Uvarowii*. *P. Imperatrice Eugénie*. *P. laurifolia*. *P. schlachterii*. *P. trifasciata*.

Существуютъ разновидности пассифлоры, которыя содержатся въ холодной оранжереѣ, а именно:

P. cinnabarina. Съ многочисленными маленькими цвѣтами, пурпуровыми внутри, зелеными снаружи.

P. hybrida Anna. *P. glauca*. *P. bicoronata*. *P. speciosa*. *P. графъ Бобринскій*. *P. графъ Ниселевъ*. *P. графъ Нессельроде*. *P. pulchella*. *P. racemosa*.

1304. *Pastinaca sativa*. Пастернакъ. Изъ семейства Umbelliferae. Двухлѣтнее растеніе. Его первоначальное тѣло существуетъ у насъ въ дикомъ состояніи, подъ именемъ „Полевой борщъ“. Корень пастернака употребляется въ пищу какъ овощъ и въ приправу къ кушаньямъ. Тоже употребленіе имѣютъ его листья. Въ огородахъ его разводятъ понемногу. Существуютъ

различные сорта: съ длиннымъ и съ круглымъ корнемъ. Сѣется осенью или самую раннюю весною, причемъ сѣмена только слегка покрываютъ землею. На почву не прихотливо. Сѣмена получаютъ черезъ посадку весною перезимовавшихъ корней.

1305. а) Paullinia thalictrifolia. Изъ семейства *Sapindaceae*. Бразильскій, ползучій кустарникъ, весьма похожъ на *Adiantum*. Тепличное растеніе, но можетъ содержаться и въ комнатѣ. Цвѣты его не заслуживаютъ вниманія.

Другой видъ: *P. thalictrifolia*. Листомъ весьма похожъ на *Adiantum*. Листья пригодны для гарнировки букетовъ.

1305. б) Paulownia imperialis. Кустарникъ, служащій для украшенія садовъ лѣтомъ; на зиму вынимается изъ грунта и сохраняется въ подвалѣ или простѣнѣхъ. Разводится и въ оранжереѣ.

1306. Pavetta. Тепличное, вмѣстѣ и комнатное растеніе, съ бѣлыми цвѣтами. Размножается черенками; требуетъ землю, составленную изъ лиственной, дерновой и вересковой.

Виды: *P. Indica*. Корень имѣетъ лекарственныя свойства.
P. kofra. *P. borbonica*.

1307. Pavonia caramitto. Изъ семейства *Malvaceae*. Оранжевое растеніе.

Другіе виды: *P. velutina*. Листья будто бархатные; цвѣты розовые — съ бѣлымъ у основанія. Любитъ сильную землю, много воздуха и обильную поливку лѣтомъ. Въ благоприятное лѣто, растеніе это высаживаютъ въ грунтъ. Размножается черенками. Зимую содержать въ свѣтломъ мѣстѣ теплицы и поливають только въ крайнемъ случаѣ.

P. strictiflora. Цвѣты малиновые съ бѣлымъ.

P. prostrata.

1308. Pearea Hurosurtiflora. Изъ семейства Геснерій. Тепличное растеніе, съ круглыми, оранжево-желтыми цвѣтами.

1309. Pelargonium. Герань. Пеларгонія. Изъ семейства, *Geraniaceae*. Оранжевое растеніе можетъ расти въ комнатѣ, хотя страдаетъ зимою; съ весьма разнообразными цвѣтами: бѣлыми, розовыми, малиновыми, алыми, нѣкоторые виды съ пятнами и струйками, нѣкоторые виды съ пестрыми листьями, также зелеными съ бѣлымъ.

Пеларгонія требует слѣдующаго ухода.

Разводится сѣменами и черенками. Для разведенія черенками самое благопріятное время—въ Августѣ. Для этого срѣзываютъ со старыхъ кустовъ сильныя побѣги, даютъ имъ немного завянуть, втыкаютъ въ землю и ставятъ въ оранжереѣ; прямо на солнцѣ безъ всякаго отѣненія. Въ продолженіи трехъ недѣль растеніе окореняется и тогда его пересаживаютъ въ небольшіе горшки, въ смѣсь двухъ частей вересковой и одной части хорошаго перегноя, пополамъ съ дерновою землею. Когда растеніе окрѣпнетъ, то въ землю прибавляютъ нѣсколько перегноя. Въ Сентябрѣ растеніе пересаживаютъ въ 6-и-дюймовые горшки и ставятъ ближе къ свѣту. Зимой тщательно очищаютъ растеніе, берегутъ отъ капли и вообще держатъ въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ. Въ концѣ Февраля Пеларгоніи пересаживаютъ въ нѣсколько большіе горшки, въ сильную и питательную землю, съ примѣсью десятой части куриного помета. Послѣ третьей пересадки, растеніе сильно поливается, часто провѣтривается, причемъ вершины большихъ вѣтвей прищипываются, чтобы усилить ростъ болѣе слабыхъ. Когда появятся на Пеларгоніи первыя цвѣточные почки, поливается жидкимъ удобреніемъ преимущественно растворомъ двухъ фунтовъ столярнаго клея въ штоффъ воды, причемъ этимъ штоффомъ разбавляется ведро чистой воды.

Для ранней выгонки Пеларгонія неспособна; но чтобы имѣть ея цвѣты въ необыкновенное время, а именно глубокою осенью и въ началѣ зимы, растеніе вторично пересаживаютъ въ Августѣ и держатъ въ тепловатомъ парникѣ до наступленія морозовъ, затѣмъ ихъ переносятъ въ оранжерею, гдѣ онѣ цвѣтутъ, пока имъ дадутъ достаточно освѣщенія.

Пеларгонія имѣетъ множество видовъ и разновидностей, перечислимъ нѣкоторые.

P. Zonale. Имѣетъ свѣтло-зеленыя листья, окаймленные бѣлою, сребристою полосою. Можетъ расти въ грунтѣ все лѣто; любитъ рыхлую почву и солнечное положеніе. Зимуетъ въ оранжереѣ или въ комнатѣ на окнѣ, обращенномъ на солнечную сторону.

P. Zonale foliis variegatis.

P. Miss Pollock. Съ пунцовымъ цвѣткомъ и великолѣп-

нымъ листомъ съ бѣлыми, мѣстами зеленоватыми пятнами и
ярко красною каймою вокругъ темно-зеленой середины листа.

P. tricolor. P. capitatum.

Въ торговлѣ существуютъ слѣдующія разности Пеларгоній:

Adèle Odier. Тѣлеснаго цвѣта съ пятью темно-кармозин-
ными пятнами.

Admiration. Серизовая съ пятью черными пятнами и
бѣлою середкою.

Archimède. Киноварнаго цвѣта, на розовомъ фонѣ пять
темныхъ пятенъ.

Aspasie. Ярко-розовая, съ черными пятнами, окаймлен-
ными серизовымъ.

Asmodée. Кармино-киноварнаго цвѣта, съ пятью темными
пятнами и свѣтлою середкою.

Beelzebub. Пурпуровый, съ тѣлеснаго цвѣта середкою,
съ пятью киноварнаго цвѣта пятнами.

Coquette. Свѣтло-коричневаго цвѣта съ каштановыми
пятнами.

Crécelle. Бѣлая съ карминовыми жилками и 5-ю фиоле-
товыми пятнами.

Charles Darwin. Съ полумахровымъ цвѣткомъ.

Elise Miellez. Тѣлеснаго цвѣта, съ пятью черными пятнами.

Emilie Castelar. Съ полумахровымъ цвѣткомъ.

Erneste Duval. Лилово-розовый, съ пятью фиолетовыми
пятнами.

Eugénie Duval. Лилловый съ пятью ярко-фиолетовыми
пятнами.

Eximium. Маленькіе цвѣты, съ свѣтло-розовыхъ, съ сере-
зовыми пятнами.

Francois Arles — Dufour. Съ полумахровымъ цвѣткомъ.

Gloire de Bellevue. Розовый съ пятью черными пятнами.

Gustave Odier. Лилово-розовый, съ пятью пурпуровыми
пятнами.

Imperatrice Eugénie. Бѣлый, съ пятью темно-пурпуро-
выми пятнами.

Lambétia. Розово-киноварный цвѣтокъ, отороченный бѣ-
лымъ, съ пятью черными пятнами.

M-me Lemoine. Лилово-бѣлый съ пятью серезовыми пятнами.

M-me Lelandais. Серизовый, съ пятью карминовыми пятнами.

M-me Pottle. Розовый цвѣтокъ, отгѣненный серизовымъ.

M-me Reisét. Пурпурово-карминовый, съ пятью каштановыми пятнами.

M-me Rougemont. Тѣлеснаго цвѣта, съ пятью темными пятнами.

Magnum. Алаго цвѣта, съ пятью темными пятнами.

Mathilde. Свѣтло-киричнаго цвѣта, съ темными пятнами.

Nonsueh. Серизовый цвѣтокъ съ пятью темно-карминными пятнами.

Novelty. Серизовый съ черными бархатистыми пятнами.

Othello. Маленький цвѣтокъ пурпуровый, съ лиловыми пятнами.

Paul et Virginie. Свѣтло-розовый съ пятью пурпуровыми пятнами.

Parthienope. Розово-карминовый, съ пятью пятнами чернаго и киноварнаго цвѣта.

Pelopidas. Маленький цвѣтокъ лиловый, съ пурпуровыми пятнами.

Prometheus. Карминный съ черными пятнами и огненнаго цвѣта отгѣномъ.

Rex. Пурпуровый, съ пятью каштановыми пятнами.

Rex Trimmer. Свѣтло-серизовый, съ пятью темными пятнами.

Star of the West. Свѣтло-коричневаго цвѣта, съ темными пятнами.

Statiaski. Маленький лиловый цвѣтокъ съ фиолетовыми пятнами.

Talisman. Бѣлый съ пятью фиолетово-пурпуровыми пятнами.

Talma. Тѣлеснаго цвѣта, съ темно-карминными пятнами.

Tamberlie. Карминовый съ пятью черными пятнами и бѣлою середкою.

Turevne. Свѣтло-брасный, съ пятью темно-пурпуровыми пятнами.

Virginie Mieliez. Розово-пурпуровый съ темными пятнами.

William Bull. Пурпуровый съ пятью темными пятнами.

1310. **Penstemon.** Изъ семейства *Scrophularineae*. Оранже-

рейное, травянистое растение, может существовать и въ комнатѣ; съ розовыми, малиновыми, синими и лиловыми цвѣтами. Размножается сѣменами, черенками и дѣленіемъ корней. Требуется листовую землю пополамъ съ дерновою и прибавкою незначительнаго количества песку. Можетъ быть подвергнуто ранней выгонкѣ; съ этою цѣлю у сидящаго въ грунтѣ Пенстемона, въ Іюлѣ обрѣзываютъ конецъ вѣтвей, въ Сентябрѣ растение пересаживаютъ въ горшокъ и пока еще тепло держать въ парникѣ подъ стекломъ, затѣмъ съ наступленіемъ холодовъ переносить въ оранжерею.

Виды: *P. baccaridifolius*. Съ пунцовыми цвѣтами.

P. crassifolius. Цвѣты лиловые съ пурпуровымъ отливомъ у основанія. Растетъ на открытомъ воздухѣ, но на зиму его лучше вносить въ оранжерею. Размножается черенками, которые надо дѣлать не иначе, какъ раннею весною.

P. cyananthus. Съ ярко-синими цвѣтами.

P. Gentianoides. *Пенстемонъ горечавколистный*. Съ фіолетовыми цвѣтами. Размножается въ началѣ весны черенками. Когда укоренится, пересаживается въ парникъ, въ горшки и сильно поливается; когда начнетъ распускаться — пересаживается въ грунтъ.

P. cordifolius. Съ ярко-пунцовыми цвѣтами.

P. Menziesii Robinsoni. Травянистое многолѣтнее растение, съ мелкими листьями и яркими, розово-лиловыми цвѣтами; растетъ по скалистымъ горамъ.

P. gordonii. Крупные цвѣты, бѣлые съ синимъ. Любитъ черноземъ. Осенью защищается отъ холодныхъ дождей и на зиму вносится въ оранжерею; въ болѣе же теплыхъ мѣстностяхъ можетъ зимовать въ грунтѣ, при надежной покрывкѣ. Размножается дѣленіемъ корневища весною и черенками.

P. elegans. *P. roseus*. *P. Alfred Pellier*. *P. guaskoi*.

P. Léonie Vainclair. *P. Liabaud*. *P. M-me de Lebrun*.

P. M-me Liabaud. *P. Meteora*. *P. Mr. Perret*.

P. Pei—*Ho*. *P. perfoliatum*. *P. surprise*.

P. Talisman. *P. vivide*. *P. jeffreyanus*, съ голубыми цвѣтами.

Всѣ вышеозначенные виды Пенстемона могутъ быть посажены въ грунтъ, но зимою ихъ корни сохраняютъ въ подвалѣ или въ оранжерей, причѣмъ въ землѣ, на которой они лежатъ

поддерживают нѣкоторую влажность. Къ тѣмъ же видамъ принадлежитъ и *P. miniatus*, съ пунцовыми цвѣтами, который размножается весною раздѣленіемъ корневища, со стеблями, а лѣтомъ черенками.

P. albidum. II. бѣлый.

P. pubescens. II. пушистый. Съ фіолетовыми цвѣтами.

P. purpureum. Съ красными цвѣтами. Три эти вида зимуютъ въ грунтѣ при надежной покрывкѣ, тогда какъ ниже слѣдующіе зимуютъ безъ покрывки:

P. grandiflorum. II. великоцвѣтный и *P. pulchellum*. II. красивый.

1311. *Pentapetes phoeticeae*. Оранжевое растеніе.

1312. *Pentarhaphia subensis*. Изъ семейства Геснеріи. Оранжевое растеніе, съ пунцовыми цвѣтами снаружи и желтыми внутри. Требуется того же ухода что и другія Геснеріи. Размножается черенками, на которыя срѣзываютъ молодыя вѣточки.

1313. *Pentas carnea*. var. *Rosea*. Изъ семейства Rubiaceae. Тепличное растеніе, съ букетомъ розовыхъ цвѣтовъ. На лѣто ставится въ оранжерею; требуетъ частой пересадки. Легко размножается черенками. Зимой его надо держать какъ можно ближе къ стекламъ, въ самомъ тепломъ мѣстѣ, при чемъ поливается весьма умеренно, тогда какъ лѣтомъ поливается обильно.

1314. *Peperomia*. Изъ семейства Перцовыхъ. Тепличное растеніе.

Виды: *P. puberula*. Тепличное полукустарное растеніе, съ широкоовальными, щитовидными листьями и тонкими, вѣточными колосьями.

P. velutina. Съ темно-зелеными, бархатистыми листьями, на красной подкладкѣ, съ серебристою полосой по серединѣ и краснымъ стеблемъ.

P. eburnea. Многолѣтнее тепличное растеніе, съ жилками изумруднаго цвѣта, по ярко-зеленымъ листьямъ и съ бѣлыми, пушистыми черенками.

P. arifolia. *P. argentea*. *P. argyrea*.

P. maculosa. *P. verschaffeltii*.

1315. *Pericycla*. Родъ вѣролистной Пальмы. Размножается сѣменами. Единственный представитель этой пальмы: *p. penduliflora*.

1316. *Perilla nankiensis*. Однолѣтнее садовое растеніе, съ сильно развѣтвленнымъ темно-краснымъ стеблемъ, вышиною фута въ $1\frac{1}{2}$. Разводится собственно вслѣдствіе необыкновеннаго цвѣта темно-красныхъ, почти черныхъ листьевъ. Цвѣтовъ этого растенія не замѣтно. Сѣется въ концѣ Марта въ теплый парникъ или теплицу, разсаживается по нѣсколькимъ штукъ въ горшочки и оставляется въ парникѣ. Въ Іюлѣ высаживается въ рыхлую питательную землю. Можетъ размножаться и черенками.

Виды: *P. atropurpurea*. *P. laciniata*.

1317. *Periploca graeca*. Свидина. Новойнокъ. Жидовникъ. Обвойникъ. Кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ; на зиму требуетъ надежной покрывки.

1318. *Peristrophe salicifolia fol. aureo variegatis*. Пестрая, иволжистая Перистрофа. Низкій, развѣистый полукустарникъ, съ ярко-зелеными листьями имѣющими золотисто-желтую кайму и разводы. Тепличное растеніе; размножается черенками. Въ Маѣ растеніе, прирученное уже изъ воздуха высаживается въ грунтъ, въ защищенное мѣсто. Его пригибаютъ и прищипываютъ къ землѣ крючками, чтобы оно кустилось и застило землю сплошнымъ дерномъ. (Регель).

1319. *Parnettia floribunda*. Вѣчно зеленый кустарникъ, съ бѣлыми цвѣтами, распускающимися зимою.

Другой видъ: *P. angustifolia*.

1320. *Persea. Laurus persea*. Оранжевое дерево. Можетъ расти и въ комнатѣ, съ небольшими бѣловатыми цвѣтами, размножается отростками и черенками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой и лиственной, съ примѣсью самага незначительнаго количества песку.

Виды: *P. gratissima*. Даетъ чрезвычайно вкусные плоды, называемые *Advogado*.

P. lingue. *P. carobynensis*.

1321. *Persica*. Персикъ. Такъ названъ по происхожденію изъ

Персін. Изъ семейства Косточковыхъ. Дерево, приносящее превосходный плодъ. Въ нашемъ климатѣ расти на открытомъ воздухѣ не можетъ, а зимою содержится въ грунтовой сараѣ или простѣнѣ и вносятся на весну въ оранжерею, либо содержится въ особыхъ, нарочито устроенныхъ помѣщеніяхъ, будучи посажено въ грунтъ.

Виды: *P. vulgaris*. *Персиковое дерево. Брускина.*

P. v. flore pleno. Съ розовыми, махровыми цвѣтами.

P. v. flore albo. Съ бѣлыми, махровыми цвѣтами.

P. v. flore rubro pleno. Съ красными, махровыми цвѣтами.

P. v. camelliaeflora. Цвѣты похожи на пунцовую, махровую камелію.

P. v. caryophyllaeflora. Пестрые цвѣты, формою похожи на гвоздику.

P. v. rosaeflora. Цвѣты похожи на розу.

P. Davidiana. Крупные, блѣдно-розовые цвѣты.

P. fastigiata. Цвѣты тѣлеснаго цвѣта.

1322. *Petasites*. *Подбѣлз*. Изъ семейства *Synanthereae*. Дикорастущее.

1323. *Petasostylis nigrescens*. Съ темно-синими цвѣтами, нѣсколько похожими на цвѣты Фуксіи, которые бываютъ такъ многочисленны, что за ними не видать листьевъ и держатся весьма долго, если ихъ предохранять отъ вліянія солнечныхъ лучей. Разводится какъ однолѣтнее растеніе. Высѣваютъ ихъ раннею весною и разсаживаютъ въ Маѣ, причемъ дѣлаютъ черенки, которые и выдерживаютъ зимою въ теплицѣ, гдѣ строго предохраняютъ отъ сырости, которой вообще это растеніе не выносить.

1324. *Petroselinum sativum*. *Apium petroselinum*. *Петрушка*. Изъ семейства *Umbelliferae*. Двухлѣтняя корнеплодная овощъ, употребляемая въ пищу только вареная. Бываетъ двухъ видовъ: *корневая* и *травянистая* или *кудрявая*. Требуется сильной глубоко обработанной, нѣсколько влажной почвы, а травянистая — преимущественно свѣже унавоженной.

Петрушку сѣютъ прямо на гряды и въ парники или ящики въ теплицѣ, для ранней выгонки. Въ первомъ случаѣ, посѣвъ

дѣлается или съ осени, сухимъ сѣменемъ или раннею весною, тотчасъ по стаянїи снѣга, сѣменемъ моченымъ въ продолженїи 3-хъ и пророщеннымъ въ продолженїи 11 дней. До появленїя всходовъ посѣвъ поливается; затѣмъ гряды держатся въ чистотѣ и разрыхляются и если петрушка взойшла очень густо, ее прорѣжаютъ и окучиваютъ корни если хотятъ получить толстую. Для разведенїя травянистой петрушки лучше употреблять вудрявые сорта, чтобы не ошибиться срѣзая зелень и не принять за Петрушку ядовитое растенїе *Зноиху*. (См. *Aethusa cynopium*). На грядѣ длиною въ 10 сажень и шириною 1½ аршина высѣвается корневой петрушки 2 лота.

Ранняя выгонка производится нѣсколькими способами, на примѣръ: 1) сѣютъ въ Январѣ или Февралѣ, въ теплый парникъ; 2) Въ Августѣ сѣютъ петрушку въ холодный парникъ и обложивъ его навозомъ, всю зиму имѣютъ свѣжую зелень, и 3) сажаютъ мелкія растенїица, остающїяся при уборкѣ петрушки съ грядъ, въ ящики, обрѣзываютъ всю зелень и ящики эти ставятъ или въ теплицу или на окно жилой комнаты— всю зиму этимъ способомъ также имѣютъ свѣжую зелень.

Корневой петрушки лучший сортъ: *Сладкая Бордовская*.

1325. Petunia. Петунія. Изъ семейства *Solaneae* (*Salpiglossis integrifolia*). Растенїе, разводимое въ нашихъ садахъ большею частью отъ сѣменъ, какъ однолѣтнее. Цвѣтетъ все лѣто до глубокой осени. Высѣвается въ плошки съ рыхлою землею, въ умѣренной теплицѣ или теплой комнатѣ; весьма мелкія сѣмена присыпаются пескомъ. Взшедшія растенїя рассаживаютъ по нѣскольку штукъ въ горшочки съ сильной землею, а когда станутъ развиваться поливаютъ разъ въ недѣлю навозною жижею. Когда разростутся высаживаютъ по одиночкѣ въ горшки, или стуломъ въ грунтъ на солнечное мѣсто, причемъ разрастающїяся вѣтки расправляютъ такъ, чтобы засаженное петунїей пространство представляло собою, одинъ сплошной, цвѣтушій коверъ.

Махровая Петунія разводится преимущественно черенками, лѣтомъ, причемъ черенки эти сажаются въ маленькіе горшечки, которые ставятся въ парникъ, на зиму же переносятся въ холодную оранжерею.

Петунію можно разводить и содержать какъ комнатное растение.

Виды: *P. hybrida*.

P. hybrida flore pleno. Махровые цвѣты. Вообще махровую Петунію, на лѣто, лучше не высаживать изъ горшка, а вмѣстѣ съ горшкомъ сажать въ грунтъ.

P. inimitabilis. Лучшій видъ. Цвѣты съ пріятнымъ запахомъ, лиловые съ бѣлыми полосами.

P. nystaginiflora. *P. violaceae*. Если хотятъ имѣть это растение въ цвѣту позднею осенью или зимою, то его сѣютъ позже обыкновеннаго, а если и затѣмъ у него стануть ране формироваться цвѣточные почки, то ихъ срываютъ.

P. meleagris. Съ малиновыми, по всему цвѣтку крапинками.

P. van Volxem. Одинокій цвѣтокъ, лилово-голубой, въ жилкахъ, съ зеленою каймою, по краямъ цвѣтка.

P. prince Camille de Kohan. Прелестный цвѣтокъ, оранжево-красный, весь въ жилкахъ внутри, съ зеленымъ бордюромъ по краямъ.

P. comtesse Ellesmere. *P. grandiflora carminea*. *P. p. purpurea*. *P. g. venosa*. *P. kermesina splendens*. *P. integrifolia*. *P. marginata*. *P. mirabilis*. *P. striatiflora*.

1326. *Phacelia*. Однолѣтнее, калифорнійское, садовое, медоносное растение; сѣется въ Апрѣлѣ въ грунтъ, на почву не прихотливо.

Виды: *P. congesta*. Вышиною фута въ 1½, съ красивыми свѣтло-голубыми цвѣтами.

P. tanacetifolia. Выше предыдущаго вида, съ цвѣтами, еще болѣе свѣтлыми.

P. heliotropioides. Оранжевое растение.

1327. *Phaedranassa chloracra*. Луковичное растение, изъ семейства Амариллисовъ. Цвѣты въ видѣ повислыхъ воловѣльчиковъ, пунсовые и зеленоватые съ обоихъ концовъ. Подобно другимъ амариллисовымъ, требуетъ совершеннаго покоя, когда завали его листья, а потому его оставляютъ послѣ отцвѣтѣнія въ той же землѣ, въ которой онъ росъ, но весною, лишь только покажутся признаки жизни, его пересаживаютъ въ хорошую землю

и начинают поливать, постепенно увеличивая поливку до того времени, пока выростут его листья, или покажутся у него цвѣточные стебли.

1328. Phajus. Тепличная Орхидея. Цвѣтетъ и въ комнатѣ, требуетъ той же культуры, что и другія эпифитныя Орхидеи. Размножается отростками отъ корней. Цвѣты желтые или бѣлые, съ краснымъ или малиновымъ.

Виды: *P. maculatus*. Съ листьями, покрытыми желтыми крапинками.

P. marshalliae. Тепличная, земляная Орхидея съ суховатыми листьями, понижеными бѣлыми цвѣтами и съ желто-лимонною губою.

P. rosellus. Маленькое растеніе, съ розовыми цвѣтами. Когда, послѣ отдыха, растеніе это начнетъ давать признаки жизни, его пересаживаютъ и держать въ сильномъ теплѣ, не только во все время цвѣтенія, но пока у него сформируются новыя бульбы.

P. grandifolius. Съ весьма большими листьями; цвѣтокъ оранжевый; нижняя губа малиновая съ бѣлымъ.

P. albus. *P. bicolor*.

1329. Phalacraea Wendlandi. Тепличное растеніе съ голубыми цвѣтами; будучи поставлено къ окну теплицы, цвѣтетъ почти всю зиму.

1330. Phalaris arundinacea fol. variegatis. *Пестрая шелковая трава.* Многолѣтній злакъ, съ красными и бѣлыми полосами. Употребляется какъ декоративное растеніе, въ большихъ садахъ по берегамъ прудовъ, рѣчекъ и тому подобнаго. Листья его идутъ въ букеты. Зимуетъ въ грунту безъ покрывки. Можетъ быть разводимо и въ горшкахъ.

Другой видъ: *P. canariensis*. *Канареечное сѣмя.* Дикорастущая, у насъ, трава.

1331. Phalenopsis grandiflora. Тепличная Орхидея. Требуетъ культуры, свойственнымъ прочимъ эпифитнымъ орхидеямъ.

Другіе виды: *P. violacea*. Орхидея съ пурпурово-фіолетовыми цвѣтами.

P. zebrina. Съ вѣжно-желтыми цвѣтами, испещренными поперечными полосками.

P. amabilis. Съ бѣлыми цвѣтами, въ срединѣ нѣсколько испещренными коричневымъ. Рѣдкое растеніе вслѣдствіе особой трудности размноженія. Постоянно содержится въ весьма теплой атмосферѣ.

P. manie. Орхидея съ пониклыми метелками желтыхъ цвѣтовъ, съ коричневыми крапинками и бѣлою губою въ пурпуровыхъ пятнахъ.

P. Schilleriana. Съ пестрыми листьями и розовымъ цвѣткомъ.

P. Veitchiana. Цвѣты такіе же, какъ у предыдущей, только мельче, съ блѣдно-пурпуровою губою, въ болѣе темныхъ пятнахъ.

1332. Phalocallis plumbea. Изъ семейства Iridaceae. Оранже-рейнное растеніе. Голубой съ желтымъ цвѣтокъ, на высокомъ стеблѣ, похожъ на цвѣтокъ касатика. Цвѣтетъ почти все лѣто и осень. Размножается сѣменами. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей листовенной, дерновой и вересковой.

Другой видъ: **P. plumbea flore striato.** Цвѣтокъ съ мраморными разводами, бѣлый съ фіолетовымъ.

1333. Pharbitis limbata. Изъ семейства Convolvulaceae. Оранже-рейнное растеніе, съ большимъ, лиловымъ цвѣткомъ. Похожимъ на цвѣтокъ Ипомеи, отороченнымъ бѣлою, по краямъ, полосою и съ красными полосами внутри цвѣтка. На лѣто высаживается въ грунтъ.

1335. Pharus vittatus. Травянистое растеніе, съ пестрыми листьями. Употребляется въ теплицѣ для украшенія орхидейныхъ корзинъ, размножается отпрысками.

1336. Phasaeolus vulgaris. Фасоль. Турецкіе бобы. Однолѣтнее растеніе, разводимое въ огородахъ. Употребляется въ пищу стручками: свѣжими, сушеными, маринованными, солеными, а также бобиками, въ тѣхъ же видахъ, а равно обращенными въ муку. Пчелы берутъ взятку съ цвѣтовъ этого растенія. На сѣмена собираются стручья уже пожелтѣлые. Для скорѣйшаго ихъ дозрѣванія, плети съ поспѣвающими стручками сры-

ваютъ, и вѣшаютъ въ такое мѣсто, гдѣ бы онѣ могли исподволь высохнуть. Фасоль сажается прямо въ грунтъ, когда уже нельзя болѣе ожидать морозовъ, сухими, преимущественно двухгодовальными бобами; на 2 дюйма глубины, въ рыхлую, сухую почву неудобрявшуюся года два, но очень любить землю, прежде удобренную человѣческими экскрементами. Сажается на солнечное мѣсто. Высокіе сорта сажаются гнѣздами, — вершкахъ въ трехъ зерно отъ зерна и вершкахъ въ шести гнѣздо отъ гнѣзда. Низкіе сорта сажаются нѣсколько рѣже. Высокой фасоли, по всходѣ ея, ставятся жерди, не менѣе сажени длиною, перекрещивая между собою ихъ верхнія части и связывая ихъ мочалою. Также можно эти жерди, не перекрещивая ихъ, привязывать, на высотѣ 1½ аршинъ, къ жердевымъ перекладинамъ. Къ среднимъ сортамъ фасоли жерди ставятся аршина въ два, — къ низкимъ вовсе не ставятся жердей. Когда растеніе достигнетъ вершковъ двухъ роста, его окучиваютъ. Гряду должно держать чисто отъ сорныхъ травъ. Когда верхніе цвѣты фасоли распускаются, верхушки стебля обрываютъ, чтобы скорѣе вызрѣвали стручья.

На гряду въ 1½ арш. ширины и въ 10 саж. длины, сажается ½ фунта бобовъ.

Фасоль требуетъ очень малой поливки и то только во время засухи.

Фасоли извѣстны до 300 сортовъ. Они раздѣляются на: высокорослые и низкорослые; по формѣ сѣменъ на продолговатые, сплюснутые, эллиптическіе и круглые. Наиболѣе заслуживаютъ разведенія слѣдующіе сорта: *Восковая, черная, ранняя — Алжирская. Восковая бѣлая. Англійская, бѣлая — испанская. Рисовая — самая мелкая. Масляная — большая. Сахарная — желто-стручкая. Широкостручкая, бѣлая, турецкая Phaseolus multiflorus. Овощная фасоль. Цвѣтушіе бобы.* Съ яркими, огненно-красными цвѣтами; достигаетъ двухъ сажень вышины; сѣется въ началѣ Марта, въ теплицу; пересаживается по одиночкѣ, въ 5-ти-вершковыя горшки и когда хорошо укрѣпится, пересаживается въ грунтъ къ стѣнѣ, шпалерѣ или тому подобному.

Сѣмена этихъ бобовъ могутъ быть употребляемы въ пищу.
P. coccineus. (P. arabicus). Бобъ Испанскій. Низкорослые

предыдущаго вида; съ красно-суримовыми цвѣтами, размножается сѣменами, въ Апрѣлѣ или Маѣ.

Для употребленія въ пищу стручьями лучшіе сорта:

Жирные рейнскіе. Мале жемчужные, сахарные. Мале жемчужные безъ ниточекъ. Вишнево-красные. Высокорослые коловые.

Слѣдующіе низкорослые турецкіе бобы: *бѣлые коловые. Ранніе желтые. Ранніе плодовые. Нанкинз. Черные для теплицъ. Жемчужные или сахарные. Масляные, бѣлые. Пестрые, орлиные. Флажолы, самые ранніе.*

Надо имѣть въ виду: Стручьями въ пищу бобы употребляются преимущественно *высокорослые*. Бобы тѣмъ пригоднѣе въ пищу стручьями, чѣмъ болѣе стручекъ ихъ, созрѣвая морщится и сгибается. Для разведенія въ большихъ размѣрахъ преимущественно употребляются: *Бѣлые принцесины бобы (Ruggelsbohne)* и *золотые бобы (Hundert für eine)*.

Для выгонки въ парникѣ лучше другихъ: *Голландскіе, низкорослые; золотые Сансуси; Англійскіе бѣлые и бѣлые стручковые.*

Для ранняго посѣва въ открытый грунтъ пригоднѣе другихъ: *сѣрно-желтые низкорослые.*

Ранняя выгонка фасоли производится нѣсколькими способами, а именно:

А) Въ Февралѣ или Мартѣ, фасоль сажаютъ въ теплый парникъ, въ тощую землю; сильно провѣтриваютъ; поливаютъ между кустами теплою водою, такъ, чтобы не замочить растенія; желтые листья и опавшіе цвѣты обираютъ, чтобы не было гніенія; если на поверхности земли покажутся корни растенія, то ихъ засыпаютъ землею.

Б) Фасоль сажаютъ прямо на гряды, въ Апрѣлѣ, покрывая всходы соломенными щитами.

В) Въ концѣ Февраля сажаютъ фасоль въ 5-ти-вершковыя, до половины наполненные землею горшки и ставятъ въ умеренно теплое мѣсто или парникъ. Когда бобы взойдутъ, постепенно добавляют землю и въ половинѣ Апрѣля пересаживаютъ, стуломъ, на гряды, въ теплое мѣсто; на ночь и во время холодовъ, покрываютъ растеніе этими же горшками, дотѣхъ-поръ, пока совершенно прекратятся морозы. Такимъ обра-

зомъ фасоль будетъ готова къ употребленію во второй половинѣ Мая.

Г) Сажаютъ ранніе бобы въ маленькіе ящики, въ теплое мѣсто, а въ Маѣ пересаживаютъ на гряды, вмѣстѣ съ землею.

1337. Phellandrium aquaticum. *Укропъ водяной.* Многолѣтнее, ядовитое, дикорастущее растеніе; разводится какъ лекарственное, на влажной почвѣ, посѣвомъ съ осени. По понятію народному имѣетъ приворотное свойство, отчего и получило названіе (*Phello*—обольщать, *aner*—мужчина).

1338. Philadelphus. *Братоловъ. Воздушный жасминъ. Чубушникъ.* Изъ семейства *Philadelphaeae*. Кустарникъ, большею частью съ душистыми цвѣтами, служитъ однимъ изъ лучшихъ украшеній садовъ; размножается черенками или корневыми побѣгами.

Наиболѣе распространены два вида, а именно:

P. coronarius. *Воздушный жасминъ. Братоловъ бѣлый. Б. благословенный.* Съ бѣлыми душистыми цвѣтами; размножается черенками, отпрысками и раздѣленіемъ старыхъ кустовъ.

Воздушный жасминъ подвергается ранней выгонкѣ. Для этого употребляются небольшіе горшечные экземпляры преимущественно **P. grandiflorus**. Передъ Рождествомъ ставятъ въ теплицу; онъ зацвѣтетъ въ Февралѣ. Кустарникъ ежегодно сильно обрѣзываютъ, но только не передъ тѣмъ, какъ подвергать его выгонкѣ.

P. inodorus. *Б. не душистый.* Съ болѣе крупными, но не дающими запаха цвѣтами; размножается подобно предыдущему, а также сѣменами. Требуется покрывка на зиму.

Кромѣ того существуютъ слѣдующіе виды:

P. parviflorus. Низкорослый кустарникъ съ мелкими, почти колокольчатыми, бѣлыми, нѣсколько душистыми цвѣтами.

P. rubicaulis. Молодые побѣги его бываютъ красно-фіолетоваго цвѣта, съ желтоватыми, нѣсколько душистыми цвѣтами.

P. gordoniflore pleno. Тоже махровый.

P. grandiflorus. Низенькій кустарникъ, съ большими цвѣтами, безъ запаха.

P. ledebouri. P. speciosus. P. triflorus. P. zeihieri. P. californicus.

P. columbianus. Эти два послѣдніе вида требуютъ хорошей покрывки на зиму.

1339. *Philageria Veitchii*. Изъ семейства *Philesiaceae*. Оранжевое, вьющееся кустарное растеніе, съ блѣдными розово-пурпуровыми цвѣтами.

1340. *Philesia buxifolia*. Изъ семейства *Smilacaceae*. Оранжевое растеніе, съ висячими, пунсовыми цвѣтами. Требуется дерновой земли пополамъ съ листовѣнною. Размножается дѣленіемъ корней.

1341. *Philodendron*. Изъ семейства *Aroideae*. Тепличное и вмѣстѣ прекрасное, травянистое комнатное растеніе. Стебли его покрыты воздушными корнями; листья то продолговатые, то овальные или рукообразные, либо рукообразно раздѣленные. Цвѣты бѣлые или зеленоватые; размножается черенками, срѣзанными съ воздушными корнями. Зимой поливается мало. Требуется землю, составленную изъ лиственной пополамъ съ дерновою и съ незначительною примѣсью песку.

Виды: *P. calophyllum*. Съ продолговатыми, ланцетовидными листьями, длиною до 16 дюймъ.

P. Roezli. Вьющееся многолѣтнее растеніе, съ остроконечными, сердцевидными, свѣтло-зелеными листьями.

P. rubro punctatum. Безстебельное растеніе, съ большими, перисто-разсѣченными листьями.

P. selloum. Съ толстыми, кожистыми листьями, тѣмъ болѣе пригодно для комнатной культуры, что можетъ содержаться въ отдаленіи отъ свѣта. Короткій стволъ не развѣтвляется, а потому размножается собственно отнятіемъ верхушечнаго побѣга, оставляя на главномъ растеніи одинъ или два листа; впрочемъ культура того растенія таже, что и *P. pertusum*. *P. crassinervum*. *P. hederaceum*. *P. pinnatifidum*. *P. Zindenii*.

P. daguense. Тепличное вьющееся растеніе, съ темнозелеными атласистыми, овально сердцевидными листьями, съ пурпуровымъ штамбомъ.

P. pertusum. (*Monstera deliciosa*). Американское тепличное и вмѣстѣ комнатное, травянистое растеніе, съ большими круглыми, до половины какъ бы разрѣзанными листьями,

на длинных черенках; съ зеленоватыми цвѣтами. На стеблѣ противъ каждаго листа, выходитъ воздушный корень, опускающійся къ землѣ. Корень этотъ не отрѣзывается — войдя въ землю, онъ усиливаетъ ростъ растенія. Требуется земля, составленную изъ дерновой, съ примѣсю половины лиственной. Размножается черенками, для которыхъ срѣзывается верхушка растенія, съ воздушнымъ корнемъ, что впрочемъ обезображиваетъ растеніе; отрѣзъ замазываютъ бѣлою масляною краскою и засыпаютъ сухимъ пескомъ. Этому способу размноженія филодендрона предпочитается другой, а именно: вѣтвь съ воздушнымъ корнемъ пропускаютъ чрезъ горшокъ, составленный изъ двухъ частей. Части эти крѣпко связываютъ и насыпаютъ землю. Когда воздушный корень прирастетъ, вѣтвь отрѣзаютъ ниже составнаго горшка, его разнимаютъ и новое растеніе пересаживаютъ въ цѣльный горшокъ.

P. Williamsii. Тепличное растеніе, съ толстымъ стеблемъ и остро-стрѣловидными листьями, на длинныхъ черенкахъ.

P. Amurense. Амурское пробковое дерево.

P. erubescens. Съ большимъ краснымъ цвѣткомъ.

1342. Phlomis tuberosa. Зап. Запѣ трава. Дикорастущее, многолѣтнее медоносное растеніе. Пухъ его цвѣтковь употребляется на свѣтильни, отчего и получилъ названіе (*phlogmos*—пламя).

P. fruticosa. Оранжевое растеніе.

Другіе виды **P. agraria.** Многолѣтнее садовое растеніе

P. leonorus. Кустарникъ съ оранжево-красными цвѣтами. Употребляется для ранней выгонки. Съ этою цѣлью большія растенія съ цвѣточными почками вынимаютъ изъ грунта, сажаютъ въ горшки и вносятъ въ оранжерею, гдѣ они и цвѣтутъ Октябрь и Ноябрь.

P. pungens. Желѣзнякъ. Дикорастущее.

1343. Phlox. Флоксъ. Пламникъ. Изъ семейства Polemoniaceae такъ названъ пояркости цвѣтвъ (*phlox*—пламя). Бываютъ однолѣтніе и многолѣтніе. На землю вообще не очень прихотливъ, но лучше любить рыхлую, дерновую, сильную землю и солнечное положеніе, во время цвѣтенія поливается жидкимъ удобреніемъ. Зимующіе флоксы достигаютъ наилучшаго развитія во второй годъ послѣ цвѣтенія. Раннею весною надле-

жить вырѣзать лишніе побѣги, когда они достигнутъ четырехъ дюймовъ, оставляя 5 или 6 лучшихъ побѣговъ. Вырѣзанные побѣги сажаются какъ черенки и часто цвѣтутъ въ тотъ же годъ, но преимущественно на слѣдующій. Растеніе въ саду должно защищать отъ восточнаго вѣтра и подвязывать къ палочкамъ, чтобы не ломалось. Растеніе, посаженное одиночкою, цвѣтетъ лучше. Для размноженія лучше всего съ осени вырытый флоксъ сберегать въ оранжереѣ или подвалѣ и приставлять въ Февралѣ. Побѣги надлежитъ срѣзывать на черенки и когда окоренятся исподволь приучать къ воздуху, затѣмъ высаживать въ грунтъ. Флоксы можно разводить и въ горшкахъ. Для этого лучшіе экземпляры, давшіе лѣтомъ наиболѣе побѣговъ, сажаютъ осенью въ 8 и 11 дюймовые (въ діаметрѣ) горшки, исподволь просушивъ, ихъ выносятъ въ подвалъ на зиму (въ 3—4° Р.); въ Мартѣ пересаживаютъ въ новую землю и выносятъ въ оранжерею гдѣ и ставятъ какъ можно ближе къ свѣту, чтобы не потянулись. Если горшокъ окажется малъ и корни оплетутъ его внутри, то пересаживается въ большій горшокъ, отнюдь не тревожа кома. Съ перваго времени пристановки поливаютъ жидкимъ удобрѣніемъ, преимущественно овечьимъ.

Сѣмена флоксовъ высѣваются въ половинѣ Марта въ ящики въ оранжереѣ или парникѣ. Отъ лучшихъ сѣменныхъ экземпляровъ въ Августѣ дѣлаютъ черенки и даютъ имъ укорѣниться въ горшкахъ подъ колпаками или рамами, а зимою содержатъ въ оранжереѣ. Чтобы имѣть ранніе цвѣты, флоксы высаживаются осенью изъ грунта и содержатъ въ холодной оранжереѣ или разводятъ раннимъ посѣвомъ, получая затѣмъ цвѣты въ Маѣ. Желашіе имѣть въ цвѣту флоксъ Друмонди осенью и весною, держать его въ холодной оранжереѣ, въ горшкѣ до Декабря.

Однолѣтній флоксъ имѣетъ много видоизмѣненій.

P. Drumondi Radetzki. Цвѣты кармозиновые, съ бѣлыми краями.

P. D. Louis gréll. Цвѣты ярко-кармозиновые.

P. acuminata. Флоксъ горный.

P. americana. Ф. американскій.

P. amoena. Ф. пріятный.

P. autumnalis. Ф. осенній.

- P. bimaculata.* Ф. двупятнистый.
P. Brownii. Ф. Брауна.
P. canadensis. Ф. канадский.
P. carnea. Ф. палевый.
P. docussata. Ф. красноцвѣтный.
P. d. flore albo. Ф. бѣлый.
P. divaricata. Ф. весенний, съ лиловыми цвѣтами.
P. elegans. Ф. красивый.
P. formosa. Ф. прекрасный.
P. glomerata. Ф. устой.
P. intermedia. Ф. средний.
P. Listoniana. Ф. Листовъ.
P. odorata. Ф. душистый.
P. o. elegans. Ф. душ. красивый.
P. o. rosea. Ф. душ. розовый.
P. omniflora. Ф. весьма красивый.
P. pallida. Ф. палевый.
P. paniculata. Ф. метелковатый.
P. p. alba. Тоже бѣлый.
P. Philadelphia. Ф. Филадельфійскій.
P. pilosa. Ф. волокнистый. Съ мелкими цвѣтами.
P. praestans. Ф. превосходный.
P. speciosa. Ф. видный.
P. suaveolens. Ф. душистый.
P. undulata. Ф. волокнистый.
P. verna. Ф. весенний. *P. subulata.* *P. setacea.* Съ красными цвѣтами.
P. Nelsani. *P. nivalis.* Съ бѣлыми цвѣтами.
Виды многолѣтняго флокса:
P. cordata. Ф. сердцелистный.
P. scabra sweet. *P. siebmanni.* *P. disticha.*
P. acominata. Ф. остролистный.
P. corimbosa. Ф. букетный.
P. pyramidalis. Ф. пирамидальный.
P. maculata. fol. argentea. Съ бѣлыми цвѣтами и бѣло-узорчатыми листьями.
P. penduliflora. Ф. повислый.
P. suffruticosa. Ф. полукустарный.
P. carolina. Ф. каролинскій.

P. Reptans. *Ф. ползучий*, съ розово-лиловыми цвѣтами и желто-узорчатыми листьями.

Въ каталогахъ сѣменоторговцевъ, мы встрѣчаемъ множество разностей многолѣтняго флокса отличающихся одинъ отъ другаго преимущественно окраскою цвѣтовъ.

1344. Phoenicoporum. Родъ Пальмъ. Стволъ покрытъ иглами. Прекрасная, но очень нѣжная пальма, весьма дорогая и для комнатной культуры весьма не пригодная. До-сихъ-поръ извѣстенъ только одинъ родъ ея.

P. sechellarum. Размножается сѣменами.

1345. Phoenix. *Финиковая Пальма.* Родъ Пальмъ. (*Phoenix* греческое названіе Финика). Тепличное растеніе съ большими перистыми листьями, согнутыми вдоль. Плоды этого растенія извѣстны въ торговлѣ подъ именемъ *Финиковъ*. Размножается сѣменами. Требуется листовенную землю, съ примѣсью половины дерновой и четвертой противъ количества листовенной земли, части песку. Можно содержать въ комнатѣ.

Виды: **P. dactulifera.** Можетъ расти и въ оранжереѣ при 8° Р. воспитывается для листьевъ, употребляемыхъ при католическомъ богослуженіи.

P. canariensis. Растетъ на Канарійскихъ островахъ, отличается отъ настоящей Финиковой Пальмы, тѣмъ, что имѣетъ косточки плода гораздо круглѣе, напоминающія своею формою кофейныя зерна.

P. Sylvestris. *Льсная Финиковая пальма.* Растетъ деревомъ, вышиною сажень въ шесть. Стволъ ея покрытъ сѣрою корою, плотно срастающеюся съ твердою бѣлою древесиною. Листья перистые. Плодъ похожъ на сливу, содержитъ въ сладкой и мучнистой мякоти, продолговатый орѣхъ, который Индѣйцы жуютъ съ листомъ бетели и извѣстно какъ орѣхи **Агеса.** Изъ плода добываютъ сахаръ.

P. reclinata. Африканское дерево. Сѣмена его Кафры употребляютъ какъ кофе.

P. farinifera. Даетъ муку въ родѣ саговой.

P. humilis. P. pumila. P. tenuis.

1346. Pholidocarpus. Родъ Пальмъ. Весьма красивое дерево, съ

большимъ цѣльнымъ листомъ. Размножается сѣменами. Единственный, извѣстный видъ его: **P. Thur.**

- 1347. Phormium.** *Новозеландскій ленъ.* Садовое, декоративное растеніе, сажается въ вазы для украшенія террасъ и балконовъ. Изъ семейства **Liliaceae**. Цвѣтеть рѣдко. На родинѣ его, въ Новозеландіи, изъ его крѣпкихъ волоконъ выработываютъ корабельныя снасти и суровый холстъ.

Разновидности его: **P. tenax Cookii.** *Новозеландскій ленъ Кука*, цвѣтеть когда растеніе еще молодо.

Другіе виды: **P. colensoi variegatum.** Весьма красивое оранжерейное растеніе, съ бѣлыми полосами на зеленыхъ листьяхъ.

P. tenax. Оранжерейное растеніе. Въ Новой Голландіи даетъ очень крѣпкую пряжу.

P. tenax nigra pictum. Оранжерейное многолѣтнее, низенькое растеніе. Темно-зеленые листья съ темно-пурпуровыми краями.

P. tenax fol. variegatis. Съ желто-пестрыми листьями. Оранжерейное растеніе.

P. saundersii. Оранжерейное, многолѣтнее растеніе. Листья съ буро-краснымъ ободкомъ.

- 1348. Phragmites communis versicolor.** Многолѣтнее садовое растеніе.

- 1349. Phygelis capensis.** Изъ семейства **Scrophulariaceae**. Оранжерейное растеніе, съ пунцовыми, висящими цвѣтами, въ серединѣ оранжевыми.

- 1350. Phrynium unilaterale.** Изъ семейства **Myrtaceae** тепличное, многолѣтнее, безстебельное растеніе, съ бѣлыми цвѣтами. Любить иловатую землю.

- 1351. Phycella corusca.** Луковичное растеніе, изъ семейства **Amaryllidaceae**, съ большими малиновыми цвѣтами, желтыми у основанія и съ желтыми тычинками и пестиками. На зиму вынимается изъ грунта и содержится подъ защитою; на лѣто высаживается на открытый воздухъ.

- 1351 а. Phylica ericoides.** *Остѣ-Индскій верескъ.* Оранжерейное

растение, съ вѣчно-зелеными листьями и бѣлыми душистыми цвѣтами. Требуется вересковую землю и частой поливки лѣтомъ. Цвѣтетъ съ Сентября по Мартъ.

Другіе виды: *P. capitata*. *P. paniculata*. Эти два вида, вѣчно-зеленаго, оранжерейнаго растенія, цвѣтутъ рано весною. Тотчасъ послѣ того, какъ растение отцвѣтетъ, его надлежитъ низко обрѣзать.

P. acerosa. *P. rosmarinifolia*. *P. buxifolia*. *P. axillaris*. *P. thymifolia*. *P. rubra*. Съ красными цвѣтами.

1352. *Phylclados trichomanoides*. Изъ семейства *Conifereae*. Оранжерейное, высокое и быстро растущее хвойное дерево. Легко размножается черенками. Форма его листьевъ представляетъ рѣзкое уклоненіе отъ прочихъ хвойныхъ породъ.

Другіе виды: *P. asplenifolia*. Съ мутовчатыми, развѣтвленными сучьями, дающими растенію оригинальной видъ.

P. hypophylla. Цвѣточные стебельки его покрыты колючками.

1353. *Phyllarthron bojerianum*. Тепличное растение съ большимъ розовымъ цвѣткомъ и оригинальными листьями, какъ бы состоящими изъ двухъ, выросшихъ одинъ изъ другаго. Требуется большаго тепла и много свѣту. Любитъ частое опрыскиваніе и нѣкоторую влажность лѣтомъ, а зимою, сухаго содержанія. Требуется чистую вересковую землю. Размножается черенками, требующими большаго ухода. На черенки рѣжутъ кончики не совсѣмъ еще созрѣвшихъ побѣговъ и сажаютъ ихъ очень глубоко въ чистый, бѣлый, сухой песокъ. Теплота и влажность тепличная замѣняетъ имъ поливку, которую производятъ только слегка и въ крайнемъ случаѣ. Покрываютъ стекляннымъ колпакомъ и на-сухо его чисто вытираютъ внутри. Держать черенокъ при 20° Р. и когда онъ примется, высаживаютъ въ надлежащую почву и опять-таки ставятъ въ тепличку, когда же черенокъ примется окончательно, то постепенно приучаютъ его къ воздуху и наконецъ вынимаютъ изъ теплички.

1354. *Phyllocactus*. См. *Cactus*.

1355. *Phyllopodium regidum*. Оранжерейное растеніе.

1356. *Phyllotaenium Lindeni*. Изъ семейства Ароидныхъ. Тепличное, многолѣтнее растеніе съ листьями, испещренными бѣлыми пятнами.

1357. *Physalis*. *Можжуха*. Изъ семейства *Solanaceae*. Однолѣтнее, садовое растеніе, не заслуживаетъ разведенія.

Виды: *P. peruviana*. Однолѣтнее растеніе, даетъ вкусный, десертный, желтый, круглый плодъ, величиною съ вишню. Любитъ тучную рыхлую почву и солнечное мѣсто.

P. Alkekingi. *Мяхунка обыкновенная*. Многолѣтнее, грунтовое, садовое растеніе, съ бѣловатыми цвѣтами и оранжевымъ плодомъ. Размножается сѣменами или побѣгами отъ корней.

1358. *Physalobium carinatum*. Оранжевое растеніе.

1359. *Phytelephas*. Родъ пальмъ. Имѣетъ ползучій, восходящій стволъ, оканчивающійся великолѣпною короною перистыхъ листьевъ.

Виды: *P. macrocarpa* или *Палу-пунту*. Тепличная пальма; можетъ расти въ комнатѣ, съ листьями сажень до двухъ длиною, выходящими букетомъ изъ лежащаго на землѣ деревянистаго стебля; размножается сѣменами; требуетъ листовенную землю съ примѣсю половины дерновой и немного песку. Изъ мякоти, окружающей орѣхъ этой пальмы, употребляемый въ пищу готовится вино.

P. aequinoctialis.

1360. *Phyteuma spicatum*. *Растрогозъ*. Дикорастущее.

Другой видъ: *p. comosa*. Многолѣтнее, садовое растеніе, требуетъ покрывки на зиму.

1361. *Phytolacca esculenta*. *Фитолакъ виргинскій, Шпинатъ американскій*. Многолѣтнее, садовое, грунтовое растеніе. Разводится сѣменами, которые сѣютъ въ парникахъ или горшкахъ. Разсаду высаживаютъ на солнечное мѣсто. Листья употребляютъ въ пищу.

Другой видъ: *P. decandra*. Разводится для сѣменъ, въ которыхъ содержится розовое красильное вещество, *баканъ*, употребляемое въ кондитерскихъ, отчего и получило названіе. (*Phyton* — растеніе, *lacca* — Лакъ).

1362. *Pilogyne*. Однолѣтнее садовое растеніе, не заслуживаетъ разведенія.

1363. *Pimelea decussata*. *Крестообразная Пимелея*. Изъ семейства *Thymelanceae*. Оранжерейно едеревцо. Все лѣто, начиная съ Апрѣля, бываетъ покрыто розовыми цвѣтами. Любитъ вересковую землю.

Другіе виды: *P. Hendersoni alba*. Оранжерейный кустарникъ съ многолѣтними листьями и бѣлыми цвѣтами.

P. rosea. *P. spectabilis*. *P. elegans*. Съ бѣлыми цвѣтами и золотисто желтыми пыльниками. Сильно страдаетъ отъ излишней сырости и излишней сухости. Часто прищипывается чтобы сильнѣе кустилось. Зимой содержится въ свѣтломъ мѣстѣ оранжереи, а лѣтомъ на открытомъ воздухѣ, въ притѣненіи. Размножается черенками или прививкою къ другимъ видамъ того же рода.

P. decussata. Съ красивыми цвѣтами.

1364. *Pimpinella saxifraga*. *Бедренецъ каменоломный*. Изъ семейства *Umbelliferae*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное и лекарственное растеніе; цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ. Любитъ влажное тѣнистое мѣсто.

Другіе виды: *P. magna laciniata*. *Оршумъ*. Дикорастущее.

P. anisum. *Анисъ*. Сѣмена употребляются какъ пряность; изъ нихъ добывается масло и они идутъ на приготовленіе воды.

P. magna. *Настоящій анисъ*.

1365. *Pinckneya pubescens*. Оранжерейное растеніе, изъ Сѣверной Америки, съ красивыми листьями, на розовыхъ черенкахъ и бѣлыми цвѣтами, испещренными темно-розовыми крапинками. На зиму теряетъ листь.

1366. *Pintenectitia tuberculata*. *Beaucarnea*. Тепличное растеніе, переносающее и комнатную культуру. Стебель этого растенія необыкновенной формы: у основанія онъ похожъ на луковицу; листья дугообразные, узкіе и длинные; желтоватый цвѣтокъ на стеблѣ длиною аршина полтора. Размножается сѣменами. Любитъ листовенную землю пополамъ съ дерновою.

Другіе виды: *P. recurvata*. *P. stricta* *P. glauca*.

1367. Pinus. Сосна. Изъ семейства *Abietineae*. Всѣмъ извѣстное дерево, растущее въ дикомъ состояніи; разводится въ садахъ, держится въ оранжереѣ и въ комнатѣ, гдѣ хорошо могутъ идти только нѣкоторые виды. Разводится сѣменами. Требуется земля вересковую, съ примѣсью четвертой части песку.

Виды: *P. pumilis*. Сосна горная. Низкорослое дерево растетъ на Европейскихъ горахъ.

P. palustris. Австрійская или черная сосна. Съ тонкими, длинными иглами.

P. resinosa. Американская сосна.

P. insignis.

P. sylvestris. Наша обыкновенная сосна. Цвѣтетъ въ Маѣ, принадлежитъ къ числу медоносныхъ растений.

P. Pallasiana. С. Крымская.

P. pinaster soland. С. Приморская.

P. austriaca (nigricans). Лиственница австрійская.

P. amabilis. Листья съ серебристо-бѣлыми концами.

P. Brunoniana. Съ длинными листьями, имѣющими на концахъ сильный голубоватый оттѣнокъ.

P. Massoniana. Оранжерейное дерево.

P. deodara. Съ листьями горизонтально отстоящими и висячими.

P. canadensis. Тоже.

P. devoniana. Иглы сидятъ по 5 вмѣстѣ.

P. filifolia. Тоже и достигаютъ 1½ футъ длины.

P. longifolia. Иглы сидятъ по 3 вмѣстѣ.

P. pinsapo. Пирамидальное дерево, съ голубоватыми зелеными листьями.

P. Montezuma. Съ сѣро-зелеными жесткими листьями.

P. Nordmaniana. Изящное пирамидальное дерево.

P. pindron. Съ иглами, снизу сребристо-бѣлыми.

P. Sabiniana. Съ тонкими до 15 дюймовъ длины листьями.

P. Webbiana. Съ темно-зелеными, снизу бѣловатыми листьями.

P. rubra. С. Красная. Съ красноватою древесиною; шишки расположены мутовкою, сидятъ по нѣсколько вмѣстѣ.

P. maritima. С. Приморская. Растетъ въ Южной Европѣ, по песчанымъ морскимъ берегамъ; иглы желтовато-зеленаго цвѣта.

P. Laricio. *C. Корсиканская.* Высокое дерево, растетъ въ Корсиканскихъ горахъ, имѣетъ пирамидальный видъ и желтовато-зеленыя иглы.

P. Halepensis *C. Алепская.* Растетъ въ Сиріи, а также на югѣ Франціи. Боятся мороза; съ весьма тонкими, прилегающими къ стволу иглами; растетъ на самой тощей почвѣ.

P. pinea. *C. каменная. C. Итальянская.* Дико растетъ на Югѣ Европы. Сѣмена ея употребляются какъ лакомство. Высокое и очень красивое дерево.

P. variabilis. *C. желтая. C. разнолистная.* Дико растетъ въ Сѣв. Америкѣ.

P. rigida. *C. колючая. C. Виргинская.* Иглы расположены по 3 вмѣстѣ; дерево съ черноватою корою.

P. Thaeda. **P. balsamea.** *C. бальзамическая. Ладонникъ.* Американское дерево, достигающее 80 футъ, съ тонкими иглами и широкою вершиною.

P. Seratina. *C. Медленная.* Американское дерево.

P. australis. *C. Австралийская.* Большое американское дерево, съ блестящими ярко-зелеными иглами.

P. strobis. *Веймутова Сосна.* Сѣверо-Американское дерево, разводится въ Европѣ; тонкія иглы ея сидятъ по 5 штукъ вмѣстѣ, достигаетъ 150 футъ высоты, растетъ весьма быстро.

P. Mandshurica. *C. Манджурская.*

P. davurica. *C. Даурская. Иракта.*

P. pichta. **P. picea.** **Abies sibirica.** *Сибирская пихта.* Дикорастущее, въ сѣверномъ краѣ, дерево; цвѣтетъ въ Апрѣлѣ и въ Маѣ, принадлежитъ къ медоноснымъ растеніямъ.

P. abies du Roi. *Европейская пихта. Польская пихта.*

P. abies. *Европейская ель.*

P. obovata. *Сибирская ель.*

P. alba. *Бѣлая американская ель.*

P. nigra. *Черная американская ель.*

P. Ladebouri. *Сибирская лиственница. (Larix sibirica).*

P. Larix. *Лиственница.* Дикорастущее преимущественно на сѣверѣ, превосходныхъ свойствъ дерево; разводится въ садахъ и оранжереяхъ какъ декоративное растеніе; съ цвѣтовъ его, раскрытыхъ въ Апрѣлѣ и Маѣ, пчелы берутъ взятокъ.

P. Cedrus. *Кедръ Ливанскій.* Издревле извѣстное, одно изъ красивѣйшихъ деревьевъ, съ темно-зеленою хвоею; въ дикомъ

состояніи растеть въ горахъ Азіи; растеть весьма медленно, достигаетъ 30 ф. въ вышину; размножается посѣвомъ сѣменъ весною; любить хрящеватую и нѣсколько сухую почву; выносить суровыя зимы; но при искусственномъ разведеніи, молодыя деревца требуютъ защиты зимою.

P. Cembra. *Кедръ Сибирскій.* Смолистое дерево. Растеть въ дикомъ состояніи на горахъ Швейцаріи, Тироля, въ Сибири и въ сѣверо-восточной Россіи. Растеть медленно; достигаетъ 120 футовъ вышины; выносить суровый климатъ и любить довольно влажную, тучную, лѣсную почву. Орѣхи его употребляются въ пищу и даютъ масло; древесина весьма цѣнится.

P. Cembra pumilla. *Кедръ сланецъ.* Кустарникъ — видоизмѣненіе Сибирскаго кедра, съ весьма мелкими орѣхами. Стелется по землѣ. Молодые побѣги его имѣютъ противоязвотное свойство.

1368. Piper. *Перецъ.* Семейства *Piperaceae*. Вьющееся тепличное растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ; размножается черенками и сѣменами; плоды въ видѣ круглыхъ зеренъ, извѣстны въ продажѣ какъ пряность; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: **P. Betle.** *Бетель.* *Тенбуръ.* Древесное растеніе съ яйцевидными листьями, которыми Индѣйцы обертываютъ Ареку, употребляемую ими какъ жвачку.

P. nigrum verum. *Перецъ Остъ-индскій.*

P. magnoliaefolium. Оранжевое растеніе.

P. arborescens.

Есть виды Перца, плоды которыхъ имѣютъ лекарственныя свойства, таковы:

P. cubeba **P. incanum.**

1369. Pistacia vera. *Настоящее фисташковое дерево.* Изъ семейства *Cassuvicae*. Даетъ орѣхи, извѣстные въ употребленіи подъ именемъ *фисташекъ*.

Другіе виды: **p. mutica.** *Сакисъ - Агачъ.*

P. Lentiscus. *Мастика.* Даетъ ароматную смолу-употребляемую въ лекарство и для куренія.

P. terebinthus. *Скипидарное дерево.*

1370. Pistia occidentalis. Из семейства **Aroideae**. Однолѣтнее плавающее растеніе, весьма пригодное для акваріумовъ, но преимущественно такихъ, въ которыхъ воду держутъ, имѣющую тепла отъ 16 до 20° Р. Растеніе это образуетъ листья на концѣ стеблей, розетками и размножается отпрысками; держится на поверхности воды посредствомъ листьевъ, имѣющихъ множество кѣлочекъ наполненныхъ воздухомъ.

Уходъ за этимъ растеніемъ тотъ же, что и за **Eichornia**.

Другіе виды: **P. texensis**. Отличается закругленнымъ спереди листомъ и меньшимъ ростомъ.

P. Stratiotes. Каждый корешокъ этого растенія даетъ новые ростки.

1371. Pisum sativum. *Горохъ*. Однолѣтнее растеніе, разводимое на поляхъ и огородахъ, употребляемое въ пищу сырымъ и сушенымъ въ видѣ муки, крупы и другими способами приготовленнымъ. Съ цвѣтовъ этого растенія пчелы берутъ взятокъ. Въ огородѣ сажается прямо на грядѣ, на глубину пальца, на 2 вершка зерно отъ зерна, по двѣ горошины вмѣстѣ. Сажается тотчасъ послѣ того, какъ растаетъ земля. При посадкѣ горохъ предварительно сутки мочать, чтобы дать ростки, грядѣ покрываютъ соломой, сѣнникомъ или мелкимъ хворостомъ въ предохраніе отъ птицъ. Когда покажутся всходы покрывку снимаютъ, но когда всходы подымутся на вершокъ къ нимъ пригребаютъ землю и у cadaго всхода втыкаютъ хворостину, аршина въ полтора, перекрещивая ихъ между собою. Грядѣ держать въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ, разрыхляютъ и изрѣдка поливаютъ. Горохъ не любитъ свѣже-удобренной земли, но требуетъ легкую почву на открытомъ мѣстѣ, удобренную сухой золою, и при самомъ посѣвѣ или при зацвѣтаніи полizei растворомъ золы въ водѣ. На грядѣ шириною въ 1½ аршина и длиною въ 10 сажень, высаживается полфунта сухихъ сѣменъ. Чтобы имѣть весной свѣжій горохъ, его сажаютъ каждые 14 дней, до Іюля. Въ парникѣ горохъ очень трудно выгнать, потому что онъ подопрѣваетъ, а для ранней выгонки въ грунтѣ извѣстны два способа:

1) Низкорослые сорта сажаютъ на теплыя гряды, открытыя къ югу, въ половинѣ Февраля и 2) сѣютъ въ полутеплый парникъ, снимая съ него рамы, какъ можно раньше.

Горохъ раздѣляется по росту: на *высокорослый* и *низкорослый*; по качеству на *сахарный*, который ѣдятъ со стручкомъ и для лущенія; по цвѣту зеренъ, на *бѣлый*, *зеленый*, *желтый*, *бурый*, *пестрый*, по формѣ зеренъ на *круглый*, *плоскій*, *уловатый*; по времени посѣва: на *ранний* и *поздний*. Лучшие сорта: а) *сахарнаго* гороха: *Англійскій*, *широкостручный*, *ранний*. Тоже *поздний*. *Большой зеленый голландскій*. (сѣрый исполнинскій). *Французскій ранний*, *парниковый*. *Марровъ новый*. *Кармиковый де Грасъ*.

б) Гороха для лущенія:

Принцъ Альбертъ. *Императорскій*. *Низкій*, *толстокожій англійскій* очень мелкій, лучший для сушки. *Большой Викторъ*. *Большой восковой*; *золотой*. *Сѣрый Курляндскій*, самый поздний, съ крупными зернами; легко перерождается. *Мамунтъ*. *Марровъ бѣлый высокій*. Тоже *низкій*. Тоже *зеленый*. Тоже *Евгенія*. *Маклина Адвайсеръ*. *Лордъ Рагланъ*. *Nec plus ultra*.

Для посѣва надлежитъ выбрать чистыя горошины, безъ пятенъ, такъ какъ дырочка на горошинѣ означаетъ, что въ горошинѣ находится *жука* или *личинка* и слѣдовательно, сажая такое зерно размножаешь насѣкомое.

Другой видъ: *P. arvense*. *Полевой горохъ*.

1372. Pitcairnia. Изъ семейства *Bromeliaceae*. Очень красивое теплое и вмѣстѣ комнатное, корневое травянистое растеніе, съ длинными, узкими листьями, на нижней сторонѣ покрытыми бѣлою пылью. Цвѣты бѣлые, розовые, желтые или алые. Размножается отростками отъ корня, требуетъ землю, составленную изъ вересковой и лиственной.

Виды: *P. Altensteinii*. Съ весьма большимъ колосомъ пунцовыхъ цвѣтовъ, изъ которыхъ выходятъ длинные, бѣлые съ желтымъ тычинки.

P. A. var gigantea. Размѣръ цвѣтка несравненно крупнѣе предыдущаго.

P. echinata. Съ широкими, зубчатыми листьями. Цвѣты оранжево-желтые.

P. nubigena. Съ большимъ, малиново-розовымъ цвѣткомъ.

P. maidifolia. Съ малиновыми цвѣтами.

P. chilensis. *P. pyramidalis*. *P. lutea*. *P. superba*.
P. tubulaeformis.

Слѣдующіе виды цвѣтутъ зимою: *P. latifolia*. *P. leucotoma*. *P. splendens*. *P. punicea*.

Оранжевые виды: *P. angustifolia*. *P. furfuracea*.

1373. *Pittosporum*. *Питтоспоръ*. Семейство Питтоспоровыхъ. Оранжевое деревцо, можетъ расти и въ комнатѣ, съ желтоватыми, душистыми цвѣтами. Размножается сѣменами, черенками и отводками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Будучи поставленъ въ тепло, цвѣтеть зимою.

Виды: *P. Tobira*. *P. Tobira. fol. variegatis*. Съ прекрасными пестрыми листьями.

P. Undulatum. *П. Волнистый*. Съ бѣлыми, душистыми цвѣтами.

P. discolor. Съ розовыми цвѣтами. Въ холодной оранжерей распускается въ Январѣ или Февралѣ.

P. crassifolium. Кустарное растеніе, съ многолѣтними листьями и темно-пурпуровыми цвѣтами.

P. nanum. Низенькій, оранжевый кустарничекъ.

P. coriaceum. *P. ferrugineum*. *P. Mayi*.

1374. *Pityrosperma aserinum*. Многолѣтнее садовое растеніе, требуетъ покрывки на зиму.

1375. *Plasea grandiflora*. Многолѣтнее оранжерейное, луковичное растеніе, изъ семейства Амариллисовъ; даетъ длинныя, узкіе листья, съ завернутыми краями и много крупныхъ бѣлыхъ цвѣтовъ, съ ярко-коричневыми полосками.

1376. *Plagianthus Lyallii*. Маленькое оранжерейное деревцо съ бѣлыми цвѣтами и желтыми въ нихъ тычинками.

1377. *Plantago major*. *Подорожникъ крупный*. Семейство *Plantagineae*. Дикорастущее.

Другіе виды: *P. major var. atropurpurea*. Многолѣтнее, зимующее въ грунтѣ растеніе, съ зеленоватыми цвѣтами и пурпуровыми листьями; размножается сѣменами.

P. lanceolata. *Арженикъ*.

P. arenaria. Толстушка.

P. maritima. Вербейникъ.

1378. *Platanthera radiata.* Оранжевая Орхидея съ бѣлыми цвѣтами.

1379. *Platanus.* Платанъ. Чинаръ. Великолѣнное дерево, съ раскидистыми вѣтвями.

Виды: *P. orientalis.* Яворъ. Чинаръ восточный. Дерево большихъ размѣровъ, переноситъ морозы. На почву не прихотливо, лишь бы была питательна. Размножается сѣменами, отводками и черенками.

P. occidentalis. Чинаръ западный. Большое дерево; любить низменную и влажную почву; въ молодости требуетъ защиты, на зиму размножается сѣменами и черенками.

1380. *Platanus.* Родъ Пальмъ. Гладкоствольное дерево, съ перистыми листьями, достигаетъ 60 футовъ; размножается сѣменами. Известенъ единственный видъ этой пальмы: *P. chiragua.*

1381. *Platanus.* Однолѣтное садовое растеніе, не заслуживаетъ разведенія.

1382. *Plectocarpus americanus.* Однолѣтное растеніе, сѣется прямо въ грунтъ; его синіе и розовые цвѣты распускаются въ Іюнь.

1383. *Plectocarpus.* Родъ Пальмъ. Тепличное, лазящее растеніе, требуетъ той же культуры, что и другія пальмы; размножается отдѣленіемъ дѣтокъ, которыя отнимаются отъ кореннаго растенія, когда образуютъ хоть одинъ корешокъ, при чемъ ставятся въ теплый парничекъ.

Виды: *P. elongata.* Растетъ слишкомъ быстро, чтобы ее содержать въ теплицѣ.

P. hystrix.

1384. *Plectocarpus variegata.* Китайское растеніе, превосходно растущее въ густой тѣни и самое прочное для комнатъ, съ бурными цвѣтами, выходящими прямо изъ подземныхъ стеблей. размножается дѣленіемъ корней.

1385. *Plectocarpus.* Плектаромы. Тепличное, весьма красивое ра-

стеніе, нѣтъ семейства Геснерій, невзыскательно относительно культуры и удобно къ пересылкѣ сухими корневищами, какъ анемоны или ранункулы.

Виды: *P. naegelioides bicolor*. Листья съ изнанки пурпуровые; большой цвѣтокъ съ широкимъ звѣномъ, трубка его снаружи розовая, внутри свѣтло-желтая, съ шафрановыми пятнами.

P. aureo-lilac. P. aureo-roseum. Цвѣтокъ розовый, внутри желтый, испещренъ крапинками.

P. candidum. Высокое рвстеніе, съ большими бѣлыми цвѣтами, середина въ крупныхъ, желтыхъ пятнахъ.

P. corallium. Стебель красный, листья темные; большой, красно-коралловый цвѣтокъ, съ желтыми пятнами по срединѣ.

P. colibri. Большой цвѣтокъ ярео-серизоваго цвѣта, бѣлый внутри, съ малиновыми крапинками, — желтыми и амантовыми разводами.

P. scintillas. Цвѣты розовые, въ серединѣ желтые, съ розовыми полосками.

P. naegelioides suave roseum. Цвѣтокъ нѣжно-розовый, въ горлышкѣ — болѣе свѣтлый.

P. suave roseum. Съ розовыми цвѣтами.

P. eucodonoides triumphans. Съ большими лиловыми цвѣтами, какъ у Глоксиній, и съ темными крапинками въ серединѣ.

P. Gibsonis. P. gloxinaeflora. P. labyrinthica. P. Rollisoni. P. triumphans. P. viola.

1386. *Plectranthus fruticosus*. Изъ семейства Губоцвѣтныхъ. Оранжерейное растеніе. Держать въ комнатѣ, какъ средство противъ моли.

Другой видъ. *P. coleoides*. Полукустарное, оранжерейное растеніе, съ блѣдно-лиловыми цвѣтами.

1387. *Pleopeltis irioides cristata*. Тепличный папоротникъ, съ широкими, лентовидными ваями.

1388. *Pleurothallis auriculigera*. Тепличная Орхидея, съ мелкими, желтоватыми цвѣтами.

Другіе виды: *P. lateritia*. Съ кирпично-красными цвѣтами.

P. avicera. Маленькая тепличная Орхидея. Листья снизу пурпуровые, цвѣты зеленовато-желтые, напоминающіе птичью голову съ клювомъ.

P. polyiria. Тоже, съ мелкими, желто-зелеными цвѣтами, похожими на ландышъ.

1389. *Plocostemma lasianthum*. Изъ семейства *Asclepiadeae*. Тепличное растение, съ висячими, желтыми цвѣтами: Во время отдыха почти не поливается.

1390. *Plumbago*. *Плюмбаго*. Кустовое, оранжерейное растение, съ голубыми, синими или розовыми цвѣтами. Размножается сѣменами, черенками и отрезками. Требуется листовенную землю пополамъ съ дерновою и съ четвертою частью вересковой. Нуждается въ сильной поливкѣ лѣтомъ. Можетъ расти въ комнатѣ. На лѣто выставляется изъ оранжерей на воздухъ. Нѣкоторые виды его помогаютъ отъ болѣзни глазъ, отчего и получило названіе. (*Plumbum* — глазная болѣзнь).

Виды: *P. larperetoe*. Съ темно-синими цвѣтами на розовыхъ ножкахъ.

P. Zeylanica. *P. rosea*. *P. capensis*. *P. lusitanica*.

1391. *Poa*. *Мятлика*. Изъ семейства *Gramineae*. Дикорастущая трава.

Другой видъ: *Poa trivialis fol. variegatis*. *Пестролистная мятлика*. Листья съ бѣлыми и зелеными полосами. Растеніе можно стричь и подрѣзать. Выводятъ въ горшкахъ, поставленныхъ на поддонникъ съ водою, въ которую кладутъ по ложкѣ гуано. Растеніе это слѣдуетъ часто дѣлать и старыя листья вырѣзывать, тогда оно лучше идетъ и дѣлается пригодно для украшенія бесѣдокъ, на посадку между камней, около группъ, на тумбы и пр.

P. annua. *Мурава*. Дикорастущее, также какъ и слѣдующіе: *P. bulbosa*. *Тонконогъ*, *P. compressa*. *P. nemoralis*. *Волосница*.

1392. *Podalyria australis*. Оранжерейное растение.

Другіе виды: *P. sericea*. *P. styracifolia*.

1393. *P. odocarpus*. Изъ семейства *Coniferae*. Хвойное дерево;

размножается черенками, получаемыми отъ боковыхъ вѣтвей. Содержится въ оранжереѣ.

P. nerifolius. Съ красными цвѣтами.

P. pardianus. Съ широкими, сѣровато-зелеными листьями.

P. salicifolius. Съ широкими, блѣдно-зелеными листьями.

P. Chilianus. *P. Makayi*. *P. nubigenus*.

1394. *Podococcus Barteri*. Родъ Пальмъ. Безълиственное растеніе вышиною до 8 футъ; покрыто бѣлымъ пушкомъ; размножается сѣменами.

1395. *Podolepis chrysantha*. *Сухоцвѣтъ*. Однолѣтнее, садовое растеніе, съ золотисто-желтыми цвѣтами; сѣется въ парникъ, потомъ разсаживается въ горшки и ставится въ парникъ; когда же нельзя болѣе ждать морозовъ, пересаживается въ грунтъ, въ глинисто-дерновую землю.

Другіе виды: *P. gracilis*. Съ розовыми или бѣлыми цвѣтами.

P. acuminata. (*P. affinis*).

1396. *Podophyllum emodi*. Изъ семейства *Berberidaceae*. Оранжевое растеніе. Большой, весьма красиво расписанный свѣтло и темно-зелеными разводами листь, формою похожій на утиную лапу; бѣлый цвѣтокъ и пунсовый плодъ. Листья и корень имѣютъ ядовитое свойство.

1397. *Pogogyne Douglasii*. Однолѣтнее растеніе, съ розово-пурпуровыми цвѣтами, у которыхъ нижняя губа, темно-пурпуровая съ бѣлымъ пятномъ.

1398. *Pogonia ophioglossoides*. Орхидея. Розовый цвѣтокъ съ бахромчатою губою, отчего и получило свое названіе. (*Pogon* — борода). Зимой содержится въ оранжереѣ; когда же совершенно прекратятся морозы, выставляется на воздухъ, въ Октябрѣ опять вносится въ оранжерею. Размножается дѣленіемъ корней.

1399. *Pogostemon patschouli*. Индійское растеніе, даетъ душистое, эфирное масло — «пачули».

1400. *Poinciana*. Очень нѣжный кустарникъ, съ красивыми желтыми и алыми цвѣтами и нѣжными, похожими на акацію

листьями. Можетъ расти въ комнатѣ. Лѣтомъ высаживается въ грунтъ, зимою содержится въ оранжереѣ. Размножается преимущественно сѣменами и черенками, въ Юнѣ, но не иначе, какъ посредствомъ теплички, подобно вообще тепличнымъ растеніямъ. Требуется вересковую землю, пополамъ съ листовною и съ примѣсью четвертой части дерновой. Зимою содержится весьма сухо, а лѣтомъ напротивъ требуетъ сильной поливки.

Виды; *P. gilliezii*. Крупный желтый цвѣтокъ, изъ котораго выходитъ длинный, пунцовый султанъ тычинокъ. На югѣ Европы растетъ на открытомъ воздухѣ.

P. pulcherima. *P. regia*.

1401. *Poinsettia pulcherima* fl. rubro. Оранжерейное растеніе.

1402. *Poivrea coccinea*. Африканское растеніе, съ алыми цвѣтами, можетъ расти въ комнатѣ, но зимою теряетъ листь. Размножается черенками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой и вересковой, съ примѣсью четвертой части листовной.

1403. *Polanisia trachysperma*. Красивое однолѣтнее растеніе, изъ семейства Каперсовыхъ, весьма душистое и покрытое мелкими волосками. Даетъ бѣлые цвѣты. Высѣвается въ плошки или парникъ раннею весною и потомъ высаживается въ грунтъ.

1404. *Polemonium coeruleum*. Красотка. Сорокоприточная. Конюха обыкновенная. Троецвѣтка. Семейство Polemoneaceae. Многолѣтнее садовое растеніе съ синими цвѣтами; зимуетъ на открытомъ воздухѣ. По словамъ Плинія, честь находки этого растенія оспаривали два царя (?) и кончили споръ войною (?), отчего растеніе и получило свое названіе. (*Polemos* — война).

Другой видъ: *P. coer. fl. albo. (lacteam)*. С. бѣлая.

1405. *Polianthes tuberosa*. Тубероза. Оранжерейное, луковичное растеніе, съ превосходными, душистыми, махровыми или полумахровыми цвѣтами, бѣлыми или розовыми, сидящими на цвѣточномъ стеблѣ, до 2 аршинъ вышины, въ числѣ отъ 20 до 30 штукъ. Требуется слѣдующаго ухода:

Въ концѣ Февраля надлежитъ заложить парникъ, когда навозъ будетъ вполне готовъ, въ него насыпаютъ рѣчнаго плу, толщиною на 5 или 6 вершковъ. Земля должна хорошо пердѣлаться и содержать въ себѣ достаточное количество песку; когда навозъ хорошо перегоритъ, въ этой землѣ прибавляютъ, четвертую часть хорошей дерновой и восьмую глины. Въ продолженіи нѣсколькихъ дней сряду должно хоть одинъ разъ въ день хорошо переворачивать землю въ парникѣ и по охлажденіи ровнять ее граблями, поливая на столько, чтобы она пропиталась на 4 вершка.

По очисткѣ и раздѣленіи луковицъ на 3 разряда: 1) на луковицы самыя большія, назначенныя для цвѣтенія въ томъ же году; 2) на луковицы, которыя до цвѣтенія должны еще укрѣпиться, и 3) на луковицы, назначенныя для вырощенія, каждую луковку обсыпаютъ мелко толченымъ кирпичемъ, для заживленія ранъ. Луковицы, назначенныя для цвѣтенія разсаживаютъ въ 5 вершкахъ другъ отъ друга, луковицы 2-го разряда чаще а 3-го еще чаще. Луковицы покрываютъ землею на столько, чтобы шейка луковицы находилась наравнѣ съ поверхностью земли. Посаженныя луковицы должно часто осматривать, дабы избытокъ тепла и сырости не причинилъ имъ вреда (онѣ легко загниваютъ), а также чтобы не попортили ихъ животныя или насѣкомыя. Поливаютъ, когда луковицы дадутъ листья, длиною въ вершокъ и затѣмъ поливку постоянно усиливаютъ до появленія цвѣтовъ, а съ этого времени поливка постепенно уменьшается. Въ Маѣ, когда уже нельзя болѣе ждать морозовъ, снимаютъ съ парниковъ рамы и разгребаютъ землю вокругъ луковицъ назначенныхъ для цвѣтенія (но такъ, чтобы не повредить кореньевъ и не разпатать луковицъ), должно очищать ихъ отъ образовавшихся отростковъ, а ранки засыпать кирпичнымъ порошкомъ. По окончаніи этой операціи луковицы опять засыпаютъ землею. Очистка ихъ отъ отростковъ повторяется до-тѣхъ-поръ, пока не прекратится появленіе ихъ особенно у луковицъ, назначенныхъ для цвѣтенія въ слѣдующемъ году. Каждый разъ послѣ отнятія отростковъ, луковицы туберозъ нѣсколько дней не спрыскиваютъ; но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ парника дѣлаютъ толстымъ колышкомъ нѣсколько отверстій, въ которыя наливаютъ воду, что повторяется, пока не сдѣлается достаточно

сыро у корней, впрочем сырость не должна доходить до пораненных мѣстъ луковицы, надъ которою производилась операція.

Отнимаются отростки только до половины Августа, а съ этого времени растеніе болѣе не тревожатъ.

Туберозы обильно поливаются до конца Августа, а въ Сентябрѣ, при наступленіи морозовъ, парники, въ которыхъ сидятъ эти растенія покрываютъ рамами, а когда морозъ усилится, то парниковый ящикъ обладывается старымъ навозомъ. Въ такомъ видѣ парникъ оставляется, пока стоитъ тепло. Съ наступленія Сентября луковицы поливаютъ очень мало и въ особенности сохраняютъ ихъ отъ сырости. Наконецъ, когда морозъ усилится, луковицы вынимаютъ изъ парника, стряхиваютъ съ нихъ землю, обрѣзаютъ до половины длинные листья и кладутъ на полки въ простѣнокъ, чтобы совсѣмъ просохли; затѣмъ связываютъ ихъ мочалкою въ пучки и развѣшиваютъ въ жилой комнатѣ, недалеко отъ печи или въ теплицѣ надъ отопляемымъ боровомъ, въ мѣстѣ безопасномъ отъ сырости. Такимъ образомъ луковицы сохраняются до Марта. Для ранней выгонки луковицы сохраняютъ въ болѣе холодномъ мѣстѣ.

При вышеописанномъ уходѣ луковицы достигаютъ величины куриного яйца. Для содержанія туберозъ въ комнатѣ въ цвѣту, должно, какъ только луковица начнетъ выпускать цвѣтовую головку вынуть ее изъ парника и пересадить въ просторный горшокъ, который, поливъ, закопать въ теплый парникъ и прикрыть рамою пока пересаженное растеніе не укрѣпится. По снятіи рамъ, растенія достаточно поливаютъ и когда они начинаютъ зацвѣтать ихъ вносятъ въ комнату.

Луковицы цвѣтшія одинъ разъ болѣе не приносятъ цвѣтовъ; для полученія цвѣтовъ сажаютъ дѣтку, вырастающую по сторонамъ главной луковицы. Разсаживая луковицы въ различное время, можно имѣть цвѣты отъ Іюня до Октября. Туберозы посаженные въ Апрѣлѣ въ теплыя гряды и притомъ безъ рамъ, прикрываемыя лишь на ночь рогожами, также хорошо растутъ и цвѣтутъ осенью.

(Садов. и огород. 1869 ст. 342—343).

1406. Polycalymna Stuarti. *Сухоцвѣтъ*. Однолѣтнее садовое растеніе, требуетъ той же культуры, что и *Rodante*.

1407. *Polycarene capensis*. Однолѣтнее садовое растеніе, не выше $\frac{1}{4}$ фута, съ желтыми цвѣтами; требуетъ той же культуры.

1408. *Polycenia*. Однолѣтнее растеніе; какъ садовое не имѣетъ значенія.

1409. *Polycyenis gratiosa*. Тепличная орхидея, съ блѣдно-коричневыми въ блѣдныхъ грапинахъ цвѣтами.

1410. *Polygala amara et comosa*. *Многочленикъ горный*. *Исмадь дерево*. Изъ семейства *Polygaleae*. Дикорастущее на влажныхъ, открытыхъ мѣстахъ, съ синими цвѣтами, лекарственное растеніе, увеличивающее удои коровъ, употребляющихъ его въ пищу, отчего и получило названіе. (*Poly*—много, *gala*—мококо).

Другіе виды: *P. speciosa*. Оранжевое растеніе, съ прекрасными пурпурово-фіолетовыми цвѣтами, формою похожими на цвѣты гороха. Любитъ вересковую землю и жидкое удобреніе, цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ, но если содержится въ холодной оранжереѣ, можетъ цвѣсти всю зиму.

P. cordifolia. *P. oppositifolia*. *P. grandis*. *P. latifolia*. *P. myrtifolia*. *P. chamaebuxus*. Цвѣты бѣлые съ желтымъ.

1411. *Polygonatum multiflorum*. *Соломонова печать*. *Купена*. Дикорастущее. *P. chamaebuxus*. Цвѣты бѣлые съ желтымъ.

Другіе виды: *P. vulgare*. (*Convallaria polygonatum*). Растеніе съ шишкообразнымъ корневищемъ; дикорастущее, но подвергаемое ранней выгонкѣ въ оранжереѣ. Въ этихъ видахъ корневище этого растенія осторожно вынимаютъ изъ земли, оставляя при немъ большую часть его тонкихъ корней и за годъ до выгонки сажаютъ въ горшокъ перпендикулярно, тогда какъ въ естественномъ видѣ оно имѣетъ горизонтальное положеніе.

Другіе виды: *P. roseum*. *Розовая купена*. Съ розовыми цвѣтами; растетъ на открытомъ воздухѣ; довольствуется не-удобренной, но рыхлою, глинистою землею.

1412. *Polygonum orientale*. (*P. elegans*). *Гречихникъ*. Семейство *Polygoneae*. Однолѣтнее садовое растеніе, съ красными или

бѣлыми цвѣтами; достигаетъ вышиною до 5 футовъ; сѣется въ парникъ въ началѣ Апрѣля; высаживается въ очень питательную землю; боится самыхъ легкихъ морозовъ.

Другіе виды: *P. aviculare*. Спорышиз. Топтунз. Цвѣты зеленые съ красными или бѣлыми краями.

P. vacciniifolium. Съ розовыми цвѣтами.

P. arenarium. Свинуха Дикорастущая трава.

P. Maximowiczii. Однолѣтнее, японское растеніе, со стеблемъ, листьями и цвѣточнымъ ножками—пурпурово-красными. Сѣютъ въ Августѣ. Перезимовавшее въ защищенномъ отъ мороза мѣстѣ растеніе на лѣто высаживается въ грунтъ.

P. sieboldtii. *P. sachalinense*. Многолѣтнія садовыя растенія.

P. Bistorta. Горлецъ. Раковыя шейки. Змѣвикъ. Тоже. Стебель безъ вѣтвей; имѣетъ на верхушкѣ колосъ розовыхъ цвѣтовъ.

P. sericeum. Дикуща. Гречиха сибирская. Тоже.

P. fagopyrum. Настоящая гречиха. Разводится какъ хлѣбное растеніе.

P. tataricum. Дикорастущее, видомъ похоже на предыдущую.

P. emarginatum.

P. capitatum. Оранжевое, многолѣтнее, вьющееся растеніе, употребляется для застилки трельяжа. Зеленые листья длиною до 2-хъ дюймовъ, имѣютъ черныя полосы, идущія отъ вершины до основанія листа, въ видѣ треугольника и мелкіе розовые цвѣтки, вырастающіе изъ угла верхнихъ листьевъ.

Существуютъ еще слѣдующіе, дикорастущіе виды: *P. viviparum*. Мукецъ татарскій.

P. tinctorium. Красильная гречка.

P. polymorphum. Кислецъ.

P. polymorphum Горчакъ бѣлый.

P. persicaria. Горчакъ почечникъ.

P. lapathifolium. Г. мужской.

P. hydropiper. Г. женскій.

P. convolvulus Повелка. Вьюнокъ. Растетъ по пашнямъ; вьющійся стебель.

P. dumetorum. Повитель. Младенческая трава.

1413. *Polymnia edulis*. *Съдобная полимнія*. Изъ семейства *Compositae*. Названо въ честь одной изъ 9 музъ. Корень похожъ на георгинныя клубни и достигаетъ вѣса до 25 фунт. Даетъ очень вкусную овощъ, которую индѣйцы ѣдятъ даже въ свѣжемъ видѣ. Размножается черенками и дѣленіемъ корней, которые на зиму вынимаются изъ грунта и содержатся въ температурѣ 3—5 градусовъ тепла.
1414. *Polipodium*. Тепличное растеніе, изъ семейство Папоротниковъ, можетъ расти и въ комнатѣ; нѣкоторые виды имѣютъ древесный стебель; размножается отростками и дѣленіемъ корней; требуетъ землю составленную изъ торфяной, лиственной и дерновой; зимою поливается мало, но лѣтомъ очень сильно.
Виды: *P. vulgare cornubiense*. Съ двуперсто-разсѣченными ваями; выемки которыхъ сливаются между собою.
P. vulgare. *Сладкій корень*. Дикорастущее. *P. arboreum*. *P. aureum*. *P. drypteris*. *P. glaucum*. *P. morbillosum*.
1415. *Polystachia carnea*. Тепличная Орхидея, съ мелкими, розовыми—съ желтымъ цвѣтами.
1416. *Polystichum filix. mas*. *Папоротникъ*. Дикорастущее.
Другіе виды: *P. setosum*. *Древковатый, тепличный папоротникъ*.
P. fragrans. *Зерликъ*. Дикорастущее.
1417. *Pontederia cordata*. Болотное растеніе, съ голубыми цвѣтами, колосомъ. Размножается сѣменами и дѣленіемъ корней. Посаженное въ горшки лѣтомъ, совершенно погружается въ воду акварія, а зимою держится въ водѣ погруженнымъ до половины горшка.
1418. *Porogyne Douglasii*. Однолѣтнее, садовое калифорнійское растеніе, съ пурпуровыми цвѣтами, испещренными бѣлымъ.
1419. *Populus*. *Тополь*. Изъ семейства *Salicineae*. Дикорастущее дерево; издревле разводится для украшенія садовъ, парковъ и вообще публичныхъ мѣстъ, отчего и получило свое названіе:—*arbor populi*—народное дерево. Выносить даже су-

ровую зиму. Сильно истощаетъ почву и пускаетъ множество корневыхъ побѣговъ. Размножается черенками, на которые берутъ водяные побѣги и крѣпкіе побѣги молодыхъ экземпляровъ; также въ концѣ осени или раннею весною, отдираютъ отъ тополя корни толщиною въ мизинецъ и разрѣзавъ на небольшія куски, кладутъ на гряды, прикрывъ незначительнымъ слоемъ земли, тутъ они укоренятся и дадутъ побѣги.

Виды: *P. argentea*. *P. alba*. (*P. nivea*). *Тополь серебристый*. Съ серебристо-бѣлымъ съ изнанки, листомъ.

P. canadensis. *Т. канадскій*. Не выноситъ нашихъ суровыхъ зимъ, вымерзая до корня и такимъ образомъ превращаясь въ кустъ.

P. dilatata. *Т. пирамидальный*. нашихъ зимъ безъ прикрышки не выноситъ.

P. laurifolia. *Душистый осокорь*.

P. pendula. *Т. плакучій*.

P. pyramidalis. *Т. итальянскій* или *пирамидальный*.

P. alba. *Топольникъ бѣлый*.

P. suaveolens. *Т. бальзамическій*. Имѣетъ душистыя почки и листья. Быстро растетъ и выноситъ самыя суровыя зимы.

P. nigra. *Осокорь*. Имѣетъ треугольно яйцевидныя листья.

P. tremula. *Осина*. Растетъ въ дикомъ состояніи по нашимъ лѣсамъ и болотамъ. Пчелы берутъ взятку съ его цвѣтовъ въ Апрѣлѣ и Маѣ.

P. betulifolia. *Т. березоволистный*.

P. cordifolia. *Т. сердцевидный*.

P. heterophylla. *Т. разнолистный*.

P. hudsonia. *Т. гудзонскій*.

P. laevigata. *Т. гладкій*.

P. pannonica. *Т. венгерскій*.

P. hybrida. Весьма схожій видъ съ *P. alba*, листья сверху голые, а снизу покрыты тонкими, бѣлыми волосками.

P. angulata. Растетъ въ Сѣв. Америкѣ похожъ на Канадскій, но еще нѣжнѣе.

P. balsamifera. *Т. бальзамическій*. *Такамагана*. Производитъ сильно пахучія почки. Сѣверо-Американское растеніе, у насъ очень рѣдко. *P. tristis*. Съ темнозелеными листьями, придающими ему мрачный видъ.

P. candicans. (*P. ontariensis*. *P. macrophylla*. *P.*

latifolia). Съ сильно пахучими почками и листьями самыми большими изъ всѣхъ родовъ тополя, снизу бѣловатыми. Достигаетъ 50 футъ высоты; выносить наши зимы.

1420. *Porliera hygrometrica*. Тепличное растеніе.

1421. *Portulaca oleracea*. *Портулакъ*. Семейства *portulacae*.

Овощъ употребляемая въ пищу, какъ приправа къ супу, — въ соеномъ видѣ и какъ салатъ, въ смѣси съ другими салатами. Требуется сильной, рыхлой, не свѣжесунавоженной земли и открытаго, солнечнаго мѣста. Сѣется въ началѣ Мая сухимъ сѣменемъ, смѣшаннымъ и перетертымъ съ землею, прямо на грядѣ, при чемъ сѣмя засыпается землею и сильно поливается. Всходы разрѣжаются такъ, чтобы растенія находились въ 8 вершкахъ другъ отъ друга, гряды постоянно полютъ и разрыхляютъ, а въ сухую погоду часто поливаютъ. На грядѣ въ 10 сажень длины и $1\frac{1}{2}$ аршина ширины, высѣвають лоть сѣмень.

Портулакъ бываетъ *желтый*, преимущественно разводимый, — *зеленый*, *широколистный*, *испанскій*.

Другой видъ: *P. grandiflora*. Прекрасное, многолѣтнее, низенькое садовое растеніе, съ весьма красными, часто махровыми, какъ маленькій розанъ, цвѣтами, разныхъ ярехъ колеоровъ. Цвѣты эти раскрываются только при солнцѣ. Сѣется въ концѣ Марта или началѣ Апрѣля, въ плошки, съ песчанистою, неунавоженною землею, при чемъ очень мелкіе сѣмена присыпаютъ пескомъ. Посѣвъ ставится на солнцѣ; по всходѣ разсаживается въ горшки, которые держатся въ парникѣ до Іюня и высаживаются въ вересковую или глинисто-песчанистую землю, на солнечное мѣсто. Портулакъ можетъ также размножаться черенками, отводками и раздѣленіемъ корней, которые зимою содержатся почти сухо. Вообще не любитъ сильной поливки и довольствуется почвою составленною изъ равныхъ частей земли дерновой, лиственной и вересковой.

Разновидности этого растенія:

P. grandiflora alba. *P. g. aurea*. Съ пурпурово-фіолетовыми цвѣтами. *P. g. kermesina*.

P. g. caryophyloides *P. g. lutea*. Съ желтыми цвѣтами.
P. g. luteo aureo striata.

P. g. rosea. Съ розовыми цвѣтами.

P. g. roseo pallida. *P. g. Speciosa*. *P. g. alba plena*.
Бѣлая, Махровая.

P. g. aurea plena. Махровая.

P. g. gillesii plena. Съ малиновыми или пурпуровыми,
махровыми цвѣтами.

P. g. rosea plena. Махровая розовая.

P. g. Splendens plena. Махровая.

P. g. Sulphurea plena. Желтая махровая.

P. Thellusonii. Съ краснокиноварными, махровыми цвѣ-
тами. Однолѣтнее растеніе.

P. Tornburnii. Тоже однолѣтнее растеніе.

1422. *Posoqueria multiflora*. Изъ семей. *Rubiaceae*. Тепличное
растеніе съ неоппадающимъ листомъ, снизу бархатистымъ. Цвѣты
пахучіе, бѣлые. Требуется, той-же культуры что и «Гарденія».

Другой видъ: *p. formosa*. Цвѣты бѣлые на длинныхъ нож-
кахъ, похожи на цвѣты *Mirabilis jalappa*.

1423. *Potentilla*. *Ланчатка*. *Мощникъ*. *Деревянка*. Изъ семейства
Rosaceae. Многолѣтнее, грунтовое растеніе, нѣкоторые виды
котораго растутъ кустарникомъ, другіе представляютъ собою
растеніе травянистое, съ желтыми и пурпуровыми цвѣтами,
похожими на цвѣты земляники. Размножается сѣменами, че-
ренками и отростками. Требуется землю составленную изъ рав-
ныхъ частей дерновой и лиственной, с примѣсью четвертой
части вересковой; зимою корни его содержатся въ едва влажной
землѣ.

Виды: *p. aurea*. Золотистый цвѣтокъ.

P. frutescens. *Серебренникъ кустовой*. Кустарникъ съ
желтыми цвѣтами любитъ низменную почву.

P. Striata formosissima. Оранжевый цвѣтокъ, испещрен-
ный темно-оранжевыми или коричневыми полосками.

P. macnabiana. Съ красно-оранжевыми цвѣтами.

P. Smouthii. Цвѣтокъ оранжевый, въ середкѣ темный,
испещренъ черточками.

P. atrosanguinea argyrophylla. Свѣтло-оранжевый
цвѣтокъ переходящій по краямъ лепестковъ въ красно-кармо-
зиновый. Любитъ рыхлую, глинистую, садовую почву, въ ко-

торой обильно цвѣтеть Іюль и Августъ. Размножается дѣленіемъ.

P. atr. var. menziesii flore pleno. Желто-оранжевый, махровый цвѣтокъ.

P. Nepaulensis. Грунтовое растеніе, съ красными цвѣтами.

P. fruticosa. *Курильскій чай.* Кустарникъ, разводимый въ садахъ и огородахъ.

*P. grandiflora. P. hybrida. P. leucotricha. P. olive-
riana. P. purpurea lutea variegatis.*

Оранжевые виды:

P. formosa. М. прекрасный.

P. atrosanguineum. М. темно-красный.

Дикорастущіе виды:

P. alba. Распестная.

P. ausserina. Бедренецъ. Гусячи лапки. Многолѣтнее, ме-
доносное растеніе, цвѣтеть съ Мая до Сентября.

P. argentea. Л. серебристая. Червишникъ. Медоносное
растеніе, цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ.

P. canescens. Переломная.

P. hirta. Золотникъ.

P. Norvegica. Горлянка.

P. reptans. Пятилистникъ. Ползучее медоносное растеніе,
цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ.

• *P. Termentilla. Сердечный корень. Завязникъ.* Медоносное
растеніе, цвѣтеть среди лѣта; его корни имѣютъ вяжущее
свойство.

P. thuringiaca. Вымяна.

P. Verna. Кокусъ.

P. floribunda. Л. многоцвѣтная.

1424. *Poterium Sanguiserba. Пимпнелъ. Черноголовникъ.* Мно-
голѣтнее растеніе, разводится посѣвомъ сѣменъ весною на су-
хихъ грядкахъ. Молодые листья употребляются какъ приправа
къ солоду и при приготовленіи пива.

1425. *Pothos.* Тепличное растеніе, требуетъ глинисто-дерновую
землю и просторную посуду. Зимой весьма умѣренно поли-
вается.

Виды: *P. acaulis. P. digitatus. P. argyrea. P. alismae-
folia. P. crassifolia. P. trifolius.*

1426. Prinos. Водомстз. Кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ.

Виды: *P. verticillatus*. Сѣверо-Американскій кустарникъ. Любитъ низменную рыхлую почву. Размножается сѣменами и отводками. Лекарственное растеніе.

1427. Prepusa hookeriana. Оранжевое растеніе, даетъ красивыя, темно-малиновые цвѣты, съ бѣлыми головками. Сажается въ смѣсь вересковой, дерновой и лиственной земли, въ горшокъ болѣе широкій, чѣмъ глубокій и хорошо дренированный. У корня его постоянно надлежитъ поддерживать влажность. Зимой это растеніе держать въ теплицѣ и давать ему много свѣту и мало воды. Размножается сѣменами или отдѣленіемъ молодыхъ отпрысковъ.

1428. Primula. Первоцвѣтъ. Баранчикъ. Примула. Семейство *Primulaceae*. Многолѣтнее садовое и оранжевое растеніе.

Виды: *P. veris*. *Первоцвѣтъ весенній*. Обыкновенный баранчикъ или барашекъ. Дико растетъ по лугамъ и лѣсамъ, съ маленькими желтыми цвѣтами. Употребляется какъ бордюрное растеніе; пчелы берутъ съ него взятки въ Маѣ и началѣ Іюня.

P. acaulis. (P. grandiflora). П. безстебельный. Безстебельные крупноцвѣтные баранчики. Душистые цвѣты бываютъ карминовые, темно-пурпуровые, бѣлые и махровые. Замѣчательны продолжительностью цвѣтенія; зацвѣтаютъ въ половинѣ Мая. На почву не разборчивы, но предпочитаютъ глинисто-известковую почву, съ примѣсью песку; животнаго удобрения не терпятъ, а если почву для нихъ и удобряютъ навозомъ, то совершенно перегнившимъ, однако листовой перегной любятъ, а потому полезно каждый годъ посыпать вокругъ ихъ землю этимъ удобрениемъ. Страдаютъ больше отъ засухи, чѣмъ отъ стужи, которую хорошо переносятъ подъ глубокимъ снѣгомъ. Легко размножается. Ихъ дѣлать лѣтомъ послѣ того какъ отцвѣтутъ, каждые два или три года, но ихъ можно дѣлать и пересаживать даже въ цвѣту. Растеніе это размножается и сѣменами. Сѣютъ въ Апрѣлѣ въ легкую землю въ парникъ, прикрывая сѣмена тонкимъ слоемъ листового перегноя или разрубленнымъ и просѣяннымъ мхомъ. Когда всхо-

ды подростутъ, ихъ высаживаютъ въ гряды, вершка на 2 другъ отъ друга, осенью пересаживаютъ на мѣсто, гдѣ остаются до весны; когда зацвѣтутъ, вынимаются стуломъ и пересаживаются на клумбы, на четверть одинъ отъ другаго. Сѣмена можно также сѣять съ Декабря до Марта въ оранжереѣ (чтобы въ слѣдующей веснѣ имѣть сильные экземпляры) и въ Іюль—Августѣ, тотчасъ послѣ того, какъ созрѣютъ сѣмена, прямо въ грунтъ, при этомъ сѣмена взойдутъ только слѣдующею весною. Мѣсто въ грунту для Барашковъ выбирается покатое и не сырое, осенью растенія эти закрываются вѣтвями ельника или можжевельника; покрывка эта снимается весною, но не слишкомъ рано. Чтобы имѣть въ цвѣту Примулю въ Январѣ, ее выводятъ въ горшкахъ, въ холодной оранжереѣ, а въ Декабрѣ переносятъ въ теплицу.

P. auricula nigra plena. На высокомъ стеблѣ темно-фіолетовый, почти черный махровый цвѣтокъ.

P. variabilis. Садовые баранчики. Въ ихъ цвѣтахъ преобладаетъ пурпуровый колеръ.

P. auricula. Медвѣжье ушко. Аврикула. Лыцакъ.

Разновидности ихъ: Чистые или обыкновенные. Съ однолѣтними цвѣтами, глазокъ которыхъ бываетъ бѣлый, тогда какъ остальная часть—желтая, темно-золотистая, бурая, темно-коричневая, пурпуровая или фіолетовая.

Тынистые или *Литтихскіе*, у которыхъ кромѣ бѣлаго или желтаго, круглаго глазка, имѣются два различные колера, идущіе концентрическими кругами.

Англійскіе или *напудренные*. Цвѣтокъ обыкновенно многоколерный, какъ бы посыпанный сизою пылью, глазокъ всегда почти бѣлый.

Махровые. Два вѣнчика вставлены другъ въ друга.

Аврикулы не требуютъ большаго ухода, землю имъ даютъ плотную, глинистую, свѣжую, не влажную и не унавоженную, въ смѣси съ дерновою или листовенною землею. Положеніе имъ необходимо отѣненное. Передъ посадкою земля должна быть хорошо перекопана и взрыхлена. Не боятся холода, но не выносятъ замерзанія и оттаиванія, сухихъ вѣтровъ и продолжительныхъ весеннихъ дождей. Воспитываются въ горшкахъ, зимою сохраняются въ подвалѣ или холодной оранжереѣ; весною высаживаются въ грунтъ. Пересаживаютъ лѣтомъ послѣ

цвѣтенія, черезъ два года въ третій въ промежуточные годы, верхній слой земли замѣняется новымъ. Передъ пересадкою, дня три растеніе не поливать. Зимой вовсе не поливать и вообще чѣмъ воздухъ влажнѣе, тѣмъ поливать ихъ меньше. На воздухѣ желтые и старые листья обирать, отрѣзая ихъ, но не отрывая. Примули-аврикули можно содержать даже въ комнатѣ. Осенью ихъ закидываютъ ельникомъ, чтобы дождевая вода стекала въ сторону, весною ельникъ съ нихъ сбрасывается.

Аврикули размножаются дѣленіемъ и отнятіемъ глазковъ. Дѣлить кусты лучше всего лѣтомъ, послѣ перваго цвѣтенія. Отсадку глазковъ дѣлать въ концѣ лѣта. Аврикули также размножаются сѣменами. Сѣютъ ихъ въ Январѣ по Мартъ, въ ящики или плошки по снѣгу, оставляя посѣвъ на воздухѣ — въ такомъ случаѣ всходъ будетъ весною; или сѣютъ въ Маѣ, причемъ иногда всходы показываются осенью, но чаще слѣдующею весною. Когда сѣянцы дадутъ 4 — 5 листьевъ, ихъ пересаживаютъ въ горшки или на гряды.

Въ ящикахъ или горшкахъ тоже можно воспитывать Аврикули. При посадкѣ въ Іюнѣ или Іюлѣ, наблюдается, чтобы на дно сосуда было положено для стока воды достаточное количество черепковъ, покрытыхъ мхомъ, чтобы водостокъ не задерживался. Также сѣменные экземпляры Аврикули осенью ставятся въ горшкахъ въ простѣнокъ или сухой подвалъ, гдѣ бываетъ даже до 5° мороза, потомъ ихъ приставляютъ въ Декабрѣ въ оранжереѣ и поливаютъ; затѣмъ въ Мартѣ или Апрѣлѣ растеніе цвѣтетъ.

Чтобы имѣть ранніе цвѣты, а именно даже въ Февралѣ, Аврикули постоянно держать въ горшкахъ въ холодной оранжереѣ. Также должно сказать о *p. minima* и *p. viscosa*.

P. sinensis. Китайскій первоцвѣтъ. Многолѣтнее растеніе, но въ нашихъ садахъ разводится, какъ однолѣтнее или двухлѣтнее. Цвѣты, въ видѣ распущеннаго зонтика на стрѣльѣ, бываютъ бѣлые, розовые и свѣтло-пурпуровые съ желтымъ глазкомъ. У насъ это растеніе разводится въ оранжереяхъ и бываетъ съ цвѣтами пестрыми, бахромчатыми, махровыми и полумахровыми. Можетъ содержаться въ комнатѣ.

Въ нашихъ садахъ встрѣчаются:

P. sinensis alba. Бѣлый цвѣтокъ, съ желтымъ, зеленоватымъ или буrowатымъ глазкомъ.

P. sinensis striata. Бѣлый цвѣтокъ съ розовыми черточками.

P. sinensis cupreata. Цвѣтокъ красно-розовый, съ металлическимъ отблескомъ.

P. s. fimbriata vel. grandiflora. Крупный цвѣтокъ съ выемчатымъ вѣнчикомъ, розоватый, бѣлый или желтоватый.

P. s. erecta superba. Крупный, ярко-розовый цвѣтокъ.

P. s. alba semi plena. Полумахровый, бѣлый или розовый цвѣтокъ.

P. Japonica. Чрезвычайно красивое, многолѣтнее, оранжевое или комнатное растение, цвѣты его расположены большими букетами въ нѣсколько этажей, одинъ надъ другимъ яркаго, розово-фіолетоваго цвѣта, такъ называемаго, *Манджеита*, съ маленькимъ, темнымъ кружечкомъ вокругъ бѣлаго глазка. Сѣмена всходятъ на слѣдующій послѣ посѣва годъ. Въ настоящее время существуютъ другія разновидности этого первоцвѣта, разныхъ колеровъ.

P. cortusoides amoena grandiflora lilacina. Превосходный лиловый цвѣтокъ.

P. sinensis alba plena и *rosea plena*. Махровый бѣлый или розовый первоцвѣтъ.

Вообще Китайскій Аврикулъ воспитывается какъ однолѣтнее растение, хотя оно можетъ жить долго и наконецъ образовать древянистый стебель. Выводится отъ сѣменъ, высѣваемыхъ въ Мартѣ или Апрѣлѣ въ оранжереѣ. Всходы ставятся въ парникъ. Чтобы получить сильные экземпляры и хорошо цвѣтущіе, стараются пересадить Аврикули два раза въ лѣто. Посуда имъ дается непросторная, чтобы переплелишія корни дренировали почву, хорошо пропуская воздухъ и воду. Землю требуютъ сильную, составленную изъ трехъ частей вересковой и одной части перегной коровьяго навоза. Осенью это растение переносится въ оранжерею поближе къ рамамъ, причемъ нѣкоторые тотчасъ зацвѣтаютъ и такимъ образомъ даже въ Ноябрь, когда почти ничего не цвѣтеть, украшаютъ собою оранжерею. На второй годъ этотъ первоцвѣтъ цвѣтеть хуже, а потому его почти всегда бросаютъ послѣ отцвѣтенія, но лучшіе сорта размножаются дѣленіемъ, отводкою и черен-

ками съ листьями, которые сажаютъ въ горшки тотчасъ послѣ того, какъ растеніе отцвѣтетъ весною. Передъ дѣленіемъ первоцвѣтъ нѣсколько просушивается, не поливая его нѣкоторое время.

(По Н. Ермолаичу. Вѣст. И. Общества Сад. 1870 № 2).

1429. Pritchardia. Единственный родъ вѣролистныхъ пальмъ. Листья этой пальмы на Маркизскихъ островахъ и о-въ Вити, только вожди имѣютъ право употреблять на опахала, циновки, шляпы, крыши. Гладкій стволъ растенія достигаетъ 30 футъ. Размножается сѣменами.

1430. Prosopis juliflora. Даетъ ядовитые стручки, а шипы его производятъ опасныя раны. Тропическое растеніе.

1431. Protea Levisanus. Оранжевое растеніе, съ роскошными листьями. Цвѣтетъ всю зиму.

Другіе виды: *P. acaulis*. *P. melifera*. *P. speciosa*.

1432. Prunella, Лайникъ. Изъ семейства *Labiatae*. Дикорастущее. Виды: *P. vulgaris*. *Л. простой*.

P. grandiflora. Содержится въ оранжевѣхъ.

1433. Prunus cerasus. Вишня. Изъ семейства *Костяновыхъ*. Дерево дикорастущее и разводимое въ садахъ для плодовъ; съ цвѣтовъ его, въ Апрѣлѣ и Маѣ, пчелы берутъ взатокъ.

Другіе виды: *P. cerasus plena*. *Махровая вишня*. *Морель*. Дерево, разводимое въ садахъ для фрукта, а также подвергаемое ранней выгонкѣ для цвѣтовъ, въ оранжевѣхъ. Съ этою цѣлю берутъ изъ грунтоваго сарая самыя низкіе, привитые, экземпляры и ставятъ, послѣ Нового года, въ оранжевую, гдѣ часто опрыскиваютъ растеніе. Лѣтомъ вѣтви дерева слегка обрѣзываютъ.

P. Chamaecerasus. *Вишеньки*. *Дикая вишня*.

P. avium. *Испанская вишня*. *Черешня*.

P. caucasica. *P. laurocerasus*. *Лавровишневое дерево*. Оранжевое растеніе, изъ листьевъ его готовится вода, употребляемая какъ лекарство.

P. padus. *Черемуха*. Дикорастущее дерево съ бѣлыми, весьма душистыми цвѣтами, очень рано распускающимися. Раз-

водится въ паркахъ. Отъ разведенія этого дерева во фруктовыхъ садахъ воздерживаются, несмотря на красоту и аромать его цвѣтовъ, такъ какъ на немъ сильно разводятся черви, потомъ переходящіе на фруктовые деревья. Размножается черенками. Можетъ быть подвергаемо ранней выгонкѣ въ оранжереѣ. Съ этою цѣлію небольшіе кусты черемухи приставляютъ въ оранжереѣ, сперва въ холодномъ, а потомъ въ болѣе тепломъ мѣстѣ съ цвѣтовъ его, въ Апрѣлѣ и Маѣ пчелы берутъ взятокъ. Изъ цвѣтовъ его перегоняютъ воду.

P. radus fol. variegatis. Ч. *пестролистная.*

P. p. mabaleb. Ч. *душистая.*

P. p. triloba plena и **P. p. californica** не могутъ зимовать въ грунтѣ; ихъ на зиму вынимаютъ и сохраняютъ въ простѣнѣхъ или подвалѣхъ.

P. p. virginiana.

P. domestica. *Слива. Черная слива.* Дерево, достигающее 20 футъ вышины, иногда растетъ дико въ лѣсахъ умѣренного климата; размножается сѣменами, черенками, отпрысками и прививкою. Любитъ глинистую, неистощенную почву. Разводится въ садахъ, грунтовыхъ сараяхъ и оранжереяхъ.

P. insticia. *С. прививная.* Дерево, иногда растетъ въ дикомъ состояніи, въ умѣренномъ климатѣ Россіи, съ темно-синими плодами, горькими и кислыми. Считается первообразомъ сливогого дерева.

P. Armenica. *Абрикосъ. Желтосливникъ.* Дерево, разводимое для превосходныхъ плодовъ. Съ цвѣтовъ его пчелы берутъ взятокъ. У насъ содержится въ грунтовыхъ сараяхъ.

P. armeniaca sibirica. *Сибирскій абрикосъ. Каменная слива.* Красивое деревцо, дивораствующее въ Дауріи, съ желтымъ, покрытымъ красными пятнами плодомъ и съ кожистою, почти сухою мякотью.

P. spinosa. *Слива колючая. Тернъ. Терновникъ.* Дикорастущій колючій кустарникъ, съ темно-синими круглыми ягодами, употребляемыми въ пищу; весьма пригоденъ для изгороди, а крѣпкая древесина его употребляется на рукоятки въ молоткамъ и другимъ столярнымъ и слесарнымъ инструментамъ. Съ цвѣтовъ его пчелы берутъ взятокъ.

P. cocumilia. Кора употребляется противъ лихорадки, а плоды въ пищу.

1434. Psammisia sclerophylla. Изъ семейства **Ericaceae**. Содержится въ умѣренной оранжереѣ, съ красными цвѣтами. Лѣтомъ выставляется на воздухъ. Любитъ листовную землю пополамъ съ вересковою. Размножается черенками.

1435. Psidium. Goiava. Изъ семейства **Myrtaceae**. Красивое деревцо, съ вкусными плодами, формою, похожими на грушу; размножается сѣменами и черенками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой, листовой и вересковой. Можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: **P. pyriferum**. Одно изъ лучшихъ плодовыхъ деревьевъ тропическихъ странъ.

P. pomiferum. Оранжевое растение.

P. kattleyanum. Плоды употребляются въ пищу.

P. aromaticum. P. polycarpon.

1436. Psoralea aphylla. Оранжевое растение.

Другіе виды: **P. bituminosa. P. pinnata.**

1437. Psychotria. Тепличное и вмѣстѣ комнатное деревцо, съ бѣлыми цвѣтами. Размножается черенками, требуетъ вересковую землю, съ прибавкою половины листовой и половины дерновой. Нѣкоторые виды имѣютъ сильное лечебное свойство, отчего и получило названіе. (**Psycha**—жизнь).

Другіе виды: **P. cyanococca**. Изъ Никарагуа. Отличается множествомъ необыкновенно красивыхъ синихъ ягодъ, которыя въ видѣ виноградныхъ кистей, покрываютъ ее всю зиму.

P. chantalensis. Не такъ красиво, какъ предыдущее. Оба вида не требуютъ особеннаго ухода.

P. laurifolia. P. Daphnoides. P. undata. P. leucoccephata.

1438. Ptelia trifoliata. Клекочна. Кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ; на зиму требуетъ надежной покрывки; размножается сѣменами и черенками.

1439. Pteris. Изъ семейства **Filices**. (Папоротники). Тепличное растение, можетъ существовать въ комнатѣ, съ листьями у нѣкоторыхъ видовъ, расписанными бѣлымъ, желтымъ и розовымъ. Размножается отростками и дѣленіемъ корней. Требуется

землю, составленную изъ торфяной, лиственной и дерновой. Зимой поливается весьма умеренно.

Виды: *P. cretica albo lineata*. Посреди каждаго листа идетъ широкая серебристо-бѣлая полоса, по обоимъ сторонамъ ярко-зеленаго нерва.

P. aquilina. Орлякъ. Папоротникъ, встрѣчаемый въ дѣлѣ состояннн въ нашихъ лѣсахъ. Одно изъ самыхъ древнихъ растений въ мнрѣ.

P. tricolor. Чрезвычайно изящный листъ, съ темно-малиновымъ нервомъ по серединѣ, отороченнымъ бѣлымъ узоромъ. Обратная сторона листа свѣтло-коричневая.

P. argyraea. Два послѣднне вида самые красивые изъ древковатыхъ папоротниковъ.

P. serrulata cristata. Древковатый папоротникъ.

P. s. applebyana. Оранжевое растение съ многолѣтнею зеленью, также какъ и *P. nobilis*.

P. s. cristata superba. Тоже кустистое, густое растение.

P. s. fimbriata. Съ нѣсколькими пониклыми ваями. *P. umbrosa*. *P. longifolia*. *P. quadria urita*.

1440. *Pterocarya caucasica*. Кавказскнй орлякъ. Дерево, разводимое для украшения садовъ и парковъ, дикорастущее на Кавказѣ. Требуется на зиму хорошей покрывки листомъ, соломой и рогожами.

1441. *Pterodiscus speciosus*. Содержится въ умеренной теплицѣ. Съ большими пунцовыми цвѣтами. Требуется одного ухода, что и Глоксинн, т. е. тепла и влажности во время развитн и сухаго содержанн въ довольно холодномъ воздухѣ, во время покоя. На зиму корень оставляютъ въ горшкѣ съ сухимъ пескомъ, до Января или Февраля, тогда его сажаютъ въ землю и закапываютъ въ корье или парникъ, гдѣ и держатъ, пока не пойдетъ въ ростъ. Размножается черенками, которые принимаются въ нѣсколько дней.

1442. *Pterospermum*. Тепличное растение; требуетъ глинисто-дерновую землю, размножается черенками, въ разводочномъ парникѣ.

Виды: *P. acerifolium*. *P. suberifolium*.

1443. *Ptychosperma*. Родъ пальмъ. Дерево съ прямымъ стеблемъ,

безъ иглъ, съ перистыми листьями, самыя верхніе разрѣзы которыхъ походятъ на рыбы перья. Размножается сѣменами.

Виды: *P. elegans*. *P. tahitiense*.

P. canninghami. Изъ плодовъ его готовится масло.

1444. *Pulmonaria officinalis*. *Медовичекъ. Медунца.* Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное и лекарственное растеніе, разводимое въ садахъ для цвѣтовъ; любитъ сухое, тѣнистое мѣсто. Цвѣты сначала розовые, потомъ дѣлаются красновато-фіолетовыми. Полагали что это растеніе служить дѣйствительно цѣлебнымъ средствомъ противъ болѣзни легкихъ, отчего и получило названіе. (*Pulmo* — легкое.

Другіе виды: *P. azurea*. *Медунца.* Ранніе, весенніе, синіе цвѣты. До цвѣтенія, въ Февралѣ, держится тепло, но когда зацвѣтетъ содержится въ холодѣ, чтобы цвѣты окрасились.

P. virginica. *Медунка.* Грунтовое растеніе, съ голубыми цвѣтами, на почву не прихотлива. Цвѣтетъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ.

P. angustifolia. Съ фіолетово-красными цвѣтами.

P. mollis. Съ сине-фіолетовыми и бѣлыми цвѣтами.

P. oblongata. Съ сине-пурпуровыми цвѣтами.

P. coerulea fol. variegatis. *P. grandiflora*. *P. paniculata*.

1445. *Pustenaë echinata*. Оранжевый кустарникъ, любитъ преимущественно вересковую землю. Цвѣтетъ въ Маѣ.

Другіе виды: *P. Daphnoideæ*. Съ желтыми цвѣтами.

P. Ausfeldi. Съ колючими листьями, — цвѣтами пурпуровыми снаружи, — золотисто-желтыми внутри. Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ, любитъ глинисто-вересковую землю.

P. ericoides. *P. linophylla*. *P. obcordata*. *P. polygolaefolia*. *P. retusa*.

1446. *Punica granatum*. *Граната. Гранатовое дерево.* Семейство *Granateae*. Дерево, въ южныхъ странахъ растущее на открытомъ воздухѣ, у насъ можетъ расти въ оранжереѣ и въ комнатѣ. Съ большими алыми цвѣтами, (отчего и получило названіе: *punicæus* — красный); но есть виды этого растенія съ бѣловатыми или желтоватыми цвѣтами, простыми или махровыми. Внутренность плода, такъ называемаго *граната*,

употребляется въ пищу, какъ лакомство. Размножается сѣменами и черенками. Зимой теряетъ листья и въ это время почти не поливается. Требуешь листовенную землю пополамъ съ дерновою и съ примѣсю четвертой части вересковой.

Другіе виды: *P. nana*. Карликовая граната. *P. gr. le-grellei*. Оранжевый, махровый большой цвѣтокъ.

1447. Purga. Jalappa. Изъ семейства *Convolvulaceae*. Въ тропическихъ странахъ собирается его корень, извѣстный въ медицинѣ подъ именемъ *Ялппы*.

1448. Puya chilensis. Изъ семейства *Bromeliaceae*. Содержится въ умеренной оранжереѣ. Съ большими, желтыми цвѣтами.

1449. Pyretrum. Ромашникъ. Изъ семейства *Compositae*. Многолѣтнее, садовое растеніе. Корень имѣетъ жгучій вкусъ, отчего растеніе и получило названіе. (*Pyg*—огонь).

Виды: *P. hybridum flore pleno*. Садовая персидская ромашка. Многолѣтнее, красивое, грунтовое растеніе; дико растетъ въ Персіи и на Кавказѣ, съ бѣлыми, розовыми или темно-карминовыми цвѣтами. Размножается дѣленіемъ старыхъ кустовъ и посѣвомъ; любитъ солнечное мѣсто, питательную почву и обильную въ сухое лѣтнее время, поливку.

P. album floribundum.

P. carneum. Изъ розово-малиновыхъ цвѣтовъ этого растенія выдѣлываютъ персидскій порошокъ. (Персидская ромашка—въ торговлѣ).

P. roseum. Ромашникъ розовый. Съ розовыми цвѣтами.

P. parthenium. Маточная трава. Ромашникъ маточный.

P. part. aureum. Зимой содержится въ оранжереѣ, съ золотисто-желтыми листьями. Размножается черенками самую раннюю весною.

P. corimbosum. Курья слѣпота. Дикорастущее.

P. ambiguum. Сердечная трава. Тоже.

P. roseum fulgens plenissima. Съ весьма махровыми, розовыми, на кончикахъ бѣлыми цвѣтами.

1450. Pyrus. Яблонь. Семейство *Pomaceae*.

Виды: *Pyrus communis*. Груша лѣсная. Дикорастущее, въ лѣсахъ, дерево, съ жесткимъ, твердымъ плодомъ, употреб-

ляемымъ въ пищу, въ приготовленномъ видѣ; размножается сѣменами, высѣваемыми осенью и отсадками отпрысковъ. Къ этому дереву прививается садовая груша. Любитъ тучную землю. Древесина употребляется на подѣлки, преимущественно въ токарномъ и рѣзномъ дѣлѣ.

Разновидности груши: *P. salicifolia*. *Лоховая груша*. *Г. Вербolistная*. Дерево, разводимое для украшенія садовъ и парковъ.

P. pompeiana. *Г. зимняя*.

P. rubescens. *Г. рыжѣющая*.

P. liquescens. *Г. наливная*. *Дуля*.

P. pollveria. *Г. неправильная*.

P. sinaica. *Г. синайская*.

P. nivasis. *Г. снѣжная*.

P. sinensis. *Г. китайская*.

P. acerba. *Кислица*. Дикорастущее въ лѣсахъ дерево.

P. malus. *Яблонь настоящая*. Дерево, разводимое въ садахъ для фрукта; имѣетъ множество разновидностей; объ его культурѣ существуетъ цѣлая литература, а потому мы не входимъ здѣсь въ исчисленіе его разновидностей и въ указаніе способовъ ухода за нимъ.

P. aucuparia. *Рябина*. Дикорастущее въ лѣсахъ дерево, разводится въ садахъ и паркахъ, какъ декоративное и для плодовъ, употребляемыхъ въ пищу.

P. sorbus. *Садовая рябина*. Разводится въ садахъ. Отличается отъ предыдущей болѣе крупными ягодами.

P. aria. *Бѣлая бакрышникъ*. Разводится въ садахъ и паркахъ, можетъ быть употребляемъ для устройства живой изгороди.*

P. baccata. *Парадизочки*. *Сибирская яблонь*. Дерево съ маленькими яблочками величиною въ крупную горошину; разводится преимущественно для украшенія садовъ. Разновидности этого вида:

P. baccata prunifolia. *P. b. cerasiformis*. *P. b. coccinea*. *P. b. c. major*. *P. b. dulcis*. *P. b. edulis*. *P. b. microcarpa*. *P. b. nigra*. *P. b. pellucida*. *P. b. striata*. *P. b. transparens*. *P. malus coronaria*. *P. m. aucubaefolia*. *P. m. fol. aur. variegatis*. *P. m. heterophylla*. *P. m. rubellina*. *P. m. tricolor*.

P. simonii. Плоды желтые полушаровидные, 2 дюйма въ диаметрѣ.

P. spectabilis roseoplana. Низкорослое деревцо, съ розовыми, полумахровыми, весьма красивыми цвѣтами.

P. ussuriensis. Растетъ въ дикомъ состояніи на Уссури.

P. japonica. Оранжевое растение.

P. japonica flore pleno. Тоже съ махровыми цвѣтами.

1451. *Pyxidanthera barbulata*. Изъ семейства *Diapensiaceae*. Маленькое, грунтовое растеніе, съ цвѣтами мелкими бѣлыми и малиновыми, составляющими какъ бы нарочно сдѣланный, плоскій, букетъ. Въ натурѣ любитъ черноземъ съ пескомъ, но искусственному разведенію и содержанію доселѣ не поддается.

1452. *Quassia amara*. *Квассія*. Американское деревцо, можетъ расти въ комнатѣ, съ весьма красивыми розовыми цвѣтами; размножается черенками; требуетъ листовую землю пополамъ съ дерновою и съ незначительною примѣсью песку. Горькая кора Квассіи употребляется для истребленія мухъ и служить дѣйствительнымъ средствомъ противъ лихорадки, отчего и получило свое названіе, по имени негра, отерывшаго это свойство растенія.

1453. *Quercus*. *Дубъ*. Изъ семейства *Cupuliferae*. Дикорастущее дерево, разводится въ садахъ и паркахъ; размножается сѣменами, которые высѣваются тотчасъ послѣ сбора; любитъ сильную глинистую почву съ сухою подпочвою.

Виды: *Q. roburo*. *Зимній дубъ*.

Q. robur nigra. Съ темными, почти черными, листьями.

Q. pedunculata. *Лѣтній дубъ*. *Д. обыкновенный*. Цвѣтеть въ Маѣ. Съ цвѣтовъ его пчелы берутъ взятокъ. Растетъ въ дикомъ состояніи, служитъ грандіознымъ украшеніемъ нашихъ садовъ и парковъ, въ молодомъ возрастѣ почти не отличается отъ *зимняго дуба*.

Q. pyramidalis. Имѣетъ пирамидальную форму — разновидность предыдущаго.

Q. Austriaca. *Д. Австрійскій*.

Q. Aegilops. *Д. Ливанскій*. Даетъ плоды, употребляемые въ пищу.

Q. coccifera. *Д. Кermesоносный*. Растетъ въ Южной Ев-

ропѣ; на немъ собираютъ насѣкомое *Кермесъ*, изъ котораго добывается малиновая краска.

Q. infectoria. *Д. красивый*. Растетъ въ Азіи.

Q. Turneri. *Турнеровъ дубъ*. Растетъ въ Тибетскихъ горахъ.

Q. ballota. *Д. вкусный*. Растетъ въ Сѣверной Африкѣ.

Q. pseudo-coccifera. *Д. колючій*. Растетъ въ Алжирѣ.

Q. striata. Японское, пирамидальное дерево, съ опадающею зеленью и пестрыми листьями.

Q. prinus. *Д. Каштановидный*. Одно изъ красивѣйшихъ Сѣверо-Американскихъ деревьевъ, достигаетъ 90 футовъ высоты, выноситъ небольшіе морозы и потому можетъ быть разводимо въ Европѣ.

Другія Американскія породы дуба:

Q. discolor. *Д. волосистый*. Достигаетъ высоты 70 футъ, имѣетъ весьма крѣпкую древесину.

Q. montana. *Д. горный*.

Q. virens. *Д. зеленѣющій*. Растетъ преимущественно по морскимъ берегамъ, любитъ кремнисто-песчаную почву, смѣшанную съ морскими раковинами.

Q. tinctoria. *Д. красивый*. Достигаетъ 90 футъ высоты. Кора его употребляется для выдѣлки кожъ и окраски матерій въ желтый цвѣтъ.

Q. olivaeformis. *Д. маслинovidный*.

Q. macrocarpa. *Д. кудрявый*. Съ большими желудями.

Q. castanea. *Д. каштановидный*.

Q. alba. *Д. бѣлый*. Достигаетъ 80 футъ вышины, чрезвычайно упругъ, можетъ быть сгибаемъ даже достигнувъ значительной толщины, а потому употребляется въ кораблестроеніи.

Q. obtusiloba. *Д. звездолистный*. Меньше предыдущаго, весьма пригоденъ для кораблестроенія, растетъ на сухой, хрящевой почвѣ.

Q. lyrata. *Д. Лирообразный*. Растетъ на болотистыхъ мѣстахъ.

И другіе.

Q. ilex. *Д. каменный*. Растетъ въ Южной Европѣ; имѣетъ листья колючіе по краямъ; стволъ съ темною корою.

Q. suber. *Д. пробковый*. Растетъ въ Испаніи и Сѣверной

Африкѣ. Листья сохраняютъ всю зиму, нашего климата не выносятъ; очень толсты не бываетъ; кора его идетъ на выдѣлку пробокъ.

Q. sessiliflora. *Зимній дубъ*. Растетъ въ Южной Европѣ и на Кавказѣ, но сѣверной зимы не выноситъ. Кора и плоды имѣютъ лекарственныя свойства.

Q. mongolica. *Чахалъ-Кура*. Листья сѣроватаго цвѣта.

Q. rubra. *Д. красный*. Оба вида изъ Сѣверной Америки. Осенью ихъ зелень бываетъ окрашена въ великолѣпный, красный цвѣтъ. Нашихъ суровыхъ зимъ не выноситъ.

Q. pubescens. *Д. мякволоосый*. Растетъ въ Южной Россіи и на Кавказѣ; въ суровыя зимы страдаетъ, а потому требуетъ покрывки.

1454. *Quisqualis indica*. Вьющееся растеніе, съ желтоватыми цвѣтами, можетъ расти въ комнатѣ; размножается черенками и отводками; требуетъ дерновую землю пополамъ съ листовною и съ незначительною примѣсью вересковой. Зимую теряетъ листъ.

1455. *Ramondia pyrenaica*. *Пиринейская рамондеа*. Многолѣтнее растеніе съ изящными, фіолетовыми цвѣтами, живущее на горахъ Южной Европы, у насъ содержится въ оранжереѣ. Любитъ листовую или вересковую землю, съ прибавкою песку и глины. Лѣтомъ выставляется на такое мѣсто въ саду, куда солнце ходитъ только утромъ. Размножается сѣменами и дѣлѣніемъ; цвѣтетъ весною.

1456. *Ranunculus*. *Лютикъ*. *Ранункулъ*. Семейство *Ranunculaceae*. Многолѣтнее, корневое, травянистое растеніе, съ желтыми, красными, лиловыми или темными цвѣтами—простыми или махровыми; размножается сѣменами и дѣленіемъ корней. За этимъ растеніемъ требуется слѣдующій уходъ: корни ранункула, въ видѣ шишечекъ, содержатъ сухо до Іюня, выносятъ на воздухъ и осенью, когда образуются цвѣточныя почки пересаживаютъ по нѣскольку штукъ въ горшки, въ землю, составленную изъ лиственной, съ примѣсью половиннаго количества дерновой и четвертой части торфяной; держатъ въ мѣстѣ, нѣсколько притѣненномъ.

Для зимней пристановки прошлогоднія шишки ранункула,

въ Августѣ мочать нѣсколько часовъ въ водѣ и сажаютъ штуки по 4 въ 6-ти, дюймовые горшки, въ смѣсь дерновой земли съ пескомъ или въ смѣсь листовой земли съ одною третью глины. Шишки эти покрываются землею на полдюйма и пока не разовьются листьямъ поливаются весьма умѣренно. Въ теплую погоду горшки покрываются мхомъ для поддержанія въ нихъ влаги, затѣмъ для защиты отъ утренниковъ, ставятъ ихъ въ парникъ, когда же растеніе достигнетъ нѣкотораго развитія, оно ставится въ умѣренный парникъ и обильно поливается, а въ солнечное время притѣняется. Когда начнутся морозы, растеніе переносится въ оранжерею или прохладную комнату, причеиъ цвѣтеть въ Январѣ или въ Февралѣ, тогда какъ въ парникѣ цвѣтеть въ Декабрѣ. Вообще надо имѣть въ виду, что чѣмъ позднѣе шишки будутъ посажены, тѣмъ позднѣе растеніе будетъ цвѣсть и потому, сажая его разновременно, можно имѣть въ цвѣту всю зиму.

Чтобы имѣть цвѣтущій въ грунту ранункулъ, въ Мартѣ или Апрѣлѣ, его сажаютъ въ Октябрѣ или въ Ноябрѣ, въ вышеуказанную смѣсь земли и покрываютъ парниковымъ ящикомъ, который при наступленіи морозовъ, окутывается навозомъ, покрывается соломой и листьями, а въ теплую погоду провѣтривается.

Виды: *R. bulbosus*. *Жабинецъ*.

R. grandiflorus. *R. speciosus flore plena*, съ махровымъ цвѣткомъ.

R. sceleratus. *Нарывная трава*.

R. spicatus. Съ желтыми цвѣтами.

R. repens. *Вьющійся ранункулъ*. *Зоря мушкетера*. *Лютикъ стелющійся*; съ махровыми, желтыми цвѣтами.

R. flammula. *Чечина*.

R. fucaria. *Чистякъ*.

R. cassubicus. *Козелецъ*.

R. arvensis. *Куповка*.

R. acris. *Купальница*.

R. aconitifolius. *Лютикъ аконитовидный*. *Серебряная куповка*. *Бѣлая голубая*. Грунтовой растеніе, съ бѣлыми цвѣтами.

R. asiaticus. *Л. азіатскій*. Садовое растеніе, только лѣ-

томъ содержится въ грунту, а зимою сохраняется въ подвалѣ или оранжереѣ; даетъ простые или махровые цвѣты.

R. asiaticus superbissimus. *Л. садовой*; со множествомъ коротенькихъ, плотныхъ стеблей, покрытыхъ цвѣтами. Многолѣтнее растеніе размножается дѣленіемъ и выводится отъ семянъ. Высаженное раннею весною въ грунтъ покрывается опрокинутымъ горшкомъ, потому что боится утренниковъ.

1457. Raphanus sativus esculentus. *Рѣдька.* Изъ семейства **Cruciferae**. Двухлѣтнее растеніе, корни котораго употребляются въ пищу въ сыромъ видѣ. Рѣдька бываетъ лѣтняя, осенняя и зимняя. Требуется легкой земли и открытой мѣстности, не любитъ свѣжаго удобренія. Сѣется и прямо въ грунтъ и въ парники, для ранняго употребленія. Въ гряды рѣдьку сажаютъ на глубину $\frac{1}{4}$ вершка, зерна по три въ одну лунку, вершкахъ въ трехъ одна отъ другой. Сѣютъ обыкновенно сухое сѣмя, но для ускоренія роста, сажаютъ сѣмя, моченое впродолженіи 4-хъ часовъ. Лѣтнюю рѣдьку сажаютъ съ Марта до Іюня, зимнюю въ концѣ Мая. По всходѣ сѣмень въ каждомъ гнѣздѣ оставляютъ по одному растенію, выдернутые ростки сажаютъ особю, немного обрѣзавъ ботву. Посѣвъ часто поливаютъ, гряды хорошо опалываютъ и разрыхляютъ. Для полученія крупной рѣдьки, раза четыре въ лѣто раскачиваютъ ее во всѣ стороны, отнюдь впрочемъ не выдергивая ее и не тревожа окончности корня. Также для увеличенія объема рѣдьки, осторожно вырѣзываютъ средніе листья. При уборкѣ рѣдьки на зиму, не нужно вмѣстѣ съ ботвою отрѣзывать коронки, а то рѣдька гніетъ и портится.

Лѣтняя рѣдька бываетъ: *бѣлая, страя, черная, длинная, круглая, желтая Майская.* Осенняя — бываетъ: *фіолетовая (лучшій сортъ) ульмская—сѣровато-мраморная, розовая китайская (самый лучшій сортъ).*

Зимняя: Эрфуртская круглая; тоже длинная, тоже черная и тоже бѣлая.

Другой видъ:

Radicula. *Редисъ.* Овощъ, употребляемая въ пищу, въ сыромъ видѣ; разводится въ грунту на открытомъ воздухѣ, въ парникахъ и въ теплицѣ.

Въ грунтъ редисъ сажается въ Мартѣ, Апрельѣ, Августѣ

и Сентябрѣ, верхкахъ въ трехъ другъ отъ друга, въ рыхлую, питательную, но не свѣже унавоженную землю, на солнечное мѣсто; сильно поливается — для сочности; тщательно опалывается и посыпается табакомъ съ известью, для спасенія отъ земляной блохи. Посадка редиса производится каждыя двѣ недѣли, чтобы постоянно имѣть свѣжій, не проросшій.

Для сѣменъ, редисъ перваго посѣва пересаживается на отдѣльныя гряды.

Для полученія ранняго редиса употребляютъ различные приемы. Исчислимъ нѣкоторые:

1) Редисъ сѣется въ парникъ или ящикъ въ теплицѣ и когда кончатся морозы разсаживается на гряды.

2) Сѣется на теплыя гряды въ Февралѣ или началѣ Марта, а въ Апрѣлѣ получается овоць.

3) Моченымъ сѣменемъ высѣваютъ въ обыкновенные парники, въ Февралѣ.

4) Выращиваютъ въ нарочно устроенныхъ теплицахъ.

Редису множество сортовъ:

а) *Круглый*: бѣлый ранній; тоже желтый, розовый, фіолетовый.

б) *Длинный*: бѣлый, розовый, фіолетовый, пунцовый англійскій — лучший сортъ, Бена парниковый, ярко-красный — самый лучший сортъ.

в) *Овальный*: бѣлый, розовый, шарлаховый.

г) *Красный*: китайскій, зимній.

1458. Ravenala (Urania). Изъ семейства Musaceae. Дерево, растущее на островѣ Мадагаскарѣ, похожее на Стрелицію. Тепличное и вмѣстѣ комнатное растеніе, съ бѣлыми цвѣтами и большими, лоснящимися листьями, достигающими трехъ аршинъ длины и аршина ширины. Размножается сѣменами и отростками; требуетъ торфяную землю, съ примѣсью шестой части листовенной и незначительнаго количества дерновой; любитъ постоянно сильную поливку.

Виды: *R. urania*—*Speciosa*.

R. madagascariensis. На вершинѣ толстаго, быстро растущаго ствола, множество широкихъ и длинныхъ листьевъ, правильно расположенныхъ—вѣеромъ. Въ стволѣ этого дерева, даже въ самую сильную засуху, содержится большее ко-

личество чистой, холодной воды. У насъ его выводятъ въ теплицѣ, въ легкой, питательной землѣ; требуетъ сильной поливки.

1459. *Reevesia thyrsoidea*. Прекрасное оранжерейное растеніе, съ бѣлыми цвѣтами. Любитъ много свѣту; питательную, смѣшанную землю; умеренную поливку; размножается черенками; будучи содержимо въ теплицѣ цвѣтеть по нѣскольку разъ въ году.

1460. *Rehmannia glutinosa*. Изъ семейства *Cyrtandraceae*. Грунтовое растеніе, съ фіолетово-малиновыми цвѣтами. Цвѣтеть въ горшкѣ раннею весною. Размножается дѣленіемъ корней.

1461. *Reineckia rosea fol. variegat.* Многолѣтнее садовое растеніе, зимою сохраняемое въ подвалѣ или оранжерей. Лѣтомъ высаживается въ грунтъ.

Другой видъ: *R. carnea fol. varieg.* Оранжерейное растеніе.

1462. *Reseda odorata*. *Резеда*. Семейство *Resedaceae*. Медоносное, однолѣтнее растеніе, которое при внимательномъ уходѣ, дѣлается многолѣтнимъ и даже древковатымъ. Имѣетъ очень душистый, слишкомъ хорошо всѣмъ извѣстный цвѣтокъ, чтобы его здѣсь описывать. Въ грунтъ высѣвается въ началѣ Мая. Для горшечной культуры, чтобы имѣть резеду въ цвѣту лѣтомъ, сѣютъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ, а для зимняго цвѣтенія въ Августѣ и Юлѣ. По всходѣ разсаживаютъ по нѣскольку штукъ въ горшокъ, причемъ на дно, послѣ слоя черепковъ кладутъ слой голубиного помета и обыкновенную, тучную, садовую землю. Растетъ и цвѣтеть въ комнатѣ. Любитъ землю парниковую съ пескомъ.

Ранняя резеда не любитъ пересадки, а потому ее лучше высѣвать прямо въ тотъ горшокъ, въ которомъ она должна расти, затѣмъ если она густо взойдетъ, то только выпалывать лишнія растенія; но если резеду сѣютъ въ ящики, то ее надо разсаживать въ самомъ раннемъ возрастѣ. Когда резеда достигнетъ нѣсколькихъ дюймовъ вышины, надлежитъ отщипывать кончики ея вѣточекъ, чтобы росла кустистѣе. Зи-

мою ее надо держать въ оранжереѣ или въ холодной комнатѣ, поближе къ окну и мало поливать; въ Февралѣ поливку надлежитъ усилить.

Виды: *R. odorata grandiflora*.

R. odorata arborea.

R. luteola. *Церва*. *Желтуха*. Дикорастущее, разводится для добыванія изъ ней желтой краски.

R. capensis. *R. ameliorae*.

R. alba. Съ бѣловатыми цвѣтами.

Слѣдующіе виды съ крупными красными цвѣтами.

R. odorata gigantea.

R. o. perfecta.

R. o. pyramidalis.

R. odorata nana compacta multiflora. Густой, вѣтвистый, полуокруглый кустъ, съ плотнымъ стеблемъ и темно-зеленымъ листомъ, съ красноватыми, яркими цвѣтами; цвѣтеть всю весну, лѣто и осень; весьма хорошо выводится въ горшкахъ.

R. od. gigantea pyramidalis. Древковидной формы, пирамидальнаго вида, съ красноватыми цвѣтами.

1463. *Restrepia elegans*. Миниатюрная тепличная Орхидея. Цвѣтки розовые съ бѣлымъ, нижняя губа оранжевая въ крапинахъ.

1464. *Retinospora*. Хвойное дерево, размножается черенками.

Слѣдующіе виды содержатся въ оранжереѣ.

R. ericoides. *R. leptoclados*.

R. obtusa. Прекрасное японское дерево, съ маленькими тонкими листьями.

R. pisifera. *R. p. argentea*. *R. p. aurea*. *R. licorodioides*. Съ вѣтвями, покрытыми какъ чешуей; маленькими тупыми листьями.

R. argentea. Съ листьями, покрытыми сверху, серебристымъ, голубовато-бѣлымъ налетомъ.

1465. *Rhamnus*. *Болбанъ*. *Крушина*. Семейство *Rhamnaceae*.

Кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ и парковъ. Размножается сѣменами и черенками. Любитъ твердую и влажную почву.

Виды: *R. cathartica*. *Жостеръ. Бирючина. Крушина лом-
кая*. Съ цвѣтовъ этого дерева въ Іюнѣ и Іюлѣ, пчелы берутъ
взятокъ. Уголь изъ него идетъ на выдѣлку пороха.

R. alpina. *К. альпійская*. Требуется покрывши на зиму.

R. daurica. *Сандагъ*.

R. Erythroxylon. *Красное дерево*. Растетъ въ Сибири
на р. Селенгѣ.

R. humilis. *К. Ползучая*.

R. glandulosus. *К. железистая*.

R. frangula. *К. хрупкая*. Изъ коры его добывается жел-
тая краска.

R. infectoria. *Красильная крушина. Авиѣонскія зерна*.
Имѣетъ врабечныя свойства.

R. Pallasii. *Дирусучка. Кустовникъ. Придорожный толкн*.

R. Alatern aur. varieg. Съ душистыми, зеленоватыми
цвѣтами, растетъ въ грунту, но зимою содержится въ оран-
жереѣ или подвалѣ.

R. clusii fol. var. R. laevigatus. Оранжевые расте-
нія.

R. saxatilis. *К. каменная*. Небольшой кустарникъ, выши-
на 1½ вышиною, съ мелкими листьями. Ягоды его идутъ для
приготовленія краски.

R. hybrida. *К. вырожденная*.

R. alnifolia. *К. ольховистая*.

1466. *Rhaphia*. *Рафія*. Родъ Пальмъ. Стволъ очень короткій; пе-
ристые, весьма сильно развитые листья. Размножается отдѣ-
леніемъ дѣтокъ, образовавшихъ самостоятельныя корешки.

Другіе виды: *R. thaedigera*. Растетъ на плавучихъ остро-
вахъ нижней Амазонской рѣки.

R. nicaraguensis. Растетъ на берегахъ и мокрыхъ лу-
гахъ, не заливаемыхъ рѣкою.

1467. *Rhaphidophora dilacerata*. (*Scindopsus monstera*).

Декоративное растеніе, съ вырѣзанными листьями; взползаетъ
по стволамъ отжившихъ деревьевъ. Чтобы дать ему полное раз-
витіе, вынувъ растеніе изъ горшка стуломъ, обертываютъ его
мхомъ и проволокою и прикрѣпляютъ къ отжившему древес-
ному стволу. При частомъ оспрыскиваніи, сильно и быстро
развивается, представляя красивую декорацию, если на верху

ствола, служащаго ему основаніемъ, помѣщаются разныя *Bromeliaceae*, а нижнюю часть ствола обставляютъ папоротниками.

- 1468. *Rhaphis*.** Родъ Пальмъ. Низкорослое, оранжерейное растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ, съ рукообразными, раздѣленными листьями и красноватыми цвѣтами, размножается сѣменами и отростками. Требуется вересковую землю пополамъ съ дерновымъ и съ незначительною примѣсью листовенной съ пескомъ.

Виды: *R. flabeliformis*. *R. f. fol. aureo variegata*. Изъ Японіи, съ полосатыми—зелеными съ бѣлымъ листьями.
R. chinensis.

- 1469. *Rhaphistemma pulchellum*.** Тепличное ползучее растеніе, съ большими бѣлыми съ розовымъ душистыми цвѣтами. Любитъ тучный компостъ тепло и сильный свѣтъ. Лучше всего посадить его въ грунтъ теплицы. Требуется частаго опрыскиванія во время роста, для спасенія отъ нападающихъ на него насѣкомыхъ. Размножается черенками.

- 1470. *Rheum palmatum*.** *Ревень копытчатый*. Изъ семейства *Poligonaceae*. Многолѣтнее садовое, грунтовое растеніе, имѣющее много видовъ; стебли и листья употребляются какъ овощъ; родится на всякой почвѣ, но она должна быть глубоко перепахана; размножается сѣменами и дѣленіемъ корней; осенью кругомъ кустовъ перекапываютъ землю и удобряютъ навозомъ изъ парниковъ. Растеніе бѣлутъ накрывая опрокинутыми горшками или корзинами; ревень зимою не требуетъ покрышки; цвѣточные стебли срезаются въ зародышѣ. Чтобы имѣть ранній ревень, бѣленіе начинаютъ съ Февраля, причемъ опрокинутые надъ нимъ горшки или корзины заваливаютъ свѣжимъ, горячимъ навозомъ.

Другіе виды: *R. Rhaponticum*. *R. сибирскій*. *R. черноковый*.

R. nobili. Образуетъ конусъ въ нѣсколько футовъ вышины, причемъ нижніе листья совершенно зеленые и весьма крупные, по мѣрѣ возвышенія стебля листья мельчаютъ и на верху конуса являются мелкими съ розовымъ отливомъ.

R. undulatum. *R. кислецъ*.

R. Emodi. Самая красивая разновидность съ маленькими, зеленовато-бѣлыми цвѣтами. Любитъ тѣнистое мѣсто, глубокую, питательную почву; можетъ зимовать въ грунтѣ; размножается сѣменами и дѣленіемъ корней.

1471. **Rhexia.** Красивое, американское кустовое растеніе, съ розовыми или пурпуровыми цвѣтами; можетъ расти въ комнатѣ; размножается черенками требуетъ вересковую землю, съ примѣсью половины дерновой и небольшого количества лиственной.

Виды: **R. rosea. R. Mariana. R. Virginea.**

1472. **Rhodante manglesii.** *Сухивецъ. Иммортель. Безсмертникъ.* Изъ семейства **Compositae**. Однолѣтне грунтовое растеніе; цвѣты снаружи серебристо-бѣлые, а внутри розовые болѣе или менѣе темные; либо снаружи розовые съ желтою сердцевиною; ихъ срѣзаютъ не совсѣмъ еще распустившимися и сохраняютъ для зимнихъ букетовъ. Сѣется въ умѣренный парникъ или въ плошку, которая ставится на окно въ комнату; въ Маѣ высаживается въ грунтъ, въ рыхлую песчанистую, неунавоженную землю, на солнечное мѣсто.

Другіе виды: **R. manglesii major. R. maculata. R. maculata alba. R. atrosanguinea.**

1473. **Rhodiola rosea.** Многолѣтнее садовое растеніе.

1474. **Rhododendron.** Изъ семейства **Ericaceae.** *Рододендронъ. Плоховецъ.* Оранжевое дерево, съ большими букетами бѣлыхъ, розовыхъ, лиловыхъ, малиновыхъ или оранжевыхъ цвѣтовъ. Можетъ расти въ комнатѣ, хотя съ трудомъ переносить въ ней зиму. Нѣкоторые виды его сажаются въ грунтъ на лѣто. Размножается сѣменами и черенками; требуетъ землю составленную изъ равныхъ частей дерновой, вересковой и лиственной. Пересаживается послѣ того, какъ отцвѣтетъ. Все лѣто требуетъ сильной поливки; съ горшкомъ сажается въ грунтъ, чтобы лучше цвѣло.

Рододендронъ можетъ подвергаться ранней выгонкѣ. Для этого преимущественно употребляютъ: **R. ciliatum** и **R. virgatum album.**

Назначенные къ ранней выгонкѣ Рододендроны, съ осени

ставять въ оранжерею, а въ Январѣ переносятъ въ теплицу. Растеніе постоянно опрыскиваютъ. До открытія цвѣтовъ. Рододендронъ держатъ вдали отъ оконъ, но не слишкомъ тепло. Отцвѣвшее растеніе ставятъ на свѣтъ, потому что въ это время оно пойдетъ въ ростъ.

Виды: *R. niveum*. *R. бѣлоснѣжный*. Кустарникъ достигающій 6 футъ, любитъ, какъ и другіе Рододендроны болотную землю, смѣшанную съ глинистою и небольшимъ количествомъ бѣлаго песку.

R. ciliatum. Низкорослый, съ бѣлыми цвѣтами. *R. cil. var. roseo albo* цвѣты бѣлые съ розовымъ.

R. Gibsonis. Съ крупными, съ слегка розоватыми бѣлыми, душистыми цвѣтами, содержится въ теплицѣ зимою, а лѣтомъ выставляется на открытый воздухъ въ затѣненное и если можно влажное мѣсто.

R. smithii aureum. Произошелъ отъ прививки *Rodod. Ponticum* къ *Azalea sinensis*. Отличается большимъ букетомъ золотисто-желтыхъ цвѣтовъ.

R. virgatum album. Съ мелкими цвѣтами.

R. odoratum.

R. ponticum. *Алѣйская роза. Розовое дерево*. Съ пурпурово-фіолетовыми цвѣтами, раскрывающимися въ Мартъ въ оранжереѣ, а на Кавказѣ въ дикомъ состояніи — въ Маѣ. Существуетъ убѣжденіе, что медъ, собираемый пчелами съ этого растенія вреденъ.

R. ponticum vervaencanum flore pleno. Съ огромнымъ букетомъ лиловыхъ цвѣтовъ.

R. caucasicum.

R. kamtshaticum.

R. arboreum. *Древовидный рододендронъ*. Съ красными, бѣлыми, желтыми или розовыми цвѣтами. На лѣто его можно высаживать въ грунтъ.

R. barbatum. Оранжерейное растеніе съ букетомъ большихъ розовыхъ цвѣтовъ.

R. Javanicum. Огромный букетъ желтыхъ съ краснымъ внутри, цвѣтовъ.

R. javanicum flore aurantiaco. Оранжевые цвѣты розовые у центра.

R. maximum. *Большой Р.* Съ розовыми или бѣлыми цвѣтами.

R. argenteum. Тоже съ большими бѣлыми цвѣтами и листьями имѣющими при раскрытіи, а равно во всякое время съ тыльной стороны металлическій отливъ и блескъ.

R. ferrugineum. Листья его, съ нижней стороны красно-бурые отъ мелкихъ чешуекъ.

R. Thompsonii. Съ весьма большими пурпурово-красными цвѣтами.

R. Dauricum. *Пьянишникъ.* Имѣетъ лекарственныя свойства. Съ лиловыми цвѣтами.

R. Chrysanthum. *Пьяная трава.*

R. Falconeri. *Р. фалконера.* Съ букетомъ бѣлыхъ цвѣтовъ. Лѣтомъ надлежитъ выставять изъ оранжереи на солнечное мѣсто. Листья его весьма плотные, похожи на листъ Фивусъ эластикумъ съ изнанки желтые, испещрены зелеными жилками.

R. Falconeri var. minor. Разновидность предыдущаго.

R. hirsutum. Разводится посѣвомъ въ Февралѣ или Мартѣ, въ плошки съ хорошою, вересковою или глинистою землею. Сѣмена его или вовсе не покрываются землею или только слегка засыпаютъ тонкою, песчанистою и вересковою землею. Поливается не сверху; а плошка съ посѣвомъ ставится въ поддонъ съ водою.

R. chamaecistus. Тоже.

R. pendulum. Съ бѣлыми цвѣтами повислыми на длинныхъ вѣткахъ.

R. pumilum. Съ маленькими листьями и розовыми цвѣтами.

R. glaucum. Съ розовыми цвѣтами.

R. triflorum. Съ желтыми цвѣтами.

R. camelliae florum. Съ мелкими цвѣтами, совершенно почти не похожими на обыкновенный цвѣтокъ рододендрона; растетъ въ горахъ на высотѣ до 12000 футъ, надъ уровнемъ моря.

R. Brookianum gracilis. Тепличный кустъ, съ блѣдно-желтыми цвѣтами.

R. molle. Съ опадающими листьями и темно-оранжевыми цвѣтами.

R. semibarbatum. Съ маленькими листьями и мелкими, желтовато-зелеными цвѣтами.

R. longifolium. *P. Длиннолистый.* Цвѣты бѣлые съ пурпуровыми пятнами, отличается превосходною зеленою размножается сѣменами или прививкою.

R. Brookianum flavum. *P. желтый. Брука.* Тепличный не высокій кустарникъ съ очень плотными темнозелеными кожистыми листьями и свѣтло-желтыми цвѣтами кистью.

R. citrinum. Съ небольшими желтыми цвѣтами.

Въ продажѣ у сѣмяноторговцевъ и садоводовъ существуетъ очень много разновидностей Рододендрона, изъ которыхъ замѣчательны.

Album elegans. Бѣлый.

A speciosum. Тоже.

Baron d'osy. Бѣлый съ кармозинными разводами.

Bijou de gand. Розоватый, съ пунцовыми краями.

Boddaertianum. Карминовый, съ бѣловатою серединою.

Brebnerii. Свѣтло-розовый, съ желтыми пятнами.

Bylsianum. Бѣлый, окаймленный ярко-розовымъ.

Caractacus. Пурпурово-кармозинный.

Charles Bagley. Серизовый.

C. Diekens. Пурпурово-фіолетовый, съ чернымъ.

C. Wagner. Свѣтло-розовый, съ чернымъ.

Chianoides. Бѣловатый въ пятнахъ.

Clovesianum. Бѣлый съ фіолетовыми полосками.

Comte Gomer. Тѣлеснаго цвѣта съ ярко-розовыми краями.

C-sse Salvi. Нѣжно-розовый съ широкими ярко-розовыми краями.

Cruentum. Красный.

Dieudonné Spaë. Красный съ бѣловатою середкою.

Dinorah. Амарантоваго цвѣта съ черными пятнами.

D-r Moore. Лиловато-розовый, съ кармозинными полосами.

Duc. Adolph de Nassau. Розовый, середка свѣтлая съ коричневыми полосами.

Edgeworthii. Весьма большіе желтовато-бѣлые душистые цвѣты. Листья съ изнанки свѣтло-коричневые.

Etendard de Flandre. Фіолетовый въ пятнахъ.

Evelyn. Бѣлый.

Francis Diekson. Пурпуровый

- Gibsonis. Большой, бѣлый душистый цвѣтокъ.
Gloria Gandavensis. Бѣлый, съ коричневыми полосами.
Guido. Темно-кармозинный.
H. W. Sargent. Кармозинный.
Ienkinzi. Желтый.
John Spencer. Розовый, къ краямъ темнѣе.
I. Waterer. Кармазинно-пурпуровый.
Joseph Withworth. Темно-малиновый, большой, будто бы бархатный цвѣтокъ, съ черными крапинами.
Lady Armstrong. Свѣтло-розовый съ пятнами.
Lady Francis Crossley. Розовый, цвѣта лососины.
Lord Clyd. Кроваваго цвѣта.
M-me Barton. Розовый, съ желтоватыми полосами и бѣлою серединою.
M-me Rude Abel. Бѣло-розовый, съ темными полосами.
Marginata punctatum. Бѣлый съ кармозиновымъ.
Minnie. Блѣдно-розовый, съ темно-ранжевными полосами.
M-rs Heneage. Пурпуровый, съ бѣлою серединою.
M-rs Holford. Лососинаго цвѣта.
M-rs I. Waterer. Красно-кармозиноваго цвѣта.
M-rs Ioh Clutton. Бѣлый.
M-rs Thomas Wain. Свѣтло-розовый съ темными пятнами.
M-rs Will Bowill. Ярко-розовый.
Multimaculatum. Розовый, совершенно покрытый черными пятнами.
Old-Port. Фиолетовый.
Othello. Пурпурово-кармозиновый.
Omnigutatum. Розовый, покрытый коричневыми пятнами.
Ornatissimum. Блѣдно-розовый, отбѣненный розово-фиолетовымъ.
President van den Hecke. Красный, съ черными пятнами.
Prince Camille de Rohan. Свѣтло-розоватый, съ красными полосами.
P-sse Alice. Свѣтло-лиловый съ черными полосами.
Purity. Бѣлый, съ желтыми пятнами.
R. s. Field. Пурпуровый.
Roseum egregium. Розовый.

Roseum plenum. Махровый, лилово-розовый.

Scipio. Розовый, съ темными пятнами.

Sir Thomas Sebright. Пурпуровый съ пятнами бронзового цвѣта.

Stella. Нѣжно-розовый, съ желтыми пятнами.

The grand Arab. Кармозинный.

Verschaffelti. Лиловый, бѣлая середка, съ черными полосами.

Zampa. Темно-красный.

Существуетъ особый видъ Рододендрона, съ большимъ числомъ разностей, а именно; **R. Catawbiense. Р. Американскій.** Въ теплыхъ мѣстностяхъ Россіи можетъ расти прямо въ грунту, на воздухѣ, но на зиму требуетъ хорошей покрывки. Вообще же въ Россіи ихъ надлежитъ на зиму вынимать изъ грунта и держать въ простѣнѣхъ оранжереи или подвалѣ. Раннею весною Рододендронъ этотъ опять высаживается въ грунтъ, въ которомъ должна преобладать торфяная земля. Въ продажѣ извѣстны слѣдующія разности Американскаго Рододендрона:

R. Cataubense album. Тоже—**elegans. R. C. grandiflorum. R. C. Alilla. R. C. aucubaefolium. R. C. azureum. R. C. bicolor. R. C. blandum. R. C. coelestinum.** Тоже—**grandiflorum. R. C. coerulescens. R. C. columbus. R. C. delicatum. R. C. Everstianum. R. C. giganteum. R. C. gloriosum. R. C. Hannibal. R. C. incidum. R. C. maculatum nigrum. R. C. Marc Anthony. R. C. perspicuum. R. C. purpureum elegans. R. C. rubrum.**

1475. Rhodoleia championi. Оранжерейное растеніе изъ семейства **Hamamelideae.** Съ большими малиново-розовыми цвѣтами. Требуется той же культуры, что и простая Камелія.

1476. Rhodotypus kerrioides. Оранжерейный кустарникъ, съ бѣлыми цвѣтами, размножается черенками.

1477. Rhopala. Красивое, орнаментальное, теплолюбивое и вмѣстѣ комнатное деревцо, удобно содержится и въ оранжереѣ. Даетъ желтоватые цвѣты. Размножается отводками и черенками, впрочемъ долго не дѣлающими корней. Требуется земля составлен-

ную изъ дерновой пополамъ съ глинистой. Любитъ обильную поливку во время роста и сильное провѣтриваніе.

Виды: *R. corcovadensis*. *R. Ionghii*. *R. magnifica*. *R. montana*. *R. crenata*. *R. glaucophylla*.

1478. *Rhynchosarpa*. Однолѣтнее растеніе, не заслуживаетъ разведенія.

1479. *Rhynchopsidium sessiliflorum*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

1480. *Rhynchosia albo-nitens*. Тепличное растеніе.

Другой видъ: *R. chrysocias*. Замѣчательное лазящее растеніе, съ букетомъ крупныхъ, ярео-желтыхъ цвѣтовъ. Содержится въ умѣренной теплицѣ и даже въ оранжереѣ.

1481. *Rhynchospermum jasminium*. Изъ семейства *Aprocytaeae*. Оранжерейное, кустарное, вьющееся растеніе, съ бѣлыми, душистыми цвѣтами. Любитъ листовенную землю съ пескомъ. При тщательномъ уходѣ, можетъ зацвѣсть въ Январѣ. Требуется умѣренную поливку, особенно зимою. Размножается черенками.

1482. *Rhytidophyllum floribundum*. Тепличное растеніе съ пунцовыми цвѣтами. Требуется той же культуры, что и Геснерія.

1483. *Rhytiglossa cristatas*. Тепличное растеніе, цвѣтетъ въ Февралѣ. Требуется того же ухода, что и Юстиція.

1484. *Rhus*. *Желтникъ*. *Сумахъ*. Изъ семейства *Cassuviae*. Кустарникъ разводимый въ садахъ и паркахъ. Размножается отдѣленіемъ отпрысковъ.

Виды: *R. angustifolia*. *Ж. узколистный*.

R. arborescens. *Ж. древесный*.

R. coriaria. *Ж. красильный*. *Кожевенное дерево*. Идетъ на дубленіе кожъ. Дико растетъ въ Крыму и на Кавказѣ.

R. cotinus. *Рай-дерево*. *Ж. красильный*. Кустарникъ съ желтоватою древесиною, дающею хорошую краску. Имѣетъ душистый запахъ. Большихъ морозовъ не выноситъ. Размножается сѣменами и отводками. Любитъ сухую и рыхлую землю.

R. elegans. *Ж. красивый*.

R. glabra. Ж. гладкій. Укусное дерево. Оранжевое растение. Ягоды употребляются на приготовление уксуса.

R. typhina. Ж. олений. Виргинское укусное дерево.

R. toxicodendrum. Ж. ядовитый. Сѣверо-Американское ядовитое растение, вредное даже своимъ испареніемъ, въ жаркую и сырую погоду.

R. vernix. Ж. лаковый. Японское ядовитое растение; изъ млечнаго сока его Японцы добываютъ свой превосходный лакъ.

R. coppalinum. Ж. смолистый.

R. radicans. Ж. коренистый.

R. osbeckii. Орнаментальный кустарникъ, съ мелкими, бѣлыми цвѣтами—метелкою.

1485. Ribes. Смородина. Кустарникъ, приносящій ягоды, употребляемыя въ пищу.

Виды: **R. nigrum.** Черная Смородина.

R. rubrum. Красная С.

Многолѣтній кустарникъ ежегодно дающій плоды, употребляемые въ пищу сырыми и различными способами приготовленными. Цвѣтетъ въ Апрѣлѣ и Маѣ; съ цвѣтовъ его пчелы берутъ взятокъ. Смородина, особенно черная, любитъ нѣсколько влажную почву, составленную изъ глинисто-черноземной земли, удобренной коровьимъ перегноемъ и перекопанной глубиною на аршинъ; мѣсто открытое на Востокъ и Западъ и нѣсколько затѣненное.

Смородина размножается сѣменами, дѣленіемъ кустовъ, отсадкою корневыхъ побѣговъ, отводками и черенками. Сѣмена смородины сѣются осенью и весною, (если сохранились зимою въ прослойкѣ) въ рыхлую землю, засыпаются мелкою землею на полпальца толщины, поливаются и закрываются мокрымъ мхомъ. Лѣтомъ всходы разсаживаются верхнахъ въ 3-хъ другъ отъ друга и на слѣдующій годъ вновь пересаживаются на полтаршина другъ отъ друга, когда же разростутся, то сажаются на мѣста, въ разстояніи сажени другъ отъ друга. При посадкѣ, корнямъ даютъ правильное положеніе и закрываютъ ихъ землею толщиною въ дюймъ. Дальнѣйшій уходъ за смородиной, состоитъ въ разрыхленіи около ней земли нѣсколько разъ въ лѣто и въ удобреніи земли перегнившимъ навозомъ, наконецъ поливкою, каждыя три недѣли, навозною

жижею. Сухія вѣтви смородины вырѣзываются поздно осенью, до самаго корня, а весною и осенью ее очищаютъ отъ корневыхъ побѣговъ, сильно истощающихъ растеніе, также вырѣзываютъ старыя вѣтви, перекрещивающіяся между собою; если же кустъ слишкомъ густъ, то вырѣзаютъ длинныя молодыя вѣтви, съ вытянутыми между узліями. Иные обрѣзаютъ кусты, придавая имъ видъ деревца или развязываютъ кустъ шпалерою. Для увеличенія плодоношенія, въ Мартѣ и Апрѣлѣ, обрѣзываютъ у молодыхъ, слабыхъ и однолѣтнихъ побѣговъ 3 верхніе глазка, а двулѣтніе укорачиваютъ на 2 и на 3 вершка. Вообще на кустѣ не оставляютъ болѣе 5 стеблей, чтобы между ними могъ свободно проникать свѣтъ. Землю вокругъ куста обсыпаютъ кострыкою, которая не даетъ расти сорнымъ травамъ и удерживаетъ въ почвѣ влажность.

Дѣленіемъ корней смородину размножаютъ раннею весною или позднею осенью, т. е. во время ея покоя, слѣдующимъ способомъ: выкапывается кустъ; вырѣзаютъ сухіе и испорченные корни и разрываютъ кустъ руками на столько частей, сколько имѣется въ немъ стеблей съ отдѣльными корнями. Въ вырытую яму наливаютъ воды, подсыпаютъ въ нее земли и въ это жидкое тѣсто опускаютъ растеніе, расправляя корень руками и засыпая землею. Корневые побѣги отдѣляютъ отъ растенія весною, сажаютъ на приготовленныя гряды, на поларшина другъ отъ друга, и когда разростутся, поступаютъ такъ какъ съ разрозненными растеніями, выпешшими отъ сѣмянъ.

Отводки дѣлаются тоже весною. Для этого выбираютъ тѣ сильныя побѣги, что ближе къ землѣ, ихъ надламываютъ и у этого надлома прищипываютъ вѣтку, деревяннымъ крючкомъ, къ землѣ; на этомъ мѣстѣ засыпаютъ землю вершка на три толщины и держатъ въ равномерной влажности. Къ осени отводокъ прирастетъ и на слѣдующую весну его отдѣляютъ отъ растенія и поступаютъ съ растеніемъ, какъ выше указано, относительно растеній выпешшихъ отъ сѣмянъ.

Черенки Смородины рѣжутъ когда они нетронулись еще въ ростъ, отъ прошлогоднихъ побѣговъ, имѣющихъ вызрѣвшую древесину. Черенокъ долженъ быть такой длины, чтобы на немъ находилось отъ 4 до 6 глазковъ и чтобы отрѣзъ приходился подъ самую почву. Черенки сажаютъ въ затѣненную

грядку въ наклонномъ положеніи, такъ чтобы надъ землею оставалось 2 глазка: ихъ закрываютъ сырымъ мхомъ и держать въ равномерной сырости; на слѣдующую весну пересаживаютъ на гряду, на футъ другъ отъ друга и когда хорошо укрѣпятся, переносятъ на мѣсто.

Черенки черной смородины быстро даютъ корни въ стаканѣ съ водою.

Смородину можно прививать къ скорорастающей штамбою, американской смородинѣ (*Ribes aureum*) посредствомъ копуляціи, на вышинѣ аршина надъ землею, также къ черной смородинѣ прививаютъ въ расщепъ, красные и бѣлые сорта.

По цвѣту ягодъ смородина раздѣляется на: красную, черную, бѣлую, розовую, желтую, зеленую и полосатую.

Лучшіе сорта красной смородины:

Большая, ранняя. Большая, голландская, съ нѣскольکو плоскими, свѣтло-красными ягодами.

Исполинская, вишневая. Императорская. Англійская. Гондуэнъ. Кавказская. Брусковая, весьма плодородная, у ней бываетъ до десяти вѣточекъ вмѣстѣ.

Шпанская, самая крупная ягода, темно-краснаго цвѣта.

Лучшіе сорта бѣлой смородины:

Голландская. Гондуэнъ. Прозрачная.

Большая Англійская, имѣетъ прозрачную кожицу, совершенно бѣлую, гладкую.

Лучшіе сорта черной смородины:

Неаполитанская.

Пестролистная, съ разнѣннымъ листомъ. Ягоды нѣсколько меньше другихъ сортовъ; листья съ желтыми пятнами.

Cassis hybride (Nathusius).

Лучшіе сорта пестрой смородины:

Большія, бѣловатая ягода, съ розовыми полосками. Голландская. Саблонская, исполинская.

Лучшіе сорта розовой смородины:

Шампанская. Голландская, съ свѣтло-розовою ягодою.

Лучшій сортъ желтой, исполинской смородины — *Императорская.*

Лучшіе сорта зеленой смородины:

Неаполитанская, Голландская, зеленая ягода по вкусу и запаху весьма похожи на черную смородину.

Другіе виды смородины:

R. procumbens. *С. Моховая.* Медоносное растеніе, цвѣтеть въ Маѣ и Іюнѣ.

R. diacantha. *Тиранушка.*

R. dikuscha. *Дикуща.* Имѣетъ листья меньше, чѣмъ у обыкновенной смородины; ягоды синеватыя и производятъ одурѣніе если употребляются въ большемъ количествѣ. Идетъ на приготовленіе варенья и наливскъ.

R. Sanguineum. Цвѣтистый смородинный кустъ, съ листьями, похожими на смородинные, съ красными цвѣтами — кистью. Чтобы имѣть красивые цвѣты, надлежитъ тотчасъ послѣ того, какъ отцвѣтетъ, подрѣзать кустъ. Подвергается ранней выгонкѣ для цвѣтовъ. Для этого оставляется въ оранжереѣ до образованія почекъ, а потомъ вносится въ теплицу. Размножается черенками.

R. Sanguineum atra sanguineum, наиболѣе пригодна для ранней выгонки.

R. Gordoniana. Съ оранжево-красными цвѣтами.

R. alpinum. *С. альпійская. С. мухая. Толокнянка.* Дико растетъ на большихъ Европейскихъ горахъ, въ Сибири. Имѣетъ мелкій листъ, желтые цвѣты и небольшія красноватая и невкусныя ягоды. Употребляется на живыя изгороди.

1486. Ribes grossularia. *Крыжовникъ.* Многолѣтній кустарникъ, плоды котораго употребляются въ сыромъ и различными способами приготовленномъ видѣ. Стебли крыжовника усажены колючками; корни идутъ въ землю не глубоко, а потому не требуетъ глубокой обработки земли и вообще не прихотливо на почву, хотя ягоды его бываютъ крупнѣе и лучше, а также на его молодые листья не такъ сильно нападаетъ, его главнѣйшій врагъ — гусеница, (*Бабочка-крыжовница. Geometra grossulariata*), если ему не только даютъ землю хорошо удобренную, навознымъ перегноемъ, но если это удобреніе возобновляютъ ежегодно осенью, облачая предварительно взрыхленную вокругъ него землю навознымъ перегноемъ.

Крыжовникъ размножается сѣменами, черенками, отводками, прививкою и дѣленіемъ корней.

Сѣменами крыжовникъ размножается слѣдующимъ образомъ: сѣмена его сѣютъ осенью или весною; въ послѣднемъ случаѣ,

пророщенныя сѣмена кладутъ въ рыхлую землю, и когда растеніе взойдетъ, его разсаживаютъ на четверть другъ отъ друга, тщательно опалываютъ и поливаютъ; затѣмъ когда саженцы разрастутся, ихъ разсаживаютъ вновь, когда же выростутъ на достаточную высоту, сажаютъ на мѣсто.

Размноженіе крыжовника черенками, рѣдко производится, по трудности этого способа. На черенки рѣжутъ прошлогодніе побѣги крыжовника, рано весною, когда еще не тронулся сокъ и не набухли почки.

Черенки рѣжутся въ полвершка, подѣ почку, такъ, чтобы срѣзать часть старой древесины. Черенки сажаются до половины въ рыхлую землю, въ тѣнь и прикрываются сырымъ мхомъ. Также черенки сгибаютъ дугою и оба конца втыкаютъ въ рыхлую землю, оставляя наружи только 2 или 3 глазка посрединѣ дуги. Эту посадку также прикрываютъ мхомъ; землѣ не даютъ просыхать.

Чаще всего зводится крыжовникъ отводками. Для этого въ Іюлѣ, молодыя вѣтви, пригибаютъ къ разрыхленной землѣ, прищипливаютъ деревяннымъ крючкомъ, обкладываютъ сырымъ мхомъ и вершка на три закрываютъ рыхлою, питательною землею. Къ концу осени отводокъ даетъ корни и на слѣдующую весну отдѣляется и сажается на мѣсто.

Другіе, просто обертываютъ сырымъ мхомъ то мѣсто отводка, которое соприкасается съ землею и когда онъ пуститъ корни, впрочемъ поступаютъ какъ выше значитса.

Прививку крыжовника производятъ раннею весною или даже зимою, во время оттепели, въ ращепъ или глазкомъ. Прививку дѣлаютъ къ двухгодовой древесинѣ дичка.

Отдѣленіе кустовъ и отпрысковъ дѣлаютъ раннею весною или позднею осенью; когда растеніе въ покоѣ, осторожно, руками раздирая растеніе и наблюдая, чтобы каждая отсаживаемая часть, имѣла свои надежные корни.

Чтобы имѣть обильный урожай и хорошія ягоды крыжовника, наблюдаютъ, чтобы онъ не высыхалъ и, въ этихъ видахъ лѣтомъ, землю вокругъ его корней покрываютъ древесными опилками или кострыною, а такъ какъ ягоды появляются преимущественно на двухгодовыхъ вѣтвяхъ, то весною обрѣзаютъ подѣ корень всѣ старыя вѣтви и вообще крыжовнику не даютъ глоснуть, допуская въ середину куста, возможно боль-

шее количество солнечного свѣта и воздуха. Для этого растеніе освобождается отъ водяныхъ побѣговъ и излишнихъ плохихъ вѣтокъ, раза два въ годъ; еще же лучше развязывать крыжовникъ въ видѣ шпалеры или образовать постоянную и аккуратную подрѣзкою штамбовое растеніе въ видѣ деревца, причемъ получаютъ самыя крупныя ягоды. Также укорачиваютъ корни крыжовника, каждые три года.

Для этого, раннею весною, въ полторѣ аршинахъ отъ куста, роютъ вокругъ него канаву и обрубаютъ всѣ корни, какіе встрѣчаются, замазывая раны глиною. Послѣ этого канаву опять закапываютъ. Отъ этого крыжовникъ образуетъ множество молодыхъ корней близъ куста. Слишкомъ старые истощенные кусты раннею осенью совершенно срубаютъ у корня, отчего образуется много новыхъ плодоносныхъ побѣговъ.

Крыжовникъ раздѣляется по формѣ ягодъ на: *шаровидный* и *продолговатый*, а по цвѣту ягодъ на: *красный*, *желтый*, *зеленый* и *бѣлый*, по виду кожи на: *гладкій* (*Ribes uva. Crista*) и съ *мохнатыми* ягодами.

Сортовъ крыжовника очень много; самыми высокими сортами признаются слѣдующіе:

Краснаго: Чейшаръ Леди.

Red. Orleans. Ягода мохнатая, круглая почти черная.

Great Mogol. Fomaus. Boordmann's royal. Съ большими темно-красными, мохнатыми ягодами.

Mason's Hercules. Шаровидный, темно-красный, гладкій.

Fox. Royal. Большая, продолговатая гладкая ягода.

Hector, большая, продолговатая, красная ягода, покрытая красными волосками.

Желтаго: Trafalgar. Sovereign. Golden scepter. Шаровидная, немного мохнатая, зеленовато-желтая ягода.

Conqueror. Credingns lerus. Большая, длинная, гладкая ягода.

Large Ambre. Большая продолговатая, гладкая ягода, покрытая бѣлыми точками.

Зеленаго: Smoothgreen.

Princesse royale. Большая, яйцевидная, мохнатая ягода.

Overall.

Fox's green Gose. Большая темно-кожая, мохнатая ягода.

Johnson's Green Willow. Большая, гладкая ягода, съ бѣлыми жилками.

Бѣлаго: Maid of the mill. Taper. Venerable. Cleopatra. Продолговатая, прозрачная, гладкая ягода.

Wellington's glory. Большая, яйцевидная мохнатая ягода.

Qulen Charlotta. Большая, круглая, мохнатая ягода.

1487. Richardia aethiopica (calla aethiopica). *Калля Эфиопика.* Семейство **Aroideae**. Тепличное растеніе, но можетъ существовать и въ комнатѣ; съ большими бѣлыми цвѣтами; размножается отростками; зимою содержится сухо.

Другой видъ: **R. albo maculata.** Растетъ на мелкихъ и глубокихъ мѣстахъ акварія, одинаково хорошо. Размножается отдѣленіемъ отростковъ, идущихъ отъ корневища. Имѣетъ красиво испещренные листья съ успѣхомъ растетъ въ теплицѣ и комнатѣ; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и торфяной, причемъ зимою корни растенія содержатся почти сухо. Во время покоя растеніе пересаживаютъ. Чтобы заставить **Callu aethiopica** цвѣсть зимою, весною дають засохнуть ея корневищамъ, въ Маѣ сажаютъ ихъ въ горшки и когда они здѣсь укоренятся, пересаживаютъ въ новые горшки, затѣмъ, постепенно приучивъ къ теплу, ставятъ въ теплицу, гдѣ растеніе распускается очень скоро.

1488. Ricinus communis. *Клещевина.* Изъ семейства **Euphorbiaceae**. Красивое декоративное, однолѣтнее растеніе, сѣется въ теплицѣ еще въ началѣ Февраля, когда взойдетъ, рассаживается по одиночкѣ въ горшки съ сильною землею и въ началѣ Мая вторично пересаживается уже въ большіе горшки; до начала Іюня его держать въ теплицѣ или парникѣ, провѣтриваютъ и поливаютъ навозною жижею, въ Іюнѣ сажаютъ въ грунтъ, подкладывая слой навоза толщиною въ футъ и насыпая сверху хорошую, питательную, рыхлую землю. Требуетъ сильной поливки. Изъ бобковъ этого растенія, въ теплыхъ странахъ добывается такъ называемое „*Касторовое масло*“. (**Oleum ricini**).

Виды: **R. purpureus monstrosus.** Крово-красный стебель; большіе листья съ красными нервами по зеленому полю. Самый большой и красивый видъ.

R. africanus albidus. Съ маленькими, сѣро-зелеными листьями, съ желтыми нервами.

R. barboniensis rubricaulis. Съ розовыми нервами и на листьяхъ.

R. borboniensis arborescens. Стволъ и стебель покрыты какъ бы инемъ—голубовато-зеленымъ. Листья свѣтло-зеленые.

R. elegantissimus. Съ пурпуровымъ стеблемъ. Розовые нервы листьевъ по ярео-зеленому фону.

R. compactus. Съ глубоко-разсѣченными листьями, испещренными розовыми нервами. Даетъ черныя зерна.

R. Africanus hybridus. Съ широкими листьями, ярео-зелеными съ голубоватымъ оттѣнкомъ.

R. sanguineus glaucus. Невысокое растеніе даетъ заключающій сѣмена капсуль бѣлый и розовый, покрытый крѣпкими розовыми иглами.

R. sanguineus minor. Небольшое растеніе съ пурпурово-краснымъ стеблемъ; иззубренные, темно-зеленые листья, въ молодости съ фіолетовымъ оттѣнкомъ и темно-красноватыми нервами; сѣменной капсуль—зеленовато-пурпуровый, съ темно-красными иглами.

R. nanus microspermus. Съ большими, вызубренными листьями.

R. sanguinolentus. По окраскѣ красивѣйшій видъ. Съ темно-пурпуровымъ стеблемъ.

R. Guianensis. Съ красноватымъ стеблемъ.

R. macrophyllus atropurpureus. Съ красивыми, темно-зелеными листьями, съ красными нервами.

R. macrocarpus. Зеленый стебель, покрытый розовыми черточками. Нервы листьевъ ярео-желтые.

R. insignis spectabilis. Растеніе, похожее на предыдущее, только ниже его и окраска его нервовъ свѣтлѣе.

R. sanguineus tricolor. Нервы листьевъ нѣжно-розовые, сѣменной капсуль крово-красный.

R. purpureus major. Стебель красный, широкіе листья съ ярео-красными нервами.

R. Obermanni. Достигаетъ 8 футъ высоты въ одно лѣто, съ краснымъ стволомъ и стеблемъ.

- 1489. *Rigidella ornatha*.** Изъ семейства **Irideae**. Луковичное растение, съ листьями, похожими на листъ молодой Пальмы. Даетъ большой, превосходный, пунцовый цвѣтокъ. Зимой содержится посаженнымъ въ гіацинтный горшокъ, въ сухомъ мѣстѣ оранжереи. Землю ему готовятъ компостную, тучную. Весною вновь пересаживается и когда покажетъ признаки жизни, переносится въ теплицу, причемъ его начинаютъ поливать, все усиливая поливку, доколѣ не покажется стебель. Въ концѣ Мая вкапывается въ землю, съ горшкомъ на открытомъ воздухѣ. Передъ морозами вносится въ оранжерею.
- Другой видъ: ***R. immaculata***. Снаружи розовые, внутри ярко-пунцовые цвѣты, съ желтыми тычинками и пестиками.

- 1490. *Rivina laevis*.** Оранжерейное растеніе.

Другіе виды: ***R. purpurascens***. ***R. humilis***. ***R. formosa***.

- 1491. *Robinia*.** *Робинія*. *Акація*. Изъ семейства **Papilionaceae**. Дерево, любящее рыхлую, питательную почву, преимущественно черноземъ, на которомъ очень скоро растетъ; размножается сѣменами, отростками и черенками. Сѣется для питомниковъ весною, когда уже нельзя ждать морозовъ. Осенью сѣянцы разсаживаются. Для того, чтобы деревца разрастались гуще, ихъ подрѣзываютъ послѣ того, какъ сойдетъ снѣгъ, до времени образованія новыхъ почекъ.

Существуютъ различныя породы Акаціи, какъ растущія на открытомъ воздухѣ, въ грунтѣ, такъ и требующія покрышки на зиму и воспитываемыя въ оранжереѣ.

***R. inermis*.** *А. безоружная*.

***R. caragana*.** *Чилига*. *А. Сибирская*. *Гороховникъ*.

***R. altagana*.** *Золотарникъ*.

***R. pygmaea*.** *А. низкая*. *А. четырехмстная*.

***R. frutescens rubra*.** *А. кустовая*.

Желтзнякъ. *Дереза*.

***R. chamlagu*.** *А. Китайская*.

***R. spinosa*.** *А. Колючая*.

***R. halodendron*.** *А. атласистая*. *Жидовникъ*.

***R. arborescens*.** *А. древовидная*.

***R. jubata*.** *А. привообразная*.

***R. spectabilis*.** *А. безъ колючекъ*.

R. pseudo-acacia, *A. Американская. А. бѣлая. Лжеакація.* Дерево съ снѣжно-бѣлыми, душистыми цвѣтами, разводимое для украшенія садовъ и парковъ. Требуется на зиму надежной покрывки. Пчелы берутъ съ его цвѣтовъ обильный взятокъ въ Маѣ и Юнѣ.

R. hispida. *A. красная. Щетиноватая.* Тоже, что и предыдущая, но можетъ быть подвергнута ранней выгонкѣ; съ этою цѣлю, къ маленькимъ штабамъ простой акаціи, посаженнымъ въ горшки съ питательною землею и поставленнымъ съ Января въ теплицу, прививаютъ, прищепомъ красную акацію. Когда прививка прирастетъ, образуются почки, которыя могутъ цвѣсть въ первый же годъ. Но лучше дѣлать прививки къ акаціи уже годъ просидѣвшей въ горшкѣ, слѣд. окрѣпшей. Вообще всѣ эти виды Лжеакаціи, на почву не прихотливы, но предпочитаютъ легкую — песчанистую.

R. pseudoacacia semperflorens. Разновидность бѣлой акаціи; цвѣтетъ до глубокой осени.

1492. Rochea foleata. *Рошеа.* Изъ семейства **Crassulaceae**. Оранжевое растение съ красными цвѣтами и мясистыми листьями; требуетъ умеренной поливки.

Другой видъ: **R. versicolor**. Съ розовыми или малиновыми цвѣтами.

1493. Rodgersia podophylla. Изъ семейства Камнеломковыхъ. Многолѣтнее, травянистое растение, съ мелкими бѣлыми цвѣтами.

1494. Rodriguezia leochilina. Тепличная Орхидея, съ мелкими желтыми цвѣтами, въ бурыхъ крапинахъ и бѣлою губою.

1495. Roella ciliata. *Розелла рясничная.* Изъ семейства **Campanulaceae**. Тепличное, кустарное растение, съ синими цвѣтами и бѣлою полоскою. Не любитъ ни сыраго воздуха, ни палящихъ лучей солнца. Землю требуетъ, составленную изъ одной части песку и двухъ частей вересковой. Размножается черенками. Постоянною подрѣзкою можно образовать штампъ.

1496. Rogiera. Изъ семейства **Rubiaceae**. Оранжевое растение, съ красными, душистыми цвѣтами, требуетъ того же ухода что и акація; цвѣтетъ зимою. Требуется листовенную

землю, съ небольшимъ количествомъ песку. Размножается черенками, требуетъ частой поливки.

Виды: *R. amoena*. Съ букетомъ розовыхъ цвѣтовъ, также какъ и *R. cordata* и *R. grotissima*.

R. versicolor. *R. Roezlii*. *R. elegans*. *R. macrophylla*.

1497. *Romanzoffia sitchensis*. *Романцовія съ Ситхи*. Изъ семейства *Hydroleaceae*. Многолѣтнее растение, сажается въ грунтъ и образуетъ густой дернъ. Любитъ землю глинисто-дерновую, съ небольшою примѣсью торфяной. На зиму покрывается еловыми вѣтвями или мхомъ. Цвѣтетъ все лѣто мелкими бѣлыми цвѣтами.

1498. *Romeria*. Однолѣтнее растение, не заслуживаетъ разведенія.

1499. *Romulea rosea*. Изъ семейства *Irideae*. Требуется той же культуры что и *Ixias*. Луковичное растение съ длинными, шнуровидными листьями и красными цвѣтами.

1500. *Rondeletia*. Оранжевое растение изъ семейства *Мареновыхъ*. Требуется много свѣта, воздуха и сильнаго провѣтриванія. Зимой содержится въ корѣ. Любитъ вересковую землю.

Виды: *R. odorata*. *R. speciosa*. *R. discolor*.

1501. *Rosa*. *Роза*. Издревле признана царицею цвѣтовъ. Растение всѣмъ извѣстно, имѣетъ множество видовъ и ихъ разновидностей. Растетъ великолѣпно и въ дикомъ состоянii, въ садахъ, въ грунтѣ, въ оранжереяхъ, а нѣкоторые виды и въ комнатахъ.

Бываютъ розы: *простыя* и *махровыя*; *бѣлыя*, *желтыя*, *розовыя*—разныхъ оттѣнковъ, *малиновыя* *двухцвѣтныя*, *зеленыя* и *полосатыя*.

Размножается рѣже всего сѣменами, но преимущественно черенками, отводками и прививкою въ пень и глазокъ. Вообще требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой. Нѣкоторые виды розы цвѣтутъ разъ въ лѣто, нѣкоторые по нѣскольку разъ.

Предлагается очень много способовъ ухода за розами; укажемъ на способы болѣе, другихъ заслуживающіе вниманія.

Для ранней выгонки употребляются преимущественно *розы ремонтанты*.

Выгонка розъ для зимняго цвѣтенія производится въ парникахъ и теплицѣ.

Выгонка въ парникѣ. Горшки розановъ оставляются на воздухѣ до морозовъ, вносятся въ оранжерею или въ холодную комнату и держатся въ темнотѣ передъ пристановкою; вѣтви розановъ обрѣзаются до здороваго глазка; ерѣпкия вѣтви срѣзываются длиннѣе, слабыя короче; Дижонскіе розаны вовсе не срѣзываются; ремонтанты срезаются почти до самаго дерева; горшки дополняются питательною землею и проросшіе черезъ нижнее отверстіе горшка корни срѣзываются. Первая пристановка дѣлается въ Октябрѣ, въ нѣсколько остывшій парникъ, но не закапывая горшковъ, пока жарко въ парникѣ. Парникъ постоянно провѣтривается; растеніе опрыскивается теплотою водою по нѣскольку разъ въ день до тѣхъ-поръ, пока покажутся бутоны. Когда станетъ холодно, парникъ нагрѣвается обкладкою горячимъ навозомъ; при наступленіи морозовъ, парникъ хорошо покрывается и обкладывается свѣжимъ навозомъ. Выгонка, начатая въ Октябрѣ очень рѣдко удается. Лучше начинать выгонку въ парникѣ съ Января, тѣмъ же способомъ, что указано, только наблюдая за поддержаніемъ теплоты въ парникѣ, осторожно его провѣтривая и затѣняя растеніе при внезапномъ появленіи сильнаго солнца. Цвѣты распускаются въ Февралѣ. Нѣкоторые бутоны, если ихъ образовалось очень много, срѣзаются. Когда роза отцвѣтетъ, ее оставляютъ до весны на свѣтломъ мѣстѣ оранжереи; весною укорачиваютъ слабыя вѣтви и болѣе слабыя кустарники сажаютъ въ грунтъ, гдѣ имъ большею частью даютъ годъ отдыха.

Въ теплицѣ подвергаютъ выгонкѣ, розы преимущественно привитыя на дикій штабъ, двухъ или трехъ-годовалыя. Желая имѣть цвѣты въ Мартѣ и Апрѣлѣ, большого тепла розамъ не даютъ, а предоставляютъ имъ развиваться отъ вліянія естественной, солнечной теплоты въ оранжерей.

Мѣсячныя розы выгоняютъ въ цвѣтъ въ грунтъ. Для этого въ Августѣ, срѣзываютъ мѣсячныя розы, сажаютъ ихъ въ гряды съ питательною землею, въ Октябрѣ покрываютъ ящикомъ съ окнами, провѣтриваютъ его; ящикъ плотно пригоняютъ къ землѣ и обкладываютъ навозомъ и проч. При насту-

пленіи морозовъ, ящикъ покрывается надежнѣе и плотнѣе. Впрочемъ, чѣмъ позже начинается выгонка, тѣмъ розы бываютъ красивѣе.

Вообще чтобы получать крупнѣе розаны, надо срѣзывать большую часть бутоновъ.

Виды розъ дикорастущихъ.

R. canina. Шиповникъ. Произростаетъ дико въ лѣсахъ и поляхъ. Разводится для украшенія садовъ и парковъ и для образованія живыхъ изгородей, а равно для привитія къ нему розановъ. Съ цвѣтовъ его въ Іюнѣ и Іюлѣ пчелы берутъ взтокъ. На кустарникъ этотъ прививаются различныя виды розъ. Плоды идутъ на варенье.

Разновидности его:

R. lutea simplex. **R. eleganteria.** Желтая роза. Можетъ расти на самой песчаной почвѣ, съ огненными, красными, желтыми или пестрыми, желто-красными одинокими цвѣтами.

R. punicea simplex.

R. rubiginosa. Р. виноградная, съ красноватыми цвѣтами.

R. cinamomea. Rose de canelle. Р. коричневая. Съ простыми или махровыми, красными цвѣтами, издающими запахъ корицы.

R. alpina. Р. альпійская. Стволъ безъ шиповъ, съ красноватыми цвѣтами, произростаетъ въ дикомъ состояніи на Альпійскихъ горахъ.

R. spinosissima. Р. многоколючая. Стволъ покрытъ множествомъ шиповъ, съ небольшими красноватыми или бѣлыми цвѣтами.

R. glauca. Р. бирюзовая. Дикорастущая на альпійскихъ горахъ.

R. villosa. Р. пушистая. Одинъ изъ самыхъ большихъ розовыхъ кустарниковъ съ широкими бѣловатыми листьями и крупными плодами.

R. gallia. Французкая роза. Дико растетъ во Франціи, съ темно и свѣтло-красными цвѣтами.

R. carolina. Р. каролинская. Американскій кустарникъ, съ розовыми цвѣтами.

R. lucida. Р. блестящая. Американскій кустарникъ съ блестящими листьями и большими красноватыми цвѣтами.

R. francofortensis. *P. Франкфуртская*, съ махровыми, но мало пахучими цвѣтами.

R. muscata. *P. благовонная*. Дико растетъ на востоѣ, съ бѣлыми, простыми или махровыми цвѣтами.

R. camtschatica. *P. Камчатская*. Съ темно-красными цвѣтами; дико растетъ въ Камчатѣ.

R. caucasica. *P. Кавказская*. Съ красноватыми цвѣтами; дико растетъ въ Грузіи.

R. damascena. Растетъ на Востоѣ. Изъ лепестковъ этой преимущественно розы выгоняютъ розовую воду и добываютъ розовое масло.

R. flandrica tricolor. Пестрый цвѣтокъ розовый съ бѣлымъ и малиновымъ.

R. pimpinellifolia. Махровая, дикорастущая роза во всей Южной Европѣ. Легко размножается побѣгами осенью или раннею весною.

Виды розъ, воспитываемыхъ въ садахъ и оранжереяхъ.

R. centifolia. *Центифолія столитвенная*. Изъ нихъ замѣчательны: красная голландская; бѣлая уника; красная моховая; красная муксенбургская; бланжевая.

Роза бенямская зеленая. Съ зелеными цвѣтами.

R. hybrida. *P. гибрида*. Весьма пригодна для нашего сѣвернаго климата, потому что менѣе другихъ страдаетъ отъ морозовъ, даетъ большой, роскошный кустъ, съ цвѣтами самыхъ яркихъ колеровъ: бѣлыхъ, розовыхъ — разныхъ оттѣнковъ, персикового цвѣта, карминовыхъ; пурпуровыхъ; бланжевыхъ; розовыхъ съ свѣтлыми краями; лиловатыхъ; почти фіолетовыхъ; двухцвѣтныхъ; розовыхъ съ мраморными разводами.

Моховыя розы обыкновенно прививаются на шиповникъ: бѣлыя, розовыя, красныя.

Розы ремонтанты или *вѣчно цвѣтущія*, такъ названныя потому, что цвѣтутъ нѣсколько разъ въ лѣто; могутъ расти въ грунтѣ, но на зиму требуютъ хорошей покрывши, бываютъ разныхъ цвѣтовъ.

Бурбонскія розы. Оранжерейныя.

Оранжерейныя и въ то же время комнатныя *чайныя розы* **R. thea**, или такъ называемыя *мѣсячныя*, съ небольшими розовыми, бѣлыми, малиновыми или желтыми цвѣтами, пахну-

щими чаемъ, если за ними имѣть внимательный уходъ, а именно давать имъ отдыхъ лишь только отцвѣтуть, по немногу прекращая и вовсе наконецъ останавливая поливку недѣли за двѣ и вновь постепенно послѣ того усиливая оную, до новаго зацвѣтанія.

Индійскіе розы.

Ноазетовыя розы.

R. Noisettiana amaranthina. R. N. Bougenville. R. N. Blandine. R. N. Camellia de Licar. R. N. Champion. R. N. Charles X. R. N. Carbonari. R. N. Hortenzi. R. N. Labiche. R. N. Lerley. R. N. maligne. R. N. minor. R. N. nouvelle. R. N. nymphaea. R. N. plena variegata. R. N. purpurea. R. N. rosa alba. R. N. rouge virginale. R. N. rubra. R. N. sarmentacea.

R. sulphurea. Р. желтая, махровая съ желто-лимонными цвѣтами.

Розы вьющіяся.

1502. *Rosanowia conspicua.* Нарядная розановія. Тепличное растеніе съ клубневидными корнями, имѣетъ большее сходство съ Глоксиніей. Послѣ того какъ отцвѣтетъ, поливка постепенно уменьшается, затѣмъ вовсе прекращается и растеніе ставится въ сухое мѣсто, гдѣ теплота не превышала бы 8—9° Р. Въ Февралѣ или Мартѣ, клубни вынимаются изъ земли и сажаются въ свѣжую смѣсь равныхъ частей вересковой, глинистой и лиственной земли. Въ началѣ весьма мало поливается, когда же появятся крѣпкіе ростки—поливка усиливается. Размножается въ теплицѣ или парникѣ сѣменами или черенками и радѣленіемъ клубней, при пересадкѣ.

1503. *Rosmarinus officinalis.* Розмаринъ аптечный. Изъ семейства *Labiatae*. Дикорастущее, кустарное, медоносное растеніе. Цвѣтетъ съ Февраля до Мая, блѣдно-голубыми цвѣтами, разводится въ садахъ и содержится въ оранжереѣ. Листья его имѣютъ ароматичекій запахъ и идутъ на приготовленіе о-де-колона.

1504. *Rozlia granadensis.* Гренадская рецмія. Полукустарникъ, растущій на высочайшихъ Южно-Американскихъ горахъ. Содержится въ умѣренной теплицѣ; цвѣтетъ въ Сентябрѣ или

Октябрѣ. Размножается черенками. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей глинистой и вересковой или торфяной земли. Производитъ букетъ мелкихъ малиновыхъ цвѣтовъ.

1505. Roupellia grata. Изъ семейства *Aprocynae*. Вьющееся тепличное растение, съ ароматическими сначала бѣлыми, потомъ сливочнаго цвѣта въ центрѣ съ темно-красными зубчиками — цвѣтами. Въ Февралѣ отводки сажаютъ въ смѣсь двухъ частей чернозема, двухъ частей торфа и одной части песку угля и лиственной земли. Ставится въ парникъ и въ Юлѣ нѣсколько разъ пересаживается, причемъ каждые три дня поливается жидкимъ удобрениемъ. Въ началѣ Августа, когда растительность остановится, ставится на солнцѣ. По мѣрѣ утолщенія стебля, уменьшается поливка, а зимою держится сухо.

1506. Rubia tinctorum. *Брускъ. Крапъ. Марена настоящая.* Изъ семейства *Stellatae*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растение, цвѣтетъ въ Юнѣ и Юлѣ; корни его доставляютъ красное, красильное вещество.

Другой видъ: *R. peregrina.* *Дикая Марена.*

1507. Rubus idaeus. *Малина.* Многолѣтнее кустарное растение, дающее извѣстную всѣмъ ягоду, употребляемую въ пищу. Съ цвѣтковь его въ Юлѣ, пчелы берутъ взятковъ. Растетъ въ дикомъ состояннн въ лѣсахъ и разводится въ садахъ или огородахъ. Стебли малины существуютъ два лѣта, принося плодъ на второй годъ своего существованія, послѣ чего стебли эти засыхаютъ.

Почву малина требуетъ низменную, глинистую, богатую черноземную и глубоко разрыхленную. Землю вокругъ кустовъ покрываютъ кусками гнилаго дерева, самымъ лучшимъ удобрениемъ для малины служить свѣжій навозъ съ древесными опилками и человѣческими экскрементами. Мѣсто этому растенію даютъ полузатѣненное, защищенное отъ холодныхъ вѣтровъ, преимущественно около стѣнъ и заборовъ, а сортамъ, дающимъ ягоды два раза въ годъ — открытое солнечное мѣсто. Во время цвѣтенія землю около малины поливаютъ растворомъ голубинаго помета и коровьяго навоза въ водѣ.

Малина размножается сѣменами, дѣленіемъ кустовъ и отсадкою отпрысковъ.

Сѣмена сѣются или осенью, или весною (но только тѣ сѣмена которыя продержатъ зиму въ прослойкѣ), прямо, на заранѣ приготовленныя гряды. Когда посѣвъ взойдетъ, его рассаживаютъ на другія гряды и когда растеніе окрѣпнетъ, пересаживаютъ на мѣсто.

Самый лучший способъ размноженія малины это корневыми отпрысками, которыхъ весною малина дастъ множество. Раннею весною, или позднею осенью изъ этихъ отпрысковъ отдѣляютъ съ корнемъ тѣ, которые сильнѣе и сидятъ ближе къ старому корню, затѣмъ ихъ сажаютъ прямо на мѣсто, причѣмъ верхушки прищипываютъ. Черезъ годъ эти растенія приносятъ плодъ. Такимъ же способомъ и въ то же время разводятъ малину дѣленіемъ кустовъ.

Обыкновенно малину сажаютъ ряда въ три на гряды, аршинахъ въ 1½ другъ отъ друга. При посадкѣ наблюдаютъ чтобы корень былъ расправленъ и не былъ бы глубоко засаженъ. Весною всѣ засохшіе двухлѣтніе стебли вырѣзаются до самой земли, а изъ молодыхъ оставляется до 5-ти стеблей, растущихъ ближе къ старому корню, прочіе также вырѣзаются, чтобы не истощали растенія. Когда малина подрастетъ ее наклоняютъ дугообразно въ сторону и связываютъ, съ наклоненными такимъ же образомъ вѣтвями сосѣдняго куста, съ цѣлью, чтобы всѣ глазки малины получили достаточно свѣта и воздуха. Такъ же посредствомъ привязки стеблей къ жердямъ, малину расправляютъ вѣрообразно.

Малина все лѣто оканчивается; земля вокругъ кустовъ осторожно разрыхляется и осенью, черезъ годъ, покрывается навозомъ. При наступленіи холодной погоды, малину отвязываютъ отъ жердей и другъ отъ друга, приклоняютъ къ землѣ, связываютъ по два куста между собою и покрываютъ солоmistымъ навозомъ. Чѣмъ сильнѣе и безснѣжнѣе зима, тѣмъ тщательнѣе и сильнѣе покрывается малина. Весною, когда уже стайтъ снѣгъ, покрывку исподволь снимаютъ съ малины и наконецъ ее поднимаютъ и ухаживаютъ за ней, какъ выше значится.

Чтобы малина давала болѣе ягодъ и чтобы она скорѣе созрѣвала, во время цвѣтенія обрѣзываютъ верхушки ея лозъ.

По цвѣту ягодъ, малина раздѣляется на: *красную, желтую и бѣлую*, (въ дикомъ состояніи не встрѣчается). По времени созрѣванія малины раздѣляется на: *позднюю, раннюю и мѣсячную*, дающую плоды два раза въ лѣто. Лучшіе сорта красной малины: *Англійская, Вѣчно носящая—Merveille de 4 saisons. Хилійская—большая. Paragon. Turban. Голландская. Виноградная. Victoria. Фальстафъ*; отличается крупными ароматическими ягодами.

Лучшіе сорта *желтой* малины:

Мальтійская, большая ягода безъ аромата.

Антверпенская. Евгенія. Новая оранжевая.

Лучшіе сорта *бѣлой* малины:

Вѣчно носящая, Merveille de 4 saisons. Новая тѣлеснаго цвѣта. Бланш де-Рансеръ.

Англійская, дающая плоды 2 раза въ лѣто.

Другіе виды: *R. leucodermis. Бѣлокожая малина. Золотая шапочка.* Разводится въ Американскихъ садахъ; листья какъ у нашей малины, а ростомъ и иглами напоминаетъ Ежевику. Ягоды похожи на желтую малину, цвѣтомъ сладкія, сочныя, съ особеннымъ ароматическимъ, но не малиновымъ запахомъ. Вообще это растеніе составляетъ какъ бы переходную форму отъ малины къ Ежевицѣ.

R. fruticosus. Черная малина. Ежевика. Растетъ преимущественно въ дикомъ состояніи и рѣдко разводится. Ягоды ея весьма похожи на лѣсную малину, но сначала только красноваты, а потомъ дѣлаются сизо-черными. Длинный, покрытый колючками стебель ея, изгибаясь дугообразно, тянется къ землѣ, коснется ея — и приростаетъ къ ней, образуя новыя растенія.

Разновидности Ежевики:

R. nootkatensis. R. odoratus. R. spectabilis.

R. fruticosus flore albo plena. Съ маховыми цвѣтами.

R. f. flore rubro pleno. Съ маховыми розовыми цвѣтами.

R. f. bellidiflorus. R. f. laciniatus.

R. f. New Rochelle. Американское растеніе.

Пять послѣднихъ разностей требуютъ покрывши на зиму.

Rubus chamaemorus. Морошка. Низенькій кустикъ, ро-

стущій въ болотистыхъ мѣстахъ сѣверныхъ лѣсовъ, приносить превосходныя ягоды, золотисто-оранжеваго цвѣта.

R. arcticus. *Сѣверная малина. Мамура. Поленика.* Растетъ дико на сѣверѣ Россіи, Швеціи и Норвегіи. Ароматная ягода, кисловатая, темно-красная, сохраняетъ ароматъ только въ сѣверныхъ мѣстностяхъ. Разводится въ садахъ, какъ клубника, въ тѣнистыхъ мѣстахъ; на зиму покрывается мхомъ и потомъ снѣгомъ. Имѣетъ свѣтло-зеленые листья и темно-розовые цвѣты.

R. saxatilis. *Костяника.* Низенькій лѣсной кустарникъ, приносящій употребляемую въ пищу ягоду, ярко-краснаго цвѣта.

R. caesius. *Полевая малина Куманика.* Растетъ дико на поляхъ и въ лѣсахъ. Стебли ползучіе, ягоды превосходнаго вкуса.

1508. Rudbeckia amplexicaulis. Однолѣтнее, трудно-разводимое растеніе.

Другіе виды: **R. amplexifolia.** **R. alata.** Всѣ эти виды высѣваются въ парникъ или плошку и потомъ высаживаются въ грунтъ, когда уже болѣе нельзя ожидать морозовъ.

R. digitata. *Рудбекія пестролистная* и **R. laciniata.** *R. разрызнолистная.* Многолѣтніе, садовые виды.

R. fulgia и **R. grandiflora**—оранжерейные виды.

1509. Rudgea macrophylla. Изъ семейства Rubiaceae. Тепличное растеніе, съ великолѣпными бѣлыми цвѣтами.

1510. Ruellia. Тепличное растеніе, требуетъ глинисто-дерновую землю; размножается черенками, которые тщательно предохраняются отъ сырости.

Виды: **R. formosa.** *Руэллія прекрасная.* Съ огненно-красными цвѣтами, которые распускаются даже въ Мартѣ, если растенію дадутъ достаточно свѣту въ теплицѣ.

R. macrophylla. Съ большими, пунцовыми цвѣтами.

R. purdieana. Съ пунцовыми цвѣтами. Любитъ черноземъ и усиленную поливку въ періодъ роста, частое опрыскиваніе и чистоту.

1511. Rumex acetosa. *Щавель.* Изъ семейства Polygonae. Многолѣтнее растеніе, находится въ дикомъ состояніи, но су-

ществуютъ и улучшенные культурою виды. На почву неприхотливо; размножается дѣленіемъ кустовъ, черезъ каждые 3 — 4 года, осенью или весною; зимуетъ въ грунту безъ покрывки. Чтобы имѣть всю зиму молодой щавель, сажаютъ нѣсколько кустовъ въ парникъ теплицы. Листья употребляются въ пищу.

Другіе виды: *R. aquatica*. *Змѣвикъ*.

R. crispa. *Чистотѣль*. Дикорастущее по лугамъ.

R. domestica. *Щавель коневикъ*.

R. Hydrolapathum. *R. obtusifolius*. *Конскій щавель*.

Пять послѣднихъ видовъ дикорастущіе *R. patientia*. *Англійскій шпинатъ*. Многолѣтнее растеніе, употребляемое въ пищу. Сначала съѣтся весною, а потомъ размножается дѣленіемъ кустовъ. Чѣмъ чаще обрѣзывается, тѣмъ дѣлаются нѣжные его нижніе листья.

1512. *Ruscus*. Садовый кустарникъ съ колючими листьями, можетъ расти въ комнатѣ; размножается отростками и сѣменами; зимою поливается мало; требуетъ листовую землю съ примѣсью половины дерновой и четвертой части песку. Производитъ цвѣты на поверхности листьевъ.

Виды: *R. aculeatus*. *Мышиный тернъ*. *Мышь въша*. Можетъ содержаться въ оранжереѣ.

R. Hypophyllum. *R. Hypoglossum*. *R. androgynus*.

1513. *Russelia juncea*. Оранжерейное растеніе.

Другой видъ: *R. sarmentosa semperflorens*; съ тонкими опущенными вѣтвями; весьма пригодно для висящихъ вазъ; любитъ листовую, питательную и рыхлую или вересковую землю; цвѣтетъ въ оранжереѣ и въ комнатѣ.

1514. *Ruta graveolens*. *Рута*. Изъ семейства *Rutaceae*. Многолѣтнее грунтовое растеніе; съ сѣровато-зелеными листьями и желтыми цвѣтами; на почву не прихотливо; разводится сѣменами и окоренившимися боковыми побѣгами; свѣжіе листья употребляются въ соусы какъ пряность; растеніе имѣетъ лекарственныя свойства.

1515. *Sabal*. *Сабалъ*. Родъ Пальмъ. Тепличное растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ, съ огромными вѣерообразными или круглыми разнѣжными листьями; размножается сѣменами,

требуетъ листовую землю пополамъ съ дерновою. Стебля или вовсе не имѣть или имѣть гладкій стебель, средней величины.

Виды: *S. mocini*. *S. princeps*. *S. Adansonii*. *S. umbraculifera*. *S. Blackburnii*. *S. filifera*. *S. palmetta*. *S. Havannensis*. *S. minor*. *S. glancescens*.

S. mauritiaeformis. Наиболее пригодна для культуры, въ небольшихъ теплицахъ.

1516. *Sabbatia campestris*. Изъ семейства *Gentianaceae*. Однолѣтнее растеніе съ душистыми розовыми и желтыми цвѣтами. Можетъ расти въ комнатѣ. Высѣвается въ Мартѣ. Требуетъ землю составленную изъ равныхъ частей вересковой и лиственной, съ примѣсью незначительнаго количества навозной.

1517. *Saccarum*. *Сахарный тростникъ*. Тепличное растеніе, но можетъ существовать и въ комнатѣ. Его цвѣты выходятъ на верху высокаго, колѣнчатаго стебля, пирамидою. Изъ сока этого тростника добывается, такъ называемый *сахарный песокъ*, служащій для выдѣлки сахара. Размножается отростками отъ корня; требуетъ торфяную землю пополамъ съ листовною и съ небольшою примѣсью дерновой. Изъ него же добывается *ромъ*.

Виды: *S. officinarum*. *S. violaceum*. *S. sinense*.

1518. *Saccolabium buccosum*. Тепличная Орхидея, съ бурыми пятнышками на губѣ желтаго цвѣтка.

Другой видъ: *S. retusum*. Съ большою кистью весьма красивыхъ бѣлыхъ испещренныхъ малиновыми пятнышками цвѣтовъ.

1519. *Sagenia decurrens*. Тепличный папоротникъ.

1520. *Sagus*. *Сагусъ*. Родъ Пальмъ, доставляющій Саго, цвѣтетъ только разъ втеченіи своей жизни; дерево срубаютъ лишь появится цвѣтъ, иначе для образованія плода дерево истрачиваетъ весь запасъ, находящагося въ его стволѣ Саго. Размножается сѣменами.

1521. *Salisburia*. Оранжевое хвойное дерево, можетъ расти въ комнатѣ, даетъ плоды величиною со сливу; зимою теряетъ листь; размножается сѣменами и черенками; требуетъ дерно-

вую землю, пополамъ съ вересковою и съ примѣсъю небольшого количества лиственной.

Виды: *S. adiantifolia*. Старыя деревья имѣютъ почти горизонтально отстоящія и висящія вѣтви.

1522. *Salix. Ива. Верба*. Изъ семейства *Salicineae*. Дикорастущее дерево и кустарникъ; разводится въ садахъ и паркахъ, а также для живой изгороди.

Виды: *S. angustifolia*. Кустарникъ вышиною въ 2 фута; изнанка листьевъ яркаго сине-зеленаго цвѣта; покрытъ серебристыми волосками.

S. alba. S. argentea. Ива серебристая. Съ листьями, имѣющими серебристый исподъ.

S. acutifolia. Шелюга. Красная верба. Дерево средней величины, съ опущенными вѣтвями; долѣ другихъ сохраняетъ листья и употребляется для укрѣпленія сыпучихъ и переносныхъ песковъ, на которыхъ можетъ сильно разрастаться.

S. americana pendula. Плакучая ива. Трудно переносить сѣверные морозы.

S. amygdalina. Блюталъ. Дерево съ ярко-зелеными листьями.

S. arenaria. Ива песчаная. Кустарникъ, растущій на песчаныхъ мѣстахъ.

S. aurita. (Vitellina). Ива ушистая. Кустарникъ вышиною до 5 футовъ. Изнанка листьевъ сѣро-мохнатая.

S. babylonica. Плакучая ива. Гладкое дерево, съ длинными, опущенными вѣтвями; растетъ въ болѣе теплыхъ мѣстностяхъ.

S. caprea pendula. Бредина. Плакучая крупно-листная верба. Дерево, листья и прямые вѣтви покрыты волосками. Одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ и наиболѣе распространенныхъ видовъ.

S. russeliana. Большое европейское дерево.

S. laurifolia. Верба лавролистная.

S. caprea. Верба пальмовая. Козья верба. Скорорастущее дерево, достигающее 50 футовъ; размножается сѣменами, отводками, но преимущественно черенками.

S. repens. Ракитникъ. Ползучая ива. Кустарникъ, не бывающій выше 2 футовъ.

S. rosmarinifolia. *Сърый талникъ.* Кустарникъ не выше 2 футъ. Листья снизу шелковисто-бѣлые, блестящіе.

S. sericea pendula. *Ива шелколистная.* Кустарникъ растетъ въ горахъ Европы, съ мохнатыми коробочками.

S. tricolor. Нечто иное, какъ разность *S. aurito*, требуетъ покрывки на зиму; съ золотисто-желтыми, узорчатыми листьями.

S. viminalis. *Таложчанникъ.* Кустарникъ съ листьями, покрытыми блестящими бѣлыми, шелковистыми волосками.

S. purpurea. *Желтолозникъ.* Высокій кустарникъ съ сизоватыми листьями, которые чернѣютъ при высыханіи.

S. phlomoides. *Верболозъ.*

S. pentandra. *Черноталъ.* Красивое дерево, листья похожи на лавровые, сверху блестящіе, темно-желтые, а снизу блѣдно-зеленые.

S. nigricans. *Бредникъ.*

S. myrtilloides. *Таловой ерникъ.* Съ голыми и зубчатыми листьями.

S. incubasea. *Малыя тальникъ.* Маленькій кустарникъ, растетъ на болотистыхъ лугахъ.

S. gerbacea. *Таловая карла.* Карличковый кустарникъ, съ короткими ползучими вѣтвями.

S. fragilis. *Ракита.* Большое дерево съ опущенными вѣтвями, достигаетъ большей толщины; съ цвѣтовъ его пчелы берутъ обильный взятъ въ Апрѣль и Маѣ.

S. divaricata. *Таловыя сланецъ.*

S. incana. *Верба сѣрая.* Кустарникъ.

S. japonica. Похожа на *S. babilonica*.

S. undulata. Высокій кустарникъ, съ ланцетовидными узкими листьями.

S. hyppophaeifolia. Кустарникъ, достигающій 15 футъ, съ тускло-зелеными листьями.

S. rubra. *Ива красная.* Кустарникъ съ плоскими свѣтло-зелеными листьями.

S. vittelina. *S. lutea.* *Ива желтая.* Любитъ хорошую почву, съ золотистымъ цвѣтомъ вѣтвей.

S. daphnoides. Кустарникъ съ сизо-зелеными листьями.

S. stipularis. Кустарникъ съ листьями, на изнанкѣ покрытыми сѣроватыми, блестящими волосками.

S. acuminata. *Верболозъ.* Кустарникъ съ продолговатыми

листьями, снизу бѣлыми или сѣроватыми, шейковисто-пушистыми.

S. phlyicifolia. Ива шведская. Сильный кустарникъ съ листьями, снизу сине-зелеными.

S. depressa. Кустарникъ вышиною до 5 футъ, стебли и листья покрыты волосками.

S. pyrolifolia. Низкій кустарникъ. Верхняя часть листа въ волоскахъ, а нижняя гладкая, изнанка листа сине-зеленая.

S. histata. Ива лапландская. Кустарникъ не выше 4 футъ, изнанка копьевидныхъ листьевъ сине-зеленая.

S. caesia. Низкій кустарникъ, съ опущенными вѣтвями.

S. myrsinites. Ива блестящая. И. миртолистная. Кустарникъ, не выше 3 футъ, съ листьями зелеными, покрытыми жилками.

S. cinerea. Ветла. Кустарникъ до 8 футъ вышины; почки бываютъ покрыты сѣровато-бѣлыми волосками.

S. repens. Ницелозъ. Кустарникъ не выше 2 футъ.

S. lapponum. Ива лапландская. Кустарникъ вышиною до 2 футъ; изнанка листьевъ покрыта сребристо-бѣлымъ пухомъ.

S. reticulata. Ива сѣтко-образная. Карликовый кустарникъ съ вѣтвями, совсѣмъ лежащими на землѣ.

S. retusa. Ива туполистная; съ незубчатыми листьями; сажается между камнями.

S. helix. Ива болотная. Съ голыми зубчатыми листьями.

1523. *Salpiglossis sinuata.* Одно изъ красивѣйшихъ, однолѣтнихъ садовыхъ растений, вышиною до 2 футъ, съ цвѣтами, формою похожими на цвѣты Петуніи: ярко-желтыми, красными, голубыми разныхъ оттѣнковъ, синими съ жилками. Цвѣтутъ Іюль и Августъ. Мелкія сѣмена сѣютъ въ Мартѣ, на слегка прижатую землю, въ плошку, и присыпаются пескомъ; высаживается въ цвѣтникъ, въ вересковую землю, съ примѣсью глинисто-луговой, но отнюдь не перегнойной. Можетъ расти въ комнатѣ; отъ слишкомъ большой влажности — загниваетъ.

Другіе виды: *S. hybrida alba grandiflora.* *S. hybrida atrobrunea.* *S. h. atrosanguinea.* *S. h. aurantiaca.* *S. h. azurea grandiflora.* Голубая. *S. h. coccinea.* *S. h. roseo lateritia.* *S. h. sulphurea.* Желтая. *S. h. violacea.* *S. h. nana alba.* *S. h. nana rubro lutea.* *S. h. nana violacea.* *S. sinuata.* *S. Parclayana.* *S. aurea.*

1524. *Salpingantha coccinea*. Маленькій кустарникъ, съ пунцовыми, довольно крупными цвѣтами. Содержится въ теплицѣ зимою сухо, лѣтомъ влажно. Размножается черенками. Требуется земля, составленную пополамъ изъ дерновой и вересковой съ примѣсью небольшой части гуано. Любитъ частое опрыскиваніе лѣтомъ.

1525. *Salvia*. *Шалфей*. Изъ семейства **Labiatae-Monardeae**. Нѣкоторые виды этого растенія многолѣтніе, другіе однолѣтніе; нѣкоторые виды принадлежатъ къ грунтовымъ, другіе къ оранжерейнымъ растеніямъ. Даетъ цвѣты: бѣлые, малиновые, красные, желтые, синіе. Размножается сѣменами и отростками отъ корня. Требуется земля, составленную изъ двухъ частей лиственной, одной части вересковой и одной дерновой. Имѣетъ сильныя лекарственныя свойства, отчего и получило свое названіе. (*Salvo*—спасать).

Многолѣтніе виды, корни которыхъ вынимаются на зиму изъ грунта и содержатся въ оранжереѣ или подвалѣ, съ небольшою поливкою: ***S. argentea*. III. *сребролистный*.** Двухлѣтнее, зимующее въ грунту растеніе, съ бѣлыми цвѣтами и листьями весьма страннаго вида, какъ-будто выстрижены изъ бѣлаго, шерстянаго одѣла. Вырастаютъ вполне черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Дождь приводитъ въ безпорядокъ шерстяные волоски его листьевъ, отнимая у нихъ видъ. Его сажаютъ маленькими клумбочками на газонѣ или группою на каменистомъ участкѣ, для контраста съ темнолистными растеніями.

S. candidissima*. *S. aurea*. *S. scabra*. *S. involucrata*. *S. porphyrantha— съ красными цвѣтами.

***S. oppositifolia*.** Лѣтомъ держится въ грунту на открытомъ воздухѣ. Любитъ тучную землю, достаточную поливку лѣтомъ и самую умѣренную зимою. Размножается черенками, на которыхъ вѣтки рѣжутъ на сочлененіяхъ.

***S. tricolor*.** Цвѣты бѣлые съ малиновымъ.

***S. coccinea*.** Ярво-красные цвѣты. Лучше размножается черенками.

***S. patens*.** Цвѣты голубые. Лѣтомъ когда посажено въ грунтъ—сильно поливается.

S. p. flore albo. Съ бѣлыми цвѣтами.

S. ianthina. Цвѣты темно-фіолетовые.

S. albo coerulea. Цвѣты бѣлые съ синимъ.

S. obtusa. Пунцовые цвѣты.

S. fulgens. *III. блестящій.* Оранжевейное растеніе, съ пунцовыми цвѣтами длиннымъ волосомъ, цвѣтеть всю осень и зимою; вторично пересаживается въ Январѣ или Февралѣ.

S. macrantha. Съ темно-синими цвѣтами; зимуетъ въ оранжереѣ.

Оранжевейные виды: **S. splendens.** Съ огненно-красными цвѣтами; разводится черенками; лѣтомъ сажается на солнечное мѣсто въ грунтъ, а въ Сентябрѣ пересаживается въ горшки и ставится въ парникъ, а потомъ переносится въ оранжерею.

S. splendens miniata. Требуется той же культуры.

S. Heriu. Въ оранжереѣ цвѣтеть весною и въ теплицѣ всю зиму.

Грунтовые виды: **S. officinalis.** *Шалфей аптечный.* Медоносное растеніе, цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ, имѣетъ лекарственные свойства.

S. of. tricolor. *III. трехцвѣтный.* Листья его съ начала только съ бѣлыми полосками, подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей, получаютъ красныя полосы. Хотя растеніе грунтовое но разводится и въ горшкахъ для комнатъ и балконовъ. Землю требуетъ не тучную и вообще тѣмъ тощѣ держать его во время роста, тѣмъ пестрота листьевъ его сильнѣе обрисуется. Можетъ быть разводимо на такихъ сухихъ и сильно нагрѣваемыхъ солнцемъ мѣстахъ, на которыхъ не выдерживаютъ другія растенія. Такъ какъ зимою нѣкоторые экземпляры вымерзаютъ, то для посадки на ихъ мѣсто держать нѣсколько растеній въ оранжереѣ.

Дикорастущіе виды: **S. pratensis.** *III. луговой.* Медоносное растеніе, цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ.

S. sylvestris. *III. лѣсной. Стенной василекъ.* Многолѣтнее, медоносное растеніе.

S. pendula. *III. повислый.* Многолѣтнее растеніе, цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ.

S. nutans. *Голышъ* цвѣтеть въ Маѣ.

Однолѣтніе виды: **S. Herminum.** *Бековина.* Съ синими цвѣтами, сѣется прямо въ грунтъ.

S. Roemeriana. Съ темно-красными цвѣтами. Высѣвается въ Мартѣ въ парникъ. Выходъ надлежитъ немедленно пикировать, затѣмъ высаживается въ грунтъ, когда уже совершенно прекратятся морозы. Цвѣточные метелки срѣзываются по мѣрѣ отцвѣтанія, иначе растеніе перестаетъ цвѣсти.

Однолѣтніе виды дикорастущіе:

S. verticillata. *Лопушникъ.*

S. dumetorum. *Васалки.*

S. Acthiopis. *Кмочъ-трава.*

1526. Sambucus. *Бузина. Самбукъ.* Изъ семейства *Viburneae*.

Кустарникъ, приносящій сильно пахучіе цвѣты и ягоды, имѣющія лекарственныя свойства. Разводится въ садахъ и паркахъ. Зацвѣтаетъ очень рано. На почву не прихотливо. Размножается черенками, отводками и сѣменами, высѣваемыми тотчасъ послѣ того, какъ онѣ созрѣютъ. Отводки дѣлаются осенью, причемъ отрѣзываются годовыя вѣтки съ толстымъ сучкомъ и втыкаются въ землю, гдѣ весною же укореняются. Въ древности изъ вѣтвей этого кустарника выдѣлывали музыкальные инструменты, бывшіе извѣстными подъ названіемъ *sambuca*, отчего растеніе и получило свое названіе.

Виды: **S. canadensis.** *Б. канадская.* Съ бѣлыми цвѣтами и черными ягодами. Вымерзаетъ на воздухѣ, если морозы наступятъ до выпаденія снѣга.

S. ebulus. *Б. дикая. Б. яровая.* Съ черными ягодами. Всѣ части растенія издають сильный запахъ и имѣютъ лекарственныя свойства.

S. racemosa. *С. обыкновенная. Дикая калина.* Съ бѣловатыми цвѣтами и красными ягодами; растетъ весьма быстро; переноситъ зиму безъ покрывки.

S. nigra. *Б. черная. Бозъ-дерево. Базовникъ.* Съ бѣлыми цвѣтами. Дикорастущій кустарникъ, разводимый въ садахъ. Въ безснѣжную зиму вымерзаетъ, но весною вновь быстро вырастаетъ отъ корня. Цвѣты его доставляютъ пчеламъ обильный взятокъ. Настой цвѣтовъ его возбуждаетъ испарину. Ягоды употребляются для подкраски винъ. Листья производятъ рвоту и употребляются какъ слабительное.

Разновидность его: **S. nigra typica.** Съ черными ягодами.

S. n. fl. pleno. Съ махровыми цвѣтами.

S. n. fl. elegan. varieg. Листья зеленые, съ золотою каймою.

S. n. fl. aureis. S. n. heterophylla. S. n. laciniata. S. мелколистная S. n. linearia. S. n. rancinata. Съ весьма узкими, длинными листьями.

S. n. virescens. Съ зелеными ягодами.

S. n. leucocarpa. Съ бѣлыми ягодами.

S. n. variegata. Листья съ желтыми краями и разводами; требуетъ покрывки на зиму, размножается черенками.

S. n. rotundifolia. Съ округленными листьями.

S. n. pulverulenta. Листья желтоватые, съ темнозелеными крапинками и пятнами.

S. n. lucida. Съ блестящею верхнею стороною листьевъ.

1527. *Sanchezia nobilis variegatis.* Тепличное растеніе.

Другой видъ: *S. spectabilis fol. varieg.*

1528. *Sandersonia aurantiaca.* Изъ семейства *Liliaceae*. Тепличное растеніе. Цвѣты имѣютъ видъ висячихъ колокольчиковъ—желтые.

1529. *Sanguisorba officinalis.* Семейство *Sanguisorbeae*. *Рядовикъ. Черноголовникъ аптечный.* Многолѣтнее грунтовое растеніе. Цвѣты колосомъ. Въ древности употреблялось какъ весьма дѣйствительное средство останавливать кровотеченіе, отчего и названо. (*Sanguis*—кровь. *Sorbeo*—поглощать).

Другіе виды: *S. of. flore pleno.* Ч. *махровый. S. canadensis.* Съ бѣлыми цвѣтами.

S. media.

1530. *Sanseveria fasciata.* Тепличное растеніе.

Другіе виды: *S. carnea. S. guineensis.* Оранжевые растенія.

S. cylindrica. Съ цвѣтами молочнаго цвѣта. Съ большими, толстыми и мясистыми корнями. Даетъ множество отпрысковъ. Внутри плотныхъ и почти круглыхъ листьевъ, содержатся твердыя и мясистыя нити, изъ которыхъ дѣлаютъ банаты и даже ткани.

1531. *Santolina chamaecyparissus.* Густой еустарникъ, дикорастущій въ южной Европѣ, съ бѣловато-пушистыми листьями.

Зимою держится въ оранжереѣ, а на лѣто высаживается въ цвѣтникъ.

Другіе виды: *S. squarosa*. *S. viridis*. *S. incana*. *S. lavandulifolia*.

1532. *Sanvitalia procumbens*. *Санвиталія лежащая*. Однолѣтнее, бордюрное растеніе, съ лежачимъ стеблемъ. Цвѣты черные съ желтымъ. Сѣется въ Апрѣлѣ въ горшки или въ грунтъ, цвѣтетъ все лѣто; на почву не прихотливо.

Другой видъ: *S. pr. plena*. Съ желтыми цвѣтами.

1533. *Sapindus Mucurassi*. Азіатское растеніе. Плоды его употребляются какъ мыло.

Другой Видъ: *S. saponaria*. *Мыльное дерево*. Темно-красные плоды употребляются для выдѣлки мыла, отчего и получило названіе: *Sapo-indicus* — *Индійское мыло*.

1534. *Saponaria officinalis*. *Натягичи*. *Мыльнянка аптечная*. Изъ семейства *Sileneae*. Дикорастущее на влажномъ и открытомъ мѣстѣ, многолѣтнее, садовое растеніе. Отваръ корней Мыльнянки употребляется вмѣсто мыла и для выводаки пятенъ изъ шелковыхъ матерій, отчего и получило названіе. (*Sapo — мыло*).

Другіе виды: *S. calabrica*. (*S. multiflora*). Низенькое, садовое, бордюрное, однолѣтнее растеніе съ многочисленными, красивыми, красными цвѣтами. Сѣется въ Апрѣлѣ въ парникъ; на почву не прихотливо, но лучше идетъ въ рыхлой, песчанистой землѣ.

S. multiflora. Бордюрное растеніе, съ темно-розовыми цвѣтами. Высѣвается въ Мартѣ въ плошки или въ Апрѣлѣ прямо въ грунтъ.

S. m. alba *S. m. rosea*.

1535. *Sapota*. Американское дерево, съ бѣлыми цвѣтами и вкусными плодами. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается черенками и сѣменами; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой и лиственной, съ примѣсю незначительной части вересковой.

Виды: *S. sessilifolia*. *S. Mammosa*.

1536. *Saracha viscosa*. Оранжерейное растеніе.

Другой видъ: *S. stapelioides*. Оранжевое растеніе, съ желтыми цвѣтами. Любитъ тяжелую, питательную землю; размножается черенками и сѣменами.

1537. *Sarcanthus*. Орхидея, съ желтыми, оранжевыми или красными цвѣтами, вырастающими съ боковъ стебля. Размножается срѣзываніемъ стеблей съ воздушными корнями или отдѣленіемъ побѣговъ. Требуется листовую землю, пополамъ съ вересковою. Стебли привязываютъ мѣдною проволокою къ большимъ кускамъ угля и обладываютъ бѣлымъ мхомъ.

Виды: *S. rostratus*. *S. paniculatus*.

1538. *Sarcostemma Brunoniana*. Изъ семейства Ласточковыхъ. Сочное оранжевое растеніе, съ безлистными вѣтвями и маленькими, желтыми цвѣтами—зонтикомъ.

1539. *Sarmienta repens*. Изъ семейства Геснерій. Тепличное, ползучее растеніе, съ краснымъ цвѣткомъ—колокольчикомъ.

1540. *Sarracenia*. Семейство *Sarraceniaceae*. Тепличное растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ, но требуетъ очень влажнаго воздуха и иловатой земли, смѣшанной съ листовою и мхомъ. Очень оригинальное растеніе. Листья его имѣютъ видъ трубы съ приподнятою крышечкою, — внутренность ихъ наполнена водою. Даетъ большіе желтые, малиновые или пурпуровые цвѣты. Лѣтомъ это растеніе сильно поливаютъ и ставятъ на поддонъ съ водою, которую ежедневно перемѣняютъ, корни же сверху обладываютъ бѣлымъ мхомъ. Зимой поливается умѣренно. Размножается отростками и дѣленіемъ корней.

Виды: *S. rubra*. Съ краснымъ цвѣткомъ.

S. flava. Съ большимъ желтымъ цвѣткомъ.

S. Drummondii. Верхушка трубы испещрена, багъ тигровая кожа. Цвѣты красные.

S. purpurea. Цвѣтокъ пурпуровый. Верхняя часть трубы росписана темно-коричневымъ — въ вѣтвѣ.

S. variolaris.

Эти виды можно на лѣтнее время выставять на воздухъ, въ затѣненное мѣсто, но въ поддонѣ всегдѣ должна постоянно находиться вода.

S. nutans. Безусловно тепличное растеніе.

1541. *Sassafras. Laurus sassafras.* Американское дерево, съ желтыми цвѣтами и листьями, издающими смолистый запахъ. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается сѣменами, отростками и черенками; требуетъ листовую землю пополамъ съ дерновою и съ небольшою примѣсью песку. Зимой требуетъ самую умеренную поливку.

Виды: *S. officinale.* Имѣетъ лекарственныя свойства.

S. albidum.

1542. *Satureja hortensis.* *Чаберъ.* Изъ семейства *Labiatae.*

Дикорастущее, однолѣтнее, ароматное растеніе, съ лиловыми цвѣтами, употребляемое для приправы при приготовленіи въ прокъ разныхъ овощей, а также при выдѣлкѣ колбасъ. Требуется рыхлую землю и солнечное положеніе. Сѣется осенью или весною прямо на гряды, въ Апрѣлѣ или раньше — въ парникъ. Въ послѣднемъ случаѣ, по всходѣ, разсаживается на четверть другъ отъ друга; впрочемъ и высѣянный прямо на гряды, если взойдетъ очень густо, можетъ быть разсаженъ. Однажды посѣянный и выросшій *Чаберъ* обмѣняется самъ собою. Гряды тщательно опалываются. Осенью его выдерживаютъ и сушатъ въ пучкахъ, впрочемъ зелень собирается все лѣто и употребляется преимущественно для солки огурцовъ.

Другой видъ: *S. montana.* *Чаберъ кустовой, горный.* Многолѣтнее растеніе, требуетъ того же ухода что и *Origanum majoranoides*, и имѣетъ то же употребленіе.

1543. *Satyrium carneum.* Тепличная Орхидея, съ розовыми цвѣтами, расположенными въ видѣ столбика; требуетъ той же культуры что и *Disa grandiflora.* Цвѣты имѣютъ возбуждающее свойство, почему и названо въ честь Сатира.

1544. *Saurauja Spectabilis.* Грунтовое растеніе любитъ большой горшокъ, питательную землю и поливку жидкимъ удобреніемъ. Размножается черенками и дѣленіемъ корней. Обыкновенно цвѣтетъ въ Августѣ, но можетъ быть подвергнуто ранней выгонѣ въ теплицѣ, для чего пересаживается въ горшокъ, готовое уже цвѣсть въ грунту, растеніе, отчего его цвѣтеніе отдалается и начавшееся разъ — продолжается до конца Января.

Другой видъ: *S. nepalensis.* Тепличный кустарникъ.

1545. *Sauromatum guttatum*. Изъ семейства *Aroideae*. Тепличное растеніе. Листъ его, обвивающійся около цвѣточнаго стебля, внутри пестрый какъ тигровая кожа. Размножается сѣменами.

1546. *Saururus lucidus*. Болотное растеніе, полезное для акваріевъ, какъ вѣчно зеленое. Производитъ маленькіе, бѣлые цвѣты. Размножается дѣленіемъ корня. Требуется того же ухода, что и *Richardia aethiopica*.

1547. *Saxifraga*. *Разрывъ трава*. *Камнеломка*. Семейство *Saxifragaceae*. Названіе камнеломки получило отъ того, что въ древности употреблялось какъ средство отъ каменной болѣзни. Грунтовое, корневое, травянистое, многолѣтнее растеніе; нѣкоторые виды его принадлежатъ къ оранжерейнымъ растеніямъ. Даетъ бѣлые и розовые цвѣты. Размножается отростками и дѣленіемъ корней. Требуется землю, составленную изъ вересковой пополамъ съ листовенною, съ примѣсью одной части дерновой пополамъ съ пескомъ.

Виды: *S. tricolor*. Съ розово-пестрыми листьями. Оранжерейное растеніе, но можетъ содержаться и въ теплицѣ.

Оранжерейные виды: *S. cristata*. Цвѣтетъ въ Мартѣ или Апрѣлѣ; для этого корни растенія раздѣляются весною, сажаются въ грунтъ и въ Августѣ, снова пересаженные въ горшки, вносятся въ оранжерею.

S. mutata. *S. pyramidalis*. *S. strachei*. Съ ярко-розовыми цвѣтами.

Виды, могущіе расти въ комнатѣ: *S. oppositifolis* *S. aisoon*. Съ бѣлыми цвѣтами.

S. geranioides.

S. cotyledon. Можетъ расти въ комнатѣ, но преимущественно содержится въ оранжереѣ.

S. c. pyramidesis. Съ большимъ букетомъ мелкихъ, бѣлыхъ цвѣтовъ.

Виды, растущіе въ грунту:

S. crassifolia. *Баданъ*. *Чаирскій* или *монгольскій чай*. *Камнеломка толстолистная*. Съ красными или розовыми цвѣтами—метелкою, цвѣтетъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ.

S. purpurescens. Съ пунцовыми цвѣтами.

S. rotundifolia. *К. круглолистная*.

S. sarmentosa, *К. цепкая*.

S. caespitosa. Съ бѣлыми цвѣтами.

S. Maweana. *К. Моуа*. Низенькое растеніе. Цвѣты бѣлые съ зеленоватымъ оттѣнкомъ въ нижней ихъ части. Самый красивый видъ по крупности цвѣтка. Лѣтомъ содержится на воздухѣ, а зимою въ мѣстѣ, защищенномъ отъ морозовъ.

S. longifolia. *S. florulenta*. Съ бѣлыми цвѣтами, также, какъ и *S. valdensis*.

S. cordifolia. *S. ligulata*. *S. umbrosa*.

Дикорастущіе виды:

S. bronchiates. *Комочки*.

S. granulata. *Земляныя почки*.

S. Hirculus. *Царскія очи*.

S. hypnoides. Съ бѣлыми цвѣтами.

1548. Scabiosa. *Скабіоза. Коростовикъ. Свербежница.* Изъ семейства *Dipsaceae*. Однолѣтнее садовое растеніе, съ цвѣтами различныхъ колеровъ и оттѣнковъ—отъ бѣлаго до темно-краснаго. Сѣется въ Апрѣлѣ въ парникъ, потомъ высаживается въ питательную землю, на защищенное мѣсто. Употребляется какъ лекарство противъ чесотки, отчего и получило названіе. (*Scabies*—чесотка).

Виды: *S. atropurpurea*. Темно-пурпуровый, крупный цвѣтокъ.

S. major. *S. nana*. *S. nana pleno*. Махровая.

S. caucasica. *С. Кавказская*. Многолѣтнее, грунтовое садовое растеніе.

Виды многолѣтніе, медоносные, дикорастущіе:

S. succisa. *Отмышиная трава. Долиха*. Цвѣтеніе осенью.

S. arvensis. *Короставикъ полевой*. Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ.

1549. Scafortia elegans. Пальма. Весьма изящное растеніе и очень медленно растущее, что дѣлаетъ его пригоднымъ для тепличной культуры. Не требуетъ сильной теплоты. Размножается сѣменами.

S. robusta. (*Areca Baueri*).

S. veitchii. Красивая, австралійская Пальма, съ перистыми листьями.

1550. *Scandix cerefolium*. *Требула*. Растетъ въ дикомъ состояніи по берегамъ рѣкъ и ручьевъ.

Другой видъ: *S. bulbosum*. *Бутень*. *Кервельная рѣпа*. Двухлѣтнее растеніе, корешки котораго, имѣющіе миндальный вкусъ, употребляются въ пищу. Любитъ плодородную, рыхлую почву. Сѣется съ осени, часто опадываетъ и земля вокругъ него разрыхляется. Бульбы сохраняются зимою въ погребѣ, зарытыя въ песокъ.

1551. *Scheelia excelsa*. Родъ Пальмъ. Содержится въ теплицѣ. Имѣетъ гладкій стволъ и перистые листья. Размножается дѣтками, которыя отнимаются не прежде, чѣмъ образуется у растеньица хоть одинъ корешокъ. Отсадовъ ставится въ теплый парничекъ.

1552. *Scheeria mexicana*. Изъ семейства Геснерій. Содержится въ умѣренной теплицѣ. Даетъ большіе фіолетовые цвѣты, требуетъ той же культуры, что и Ахименесъ.

1553. *Schinus molli*. *Перечневое дерево*. Съ розовыми ягодами.

1554. *Schizanthus pinnatus*. Красивое, однолѣтнее, садовое растеніе, достигающее 2 футъ высоты. Цвѣты, коренной формы — нѣжно-лиловые, съ желтымъ глазкомъ и пурпуровыми кончиками, но есть видоизмѣненія съ бѣлыми и темно-лиловыми цвѣтами. Сѣется въ Апрѣлѣ въ плошки или на гряды, въ рыхлую, песчанистую, сильно унавоженную землю, на солнечное мѣсто. Можетъ расти въ комнатѣ.

Другіе виды: *S. chilensis*. *S. grandiflorus oculatus*. *S. g. o. atropurpureus*. *S. g. o. albus*. *S. violaceus*. *S. pinnatus albus*. *S. elegans*.

S. retusus. Двухлѣтнее растеніе, съ пурпуровыми цвѣтами. Зимуетъ въ оранжереѣ.

S. r. albus. Тоже съ бѣлыми цвѣтами.

S. humilis. *S. gracilis*. *S. Grahami*. Съ большими, темно-красными или бѣлыми цвѣтами.

S. g. lilacinus.

1555. *Schizopetalum Walneri*. Однолѣтнее садовое растеніе, сѣется въ горшки или парникъ, потомъ разсаживается и дер-

жится въ парникѣ до окончанія морозовъ, тогда высаживается въ грунтъ. Бѣлые цвѣты распускаются въ Іюль.

1556. *Schizostylis coccinea*. Изъ семейства *Tridaceae*. Оранже-рейнное растеніе, съ большими ярко-красными цвѣтами, кото-рые распускаются позднюю осенью и зимою. На лѣто высаживается въ грунтъ и сажается группами. Когда отцвѣтеть, въ оранжереѣ, содержится сухо. Размножается дѣленіемъ кор-ней весною.

1557. *Schistanthe*. Изъ семейства *Scrophularineae*. Однолѣтнее садовое растеніе, не заслуживаетъ разведенія, въ садахъ. Видъ его: *S. grahami flore albo*. Бѣлый цвѣтокъ съ вну-треннимъ оранжевымъ лепесткомъ. Высѣвается въ Августѣ и потомъ разсаживается.

1558. *Schoenia oppositifolia*. Грунтовое растеніе, изъ семейства *Compositae*. Съ розовыми цвѣтами. Требуется той же куль-туры, что и *Rhodante mangletii*.

1559. *Schomburgkia tubicinis*. Орхидея. Превосходные цвѣты лиловые или шоколадные, съ бѣлымъ. Молодые побѣги надле-житъ оберегать отъ сырости; во время роста, растеніе только опрыскивается. Зимою требуетъ температуры до 15° Р. и со-вершенно сухаго содержанія, почти безъ поливки.

1560. *Schôtia*. Оранжерейнное деревцо, съ весьма красивыми ма-линовыми или лиловыми цвѣтами; зимою содержится сухо; мо-жетъ расти въ комнатѣ; размножается сѣменами и черенками; требуетъ листовенную землю, пополамъ съ дерновою и съ примѣсью одной восьмой части вересковой.

Виды *S. speciosa*. *S. latifolia*. *S. tamarindifolia*.

1561. *Schubertia auricoma*. Вьющееся растеніе, съ большими бѣ-лыми цвѣтами; содержится въ умѣренной теплицѣ. Любитъ питательную землю и весьма частое опрыскиваніе для спасе-нія отъ сильно на него нападающихъ насѣкомыхъ. Легко раз-множается черенками, посаженными въ тепличку.

1562. *Sciadocalyx warszewiczii*. Изъ семейства Геснерій. Теп-личное растеніе. Ухоть тотъ же, что и за Ахименесъ. Цвѣты пунцовые съ желтымъ.

1563. *Sciadophyllum farinosum*. Прекрасное, тепличное растеніе.

1564. *Sciadopitus verticillata*. Изъ семейства *Conifereae*. Оранжевейное, хвойное растеніе.

1565. *Scilla cernua*. *Пролѣска*. *Сибирскій подснежникъ*. Изъ семейства *Liliaceae*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное, луковичное растеніе. Цвѣты темно-голубые. Цвѣтетъ въ Апрѣлѣ и Маѣ. Имѣетъ ядовитыя луковицы, отчего и получило названіе: (*skylo* — вредить). Для ранняго цвѣтенія, разводится въ оранжереѣ, также какъ Крокусъ, и если будетъ поставленъ въ тепло, въ началѣ Декабря, то цвѣтетъ около Рождества.

Другіе виды: *S. bifolia*. *Растъ*. Съ сине-лиловыми цвѣтами. Требуется того же ухода, но цвѣтетъ позже и не любитъ искусственной теплоты.

S. sibirica. *Сибирскій подснежникъ*. Съ свѣтло-синими цвѣтами.

S. italica. Съ свѣтло-голубыми цвѣтами, также какъ и *S. peruviana* и *G. ugni*.

Если Сцилла не подвергается ранней выгонкѣ, то ея корни остаются нѣсколько лѣтъ на одномъ мѣстѣ.

1566. *Scimmia japonica*. Оранжевейное, кустарное растеніе съ бѣлыми, душистыми цвѣтами. При ранней выгонкѣ можетъ цвѣсти въ Январѣ.

1567. *Scirpus*. *Камышъ*. Изъ семейства *Сурепасеae*. Дико растетъ по болотамъ.

1568. *Sclerosperma manni*. Родъ Пальмъ. Производитъ снопы перистыхъ листьевъ длиною до 13 футъ, сверху сизоватыхъ, снизу — бѣловатыхъ. Размножается сѣменами.

1569. *Scorzonerra hispanica*. *Скорцонера*. *Ужовникъ*. Дикорастущее, двухлѣтнее, медоносное растеніе. Любитъ плодородную, глубоко перекопанную почву и низменное мѣстоположеніе. Употребляется въ пищу зимою и весною. Сѣется весною. Слишкомъ частые всходы проредываются. Земля держится постоянно разрыхленною. Корни выкапываютъ и употребляютъ на второй годъ послѣ посѣва. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Другіе виды: *S. purpurea*. *Козелецъ пурпуровый*. Многолѣтнее, садовое, грунтовое растеніе.

1570. *Scrophularia*. *Порочникъ*. Семейство *Scrophularineae*.

Видъ. *S. nadosa*. Цвѣты темно-оливковые, съ изнанки бурые.

1571. *Scucellaria*. *Шлемникъ*. Изъ семейства *Labiatae*. Многолѣтнее растеніе зимующее на открытомъ воздухѣ; способно цвѣсть зимою, если лѣтомъ его обрѣзать и посадить въ грунтъ, на мѣсто обращенное къ сѣверу, осенью же, когда образуетъ цвѣточные почки, пересадить въ горшки. Любитъ легкую землю. Размножается дѣленіемъ корней или черенками.

Виды: *S. japonica*. Съ небольшими голубыми цвѣтами, формою, напоминающими цвѣты *Delphinium*. На зиму требуетъ надежной покрывки. Любитъ тучную землю и сильную поливку. Размножается сѣменами, черенками и отводками, какъ гвоздика.

S. baicalensis. *S. splendens*. *S. Moinciana*. *S. coccinea*. *S. galericulata*. Сердечная трава.

S. hastaefolia. *Акулька*.

S. subornata. Съ розовыми цвѣтами.

S. lupulina. Съ желтыми цвѣтами.

S. macrantha. Съ темно-синими цвѣтами.

S. peregrina. Съ синими цвѣтами.

S. costaricana. Тепличное растеніе съ букетомъ оранжевыхъ цвѣтовъ, имѣющихъ желтый зѣвъ.

S. villosa. Съ малиновыми цвѣтами. Тепличное растеніе, на лѣто ставится въ оранжерею, въ полутѣнь. Требуется смѣсь лиственной земли съ дерновою. Въ почвѣ постоянно поддерживается влажность. Размножается черенками.

S. ventenatii. Съ огненно-красными цвѣтами. Лѣтомъ держится въ тѣни, на открытомъ воздухѣ; на зиму вносится въ теплицу; землю любитъ тучную; лѣтомъ поливается довольно сильно, — зимою весьма умеренно. Размножается черенками, на которые употребляются молодые побѣги.

1572. *Scyphanthus elegans*. Красивое, однолѣтнее, вьющееся, садовое растеніе, разводимое съ большимъ трудомъ. Высѣ-

вается предварительно въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ.

1573. *Seafortia elegans*. Тепличное растеніе. *Seafortia elegans*

Другой видъ. *S. robusta*. *S. robusta*

1574. *Securigera*. Однолѣтнее садовое растеніе. Не заслуживаетъ разведенія.

1575. *Sedum*. *Очитокъ*. *Заячья капуста*. *Молодило*. Изъ семейства *Crassulaceae*. Нѣкоторые виды долголѣтніе, другіе многолѣтніе, оранжерейные или грунтовые. Съ толстыми листьями; желтыми, красноватыми и бѣлыми цвѣтами; размножается дѣленіемъ корней и черенками изъ стеблей и листьевъ. Требуется земля, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной, вересковой и небольшого количества песку. Зимой поливается весьма умеренно. Многолѣтніе виды *Sedum*, растущіе въ грунтъ.

S. Selskianum. *Очитокъ Сельскаго*. Съ золотисто-желтыми цвѣтами. Любитъ глинисто-дерновую землю; размножается сѣменами и дѣленіемъ.

S. Rodigasi. Съ розовыми цвѣтами и пурпуровыми листьями.

S. albo roseum Baner. fol. *variegatis*. Съ розовыми цвѣтами и бѣло-узорчатыми листьями.

S. Ewersi. Съ розовыми цвѣтами и сизаго цвѣта листьями.

S. Fosterianum. Тоже, съ золотисто-желтыми листьями.

S. reflexum. Съ ярко-зелеными листьями и золотисто-желтыми цвѣтами.

S. spurium. Съ тѣлеснаго колера цвѣтами.

S. atropurpureum. *О. пурпуровый*.

S. azoideum. fol. *variegatis*. На зиму вынимается изъ грунта и содержится въ подвалѣ или оранжереѣ.

S. cristatum. Употребляется для украшенія клумбъ и протовъ, сдѣланныхъ изъ туфовъ и камня.

S. spectabile. *О. Японскій Красивый*. Самый красивый, многолѣтній видъ, съ многочисленными розовыми цвѣтами, собранными въ густую плоскую макушечную метелку, на прямомъ стеблѣ; растетъ въ грунтъ, но поздно разцвѣтаетъ, а потому сажается рано въ горшки и выдерживается въ теплицѣ или парникѣ.

S. albo roseum. *O. Японскій блѣно-розовый.* Съ мелкими блѣдно-тѣлесными цвѣтами; распускается въ грунтѣ. Въ Сентябрѣ или началѣ Октября.

S. japonicum (Fabaria) fol. variegatis. *O. Японскій блѣно-розовый пестролистный.* Разность предыдущаго, имѣетъ широкую, желтую полосу на листьяхъ.

S. Faburias speciosa. S. hybridum. *O. помѣстный.*
S. involucratum. S. Kamtschaticum. S. leptorhizon. S. Rhodiola.

S. cordifolium. Съ красно-бурыми стеблями Цвѣты бѣлые съ розовымъ.

S. coccineum. S. sieboldii foliis mediopictis. S. repens.

Однолѣтніе виды:

S. glandulosum. Съ розово-пурпуровыми цвѣтами.

S. caespitosum. Съ желтыми цвѣтами.

S. coeruleum. Низенькое растеніе съ мясистыми листьями и красивыми голубыми цвѣтами. Долго цвѣтетъ. Сѣется въ Апрѣлѣ въ плошки причемъ его мелкія сѣмена едва прикрываются пескомъ; высаживается въ цвѣтникъ въ землю, составленную изъ глинистой и листовой, съ большимъ количествомъ песку.

S. repens. Съ розовыми цвѣтами.

S. sempervivium. Двухлѣтнее растеніе съ красными цвѣтами. Зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

Дикорастущіе виды:

S. elongatum. *Родянки.* **S. acre. S. elegans.** Пестролистный.

S. purpurescens. *Забируха. Заячья капуста красная.* Медоносное растеніе. Цвѣтетъ посреди лѣта.

Оранжевые виды:

S. maximum. *Заячья капуста.* Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе. Содержится въ оранжевѣхъ; цвѣтетъ среди лѣта.

S. m. versicolor. Листья съ малиновыми краями и росписаны розовымъ.

S. Telephium fol. variegatis. *Заячья капуста.*

S. adenotrichum. Цвѣты желтоватые съ розовымъ отливомъ.

S. ebracteatum. Съ маленькими, желтыми цвѣтами.

S. dasphyllum, S. sieboldii. S. villosum. S. virescens,

1576. *Selaginella*. Американскій мохъ. См. *Lycopodium*. Семейство Плауновыхъ.

Другой видъ. *S. rubella*. Тепличный плаунъ, съ красно-бурыми листьями.

1577. *Selago Spuria*. Оранжевейное растеніе.

Другіе виды: *S. myrtifolia*. Съ свѣтло-пурпуровыми цвѣтами; распускается осенью.

S. Ohlendorffiana. Тоже.

1578. *Selenipedium pearcei*. Тепличная Орхидея съ зеленоватыми цвѣтами и двумя фіолетовыми, опущенными, завитыми въ видѣ усовъ, длинными лепестками.

1579. *Scelinum carifium*. Гирча. Дикорастущее.

Другой видъ. *S. decipens*. Трехъ или четырехлѣтнее растеніе. Размножается сѣменами. Зимуетъ въ оранжереѣ.

1580. *Semeiandra grandiflora*. Изъ семейства *Oenotheraceae*. Оранжевейное растеніе съ пунцовыми цвѣтами, требуетъ той же культуры, что и *Fuchsia*.

1581. *Sempervivium*. Растеніе кустовое или травянистое. Можетъ расти въ комнатѣ. Съ сочными листьями, бѣлыми, розовыми, желтыми или красными цвѣтами. Размножается отростками или черенками изъ побѣговъ и листьевъ; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой, съ небольшою примѣсью песку.

Оранжевейные виды:

S. arboreum. Растетъ въ Сѣверной Африкѣ.

S. caespitosum *S. barbatum* *S. canariense*.

Дикорастущіе виды:

S. testorum. Подсѣженикъ.

S. hirtum. Скопки.

S. globiferum. Дикая роза.

S. smithii.

S. arachnoideum. Дикорастущее на Альпійскихъ горахъ, въ то же время зимующее въ грунту, при надежной покрывкѣ—растеніе, многолѣтнее, съ пестрыми листьями и красноватыми цвѣтами.

Виды садовые, многолѣтніе, грунтовые.

S. tectorum. Молодилъ кровельный. Съ сизыми листьями и красноватыми цвѣтами.

S. montanum. Съ ярко-зелеными листьями и красноватыми цвѣтами.

S. Funki и *S. ruthenicum.* Похожи на *S. tectorum.*

1582. *Senecio.* Крестовикъ. Изъ семейства *Synanthereae.* Есть виды этого растенія травянистые и кустовые, многолѣтніе и однолѣтніе. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается посѣвомъ въ Мартѣ, раздѣленіемъ корней и черенками.

Корни многолѣтнихъ видовъ, зимою охраняются отъ сырости. Принадлежить къ числу медоносныхъ.

Виды травянистой Сенеціи.

S. humilis. *S. auratus.* *S. odorata.*

S. elegans. К. индійскій. Однолѣтнее, садовое растеніе, высѣвается в Мартѣ, въ горшокъ или въ плошку, въ теплицѣ и пересаживается въ грунтъ. Заслуживаютъ разведенія только махровые, съ цвѣтами бѣлыми и красными, разныхъ оттѣнковъ. Для весенняго цвѣтенія разводятъ черенками. Осенью вынимаютъ изъ грунта и сажаются въ горшки, махровые экземпляры, которые еще долго цвѣтутъ.

Видоизмѣненія *S. elegans.*

S. e. alba plena. *S. e. carnea plena.* *S. e. cinerea plena.* *S. e. lilacina plena.* *S. e. rubra plena.* *S. e. purpurea plena.* *S. e. nana alba plena.* *S. e. atrocinnerea plena.* *S. e. coerulea plena.* *S. e. cupreata plena.* *S. e. purpurea plena.* *S. e. rubra plena.*

Съ красными цвѣтами.

Виды кустовой Сенеціи.

S. Maderensis. *S. populifolia.* *S. cruens.* Отъ этихъ видовъ произошла *Cineraria.* (См. это растеніе).

Оранжевые виды:

S. farrisii. Съ желтыми цвѣтами.

S. multibracteatus. Съ ярко-малиновыми цвѣтами.

S. potroneura. Цвѣты бѣлые, имѣющіе запахъ геліотропа.

Дикорастущіе виды.

S. vulgaris. Золотая трава.

S. sylvatica. Самостой.

S. polustris. *Выпадающая трава.*

S. jacobea. *Долгоустикъ.*

S. campestris. *Живительная трава.*

1583. *Sericographis giesbrechtiana.* Оранжевое растение, съ ярко-красными цвѣтами; распускается зимою.

1584. *Serratula tinctoria.* *Серпуха.* Изъ семейства *Synanthereae*. Дикорастущее. Другой видъ: *S. arvensis.* *Осоцъ.* Многолѣтнее, дикорастущее растение, съ красноватыми цвѣтами. Употребляется въ пищу, какъ шпинатъ.

1585. *Sesamum orientale.* *Кунжутъ.* Травянистое растение, съ бѣловатыми или красноватыми цвѣтами; съ плодами, имѣющими сладкія, маслянистыя сѣмена, изъ которыхъ выжимается масло. Растетъ въ умеренныхъ мѣстностяхъ Россіи въ грунту, на воздухѣ. Высѣвается весною.

1586. *Shutereaia bicolor.* Изъ семейства *Convolvulaceae*. Размножается сѣменами. Желтоватые цвѣты съ фіолетовымъ внутри, похожіе на Ипомею. Цвѣтетъ на второй годъ. Теряетъ стебель осенью и на зиму ставится въ наиболѣе холодное мѣсто теплицы; въ это время не поливается. Пересаживается въ Январѣ и когда покажется стебель, поливка постепенно усиливается. Вьющіяся вѣтки развязываются на трельяжъ. Въ Маѣ растение переносятъ въ оранжерею. Послѣ того, какъ отцвѣтетъ, ставятъ въ полутѣнь, на открытый воздухъ, гдѣ и держать до Сентября, т. е. до того, когда начнетъ терять стебель.

1587. *Sicydium.* Однолѣтнее, вьющееся, садовое растение, изъ семейства Тыквовыхъ. Трудно разводимое растение.

1588. *Sicyon.* Тоже.

1589. *Sicyos angulatus.* *Волохатые огурцы.* Однолѣтнее цвѣточное растение, высѣвается въ парникъ или плошки и высаживается въ грунтъ, когда уже нельзя ждать морозовъ.

1590. *Sicyosperma.* Тоже что и *Sicydium.*

1591. *Sida tiliaefolia.* Оранжевое растение.

Другой видъ: *S. venosa*. Цвѣты желтые, съ красными жилками; цвѣтетъ съ Октября до Января.

1592. *Sideritis macrostachya*. Декоративный, садовый полукустарникъ, у котораго стебли и нижняя сторона листьевъ покрыты густыми бѣлыми волосками. Размножается сѣменами и черенками. Любитъ смѣсь дерновой земли съ листовенною.

1593. *Silene*. *Куколица*. Существуютъ виды многолѣтніе и однолѣтніе. Садовое; бордюрное растеніе съ розовыми, бѣлыми или красными цвѣтами. Сѣется съ осени или въ Мартѣ въ плошки, иначе многолѣтнее не зацвѣтетъ въ годъ посѣва. Посѣянное осенью, сохраняется въ защищенномъ отъ холода мѣстѣ.

Однолѣтніе виды:

S. pendula. Съ темно-розовыми цвѣтами, сѣется въ Маѣ прямо въ грунтъ; на почву неприхотливо.

S. p. alba. Съ бѣлыми цвѣтами.

S. armeria. Съ ярко-красными цвѣтами.

S. compacua. *S. orientalis*.

S. muscipula. *Мушоловка*.

S. elegans. *S. ruberrima*.

S. bipartita. Съ розовыми цвѣтами.

S. nutans. *Смолевка пониклая*. *Щавель воробыный*. Дикорастущее, однолѣтніе, сорное, но вмѣстѣ медоносное растеніе; цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ бѣлыми цвѣтами.

Многолѣтніе виды Силены размножаются дѣленіемъ корней; зимою требуетъ небольшой поливки; имъ дается листовенная земля съ прибавкою такого же количества дерновой, пополамъ съ вересковою. Можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: *S. amoena*. *S. virginica*. *S. ramosissima*.

S. inflata. *Куколица*. Дикорастущее.

S. alpestris. Съ бѣлыми цвѣтами и желто-узорчатыми листьями.

Виды, содержащія въ оранжереѣ:

S. cooperi. *S. fruticosa*. *S. Zawadskii*.

S. acaulis.

S. saxifraga. } Съ красными цвѣтами.

S. speciosa. Съ пунцовыми цвѣтами лѣтомъ держится въ грунтѣ, а зимою въ оранжереѣ.

1594. *Silphium connatum*. *Силфій сростнолистный*. Много-
лѣтнее грунтовое, садовое растеніе.

Другой видъ: *S. laciniatum*. *Дикій подсолнечникъ*. Дико-
растущее. Называется такъ же *комнатнымъ растеніемъ*, такъ
какъ черешки его листьевъ, достигнувъ вышины 3 — 4 дюй-
мовъ, скручиваются такъ, что дають направленіе пластинкѣ
на Сѣверъ и Югъ. Наблюденія показали что $\frac{5}{7}$ листьевъ этого
растенія имѣютъ направленіе магнитнаго меридіана.

1595. *Sinapis alba*. *Горчица*. Изъ семейства *Cruciferae*. Дико-
растущее и разводимое въ огородахъ и поляхъ растеніе. Сѣмя
его употребляется въ пищу какъ пряность, имѣетъ лекар-
ственные свойства, служить для выдѣлки „горчичнаго масла“.
Высѣвается осенью прямо въ грунтъ.

Другіе виды: *S. arvensis*. *Сурьница, полевая горчица*. Изъ
сѣменъ его также выдѣлывается масло. *S. nigra* *черная*
горчица.

1596. *Sinningia sinensis*. Оранжевое растеніе.

Другой видъ: *S. vitlosa*.

1597. *Sipanea carnea*. Тепличное растеніе. Цвѣтетъ осенью. Что-
бы отдалить цвѣтеніе до Января, растенію не дають распу-
саться въ свое время и прибавляютъ въ горшокъ свѣжей
земли. Въ теплицѣ дается самое свѣтлое мѣсто и тща-
тельно очищается отъ вшей.

1598. *Simphoricarpus racemosa*. Грунтовое растеніе съ пло-
дами въ видѣ вишни.

1599. *Siphocampylus*. Изъ семейства *Lobeliaceae*. Оранжево-
ное, кустовое растеніе, съ красными или желтыми цвѣтами.
Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается сѣменами и черен-
ками. Требуешь листовую землю, пополамъ съ дерновою и
незначительною примѣсью вересковой.

Виды: *S. orbignianus*. Цвѣты пунцовые съ зеленымъ.

S. penduliflorus. Съ пониклыми, длинными розовыми
цвѣтами.

S. molly S. amoenus. Съ пунцовыми цвѣтами, содер-
жится въ умѣренной теплицѣ.

S. elegans. Оранжевое растение.

S. bicolor. Тоже. Цвѣты красные, а внутри желтые. Двухлѣтнее растение.

S. glandulosus. Съ большими, розовыми цвѣтами. Зимой содержится въ оранжереѣ, — лѣтомъ въ грунтѣ. Размножается черенками, которые держатъ подъ стекляннымъ колпакомъ.

S. microstoma. Тепличное растение, съ огненно-шарлаховыми цвѣтами. Въ Маѣ, полученные отъ черенковъ или отъ раздѣленія корней экземпляры, сажаются въ грунтъ; осенью они вновь сажаются въ горшки. Находясь въ теплицѣ, цвѣтеть въ Январѣ.

Другіе тепличные виды: **S. coccinea.** Съ красными цвѣтами. Любитъ питательную землю, сильную поливку — лѣтомъ, весьма умеренную, зимою — свѣтъ и чистый воздухъ.

S. coccinea var. leucostoma. Съ малиновыми цвѣтами.

S. betulaefolius.

1600. Siphonia elastica. Гумми-эластиковое дерево. Изъ семейства **Euphorbiaceae**. Большое дерево; изъ сока его добывается „каучукъ“.

1601. Sisymbrium loeselii. Горчичникъ. Гулявникъ. Изъ семейства **Cruciferae**. Дикорастущее, двухлѣтнее, медоносное растение, цвѣтеть съ Мая до конца Августа. Одна изъ сорныхъ травъ. Листья даютъ при растираніи чесночный запахъ, — ихъ ѣдятъ съ хлѣбомъ. Коровы охотно ѣдятъ эту траву, а овцы вовсе не ѣдятъ ее.

Другіе виды: **S. officinale.** Уразная трава. **S. alliaria.** Употребляется въ лекарства. Также какъ и **S. sophia.** Горчица полевая. **S. austriacum.** Медоносное, двухлѣтнее растение, цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ.

1602. Sisyrinchium Douglasi. Цвѣтеть раннею весною на открытомъ воздухѣ, фіолетовыми, большими цвѣтами, съ желтыми тычинками. Любитъ дерновую землю пополамъ съ вересково-песчанистою, размножается дѣленіемъ корневища — осенью. Другой видъ: **S. longistylum.** Оранжевое растение съ желтыми цвѣтами. Размножается дѣленіемъ корней и сѣменами.

1603. *Sium sisarum*. Сахарный корень. Сладкій корень. Многолѣтнее растеніе любитъ рыхлую, песчаную почву; употребляется какъ морковь. Разводится сѣменами или молодыми корневыми отпрысками. Сѣютъ осенью, или раннею весною. Посѣвъ поливается навозною жижею и слегка покрывается землею. Отпрысками размножается весною. Лучше сѣять каждый годъ, такъ какъ молодые корни вкуснѣе. Однолѣтніе корни выкапываются съ осени, до весны.

Другой видъ: *S. latifolium*. Паточникъ. Дикорастущее.

1604. *Sgiius ongulatus*. Однолѣтнее, вьющееся растеніе, съ желтыми цвѣтами; высѣвается прямо въ грунтъ.

1605. *Skimmia*. Маленькій кустъ, съ многочисленными мелкими, блѣдно-желтыми, душистыми цвѣтами, дающими осенью, красныя ягоды. Любитъ вересковую землю, пополамъ съ глинисто-дерновою. Содержится въ оранжереѣ.

Виды: *S. japonica*. Съ блѣдно-желтыми, душистыми цвѣтами. Можетъ цвѣсти зимою; — для этого весною пересаживается въ грунтъ, а осенью снова въ горшки.

S. fragrans. Съ свѣтло-желтыми, пахучими цвѣтами.

S. oblata. Цвѣты съ красноватымъ отливомъ; впоследствии дѣлаются бѣлыми.

S. veitchii. Красивѣйшій видъ; низкій кустъ, съ бѣлыми, душистыми цвѣтами.

S. laureola. Съ желтыми, душистыми цвѣтами; нѣженѣе прочихъ видовъ.

1606. *Smilax aspera*. Тунъ. Семейство *Smilacaceae*.

Другіе виды: *S. aspera* var. *punctata*. Точечная жесткая сассaparиль. Кустарникъ вышиною до 2 футовъ, съ неоппадающими листьями. Содержится въ оранжереѣ; любитъ рыхлую, глинисто-дерновую землю. Лѣтомъ ставится на солнцѣ въ цвѣтніиъ и любитъ солнечное мѣсто. Изъ корней его готовятъ поддѣльную сальсаперель.

S. mauritiana. Оранжерейное растеніе, съ пунцовыми ягодами, въ видѣ виноградныхъ кистей. На лѣто выставляется на воздухъ.

S. rotundifolia. *S. sarsaparilla*. Корень ихъ употребляется какъ лекарство, также какъ и *S. medica*.

S. caucasica. Растетъ въ грунту; на зиму требуетъ надежной покрывки.

1607. *Sobralia*. Тепличная Орхидея. Можетъ цвѣсти и въ комнатѣ; съ листьями на высокихъ стебляхъ и большими, блѣдно-розовыми или лиловыми цвѣтами. Размножается дѣленіемъ корней; сажается прямо на землю; вообще требуетъ той же культуры, что и прочія земныя Орхидеи.

Виды: *S. chlorantha*. Съ желтыми цвѣтами.

S. macrantha. Съ большими, малиновыми цвѣтами.

S. m. variegata major. *S. decora*.

S. macrantha albida. Съ бѣлыми, крупными цвѣтами, имѣющими свѣтло-розовую губу.

1608. *Socratea*. Родъ Пальмъ. Имѣетъ стебли, выходящіе изъ колочихъ корней, которые вырастаютъ на нѣсколько футовъ надъ поверхностью земли конусомъ, такъ, что стебли этой пальмы кажутся какъ-будто подперты жердями. Размножается сѣменами.

Виды: *S. elegans*. *S. orbigniana*. *S. exorrhiza*. *S. durissima*.

1609. *Solandra grandiflora*. Оранжевое растеніе.

Другой видъ: *S. laevis*. Тепличное растеніе, съ весьма ароматическимъ желтовато-бѣлымъ цвѣткомъ, въ видѣ трубы. Требуется частой очистки листьевъ отъ нападающихъ на нихъ насѣкомыхъ. Легко размножается черенками, на которые употребляются уже одревѣнѣвшіе побѣги.

1610. *Solanum*. Семейство *Solanaceae*. Растеніе многолѣтнее и однолѣтнее, — кустовое и травянистое; со стеблями то гладкими, то покрытыми колючками; съ бѣлыми, розовыми, желтыми или лиловыми цвѣтами; съ плодами красными, зелеными, бѣлыми или лиловыми.

Кустовые виды *Соланума* размножаются черенками; требуютъ листовую землю пополамъ съ дерновою и немного песку; зимою корни иногда поливаются.

Виды *Куставаго Соланума*.

- S. authro porphogorum*. Тепличный кустарникъ до 6 футовъ высоты, съ блестящими листьями и желтыми или крас-

ными плодами, формою и цвѣтомъ, похожими на Томаты, съ ароматическимъ запахомъ, размножается черенками.

Людоѣды острововъ Фиджи употребляютъ его листья, какъ приправу, при потребленіи человѣческаго мяса, которое по ихъ словамъ трудно варимо для желудка и обыкновенно его разстраиваетъ на нѣсколько дней. Въ листья этого растенія обвертываютъ человѣческое мясо, когда пекутъ его въ горячихъ камняхъ, предварительно посыпавъ солью и прибавивъ въ этой приправѣ листьевъ растенія *Malawaci* и *Tudana*. Чтобы имѣть всегда подъ рукою листья описываемаго растенія, туземцы разводятъ его кусты при каждомъ *Rura ni sa*, т. е. домѣ иноземцевъ, въ который складываютъ всѣхъ убитыхъ непріятелей.

S. arboreum. S. lycioides. S. fragrans. S. coccineum.

Травянистые виды размножаются черенками или посѣвомъ въ Мартѣ; требуютъ такую же землю, какъ и бустовые, съ небольшою прибавкою навозной земли.

Многолѣтніе виды травянистаго Саянумъ.

S. aculeatissimum. Разводится у насъ въ садахъ, какъ однолѣтнее. Имѣетъ выемчатые листья, усаженные иглами. Сѣется въ Мартѣ или началѣ Апрѣля въ теплицу; въ концѣ Мая пересаживается въ грунтъ, причемъ подъ растеніе подкладывается слой конскаго навоза, толщиною въ футъ такъ, что растеніе сажается выше поверхности земли, ему дается сильная, питательная почва и оно поливается жидкимъ удобреніемъ.

S. giganteum. S. longiflorum. S. monanthum. S. cristatum. S. hybridum. S. involucratum. S. kamtschatkense. S. leptorrhizon. S. rhodiola.

Однолѣтніе виды травянистаго Солянумъ: *S. balbisii S. flavum. S. armatum* усажено прямыми шипами съ листьями длиною до 8 дюймовъ; съ свѣтло-голубыми цвѣтами; высаживается на солнечное мѣсто уже сильнымъ экземпляромъ — очень красиво.

S. rubrum. S. citrullifolium, предварительно сѣется въ парникъ, потомъ высаживается въ грунтъ; можетъ выдержать зиму, при надежной покрывкѣ.

S. atropurpureum, съ черноватымъ стеблемъ и множествомъ иголь, покрывающихъ все растеніе.

S. sisimbrifolium. Г. lycopersium. C. melongena. Любное яблоко. Бакажанг. Pomme d'Amour. Плоды его употребляются въ пищу, бываютъ красные и фіолетовые, зелень — противъ муравьевъ. Любитъ свѣжеудобренную тучную почву. Сѣется въ Мартѣ въ парникъ и разсаживается преимущественно у стѣнъ, по которымъ, шпалерою развязываются его вьющіеся стебли. Для увеличенія объема овоща, обрабатываютъ верхушки побѣговъ. Собираютъ овощъ съ Августа по Октябрь полузрѣлыми, когда только зарумянятся, и даютъ дозрѣвать на сухомъ чердакѣ.

S. texanum. Техасскій пасленъ. Высѣвается въ Мартѣ въ парникѣ, въ Маѣ высаживается въ грунтъ въ сильно удобренную землю, на солнечное мѣсто.

S. siliatum. Съ бѣлыми цвѣтами. Собственно *оранжерейные виды*:

S. lanceolatum pyracanthum. Съ прекрасными огненно-красными иглами, на бѣловатомъ стеблѣ.

S. Marginathum. Стебель и листья покрыты бѣлыми волосками, а стебель желтоватыми иглами.

S. Macrophyllum. Съ темно-синими цвѣтами и большими листьями.

S. asarifolium. Съ тонкимъ вьющимся стеблемъ и крупными, сѣрыми цвѣтами.

S. quitense. Съ большими листьями, покрытыми бѣлыми волосками.

S. verbascifolium. Съ толстыми листьями, покрытыми бѣлымъ пухомъ.

S. Balbisii. S. ferax. S. giganteum.

S. lacinatedum. Двухлѣтнее декоративное растеніе съ шиповатымъ стеблемъ и прекрасными, свѣтло-голубыми цвѣтами. На почву не прихотливо, лишь не любитъ слишкомъ плотной и сырой. Размножается черенками, около половины Іюля или въ Августѣ и сѣменами высѣваемыми въ первой половинѣ Октября. До весны содержится въ оранжереѣ, когда же болѣе нельзя ждать морозовъ, высаживается въ грунтъ.

S. robustum. Съ свѣтло-оранжевыми листьями.

S. capsicastrum. Съ красными плодами. Размножается сѣменами.

S. capsicast. fol. variegatis. S. Warszewicziodes.

S. somniculentum. Съ фіолетовыми цвѣтами, похожими на цвѣтокъ Ипомеи. Все лѣто содержится въ грунтѣ; осенью лишь вѣтви начнутъ обваливаться, растение пересаживаютъ въ горшокъ и вносятъ въ оранжерею, гдѣ всю зиму поддерживаютъ въ землѣ, въ которой растение сидитъ, на столько влажности, чтобы корни не высохли вовсе. Размножается черенками.

Дикорастущіе виды Солянумъ:

S. pseudo capsicum. *Любовная вишня.*

S. persicum. *Сладкая трава.*

S. nigrum. *Пасленъ.*

S. Dulcamara. *Глистовникъ. Пасленъ сладкогорькій.* Вьющійся кустарникъ растетъ въ лѣсахъ, на влажной почвѣ, размножается за лекарственное свойство его молодыхъ стеблей.

Solanum tuberosum. *Картофель.* Повсюду нынѣ известная овощъ, имѣющая разнообразное употребленіе. Родится на всякой почвѣ, но предпочитаетъ сухую, глинисто-песчаную и не любитъ свѣжаго удобренія, дающаго картофелю дурной вкусъ. Размножается посадкою картофеливъ въ трехъ четвертяхъ аршина другъ отъ друга, глубиною на вершокъ. Когда покажутся всходы, земля около нихъ окучивается, что повторяется неоднократно во время роста. Также размножается посѣвомъ сѣменъ, въ Мартѣ, въ парникъ и посадкою черенковъ для чего срѣзаются и сажаются въ песчанистую, сильно смоченную землю, верхушки ботвы выспитыхъ сортовъ картофеля. Для картофеля весьма полезна поливка жидкимъ удобреніемъ и верхнее удобреніе, состоящее въ томъ, что послѣ того, какъ первый разъ картофель окучатъ, то кучки, которыя при этомъ образуются, обкладываютъ хорошо перепрѣвшимъ навозомъ. Въ продолжительную засуху, картофель надо нѣсколько разъ сильно поливать.

Собирать картофель должно когда завянетъ его зелень; вынувъ изъ земли даютъ ему просохнуть на воздухѣ и убираютъ въ подвалъ, назначенный къ употребленію, предназначенный же на сѣмена, оставляютъ на воздухѣ, пока позеленѣтъ тогда убираютъ. На сѣмена употребляется картофель средней величины.

Для полученія ранняго картофеля есть нѣсколько способовъ, а именно:

1) Картофель сажают осенью, и на зиму прикрывают соломой, листом или навозом; весною покрывку эту снимают.

2) Въ Февралѣ сажают картофелины въ горшки, а именно сорта *англійскаго*, *парниковаго* или *шестинедельнаго* и ставят ихъ въ тепло, чтобы дали ростки. Въ Мартѣ обыкновенный парникъ насыпается песчанодерновою землею, съ примѣсью части толченаго угля, въ эту смѣсь картофель изъ горшковъ пересаживается стуломъ; затѣмъ картофель умѣреннo поливается и постоянно хорошо провѣтривается — овощъ поспѣетъ въ началу Апрѣля.

3) Въ концѣ Февраля, картофель сажается въ горшки, по нѣскольку штукъ; горшки ставятся въ теплый парникъ, тамъ картофелины проростають, ихъ исподволь приучають къ свѣжему воздуху; въ началѣ Апрѣля ихъ высаживаютъ на солнцепекъ у стѣны, чтобы отъ холода ихъ можно было прикрыть приставленными рамами. Въ половинѣ Мая картофель будетъ готовъ.

4) Приготовляются покатыя гряды на солнцепекѣ. На южной ихъ сторонѣ садится картофель (на сѣверной салатъ, впоследствии цвѣтная капуста). Въ Февралѣ картофель кладутъ на печь, чтобы возбудить въ немъ ростъ и вмѣстѣ, чтобы онъ завялъ. Картофель, поздно дающій ростки и не вянущій, не годится для ранней выгонки. Въ концѣ Февраля, картофель съ ростками, сажаютъ въ горшки или ящики и лишь появляются надъ землею порядочные побѣги, пересаживають ихъ на теплую сторону гряды, такъ, чтобы ростки только выглядывали изъ земли; затѣмъ обкладываютъ ихъ навозомъ, въ предохраненіе отъ морозовъ, гряду закрываютъ соломой или соломенными щитами. Картофель поспѣетъ въ концѣ Мая.

5) Въ концѣ Февраля отбирають здоровыя картофелины, ранняго сорта и зарываютъ въ слой сыраго песка въ тепломъ помѣщеніи. Въ Мартѣ картофелины съ побѣгами пересаживають въ грунтъ и обкладываютъ соломистымъ навозомъ. Если случится, что верхушки побѣговъ замерзнутъ, то явятся новые побѣги.

Лучшіе сорта картофеля обыкновенно по цвѣту картофелинъ раздѣляются на: *фіолетовый*, *розовый* и *желтый*, *ранний* и *поздний*;

а) Ранніе сорта: *Анлійскій*; желтый шестинедельный; фиолетовый шестинедельный; *Анлійскій почковидный*; *Мраморный*; розовый почковидный; *Preiss von Holland*. Бискупитный. Фариноза. Розовый мукообразный;

б) Поздніе сорта: сахарный или голландскій; *Миндальный*. Жаворонковый. Фиолетовый—*Фильдерскій*; *Ливерпульскій*.

Solanum ciliatum. Съ бѣлыми цвѣтами фруеть величиною съ померанецъ—мондаринъ.

1611. *Soldanella alpina*. Семейство *Primulaceae*. Многолѣтнее оранжерейное растеніе съ сине-фиолетовыми цвѣтами, содержится постоянно въ горшкѣ.

Другіе виды: *C. elusii*. *S. minima*.

Цвѣты этихъ растений, въ Швейцаріи появляются немедленно по стаяніи снѣга, а иногда даже выходятъ изъ-подъ снѣга. Въ саду любятъ дерновую землю, въ смѣси съ глинистою или торфяною. Предпочитають тѣнистое, защищенное съ сѣвера мѣсто. Съ наступленіемъ морозовъ растеніе, покрывается мохомъ, а предназначенное для роста въ горшкахъ, осенью переносятся въ парникъ, закрываемый ставнями, зимою же наваливаютъ на стекла листву. Также могутъ зимою содержаться съ оранжереѣ. Размножается дѣленіемъ корней послѣ того какъ отцвѣтеть.

1612. *Solidago*. *Золотуха*. *Золотарникъ*. Изъ семейства *Synanthereae*. Многолѣтнее садовое растеніе.

Виды: *S. argirostygia*.

S. virgaurea. З. обыкновенный. Дивораствующее, многолѣтнее медоносное растеніе, съ желтыми цвѣтами. Цвѣтеть среди лѣта.

S. altissima. З. высокій.

S. bicolor. З. двуцвѣтный.

S. canadensis. З. канадскій.

S. flexicaulis. З. горный.

S. hyrta. З. шерстяной.

S. laevigata. З. гладколистный.

S. mexicana. З. мексиканскій.

S. rigida. Г. упругій.

1613. *Sollya heterophylla*. Оранжерейное растеніе съ голубыми цвѣтами, можетъ расти въ комнатѣ; размножается черенками;

требуетъ вересковую землю съ примѣсъ такой же части дерновой пополамъ съ листовною; зимою поливается умѣренно.

1614. *Sonchus oleraceus*. *Осотъ*. Изъ семейства *Synanthereae*. Дикорастущее, однолѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтеть съ Іюня по Сентябрь.

Другіе виды: *S. uliginosus*. *Молочай*. Дикорастущее.

S. jacquini (*fruticosus*) Оранжевое растеніе.

S. tingitanus. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

1615. *Sonerila margaritacea*. Изъ семейства *Melastomaceae*. Маленькое тепличное густое растеніе, съ листьями испещренными круглыми бѣлыми крапинами и розовыми съ желтымъ цвѣтами; требуетъ легкой дерновой, но очень питательной земли, съ примѣсъ хорошо перепрѣвшаго перегноя. Лѣтомъ часто опрыскивается и хорошо притѣняется.

1616. *Sophora alopecuroides*. *Брунелъ*. Изъ семейства *Papilionaceae*. Травянистое дикорастущее растеніе. Другіе виды: *S. japonica*. Дерево, похожее на ясень, съ пестрыми, блестящими листьями. Весьма нѣжное, содержится преимущественно въ оранжереѣ, но можетъ расти и на воздухѣ, при надежной покрывкѣ на зиму.

S. littoralis. Тоже.

1617. *Sophronitis*. Орхидея. Съ красными цвѣтами; размножается дѣленіемъ корней; сажается на кусокъ угля, требуетъ листовную землю, съ примѣсъ половины вересковой.

Виды: *S. grandiflora*. *S. cernua*.

1618. *Sorbus*. *Рябина*. Изъ семейства *Romaceae*. Дикорастущее дерево, разводится въ садахъ и паркахъ даетъ ягоды употребляемыя въ пищу, въ различныхъ видахъ. Любитъ хорошую, питательную почву. Размножается прививкою и посѣвомъ тотчасъ послѣ того какъ сѣмена созрѣютъ.

Виды: *S. americana*.

S. aucuparia. *Р. простая*. *Р. тѣсная*. Съ красными шаровидными плодами. *Р. свѣрная*.

S. aucup. fru. luteo. Съ свѣтло-желтыми ягодами.

S. au. pendula.

S. au. pendula fol. variegat. Пестролистная.

S. canadensis. S. heterophylla. S. intermedia. S. hybrida. P. плакучая. S. lanuginosa. S. l. quercifolia. S. monstrosa. S. pinnatifida. S. sambucifolia.

S. vestia. P. Непальская.

S. domesticus. P. домашняя. P. садовая.

1619. *Sorghum nankinense*. Однолѣтная букетная трава, разводится какъ дикорастущее растеніе.

Другіе виды: *S tartaricum*. Тоже.

S. saccharatum. Sorго сахарное. Бываетъ черное, съ черными сѣменами и бѣлое съ бѣлыми сѣменами, дающее раскидистую кисть. Стебли растенія заключаютъ въ себѣ много сахара. Изъ стебля гонять спиртъ; сѣмена употребляются въ пищу людьми и животными. Боятся весеннихъ утренниковъ; любить самую легкую землю съ перепрѣвшимъ навозомъ; высѣвается прямо въ грунтъ, но не ранѣе Мая; въ незначительномъ количествѣ, удобно размножается посѣвомъ въ маленькіе горшки по одному зерну и потомъ высадкою растеній въ грунтъ въ Маѣ. Бываетъ на хорошей землѣ выше трехъ аршинъ, а чтобы получило надлежащій ростъ и во время созрѣло, надлежитъ взрыхлять около него землю, не оставляя безъ поливки и обрѣзать боковые побѣги, оставляя одинъ стволъ. Легкіе морозы не мѣшаютъ дозрѣванію сѣменъ сорго, если таковыя уже налились.

1620. *Sphaenandra viscosa*. Низенькое, однолѣтнее растеніе, съ бѣлыми цвѣтами; высѣвается прямо въ грунтъ.

1621. *Spaenogyne anthemoides*. Низенькое однолѣтне растеніе, съ желтоватыми цвѣтами, высѣвается прямо въ грунтъ.

Другой видъ: *S. speciosa*. Цвѣты оранжевые съ бурымъ. Сѣется въ парникъ и потомъ разсаживается.

1622. *Sparaxis*. Оранжевое растеніе, изъ семейства *Iridiæ*.

Виды: *S. pulcherrima*. Съ лиловыми цвѣтами, на весьма нѣжныхъ стебелькахъ.

1623. *Sparganium ramosum*. *Ежеголовникъ*. Изъ семейства *Thyphaceæ*. Дико растетъ у береговъ стоячихъ водъ.

1624. *Sparmania africana*. *Африканская спарманья*. Оранжевый кустарникъ, съ мохнатыми листьями и букетами бѣ-

лыхъ цвѣтовъ, въ срединѣ оранжевыхъ къ коричневымъ. Любить питательную землю. Цвѣтетъ почти каждый годъ зимою. По временамъ ему хорошо давать жидкое удобрение. Размножается черенками.

1625. *Spartium*. Оранжевое растение.

Виды: *S. linifolium*.

S. junceum. Бобровникъ. Кустарникъ, разводимый въ садахъ и огородахъ.

S. scoparium. Кустарникъ съ желтыми цвѣтами, способный для ранней выгонки, въ оранжевѣ. Съ этою цѣлю его или выращиваютъ, въ горшкѣ, или пересаживаютъ, въ грунтовомъ сараѣ, такъ часто, что его корень образуетъ крѣпкій комокъ. Приставляютъ для выгонки въ Февралѣ и при этомъ обрѣзываютъ его вѣтви.

S. multiflorum. Съ бѣлыми цвѣтами. Распускается въ Февралѣ, любитъ питательную землю.

1626. *Spathiphyllum cannifolium*. Прекрасное, декоративное, тепличное и комнатное растение, изъ семейства Арониковыхъ, неимѣющее стебля. Землю требуетъ, составленную изъ трехъ частей рыхлой и нѣжной торфяной или вересковой и одной части глинисто-дерновой, съ примѣсю малаго количества рубленнаго мху. Въ комнатѣ растение, посаженное въ просторный горшокъ, ставится на поддонъ и тщательно поливается, чтобы комъ никогда не просыхалъ. (По Регелю. Вѣстникъ И. О. Садоводства 1870 г. № 3).

1627. *Spathodia*. Тепличное растение, съ бѣлыми, желтыми или оранжевыми цвѣтами, изъ семейства *Bignoniaceae*. Размножается сѣменами, отводками и черенками. Требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей вересковой, дерновой и лиственной. Можетъ расти въ комнатѣ.

Виды: *S. speciosa*. Бѣлые цвѣты съ малиновыми крапинками.

S. campamelato. Большіе пунцовые цвѣты съ желтою каймою.

S. corymbosa. *S. gigantea*.

1628. *Spherogyne imperialis*. Тепличный кустарникъ. Стебли покрыты желто-краснымъ пушкомъ.

1629. *Sphenandra viscosa*. Однолѣтнее грунтовое растеніе, вышиною въ футъ, съ розовыми цвѣтами; сѣется въ парникъ и потомъ разсаживается въ вересковую землю, смѣшанную съ глинисто-луговой.
1630. *Sphoeralea miniata*. Изъ семейства *Malvaceae*. *Однолѣтнее, грунтовое растеніе, съ цвѣтами сурикovaго цвѣта.
Другой видъ: *S. nutans*. Малиновые цвѣты. Оранжевое растеніе. Требуется одной культуры съ Абутильономъ.
1631. *Spigelia splendens*. Изъ семейства *Loganiaceae*. Красивое тепличное растеніе, съ шарлахово-красными или розовыми цвѣтами, внутри бѣлыми, распускается въ Апрѣлѣ. Любитъ землю рыхлую, глинистую, размножается сѣменами и дѣленіемъ.
Другой видъ. *S. marilandica*. Имѣетъ лекарственныя свойства. Цвѣты ярко-пунцовые съ желтымъ, вѣнчикомъ зеленымъ по краямъ.
1632. *Spilanthus oleracea*. *Парскій Кресъ*. Однолѣтнее садовое растеніе вышиною въ футъ, съ красно-бурыми цвѣтами, сѣется въ парникъ, потомъ высаживается въ грунтъ въ плодородную землю. Имѣетъ свойство утѣлять зубную боль, если цвѣткомъ тереть десна, или натирать спиртомъ, настоеннымъ на этихъ цвѣтахъ. Также употребляется въ пищу въ качествѣ салата.
1633. *Spinacea oleracea*. Изъ семейства *Chenopodiaceae*. *Шпинатъ*. Огородное растеніе, употребляемое въ пищу. Бываетъ двухъ главныхъ видовъ: *длиннолистный*, *остролистный* (съ колючими сѣменами) и *широколистный*, *круглолистный* или *голландскій* (съ гладкими сѣменами). Высѣвается прямо на гряды и для ранняго употребленія выводится въ парникъ. Чтобы имѣть постоянно свѣжій шпинатъ, высѣваютъ его нѣсколько разъ въ лѣто. Въ грунтѣ онъ требуетъ сильной питательной земли, сѣется въ разбросъ, такъ, чтобы возшелъ въ верхушкѣ другъ отъ друга. Никакого особаго ухода не требуетъ, кромѣ только полива во время засухи, (самое лучшее—навозною жижею); сѣютъ его преимущественно сухимъ, но для ускоренія всхода можно сѣять моченымъ, впродолженіи трехъ сутокъ. Съ каждаго куста въ лѣто можно срѣзать для употребленія листья три раза. Для полученія шпи-

ната зимою и раннею весною, его сѣютъ въ Августѣ, а для употребленія въ Маѣ сѣютъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ. Для ранняго употребленія разводится въ парникѣ, также какъ салатъ.

Крулолистный шпинатъ вообще урожайнѣе и общепотребительнѣе, а *остролистный* прочнѣе и можетъ зимовать на грядѣ.

Растеніе, оставляемое на сѣмена не обрѣзывается, при томъ они должны стоять просторно. Послѣ опыленія мужскія растенія выдергиваются; сѣмена ихъ собираются когда пожелтѣютъ.

1634. Spiraea. Тавола. Спирея. Семейство Rosaceae. Кустарникъ разводимый въ садахъ и паркахъ; размножается травянистыми черенками.

Виды: *S. argentea*. *S. alpina*. *T. алтѣйская*. Дикорастущій въ Сибири красивый кустарникъ съ бѣлыми цвѣтами.

S. cana. *S. canadensis*.

S. chamaedrifolia. *Товольникъ*.

S. crenata. *S. crataegifolia*. *T. Боярышниковлистная*.

S. expansa. *S. Douglasi*. Съ пурпуровыми цвѣтами.

S. grandiflora. Съ большими бѣлыми цвѣтами.

S. hypericifolia. *T. Каменная*.

S. lancifolia. *S. laevigata*. *Шомполникъ*.

S. Media. *T. Средняя*.

S. Nikonditieri. *S. opulifolia*. *T. Калинолистная*.

S. repanda. *S. Kamtschatika*. *Шламда*.

S. acutifolia. *Лобазникъ остролистный*.

S. salicifolia rosea. *T. верболистная*. Дикорастущій въ Сибири кустарникъ, достигающій 5 футъ, съ розовыми цвѣтами.

S. sibirica. *S. sobrifolia*. *T. рябинолистная*. *Пустой Таволжникъ*. Дикорастущій, медоносный кустарникъ; цвѣтетъ съ Апрѣля по Іюль.

S. thaleitroides. *S. tomentosa*. *T. Пушистая*.

S. triloba. *T. Трехдольная*. Дикорастущій, не высокій кустарникъ съ бѣлыми цвѣтами.

S. Ulmifolia. *S. Ulmaria*. *fol. variegatis*. Съ желтовато-узорчатыми листьями и бѣлыми цвѣтами, красивое многолѣтнее растеніе.

S. lobata flore albo. *S. l. f. rosea*. *S. Sieboldii*.

S. fortunei. Съ пунцовыми цвѣтами.

S. Ulmaria. *Болотная бузина.* Многолѣтнее, медоносное растение, съ душистыми цвѣтами, раскрытыми съ Іюня по Сентябрь.

S. Ulmaria plena. *Махровая бѣлогловка.*

S. u. floribus pictis.

S. aruneae. *Козья борода.* Донникъ колосистый.

S. Digitata. *Донникъ Сибирскій.*

S. filipendula plena. *Дон. медоносный,* съ махровыми цвѣтами.

S. f. nana plena.

Слѣдующіе виды требуютъ на зиму надежной покрывки.

S. amoena. **S. ariaefolia.** **S. Billardieri.**

S. brachystachya.

S. callosa. Съ пурпуровыми цвѣтами.

S. callosa alba. **S. eximia.**

S. Reveesi plena; съ бѣлыми махровыми цвѣтами.

Оранжевые виды: **S. barbata.**

S. lindleyana. Съ мелкими бѣлыми съ желтымъ цвѣтами; размножается отдѣленіемъ отпрысковъ раннею весною, лишь начнетъ расти.

S. prunifolia fl. pleno. Съ бѣлыми цвѣтами; будучи со-держимо въ оранжереѣ, приставляется въ тепло въ Декабрь и зацвѣтаетъ въ Январѣ.

S. Thunbergi. Тоже.

1635. Srophularia nodosa. *Норичникъ шишковатый.* Дивора-стущее, многолѣтнее, медоносное растение. Цвѣтетъ почти все лѣто.

1636. Stachys. *Живучка.* Изъ семейства **Labiatae.** Дивора-стущее.

Виды: **S. germanica.** Многолѣтнее, зимующее въ грунту растение, разводится въ цвѣтникахъ за его красивые, пестрые листья. Имѣетъ красно-фіолетовые цвѣты.

S. lanata. *Живучка.*

S. palustris. *Черноязыбенникъ.*

S. recta. *Чистецъ прямой.* Медоносное растение, цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ.

S. Sylvatica. *Льсная буквица.*

S. coccinea. Многолѣтнее растение, съ красными цвѣтами. Зимуетъ на открытомъ воздухѣ.

1637. Stachytarpetta aristata. Содержится въ умѣренной теплицѣ, съ колосомъ темно-пурпуровыхъ цвѣтовъ. Любитъ много свѣту и воздуху. Требуется сильной поливки во время роста и значительнаго уменьшенія или совершеннаго прекращенія ея во время отдыха. Растенію этому дается тучная и легкая земля; размножается оно черенками, которые держатъ подъ стекляннымъ колпакомъ.

1638. Stadmannia. Новоголландское дерево. Содержится въ теплицѣ.

Другой видъ: *S. australis*. Тепличное деревцо, съ листьями, покрытыми желтыми волосками. Цвѣты бѣлые. Можетъ расти въ комнатѣ. Требуется дерновую землю пополамъ съ листовенной.

1639. Stanhopea. Тепличная Орхидея, цвѣтетъ и въ комнатѣ. Имѣетъ очень красивый, душистый, большой цвѣтокъ, висящій длинною кистью, — бѣлый, желтоватый, желтый съ красными и темными крапинками и полосами. Уходъ за этимъ растеніемъ тотъ же, что и за прочими эпифитными Орхидеями. Его сажаютъ на кусокъ угля, въ корзину съ большими отверстиями или на деревянный обрубокъ, потому что его цвѣточныя вѣтви выходятъ изъ боковъ и затрудняютъ посадку растенія въ горшокъ. Размножается дѣленіемъ корней.

Виды: *S. ecorruta*. Большіе бѣлые цвѣты, съ желтовато-испещренною, нижнею губою.

S. graveolens. Большіе, нѣжно-фіолетовые цвѣты.

S. tigrina grandiflora. *S. t. oculata*.

S. t. superba. Превосходный, весьма большой цвѣтокъ, испещренный коричневымъ съ желтымъ.

S. Martiana. *S. oculata*. *S. insignis*.

S. Devonensis. Цвѣтокъ желтый, съ темно-пунцовымъ, впадающимъ въ коричневый.

S. Bucephalus. *S. aurea*. *S. pallida*. *S. varietas*. *S. punctata elegans*. *S. Rückeri*.

1640. Stangeria Schizadon. Изъ семейства *Cicadeae*. Оранжевое, кустарное растеніе, съ рѣпообразнымъ стволемъ.

1641. Stapelia. Изъ семейства *Asclepiadeae*. Тепличное растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ. Листьевъ не имѣетъ, вѣтви его покрыты мяговатыми колючками. Весьма краси-

вые цвѣты, въ видѣ зеленоватой звѣзды, съ темно-лиловыми крапинками, имѣютъ отвратительный запахъ падали. Размножается черенками и отрезками; требуетъ вересковую землю, съ примѣсью четверти дерновой и четверти лиственной. Зимой содержится очень сухо.

Виды: *S. cactiformis*. Столпообразный стебель, похожій на таковой же Кактуса Мамиллярія, даетъ, на вершинѣ своей, мѣсто звѣздообразному цвѣтку — желтому, испещренному красными крапинками и полосками. Зимой почти вовсе не поливается.

S. orbicularis. Пестрый цвѣтокъ, желтоватый, съ коричневыми узорами.

S. conspurcata. Можетъ расти въ оранжереѣ.

S. grandiflora. *S. reflexa*. *S. multiflora*. *S. asterias*. *S. humata*. *S. pulchra*. *S. mamillaris*. *S. variegata*.

1642. *Staphylea*. *Фисташка*. *Клеючка*. Кустарникъ, разводимый въ садахъ.

Виды: *S. pinnata*. *Клопещ*. *Лисная фисташка*. *Клеючка перистая*. Разводится въ садахъ на всякой почвѣ. Размножается сѣменами, черенками, отводками и отпрысками.

S. trifoliata. *К. трилистная*. Американскій кустарникъ.

1643. *Stratice tartarica*. *Желтый корень*. Грунтовое растеніе; на почву не прихотливо. Цвѣтетъ въ Іюнѣ красноватыми цвѣтами.

Другіе виды: *S. armeria*. Многолѣтнее, бордюрное растеніе, съ свѣтло-красными цвѣтами. Зимуетъ на открытомъ воздухѣ. Цвѣтетъ все лѣто.

S. fortunei. Съ желтыми цвѣтами. На зиму вносится въ оранжерею. Размножается сѣменами и дѣленіемъ корней осенью или раннею весною.

Дикорастущіе виды: *S. latifolia*. *Дубилный корень*.

S. Gmelini. *Красный катранъ*.

S. tomentella. *Солоней*.

S. speciosa. *Каменный чай*.

S. spicata. Однолѣтнее, обильно цвѣтущее растеніе, съ Кавказа. Даетъ сухой цвѣтокъ, имѣющій сине-лиловую чашечку и розовый вѣнчикъ.

Слѣдующіе оранжерейные виды, на свѣтломъ мѣстѣ оранжерей цвѣтутъ въ началѣ зимы и вторично въ Февралѣ; любятъ легкую землю и хорошій слой черепковъ на дно горшка для стока воды. Размножаются сѣменами.

S. frutescens. Цвѣты голубые.

S. imbricata. Большой букетъ голубыхъ цвѣтовъ, расположенныхъ зонтикомъ. Содержится въ сухомъ мѣстѣ оранжерей, свѣтломъ и доступномъ воздуху. Лѣтомъ затѣняется отъ солнца. Требуется тучную землю и хорошій водостокъ. Размножается сѣменами и дѣленіемъ корневища.

S. macrophylla. S. Humboldti. S. arborea. S. foliosa. S. eximia. S. Halfordi. S. macroptera. S. brassicaefolia.

1644. *Stellaria media.* Мокрица. Сорная трава, много причиняющая хлопотъ своимъ быстрымъ распространениемъ въ сыроватыхъ мѣстахъ цвѣтниковъ.

1645. *Stemona tuberosa.* Ползучее, тетличное растеніе. Большіе цвѣты бѣлые съ зеленымъ и фіолетовымъ. Къ концу осени, каждый годъ теряетъ стебель, послѣ того его оставляютъ безъ полива и въ концѣ Февраля его пересаживаютъ въ вересковую землю съ примѣсью песку и начинаютъ понемногу поливать. Все время роста держать въ температурѣ 20° Р., часто поливаютъ, опрыскиваютъ и притѣняютъ отъ сильнаго солнца. Размножается отдѣленіемъ молодыхъ бородавочекъ, тогда, когда стебли растенія начнутъ развиваться. Молодые растеньица держать подъ стебляннымъ колпакомъ.

1646. *Stenactis speciosa.* Стенаксисъ прекрасный. Многолѣтнее, садовое, грунтовое растеніе, содержится въ оранжереѣ.

1647. *Stenia fimbriata.* Тепличный Эпифитъ, не производящій луковицъ. Цвѣты блѣдно-желтые.

1648. *Stenocarpus cunninghamii.* Красивое австралійское дерево, съ прекрасными, необыкновенной формы, пунцовыми съ желтымъ цвѣтами. Можетъ расти въ комнатѣ. Размножается сѣменами и черенками. Зимой требуетъ весьма умѣренной поливки, но частаго опрыскиванія, особенно весною и лѣтомъ. Любитъ вересковую землю пополамъ съ листовенною и съ небольшою примѣсью дерновой. Содержится въ оранжереѣ.

1649. *Stenogastra concinna* и *S. multiflora*. Изъ семейства *Cyrtendraceae*. Маленькое бразильское растеніе, съ фіолетовыми и бѣло-фіолетовыми цвѣтами. Листья сверху темно-зеленые, снизу фіолетовые. Содержится въ теплицѣ. Цвѣтеть всю зиму. Размножается сѣменами. Требуется земля листовенную съ пескомъ.

1650. *Stenoglottis fimbriata*. Оранжевой, земная Орхидея, съ мелкими розовыми цвѣтами.

1651. *Stenomesson pearcei*. Изъ семейства *Amarillideae*. Оранжевой, луковичное растеніе. Цвѣты блѣдно-желтые, съ зелеными полосами.

1652. *Stephanophysum baiciei*. Изъ семейства *Acanthaceae*. Тепличное растеніе съ пунцовыми цвѣтами. Тотъ же уходъ, что и *Tiphocampylus*.

1653. *Stephanotis*. Тепличное и вмѣстѣ комнатное, вьющееся кустовое растеніе, съ большими бѣлыми, душистыми цвѣтами, имѣющими запахъ Туберозъ. Воспитывается въ парникѣ, поставленное въ корѣ. Землю требуетъ легкую, дерновую пополамъ съ листовымъ перегноемъ. Лѣтомъ нуждается въ отѣненіи и влагѣ. Зимой поливается мало. Размножается черенками и отводками. Цвѣтеть до глубокой зимы.

Виды: *S. floribunda*. *Стефанотисъ цвѣтистый*.

S. Thouarsii. Съ желтовато-бѣлыми цвѣтами и листьями, испещренными красными жилками.

1654. *Sterculia*. Тропическое деревцо съ желтыми цвѣтами. Можетъ расти въ комнатѣ; зимою теряетъ листъ и тогда почти не поливается. Размножается сѣменами и черенками; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей листовенной, вересковой и дерновой.

Виды: *S. foetida*. Изъ семянъ добывается масло, употребляемое въ пищу.

S. Balanghas. *S. grandiflora*. *S. villosa*.

Оранжевые виды: *S. platanifolia*.

S. nobilis. Съ метелками бѣлыхъ цвѣтовъ.

1655. *Steriphoma paradoxum*. Тепличный кустарникъ изъ семейства *Capparideae*, съ большимъ букетомъ оранжево-желтыхъ цвѣтовъ съ весьма длинными тычинками и пестиками. Отдыхаетъ зимою, а потому не поливается. Размножается черенками.

1656. *Steudnera colocasiaefolia*. Изъ семейства Ароидовъ. Тепличное, многолѣтнее растеніе, на короткомъ, испещренномъ красными и коричневыми пятнами стеблѣ, съ красивымъ и весьма оригинальнымъ овальнымъ цвѣткомъ.

1657. *Stevia violaceae*. *Стевія фіолетовая*. Многолѣтнее, грунтовое, садовое растеніе.

Другіе виды: *S. alba*. Цвѣтетъ до поздней осени. Размножается сѣменами и дѣленіемъ корней.

S. purpurea. Цвѣты красные.

S. rosea. Цвѣты розовые.

S. Lindleyana. Цвѣты бѣлые.

S. serrata. *С. зубчатая*. Оранжевое растеніе съ бѣлыми цвѣтами, также какъ и *S. dentata*.

1658. *Stillingia sobifera*. Тропическое растеніе. Изъ сѣменъ его добывается масло.

1659. *Stixtia*. Очень красивое, американское деревцо, съ оранжевыми цвѣтами, можетъ расти въ комнатѣ. Зимою нуждается въ самой умѣренной поливѣ. Разводится черенками и отводками.

Виды: *S. chrysantha*. *S. insignis*.

1660. *Strelitzia*. Изъ семейства *Musaceae*. Тепличное и вмѣстѣ комнатное травянистое растеніе, съ большими и широкими листьями. Цвѣтокъ распускается на верхушкѣ длиннаго, колчатаго стебля и имѣетъ весьма своеобразный видъ. Изъ оконечности стебля поднимаются два оранжевые или бѣлые лепестка, величиною и рисункомъ, вполне напоминающіе заячьи уши, а отъ ихъ основанія выдается впередъ совершенное подобіе наконечника стрѣлы голубо-лиловатаго цвѣта, раздвояющееся въ видѣ змѣинаго жала. Вообще цвѣтокъ имѣетъ видъ птички, готовой вспорхнуть и уже поднявшей крылья.

Размножается сѣменами, преимущественно отростками и дѣ-

леніемъ корня. Землю любить плотную, особенно торфяную, съ примѣсью шестой части дерновой и шестой части лиственной. Требуется постоянной влажности. Цвѣтетъ въ теплицѣ зимою.

Виды: *S. augusta*. Оконечность стебля, изъ котораго поднимаются части цвѣтка, свѣтло-пурпуровыя, изъ ней постоянно вытекаетъ, падая каплями, прозрачный сокъ; — лепестки изъ этого влагалища поднимаются бѣлые.

S. Nicolai. Древоидное. Растетъ въ тропической Африкѣ. Стрѣлка цвѣтка голубая. Прочія части цвѣтка сѣрыя. Требуется дерновую землю въ смѣси съ торфяною. Размножается отростками.

S. Regina. Цвѣтетъ обильнѣе другихъ видовъ, особенно, если простояло лѣто на воздухѣ, на припежѣ. Такъ названо въ честь англійской королевы, какъ красивѣйшій видъ.

S. juncea. Отличается едва замѣтными листьями на толстыхъ стебляхъ.

S. farinosa. *S. humilis*. *S. ovata*.

1661. *Streptocarpus rexii*. Оранжевое растеніе. Изъ семейства *Cyrtandraceae*.

Другіе виды: *S. hardeni*. Съ лиловатыми цвѣтами.

S. polyanthus. Съ большими листьями и голубовато-лиловымъ цвѣткомъ. Содержится въ теплицѣ, лѣтомъ — во влажной атмосферѣ, зимою — нѣсколько въ болѣе сухомъ воздухѣ. Размножается сѣменами.

S. saundersi. Содержится въ умѣренной теплицѣ, съ многочисленными бѣлыми цвѣтами.

1662. *Strychnos nux vomica*. Изъ семейства *Аросуеае*. Тропическое растеніе. Сѣмена его даютъ сильный ядъ, а изъ коры добывается стрихнинъ. Растеніе, употребляемое въ медицинѣ.

Другой видъ: *S. colubrina*. Содержитъ страшный ядъ, называемый *Унасъ*, которымъ туземцы отравляютъ наконечники своихъ стрѣлъ и копій.

1663. *Strobilanthes lactata*. Тепличное растеніе. Красивые листья съ голубоватою полоскою по срединѣ и бѣлые, голубые по краямъ цвѣты. Культура этого растенія та же, что и *Ruellia purdienna*,

- 1664. Sromantha sanguinea.** Изъ семейства *Cannaceae*. Держать въ Орхидейной теплицѣ, такъ какъ любитъ теплый и влажный воздухъ. Цвѣты и изнанка длиннаго листа пунцовые. Размножается дѣленіемъ корневища.
- 1665. Stylidium hookeri.** Изъ семейства *Stylideae*. Оранжевое растеніе съ желтыми цвѣтами. Требуется легкую землю. Лѣтомъ высаживается въ грунтъ, чтобы не поливать всякій день. Зимой надо остерегаться чтобы не сгноить корней. Размножается черенками.
Другіе виды: *S. aduatum*. *S. recurvum*. Съ малиновыми цвѣтами.
- 1666. Styrax officinalis.** *Стираковое дерево*. Небольшое деревце, дикорастущее въ тепломъ климатѣ и разводимое въ садахъ южной Европы. Любитъ легкую почву. Размножается сѣменами и черенками. Цвѣты бѣлые, душистые. Ягода съ двумя косточками, покрыта бѣлою, пушистою кожицею. Смола его употребляется въ медицинѣ, извѣстная подъ именемъ: *Стираксы*.
- 1667. Swainsonia coronillaefolia.** Оранжевое растеніе, съ бѣлыми цвѣтами, распускающимися при ясной погодѣ въ Февралѣ.
- 1668. Swietenia Mahagony.** Изъ семейства *Cedreleae*. Растетъ въ жаркихъ странахъ. Древесина идетъ на столярныя подѣлки подъ именемъ *краснаго дерева*.
- 1669. Syagrus.** Родъ Пальмъ. Съ гладкимъ, колчатымъ стволомъ.
Виды: *S. amara*. *S. botryophora*. *S. plumosa*. *S. campestris*. *S. Mikianiana*. *S. reflexa*.
- 1670. Sycios angulata.** *Волосатый огурецъ*. Однолѣтнее, вьющееся растеніе, всползающее на высоту до 12 футъ. Съ небольшими, желтыми цвѣтами и маленькими, яйцообразными плодами. Высѣвается въ Мартѣ и въ Апрѣлѣ въ горшки.
- 1671. Symea gileesioides.** Изъ семейства *Liliaceae*. Оранжевое, клубневое, многолѣтнее растеніе, съ мелкими, зеленоватыми цвѣтами.

1672. *Symphoria racemosa*. *Снѣжное дерево.* Кустарникъ, разводимый въ садахъ, съ бѣлыми, какъ бы жемчужными ягодами.

Другой видъ: *S. glomerata*. *Снѣжно-фруктъ.*

1673. *Symphoricarpus racemosus*. Кустарникъ. Цвѣты тѣлеснаго цвѣта и бѣлые, какъ снѣгъ, ягоды. Выносить на воздухъ сильную, но только снѣжную зиму.

1674. *Symphyandra pendula*. Оранжевое растеніе.

1675. *Symphytum officinale*. Изъ семейства *Boragineae*. *Живокистъ. Сильный корень.* Многолѣтнее садовое растеніе, употребляется въ лекарства.

Другіе виды: *S. officinale fol. variegatis*. Красноватые цвѣты и желто-узорчатые листья.

S. asperinum. *Окопникъ.*

S. coccineum. *S. orientale*.

S. officinale flore luteo marginalis. Ярко-зеленый листъ съ бѣлою каймою.

1676. *Symplocos coccinea*. Деревце съ прекрасными листьями и розовымъ, душистымъ цвѣткомъ, содержится въ умѣренной теплицѣ. Размножается черенками, которые надо тщательно предохранять отъ сырости.

1677. *Synapis arvensis*. *Горчица полевая.* Дикорастущее, сорное, двухлѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтеть съ Іюня до конца Августа.

1678. *Synechanthus*. Одинъ изъ видовъ Пальмъ. Съ прямымъ, гладкимъ, коленчатымъ, тростевиднымъ стеблемъ. Маленькаго росту. Родъ этотъ немногочисленъ. Размножается сѣменами. Болѣе замѣчательные виды: *S. fibrolus*. *S. serapiguensis*. Изъ тропической Америки.

1679. *Syngonium album lineatum*. Цѣльное тепличное растеніе.

1680. *Syringa*. *Сирень.* Изъ семейства *Oleinceae*. Кустарникъ разводимый въ садахъ и паркахъ, съ бѣлыми, лиловыми или розовыми цвѣтами. Размножается ворневыми отпрысками, отводками и прививкою,

Виды: *S. chinensis*. *C. китайская*. Сильно растущій кустарникъ, вышиною до 8 футь, съ очень душистыми, лиловыми цвѣтами.

S. c. flore rubro. Съ карминово-красными цвѣтами.

S. c. flore albedo. Съ бѣловатыми цвѣтами.

S. persica. *C. персидская*. Кустарникъ вышиною до 4-хъ футь.

S. p. integrifolia. Душистые, свѣтло-фіолетовые цвѣты.

S. p. alba. Цвѣты бѣлые.

S. p. laciniata. Свѣтло-фіолетовые цвѣты.

S. hybrida Amb. Verschaffelt.

S. h. azurea plena.

S. h. charlemagne.

S. h. croix de Brahy.

S. h. Eckenholm.

S. h. Karzubiana.

S. h. prince Rohan.

S. h. vulgaris violacea. *C. обыкновенная, лиловая*. Пчелы берутъ обильный взяткоъ съ его цвѣтовъ, — лилово-фіолетовыхъ.

S. v. alba. (virginalis). *C. бѣлая*.

S. v. bicolor.

S. v. rubro. *C. красная*. Цвѣты фіолетово-пурпуровые, въ большихъ метелкахъ.

S. v. coerulea. Цвѣты первоначально красные, потомъ синеватые.

S. v. amoena. Темно-синеватые цвѣты.

S. v. carlsruhensis. Похожа на предыдущую.

S. v. Iosti. Большіе блѣдно-красные цвѣты.

S. v. versaliensis. Фіолетово-красные цвѣты.

S. v. calmariensis.

S. v. Duchesse de Nemours.

S. v. D-sse. d' Orleans.

S. v. grandiflora. *S. v. media*.

S. v. macrothyrsus. *S. v. psse. Marie*.

S. v. prince Notger. Свѣтло-лиловые цвѣты.

S. v. rubra de Marly. Красные цвѣты.

S. v. rubra plena. *S. v. sibirica*.

S. v. rubra insignis. Бѣлые цвѣты.

S. v. Valentiniana. I. v. amurensis.

S. v. hortensis. Наружная часть крупнаго цвѣтка—лиловая, а внутренняя фіолетовая.

S. Iosikaea. Кустарникъ вышиною до 12 фута съ прямымъ ростомъ. Душистые, красновато-лиловые цвѣты появляются въ концѣ Іюня; выдерживаетъ самыя суровыя зимы въ грунту. Размножается собственно сѣменами.

S. Emodi. Похожъ на предыдущій видъ. Съ Гималая. Зимы нашей въ грунту не переносятъ.

Для ранней выгонки употребляется персидская сирень съ ея разновидностями, а преимущественно подвергаютъ ранней выгонки обыкновенную сирень съ ея видоизмѣненіями. Выгонку небольшихъ экземпляровъ, выращенныхъ въ кадкахъ, или съ весны высаженныхъ изъ грунта въ горшки, начинаютъ около Новаго года. Тотчасъ послѣ посадки Сирени въ горшки—срѣзываютъ ее.

1681. Sysirinchium anceps. Многолѣтнее садовое растеніе.

1682. Taber naemontana longiflora. Тепличное растеніе изъ семейства **Aprocynaeae**. Съ большими листьями и нѣжными, ароматическими, желтовато-бѣлыми цвѣтами. Достаточно поливается и опрыскивается во время роста, но напротивъ, когда ростъ прекратится, растеніе переносятъ въ сухое мѣсто и поливаютъ только въ крайнемъ случаѣ, такъ, чтобы корень его не засохъ. Весьма надо остерегаться, чтобы не сгноить нѣжный корень растенія, а для того въ горшкѣ надо сдѣлать хорошій водостокъ. Размножается черенками.

1683. Taber naemontana coronaria flore plena. Тепличное растеніе. Млечный сокъ его употребляется противъ глазныхъ болѣзней.

1684. Tacsonia Buchanani. Изъ семейства **Пассифлоръ**. Тепличное растеніе.

Другіе виды: **T. speciosa.** Оранжевое, цѣнное растеніе, съ красно-розовыми цвѣтами.

T. quitensis eriantha. Оранжевое, вьющееся растеніе, съ ярко-розовыми цвѣтами.

T. volxemii. Съ красноватыми цвѣтами. Цвѣтеть только въ томъ случаѣ, если находится въ грунту холодной оранжереи, около оконъ.

T. mollissima. Вьющееся растеніе, содержится въ умѣренной теплицѣ. Даетъ большой, розовый цвѣтокъ. Любитъ плотную, но тучную землю, сильную поливку лѣтомъ и весьма умѣренную зимою. Весьма легко размножается черенками.

T. exoniensis. Оранжерейное, вьющееся, кустарное растеніе, цвѣты ярко-малиновые, съ пунцовымъ кольцомъ по срединѣ.

1685. Tagetes erecta. *Бархатцы и шапки.* Однолѣтнее, садовое растеніе; можетъ высѣваться прямо въ грунтъ, въ питательную садовую землю. Цвѣты имѣютъ бархатистый видъ и не совсѣмъ пріятный запахъ. Заслуживаютъ культуры только махровыя разновидности.

Виды: **T. erecta aurantiaca.** *Шапки.*

T. e. nana. T. e. sulphurea. T. lucida.

T. patula. *Бархатцы.* **T. p. aurea. T. p. minima.**

T. p. nana. T. p. n. lutea. T. p. pulchra.

T. p. ranunculoides. T. p. striata plena.

T. p. signata. T. p. signata pumila. Низенькій бархатецъ, съ золотистыми головками.

1686. Talinum patens. Многолѣтнее, цвѣточное растеніе, высѣвается въ Мартъ, по всходѣ разсаживается на гряды и на слѣдующій годъ сажается на мѣсто. Очень долго сохраняетъ зелень.

1687. Tamarix. *Тамариксъ. Гребенщикъ. Болманъ.* Семейство *Tamariscineae.* Дикорастущій кустарникъ.

Виды: **T. germanica.** *Нѣмецкій кипарисъ.* Дикорастущій, разводимый для украшенія садовъ кустарникъ, съ тонкими, буровато-красными и гладкими вѣтвями и съ красноватыми цвѣтами.

T. gallica. *Т. французскій ладанъ.* Дикорастущій кустарникъ, разводимый для украшенія садовъ и парковъ. Похожъ

на кипарисъ, съ блѣдно-красными цвѣтами, раскрытыми все лѣто. Зеленъ его весьма пригодна для букетовъ.

T. parviflora. Съ розовыми цвѣтами. Любитъ глубокую и свѣжую почву. Растетъ на открытомъ воздухѣ, иногда вымерзаетъ, но отъ корня идутъ новые побѣги. Размножается черенками — осенью.

1688. Tanacetum balsamita. *Калугбергъ.* Изъ семейства **Compositaeae.** Многолѣтнее садовое растеніе, съ листьями, имѣющими свой особый, весьма пріятный запахъ.

Другіе виды: **T. vulgare.** *Пижма.* *Дикая рябина.* Дикорастущее, многолѣтнее растеніе, разводимое на сухихъ и открытыхъ мѣстахъ, для цвѣтовъ, содержащихъ летучее масло.

T. elegans. Весьма красивый листъ и желтые цвѣты.

1689. Tanghinia venenifera. Растетъ въ жаркихъ странахъ; весьма ядовито.

1690. Tapeinotes caroline. Изъ семейства Геснерій. Превосходный темно-зеленый, съ свѣтлыми тѣнями листъ, съ малиновою изнанкою.

1691. Tarchonanthus camforatus. Оранжевое растеніе.

1692. Taxodium distichum. Американское хвойное растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ; размножается черенками. Требуется вересковую землю пополамъ съ дерновою, съ примѣсю четвертой части лиственной. Имѣетъ пирамидальную форму, дѣлающую его похожимъ на кипарисъ. Въ торговлѣ древесина его извѣстна подъ именемъ бѣлаго кедроваго дерева.

Другой видъ: **T. sempervirens.** *Чажное дерево.* Пирамидальное дерево съ мутовчатыми листьями.

1693. Taxus. Тисъ. Изъ семейства **Taxineae.** Хвойное дерево, разводимое въ садахъ, гдѣ требуетъ на зиму надежной крыши. Размножается черенками, сѣменами и отводками. Предпочитаетъ хорошую и не сухую почву. Получило названіе отъ слова **taxon** — лукъ, потому что изъ него дѣлали *луки.*

Виды: *T. baccata*. *T. обыкновенный*. *Зеленица*. Всегда зеленѣющее дерево.

T. baccata Barroni. Кустарное растеніе съ многолѣтнею зеленью и съ желто-пестрыми листьями.

T. Taccata fol. variegatis. Съ золотисто-пестрымъ листомъ.

T. adpressa. *T. canadensis*. *G. Daviestii*. *T. Dawsoni*. *T. ericoides*. *T. horizontalis*. *T. monstrosa*. *T. nana*. *T. stricta*. *T. hibernica*. Имѣетъ колонообразный ростъ.

T. nucifera. *T. орехоносный*. Японское дерево.

T. verticillata. *T. колчатый*. Тоже.

1694. *Tecoma radicans*. Изъ семейства *Bignoniaceae*. Оранже-
рейнное растеніе.

Другіе виды: *T. spectabilis*. Съ желтыми цвѣтами.

T. fulva. Оранжевые цвѣты съ малиновымъ.

1695. *Tecophilasa cyanocrocus*. *Лазуревая текофилия*. Луко-
вичное растеніе, съ превосходными темно-лазуревыми, арома-
тическими цвѣтами. Весною, когда растеніе отцвѣтетъ, горш-
ки ставятъ въ сухое, не глухое мѣсто и поливку, постепенно
уменьшая, прекращаютъ. Осенью вынимаютъ луковицы; круп-
ныя сажаютъ, штуки по три, въ трехвершковыя горшки, въ
смѣсь глинистой земли, пополамъ съ вересковою и торфяною,
ставятъ на свѣтъ въ оранжереѣ и умѣренно поливаютъ. Въ
Мартѣ и Апрѣлѣ переносятъ растеніе въ парникъ и усили-
ваютъ поливку, при надлежащемъ его провѣтриваніи.

1696. *Tectona grandis*. *Тековое дерево*. Дерево, растущее въ тро-
пическихъ странахъ, самое крѣпкое изъ употребляемыхъ для
постройки судовъ.

1697. *Teleanthera*. Низкій, густой полукустарникъ, изъ семей-
ства Амарантовыхъ. Зиму содержится въ оранжереѣ у са-
мыхъ рамъ; зимою же изъ нихъ выводятъ молодые экземпляры.

Виды: *T. amoena amabilis*. Съ фиолетовыми стеблями и
листьями.

T. Bettzichiana. Верхніе листья красные, а прочіе олив-
ково-зеленые.

T. versicolor. T. spathulata.

1698. *Telephium purpureum*. Однолѣтнее, цвѣточное растеніе.

1699. *Telfairia pedata*. Изъ семейства *Cucurbitaceae*, тепличное, ползучее растеніе, съ фіолетово-желтыми цвѣтами. Размножается сѣменами и при особомъ трудѣ—черенками.

1700. *Tephrosia longifolia*. Однолѣтнее цвѣточное растеніе, съ листьями пепельнаго цвѣта.

1701. *Tetragonia expansa*. *Новозеландскій шпинатъ*. Однолѣтнее растеніе. Все лѣто замѣняетъ обыкновенный шпинатъ. Любитъ рыхлую почву и полутѣнь. Сѣется осенью прямо въ грунтъ или въ Апрѣлѣ въ парникъ, либо разсадникъ, предварительно размоченнымъ сѣменемъ. При посѣвѣ прямо въ грунтъ—слишкомъ частые всходы прорѣжаются, а посѣянный въ парникъ или разсадникъ, высаживаютъ на гряды вершкахъ въ 5-ти другъ отъ друга. Требуется поливки навозною жижею. Сѣмена четвероугольные, собираются позднею осенью, когда сдѣлаются совсѣмъ твердыми.

1702. *Tetragonolobus purpureus*. *Спаржевый горохъ*. Однолѣтнее огородное растеніе. Четвероугольные стручки его употребляются въ пищу, пока еще молоды, замѣняя собою спаржу. При этомъ верхняя кожица стручковъ сдирается. Сѣется прямо въ грунтъ, позднею осенью, на четверть другъ отъ друга, потому что сильно кустится.

1703. *Tetranthera japonica*. Даетъ растительный воскъ.

1704. *Tetranax papyrifera*. Изъ стволовъ его добываются волокна, служащія для приготовленія тонкой, китайской бумаги.

1705. *Tetratheca ericifolia*. Изъ семейства *Tremandicae*. *Тетратека вересколистная*. Красивое кустарное, оранжевое, низкорослое растеніе, изъ Новой Голландіи, съ мелкими розовыми цвѣтами. Размножается черенками весною. Любитъ вересковую землю.

1706. *Teurium marum*. *Кошачья трава*. Оранжевое растение. Другіе виды: *T. betonicum*. *T. flavum*. *T. massiliense*.

Дикорастущіе виды:

T. sibiricum. *Дубровка*.

T. scordium. *Конскій чеснокъ*.

T. polium. *Чебрецъ*.

T. chamaedrys. *Растиморъ*.

1707. *Thalia dealbata*. Глубоко растущее, чрезвычайно красивое и стройное, болотное растение, стебли котораго достигаютъ четырехъ футовъ, съ красно-бурыми цвѣтами—метелкою. Ухоть за нимъ тотъ же, что и за *Richardia aethiopica*.

1708. *Thalictrum aquilegifolium*. *Василисникъ*. *Серебрянка*. Изъ семейства *Ranunculaceae*. Многолѣтнее садовое растение, съ бѣлыми и желтыми цвѣтами.

Другіе виды: *T. exaltatum*. *T. speciosum*. Съ такими же цвѣтами.

T. anemonoides flore pleno. Съ бѣлыми, махровыми цвѣтами.

Дикорастущіе виды: *T. simplex*. *Камчужная*.

T. minus. *Сузикъ*.

T. majus. *Золотуха*.

T. angustifolium. *Рутеица*.

T. flavum. Ползучее корневище и желтоватыя цвѣты.

1709. *Thamnopteris nidus ramosa*. Тепличный папоротникъ, съ многолѣтнеею зеленью, вѣтвистыми и многоразсѣченными ваями.

1710. *Thamus. Testudinaria*. Тепличное, травянистое, вьющееся растение, съ корнями необыкновенной формы, выдающимися надъ землею, въ видѣ деревянистыхъ наростовъ, въ общемъ похожихъ на оболочку черепахи. Размножается сѣменами, можетъ расти въ комнатѣ; зимою содержится почти сухо; требуетъ землю, составленную изъ равныхъ частей дерновой, лиственной и вересковой.

Другіе виды: *T. elephantipes*. Штамбъ этого растения похожъ на ногу слона.

T. communis. *Двѣй корень*. Дикорастущее.

1711. **Thea.** *Чай.* Изъ семейства **Camelliaceae**. Китайское дерево, содержится у насъ въ теплицѣ, но можетъ жить въ комнатѣ, съ бѣлыми, душистыми цвѣтами, изъ листьевъ его готовится извѣстный всѣмъ *чай*.

Для этого листья *чайнаго деревца* собираются четыре раза въ годъ, съ 3-хъ 8-ми-лѣтнихъ вѣтвей, а именно: въ Февралѣ, Апрѣлѣ, Юнѣ и Августѣ. Собранные листья обвариваютъ кипяткомъ и потомъ поджариваютъ на желѣзныхъ листахъ. Своего аромата чайные листья не имѣютъ и получаютъ его отъ прибавки цвѣтовъ разныхъ другихъ растений, напр. **Olea fragrans**, **Rosa thea** — *чайной розы*, **Jasminum sambac**, **camelia sesanqua** и другихъ. Цвѣты этихъ растений примѣшиваются къ высушенному уже чаю и потомъ выбираются прочь. Эта операція повторяется нѣсколько разъ.

Чай размножается сѣменами и черенками. Требуется земля составленную изъ равныхъ частей вересковой, дерновой и лиственной.

Виды: **T. Bolea.** *Черный чай.*

T. viridis. *Зеленый чай.*

T. stricta. **T. assamica.** **T. chinensis.**

1712. **Themistoclesia coronilla.** Оранжевый кустарникъ, съ ярко-красными цвѣтами.

1713. **Theobroma.** Американское дерево, съ желтыми цвѣтами, можетъ расти въ комнатѣ. Размножается свѣжими сѣменами и черенками. Требуется земля, составленную изъ двухъ частей лиственной, одной дерновой и одной вересковой.

Виды: **T. cacao.** *Шоколадное дерево. Какао.* Зерна продолговатыхъ плодовъ этого дерева, служатъ для приготовления *шоколада*.

T. guianensis. **T. bicolor.**

1714. **Theophrasta.** Тепличное и вмѣстѣ комнатное, орнаментальное дерево, съ жесткими, весьма красивыми, листьями, по краямъ усаженными колючками и съ маленькими, желтоватыми или красноватыми цвѣтами. Любитъ питательную, дерновую землю. Зимой иногда теряетъ листь и въ это время

весьма мало поливается. Размножается черенками, сѣменами и отводками.

Виды: *T. imperialis Lindeni*. Рѣдкое растеніе, съ листьями, достигающими 4 футъ. Любитъ рыхлую, питательную, дерновую землю, частую пересадку въ большую посуду и свѣтлое мѣсто въ теплицѣ, при 14 — 15° Р. Для размноженія, когда является новый побѣгъ, у стараго срѣзаютъ верхушку и дѣлуютъ ее на столько кусковъ, сколько окажется листьевъ на срѣзанномъ кускѣ. Съ каждымъ изъ этихъ кусковъ поступаютъ какъ обыкновенно съ черенкомъ, который укореняется иногда не раньше года.

T. Americana. *T. latifolia*. *T. longifolia*. *T. nobilis*. *T. macrophylla*. *T. regale*.

1715. *Thermopsis lanceolata*. Мышьязъ. Мышиный горохъ. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ лѣтомъ.

Другой видъ: *T. fabacea*. Многолѣтнее растеніе; зимою сохраняется въ подвалѣ или оранжереѣ; на лѣто высаживается въ грунтъ.

1716. *Thevirania candida*. Изъ семейства Геснерій. Съ бѣлыми, изсѣра цвѣтами. Требуется того же ухода, что и Ахименесъ.

1717. *Thibandia pulcherrima*. Изъ семейства *Ericaceae*. Оранжерейное растеніе съ малиново-оранжевыми цвѣтами, сидящими букетами на стволѣ растенія. Землю составляютъ изъ равныхъ частей дерновой, песку и вересковой. Цвѣтетъ въ концѣ Декабря. Размножается черенками.

Другой видъ: *T. macrantha*. Содержится въ умѣренной теплицѣ. Даетъ необыкновенно красивые, бѣлые, испещренные малиновыми жилками, съ желтыми раструбами цвѣтки, висящіе на малиновыхъ черешкахъ.

1718. *Thichocentrum capistratum*. Маленькій, тепличный Эпифитъ, съ пурпуровыми листьями, съ желтыми, съ бѣлою губою цвѣтами, испятнанными пурпуровыми крапинками.

1719. *Thladiantha dubia*. Китайское, введенное въ Европу, вьющееся растеніе, съ большими листьями, покрытыми мягкими

волосами и съ желтыми цвѣтами. Разножается сѣменами и клубнями, похожими на картофельные. Зимуетъ въ оранжереѣ, гдѣ его содержать сухо, а также у насъ и на открытомъ воздухѣ при надежной крышкѣ, причемъ оставляя растеніе на зиму въ грунту, надлежитъ осенью совершенно, у самой земли срѣзать его стебель, достигающей высоты 5—6 сажень.

1720. *Thlaspi umbellata*. *Ежовый глазъ*. Изъ семейства *Crucifereae*. Однолѣтнее, грунтовое растеніе, съ бѣлыми или фіолетовыми цвѣтами.

Другіе виды: *T. perfoliatum*. *Заячьи крыльца*. Дикорастущее.

T. arvense. *Ярутка*. Тоже, съ бѣлыми цвѣтами.

1721. *Thrinax*. Родъ Пальмъ. Очень красивое, не высокое тепличное растеніе, содержится и въ комнатѣ, съ круглыми, разрѣзными вѣерообразными листьями; размножается сѣменами. Требуется вересковую землю пополамъ съ дерновою и съ примѣсю незначительнаго количества вересковой и песку. Размножается отдѣленіемъ дѣтвѣ.

Виды: *T. elegans*. Особенно замѣчательна декоративною.

T. argentea. Нижняя сторона листьевъ — серебристо-бѣлая.

T. multiflora. *T. parviflora*. Листья этихъ двухъ видовъ употребляются на плетеніе шляпъ, называемыхъ матросами: „ship—hats“.

T. Havanensis. Нѣжная Остъ-Индская Пальма, съ вѣерообразными листьями на тонкихъ черешкахъ.

T. Mauritiana. *T. Pumila*. *T. excelsa*. *T. ferruginea*. *T. graminifolia*. *T. radiata*.

1722. *Thuja*. *Туя*. *Немючка*. Изъ семейства *Cupressineae*. Оранжерейное, хвойное растеніе, съ своеобразнаго вида листьями, очертаніемъ, похожими на листья клена, но состоящими изъ плоскихъ, зазубренныхъ, узенькихъ хвой. Размножается черенками, которые сажаются зимою; сѣменами, высѣваемыми въ началѣ весны, въ тѣнистомъ мѣстѣ. Требуется вересковую

землю, съ примѣсю небольшого количества дерновой и лиственной. Можетъ расти въ комнатѣ, но зимою очень страдаетъ отъ комнатной теплоты. Напротивъ, нѣкоторые виды Туи успѣшно переносятъ зиму на открытомъ воздухѣ, будучи посажены въ грунтъ и закутываемы на зиму.

Виды: *T. filiformis*. Съ длинными, нитеобразными вѣтвями.

T. occidentalis argentea. *T. западная*.

T. o. aurea. *T. nepalensis*. *T. Tom pouse*.

Виды переносящіе зиму на открытомъ воздухѣ: *T. articulata*. *T. caucasica*. *T. aurea*. Густое дерево. Листья съ желтоватымъ отливомъ.

T. gigantea. Съ вѣтвями по обѣмъ сторонамъ ствола.

T. globosa aurea. *T. hybrida*. *T. horizontalis*. *T. meldensis*. *T. pyramidata*. *T. occidentalis*. *Жизненное дерево*.

T. oc. fol. variegatis.

T. orientalis. *T. восточная* или *китайская*.

T. plicatilis. Пирамидальное дерево средней величины.

T. excelsa. Весьма быстро растущее дерево.

1723. Thujaopsis. Хвойное дерево.

Виды содержимы въ оранжереѣ:

T. borealis. *T. dolabrata*. Одно изъ самыхъ красивыхъ хвойныхъ деревьевъ, съ листьями, снизу бѣлыми. Происходитъ изъ Японіи. *T. fol. variegatis*.

1724. Thunbergia alata. *Тунбергія перистая*. Изъ семейства *Acanthaceae*. Однолѣтнее, садовое, красивое, вьющееся растеніе. Цвѣты желтые съ темно-пурпуровымъ зѣвомъ. Сѣется въ началѣ Марта въ теплицу; когда хорошо окрѣпнетъ, высаживается въ грунтъ къ стѣнамъ и шпалерамъ. Также размножается черенками. Требуется лиственную землю, пополамъ съ дерновою и съ примѣсю четвертой части вересковой. Зимою поливается весьма умеренно.

Другіе виды: *T. alata var. doodsii*. Листья оторочены бѣлымъ. Цвѣты желтые, внутри темно-фіолетовые.

T. aurantiaca. Съ темно-оранжевыми цвѣтами.

T. bareeri. Съ бѣлыми цвѣтами.

T. coccinea. Съ шарлаховыми цвѣтами. Въ теплой грядѣ теплицы цвѣтеть отъ Января до Марта.

T. grandiflora. Съ синими цвѣтами.

T. chrysops. Наружное основаніе цвѣтка золотисто-желтое, остальной цвѣтокъ темно-синій. Содержится въ умѣренной оранжереѣ, но будучи содержимо въ холодной оранжереѣ превращается въ кустарникъ, не вѣтается и даетъ меньше цвѣтовъ. На растеніе это нападаетъ красный паучекъ, (*Acarus telarius*). Для спасенія отъ него опрыскиваютъ исподъ листьевъ растенія по вечерамъ и не даютъ много воздуха. Требуется отбѣненія отъ солнечныхъ лучей.

T. Harrisii. Вьющееся, тепличное растеніе, съ великолѣпными голубыми цвѣтами.

T. laurifolia. Вьющееся тепличное растеніе. Большіе свѣтлосиніе цвѣты съ бѣлымъ зѣвомъ. Размножается черенками весною и лѣтомъ.

T. afzelia. T. alata flore albo. T. leucantha. T. latifolia.

1725. **Thymus.** *Богородская трава.* Изъ семейства *Labiatae*. Садовое и дикорастущее. Имѣетъ сильный запахъ. Употребляется въ приправу и какъ лекарство.

Виды: **Thymus serpyllum.** *Полевая Богородская трава. Чабрецъ.* Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе. Чай изъ него сдѣланный, употребляется какъ лекарство отъ запоя. Цвѣтеть съ Іюня по Сентябрь.

T. citriodorus. (T. vulgaris). *Тимьянъ. Садовая Богородская трава.* Многолѣтнее растеніе, зимою содержится въ подвалѣ или оранжереѣ, на лѣто пересаживается въ грунтъ; любить сухую и рыхлую почву; разводится сѣменами въ Апрель, причѣмъ разсаживается въ Май, и дѣленіемъ корней — весною. Молодые побѣги употребляются, какъ приправа къ кушаньямъ.

T. pannonicus. *Тимьянъ Биберштейновъ.* Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтеть съ Мая до Августа.

T. angustifolius. *T. узколистный.* Медоносное, кустарниковое растеніе, цвѣтеть съ Мая до Августа.

1726. *Thyrsacanthus rutilans*. Изъ семейства **Aconthaceae**. Съ кистью кармино-красныхъ цвѣтовъ, требуетъ тойже культуры, что и ***Dipteracanthus spectabilis***.

Другой видъ: ***C. barleriodes***. Тепличное растеніе, съ малиновыми цвѣтами.

1727. *Thysanotus proliferus*. Изъ семейства **Liliaceae**. Оранжевое растеніе съ фіолетовыми цвѣтами. Любитъ много воздуха и полутѣнь.

1728. *Tiarella cordifolia*. Многолѣтнее садовое растеніе.

1729. *Tigridia pavonia*. Изъ семейства **Irideae**. Луковичное растеніе съ желтыми и красными цвѣтами, покрытыми черными крапинками. Размножается отростками луковицъ; можетъ существовать въ комнатѣ; требуетъ вересковую землю, пополамъ съ листовенною и съ небольшою примѣсью дерновой. Луковки зимою сохраняются въ сухой землѣ. Можетъ существовать въ комнатѣ.

Разновидности: ***T. p. speciosa***. Цвѣтокъ оранжевый съ краснымъ, внутри испещренный; на лѣто высаживается въ грунтъ.

T. p. conchiflora.

T. violacea. Оранжевое растеніе, съ фіолетовымъ цвѣткомъ.

1730. *Tilia*. *Липа*. Дикорастущее дерево, разводимое въ садахъ и паркахъ. Цвѣтетъ въ Іюлѣ. Пчелы берутъ съ его цвѣтовъ обильной взятокъ. Размножается отростками, черенками, отводками но преимущественно сѣменами. Любитъ тучную землю.

Виды: ***T. latifolia* (hollandica)**.

T. americana alba. *Л. американская бѣлая*. Съ бѣловатыми листьями, съ исподней стороны.

T. a. argentea. ***T. a. glabra***. *Л. американская черная*.
T. a. gradidentat. ***T. a. longifolia***. ***T. a. nigra***. ***T. a. pendula***. ***T. a. pendula fol. variegatis***. ***T. asplenifolia***.
T. asplen. speciosa. ***T. begoniaefolia***. ***T. Blechiana***. ***T. heterophylla***. ***T. cordata***. ***T. europea***. *Л. обыкновенная*.

T. canadensis. Л. канадская. *T. hybrida superba.* *T. mississippiensis.* *T. pannonica.* *T. pubescens.* Л. душистая.

T. p. parmentierii. *C. pyramidata.*

T. parvifolia. Л. мелколистная. Самая обыкновенная въ Россіи. Душистые цвѣты этой липы имѣютъ лекарственныя свойства.

T. grandifolia. Л. крупнолистная. Растетъ преимущественно въ Германіи.

1731. Tillandsia. Изъ семейства Бромелиевыхъ. Очень красивый тепличный эпифитъ и вмѣстѣ комнатное, травянистое растеніе, съ кожеобразно заостренными листьями и цвѣтами бѣлыми, лиловыми или синими. Размножается отдѣленіемъ отпрысковъ, когда отцвѣтеть. Отнявъ такіе отпрыски, ихъ просушиваютъ дня три, а потомъ сажаютъ въ горшки и ставятъ въ теплый парникъ, гдѣ они вскорѣ задаютъ корни. Растеніе затѣняется отъ сильнаго солнца. Землю требуетъ, составленную изъ вересковой и лиственной.

Виды: *T. bulbosa picta.* Цвѣты алые съ лиловымъ.

T. argentea. Листья серебристые, съ короткими, сѣрыми волосками.

T. pyramidalis. Съ голубыми цвѣтами.

T. vittelina. Цвѣтеть съ Января до Марта.

T. splendens. Съ колосомъ пунцовыхъ цвѣтовъ; листья красивые, полосатые, зеленые съ коричневымъ.

T. complanata. Тепличное, многолѣтнее растеніе, съ голубыми цвѣтами, колосомъ.

T. ionantha. Цвѣты малиновые, въ серединѣ синіе, живетъ безъ пищи на сухихъ деревьяхъ.

T. lindenii major. Цвѣты ярко-лазурные съ бѣлымъ глазкомъ.

T. pulchra. *C. rubida.* *C. dianthoidea.* *C. zebrina.*

T. vriesia. *T. amoena.* *C. bivittata.* *C. flexuosa.*

1732. Tithonia tagetiflora. Однолѣтнее садовое растеніе, не удается въ нашемъ климатѣ; съ ярко окрашенными цвѣтами.

1733. Todea barbara. Древовидный папоротникъ, съ толстымъ стволомъ, растетъ на мысѣ Доброй Надежды.

1734. Tobris barbata. Однолѣтнее растеніе съ желтымъ, внутри бурымъ цвѣткомъ, высѣвается прямо въ грунтъ.

1735. Torenia. *Торенія.* Изъ семейства **Scrophulariaceae.** Тепличное растеніе, требуетъ рыхлой, питательной земли. Держится въ подвѣсныхъ вазахъ. Лѣтомъ требуетъ затѣненія и влажности. Размножается сѣменами и черенками.

Виды: **T. asiatica.** *T. азіатская.* Цвѣты синіе съ черно-фіолетовымъ зѣвомъ. Цвѣтетъ въ Декабрѣ. Размножается черенками, которые зимуютъ въ плошкахъ, будучи поставлены въ умѣренную теплицу. Весною ихъ разсаживаютъ въ горшки, чтобы пересадить потомъ въ грунтъ или держать въ оранжереѣ.

T. pulcherima. Цвѣты темно-фіолетовые съ бѣлымъ. Выущее тепличное растеніе.

T. auriculaefolia. Низкое, дернистое растеніе, съ лиловыми цвѣточками, покрытыми пурпуровыми крапинками.

1736. Tourraja. Хвойное растеніе. Размножается черенками.

1737. Tourrettia lappacea. Изъ семейства **Bignoniaceae.** Цвѣты фіолетовые, сверху пунцовые. Держать въ оранжереѣ. Рѣжутъ на черенки, осенью, кончики вѣтвей. Также размножается сѣменами.

1738. Trachymene coerulea. Красивое, однолѣтнее, садовое растеніе, въ высоту, достигающее фута, съ лазуревыми цвѣтками. Весьма чувствительное растеніе, требуетъ сильнаго тепла. Высѣвается въ парникъ; разсаживается въ горшки и пересаживается въ грунтъ, когда уже нельзя ждать морозовъ, въ смѣсь вересковой съ глинисто-дерновою землею.

1739. Tradescantia albiflora. Изъ семейства **Commelyneae.** Стелющееся тепличное растеніе, одно изъ самыхъ прочныхъ, и красивѣйшихъ для образованія дерновыхъ возвышеній, для висячихъ сосудовъ и акваріумовъ. Можетъ расти въ комнатѣ. Требуется плотной питательной земли, размножается побѣгами и черенками. Самое цѣнное изъ этихъ растений.

T. zebrina. Цвѣты въ видѣ распущеннаго зонтика, бываютъ розовые, бѣлые и темно-синіе, требуетъ вересковую землю

пополамъ съ лиственной, съ примѣсью четвертой части дерновой.

Другіе виды: *T. discolor*. Имѣть большіе листья, съ нижней стороны лиловые.

T. discolor var. vittata. Тепличное растеніе, съ великолѣпными, мечеобразными листьями, темно-фіолетово-малиновыми съ изнанки и полосатыми, бѣло-зелеными съ лицевой стороны. Любитъ сильное тепло, свѣтъ и влажность. Никогда его не слѣдуетъ притѣнять. Размножается черенками.

T. lineata. Съ пестрыми листьями.

T. albiflora fol. variegatis.

T. crassifolia. *T. rosea*.

Существуютъ многолѣтніе виды *Tradescantii*, разводимой въ садахъ, гдѣ она на зиму покрывается надежнымъ образомъ. Назовемъ лучшіе.

T. ciliata. Цвѣтетъ по утрамъ.

T. pilosa. *T. subaspera*. *T. virginica alba*. *T. v. coerulea*. *T. v. lilacina*. *T. v. rubella*. *T. v. rubra*.

1740. *Tragopogon porrifolium*. Овсяный корень. Изъ семейства *Synanthereae*. Двухлѣтнее растеніе. Корни его, только въ первый годъ его роста, употребляются какъ овощъ, а молодые листья, какъ салатъ. Сѣютъ въ Іюлѣ, чтобы далъ въ Ноябрь толстые, вкусные корни. Зимуетъ въ грунту. Сѣмячко этого растенія имѣетъ хохолокъ, что и дало поводъ къ названію растенія. (*Tragos*—козель; *pogon*—борода).

Дикорастущіе виды:

T. pratense. Кудрявка. Козелецъ. Козлобородникъ луговой. Многолѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ въ Іюнѣ и Августѣ. Цвѣтокъ желтый.

T. ficosum. Молочникъ.

1741. *Tragopirum lanceolatum*. Низкорослый кустарникъ сизаго цвѣта, съ тѣлеснаго колера цвѣтами. Выдерживаетъ зиму въ грунту, безъ покрывши.

1742. *Treculia africana*. Тепличное дерево.

1743. *Tremandra Hugelii*. Оранжевый кустарникъ, съ пурпуровыми или фиолетовыми цвѣтами. Распускается поздно осенью.

Другой видъ: *T. verticulata*.

1744. *Trevesia sundaica*. Прекрасное, декоративное, оранжевое растение, съ колючимъ стволомъ. Любитъ глинисто-дерновую землю, частую пересадку, свѣтлое мѣсто въ умеренной оранжереѣ, при 8 — 10° Р. Размножается отнятіемъ верхушечнаго побѣга и боковыми побѣгами, которые образуются у стараго растенія, послѣ означенной операціи.

1745. *Trachelium purpureum*. Оранжевое растение.

Другіе виды: *T. coeruleum*. *Трахелиумъ голубой*. Двухлѣтнее растение съ сине-фиолетовыми цвѣтами. Лѣтомъ содержится въ грунту, зимою въ оранжереѣ.

1746. *Trichinium Manglesi*. *Манглесовъ волосяникъ*. Оранжевое растение, не больше шести вершковъ, съ красивымъ краснымъ цвѣткомъ, покрытымъ волосами и представляющимъ собою видъ султана, отчего и получило названіе. (*Trichinos* — покрытый волосами). Цвѣтетъ все лѣто. Любитъ вересковую землю съ примѣсью $\frac{1}{3}$ глинистой и немного песку.

1747. *Trichoglottis fasciata*. Тепличная Орхидея. Цвѣты большіе, въ короткихъ волоскахъ, бѣлые, съ коричневыми полосками и бѣлою губою.

1748. *Trichomanes auriculatum*. Тепличный папоротникъ, съ ползучимъ корневищемъ и стеблями, покрытыми мягкими волосами, отчего и получило названіе (*thrix*—волосъ; *manos*—мягкій).

1749. *Trichonema bulbocodium*. Прекрасные, большіе цвѣты: фиолетовые, желтые, розовые, пурпуровые. Содержится въ оранжереѣ, но переносится въ теплицу тотчасъ послѣ появленія перваго цвѣтка. Распускается въ Февралѣ.

1750. *Trichopilia fragrans nobilis*. Орхидея съ бѣлыми, какъ снѣгъ цвѣтами и золотистымъ пятномъ, издающими ароматъ

померанцового цвѣтка. Оранжевое растение и требует той же культуры, что и *Odontoglossum*.

Другіе виды: *T. humenantha*. Тепличная Орхидея. Цвѣты бѣлые, пониклыми кистями; губа съ красными крапинками.

T. coccinea. Розовый, большой цвѣтокъ; нижняя губа похожа на Глоксинію, снаружи бѣлая, внутри малиновая.

T. suavis. Цвѣты желтовато-бѣлые, нижняя губа испещрена фіолетовыми и желтыми пятнами.

T. crispa marginata Большіе бѣлые цвѣты, росписанные малиновымъ и съ зѣвомъ внутри малиновымъ.

T. rostrata. Цвѣты бѣлые, съ оранжевыми полосками.

1751. *Trichosacme lanata*. Изъ семейства *Aprocynaceae*. Тепличное растение съ фіолетовыми цвѣтами, окруженными какъ бы шелковою, бѣлою бахромою. Требуется весьма жаркой температуры и сильнаго освѣщенія. Любитъ землю составленную изъ вересковой и гравія. Нуждается въ весьма умѣренной поливкѣ.

1752. *Trichosanthes*. Однолѣтнее растение, изъ семейства Тыквенныхъ. Разводится только въ теплой оранжерей; въ грунтъ не высаживается. Даетъ длинный, зеленый плодъ, похожій на змѣю. Высѣвается въ Мартѣ. Требуется листовую землю пополамъ съ дерновою и съ примѣсю незначительнаго количества навозной и песку.

Виды: *T. anguina*. Змѣеобразная трава.

T. japonica. Клубневое, многолѣтнее, цѣпкое растение. Цвѣты на длинныхъ ножкахъ, зеленоватые, бахромчатые; плоды шаровидные.

T. colubrina. Съ изящнымъ, бѣлымъ цвѣткомъ и красивымъ зелено-краснымъ, длиннымъ плодомъ. Содержится въ теплицѣ, въ тучной землѣ. Требуется того же ухода, что и Дыня. Въ тепломъ климатѣ ихъ можно высаживать въ грунтъ. Плоды дозреваютъ въ Октябрѣ или Ноябрь.

1753. *Tricyrtis hirta*. Изъ семейства *Melanthaceae*. Многолѣтнее растение съ шиповатымъ корнемъ. Цвѣты бѣлые, покрыты красными и темными пятнышками. Въ оранжерей цвѣтеть зимою.

Другіе виды: *T. pilosa*. Изящный, зеленоватый цвѣтокъ, испещренный малиновыми крапинками.

T. hirta aestivalis. Зацвѣтаетъ рано осенью.

1754. *Trifolium*. *Трилистникъ*. Такъ названъ по формѣ листа. (*Tres*— три; *folium*— листъ). Дикорастущее.

Виды: *T. repens*. *Медовикъ*. *Кашка бѣлая*. *Дятлина ползучая*. Многолѣтнее, дикорастущее, медоносное растеніе; цвѣтетъ съ Мая до Октября; составляетъ хорошую кормовую траву.

T. repens foliis atropurpureis—maculatis. Тоже, съ бѣлыми цвѣтами и черно-красными листьями.

T. montanum. *Бѣлоголовка*. *Клеверъ*. *Кашка горная*. Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе, цвѣтетъ съ Мая до Сентября.

T. rubens. *Красная кашка*. Многолѣтнее растеніе, требуетъ покрывки на зиму.

T. album. Тоже, съ бѣлыми цвѣтами.

T. purpureum. Содержится въ оранжереѣ.

T. suaveolens. Однолѣтнее садовое растеніе.

Дикорастущіе виды:

T. spadicum. *Голубиный хмль*.

T. pratens. *Дятлина*.

T. incarnatum. *Пунцовый клеверъ*.

T. medium. *Красная кашка*.

T. hybridum. *Свѣтлебей*.

T. arvense. *Котятникъ*.

T. alpestre. *Красная кашка*.

T. agzarium. *Хмльокъ*.

1755. *Trillium pendulum*. Изъ семейства *Liliaceae*. *Пониклая Кольковія*. Многолѣтнее растеніе съ бѣлыми цвѣтами, распускающимися въ Маѣ. Требуется затѣненнаго положенія какъ лѣсное растеніе и почву изъ вересковой или торфяной земли, смѣшанной съ четвертою частію глинистой, зимуетъ на воздухѣ, прикрытое листомъ. Размножается посѣвомъ и дѣленіемъ корней.

Другіе виды: *T. erectum*. Цвѣты темно-малиновые.

T. grandiflorum. Цвѣты бѣлые.

T. obovatum. Дикорастущее.

1756. *Triplaris americana*. Растетъ въ южной Америкѣ. Листья и вѣтви его служатъ для прогнанія муравьевъ.

1757. *Triteleia uniflora*. Изъ семейства *Liliaceae*. Оранжерейное растение. Цвѣты бѣлые съ лиловымъ на концахъ лепестковъ.

1758. *Trithrinax brasiliensis*. Родъ Пальмъ. Тропическое растение, содержится въ теплицѣ, съ прямымъ и гладкимъ стволомъ. Размножается сѣменами.

1759. *Tritonia aurea*. (*Crocusma*). *Золотистая Тритонія*. Луковичное растение, не терпитъ частой пересадки. Цвѣты оранжевые. Распускается въ горшкахъ и въ грунту, въ Сентябрѣ.

1760. *Trollius caucasicus*. *Купальница*. Изъ семейства *Ranunculaceae*. Многолѣтнее садовое растение, любитъ сырость и въ оранжереѣ цвѣтетъ въ Мартѣ.

Другіе виды: *T. calthoides*. *T. hybridus*. *T. napellifolius*. *T. altaicus*. Съ большими оранжевыми цвѣтами.

T. asiaticus. *Купальница азіатская*. *Прикрытъ*. Оранжевые цвѣты.

T. europaeus. *К. европейская*. *Бубенчикъ*.

T. e. plenus. Тоже махровая.

1761. *Tropeolum*. *Настурія*. Существуютъ однолѣтніе и многолѣтніе виды этого растенія.

Однолѣтнее, вьющееся, садовое растение имѣетъ множество разновидностей. Сѣется въ Мартѣ въ теплицѣ въ плошки или въ Апрѣлѣ въ парникъ, потомъ рассаживается по одиночкѣ въ горшки и держится въ парникѣ до половины Іюня, пока хорошо не подрастетъ, затѣмъ сажается въ цвѣтникъ на солнечное мѣсто, въ хорошую садовую землю. Круглые листья цвѣтка похожи на щиты, а самый цвѣтокъ на древній щлемъ, отчего и получило названіе. (*Tropaeum* — трофей).

Виды: *T. aduncum*. Цвѣты желтые съ зеленою шпорою.

T. lobbianum. Цвѣты огненно-красные, съ бахромчатыми лепестками. Цвѣтетъ очень поздно осенью, потому у насъ если и разводится, то въ умѣренной теплицѣ или оранжереѣ, гдѣ содержится довольно сухо, въ свѣтломъ мѣстѣ, затѣмъ,

когда совершенно пройдут морозы, высаживается на лето на воздухъ.

T. crenatiflorum. Цвѣты совершенно желтые.

T. Deckerianum. Цвѣты имѣютъ оригинальную окраску, а именно: цвѣтокъ темно-пунцовый, вѣнчикъ зеленый съ синимъ, образуетъ красивую звѣздочку.

T. azureum grandiflorum. Прекрасные, фіолетовые цвѣты, внутри бѣлые.

Растеніе оранжерейное.

T. lobbianum Smithi. (*T. Hockiamum* и *T. Lipseri*). Высоко вьющееся растеніе. Цвѣты желто-оранжевые съ темными жилками и длинными ноготками.

T. canariense.

T. hybridum caroline Smith,

T. h. Duc de Luyenes.

T. h. géant de Bataille.

T. h. Lili Smith.

T. h. M-me. Colmet. *T. h. triomphe de Gant*.

T. h. Napoleon III. *T. h. queen Victoria*. *T. Brasiliensis*.

T. majus. *Повертень*. Высѣвается въ Апрѣлѣ или Маѣ, въ горшки.

T. m. atropurpureum. *T. m. a. fimbriatum*. *T. m. cristall palace*. *T. m. luteum*. *T. m. Dunetti maculatum*. *T. m. feuille morte*. *T. m. quinquevulnerum*. *T. m. Regelianum*. *T. m. scheuerianum*. *T. m. Thom Thumb*. *T. m. T. T. atosanguineum*. *T. m. T. T. luteum*. *T. m. T. T. King Theodor*. *T. m. nanum album*. *T. m. n. Golden King*. *T. m. n. kermesinum*. *T. m. n. Lili Smith*. *T. m. n. roseum*. *T. m. n. coeruleum*. *T. m. pyramidalis coccineum*.

T. minus. Съ маленькими цвѣтками.

T. m. coccineum. *T. m. trimaculatum*.

Нѣкоторые виды содержатся зимою въ теплицѣ или оранжереѣ съ самою умѣренной поливкою. Требуется листовенную землю пополамъ съ дерновою и съ примѣсью четвертой части вересковой и немного навоза.

Исчислимъ нѣкоторые изъ этихъ видовъ.

T. polyphyllum, *T. brachyceros*. Цвѣты желтые.

T. wagnerianum. Цвѣты красные, вѣнчикъ зеленый, описанный синимъ.

T. Smithi. Цвѣты темно-оранжевые съ желтымъ, будто бахромчатые.

T. tricolorum. Цвѣтокъ пунцовый, вѣнчикъ синій съ желтымъ.

T. umbellatum. На лѣто высаживается въ грунтъ, зимою держится въ оранжереѣ. Даетъ цвѣты красные съ оранжевымъ.

T. speciosum. Цвѣты пунцовые.

T. albiflorum. Цвѣты бѣлые съ голубымъ и розовымъ.

T. tuberosum. Растеніе, вывезенное изъ южной Америки, для клубней, употребляемыхъ въ пищу. Цвѣты желтые внутри, оранжевые снаружи, на красныхъ черенкахъ.

T. chrysanthum. Цвѣты золотисто-желтые; растетъ въ теплыхъ мѣстностяхъ въ грунтъ; высѣвается въ Апрѣлѣ въ плошки, и высаживается на воздухъ въ Іюнѣ.

T. Iarotte. Оранжерейное растеніе. Цвѣтокъ шарлаховый или фіолетовый съ желто-краснымъ.

T. pentaphyllum. Оранжерейное растеніе.

T. azureum. Голубой цвѣтокъ. Послѣ того какъ отцвѣтеть, держится совершенно сухо до возобновленія роста, т. е. до конца Октября; тогда его пересаживаютъ въ питательную землю и онъ будетъ цвѣсть съ половины зимы до Мая. Размножается черенками, которые срѣзаютъ, пока еще растеніе не разцвѣло.

T. violaeiflorum. Фіолетовый душистый цвѣтокъ.

T. pentafillum. Цвѣтокъ свѣтло-красный, съ зеленымъ.

T. sessilifolium. Желто-фіолетовый цвѣтокъ.

T. Popelari. Бѣлый цвѣтокъ съ фіолетовымъ отливомъ.

1762. Tulipa. Тюльпанъ. Thoulyban, по-персидски отчего и получило ботаническое названіе. Изъ семейства *Liliaceae*. Луковичное растеніе, производящее весьма разнообразныя цвѣты: махровые, — и простые, разсѣнные, бѣлые, розовые, малиновые, желтые, — цвѣтовъ всевозможныхъ смѣшеній, полосатые и пестрые. Размножается отростками луковицъ. Безчисленныя разновидности этого растенія выведены изъ сѣменъ. Тюльпаны сажаютъ въ грунтъ на зиму, также держатъ въ оранжереѣ или комнатѣ,

выгоняя ихъ въ ростъ еще зимою, тѣмъ же способомъ, что и гіацинты. Предназначенныя къ ранней выгонкѣ луковицы тюльпановъ, когда поблекнутъ ихъ трава, вынимаютъ изъ земли и держать въ сухомъ мѣстѣ, впредь до посадки.

Когда цвѣты начнутъ распускаться, ихъ держать въ прохладномъ мѣстѣ, чтобы долѣе цвѣли.

Чтобы изящная форма цвѣтка сохранилась долѣе, а именно чтобы его лепестки не разваливались, обвязываютъ цвѣтокъ тюльпана красною ниткою или надѣваютъ на него легонькое колечко изъ красной бумаги.

Виды: *T. gesneriana*. *Ростъ*.

T. duc. v. Tholl. T. ранній.

T. suaveolens. T. gallica.

T. monstosa. T. большой.

T. junger gelber Prinz. Одинокій цвѣтокъ лимоннаго цвѣта.

T. jagt von Rotterdam. Цвѣтокъ росписной, одинокій, бѣлый съ малиновымъ.

T. Portebakker blanc. Цвѣтокъ бѣлый.

T. Cameleon. Цвѣтокъ бѣлый, росписной оранжево-краснымъ.

T. Matelas rose. Малиновый съ бѣлыми краями.

T. Dorothea. Цвѣтокъ бѣлый съ широкими, малиновыми полосами.

T. Grootmester van Malta. Тоже, но цвѣтокъ крупнѣе.

T. Grouden standart. Цвѣтокъ оранжевый, росписанный краснымъ.

T. Ville de Harlem. Бѣлый цвѣтокъ съ небольшими малиновыми полосками.

T. Couronne de Roses. Цвѣтокъ махровый, розовый.

T. Gloria solis. Цвѣтокъ махровый, красный съ оранжевымъ.

T. mariage de ma fille. Весьма большой, махровый цвѣтокъ, малиновый съ бѣлымъ.

T. Regina rubrorum. Махровый, темно-пурпуровый цвѣтокъ, съ желтымъ.

T. Rex rubrorum. Темно-пурпуровый, махровый цвѣтокъ.

T. precox Lak van Rhyn. Цвѣтокъ одинакій, бѣлый съ малиновымъ. Листья оторочены желто-бѣлыми по краямъ полосами.

Tournesol. Большой, махровый цвѣтокъ желтый съ краснымъ, а иногда съ чернымъ, внутри же росписанный бѣлымъ и золотистымъ. Принадлежитъ къ самымъ раннимъ тюльпанамъ. Лучше всего распускается въ умѣренной температурѣ.

T. orphanidea. *T. orphanidesъ*, съ красивыми, ярко-пурпуровыми цвѣтами, испещренными болѣе темными жилками.

1763. Tupistra squalida. Тепличное растеніе. Цвѣтокъ похожъ на молотокъ, отчего и получило свое названіе. (*tupis*—молотокъ).

Другой видъ: **T. squalida fol. variegatis.**

1764. Turnefortia heliotropioides. Однолѣтнее цвѣтущее растеніе. Сѣется въ парникъ или плошку и высаживается въ грунтъ, когда уже нельзя ожидать морозовъ.

1765. Turnera elegans. Бѣло-желтоватые цвѣты, внутри испещренные черно-краснымъ.

Другой видъ: **T. cuneifolia.** Съ желтыми цвѣтами. Оба вида цвѣтутъ всю зиму въ умѣренной оранжереѣ.

1766. Turritis glabra. Усовная. Дикорастущее.

Другой видъ: **T. verna.** *Турретъ весенній.* Грунтовое, бордюрное растеніе, съ бѣлыми цвѣтами.

1767. Tussilago farfara. *Мать и мачиха.* Изъ семейства *Synanthreae*. Дикорастущее.

Другіе виды: **T. farfara fol. variegatis.** *Пестролистная мать и мачиха.* Дикорастущее, многолѣтнее, медоносное растеніе. Отличается свойствомъ мѣнять мѣсто, потому что его корневище ползетъ съ мѣста на мѣсто, такъ, что если въ этомъ году оно составляло клумбу, въ будущемъ на ней ничего не останется, а растеніе уже надо искать фута три—четыре въ сторонѣ. Чтобы удержать растеніе на мѣстѣ, клумбу плотно облаживаютъ поставленнымъ на ребро кирпичемъ или камнемъ и каждый годъ растеніе вынимаютъ и сажаютъ на свое мѣсто. Размножается само собою. Требуется для полного

развитія сильной поливки, пока сформируются листь. Любитъ тяжелую, глинистую или суглинистую землю, на зиму прикрывается сухимъ листомъ; цвѣтетъ въ Апрѣлѣ и Маѣ.

T. fragrans. *Подбѣлъ душистый.* Многолѣтнее растеніе, съ бѣловатыми, въ началѣ красноватыми цвѣтами, имѣющими форму поднятой кверху кисти и запахъ, похожій на геліотропъ. Цвѣтетъ зимою, по этому драгоцѣнно для любителя. Безъ затрудненія разцвѣтаетъ въ оранжереѣ или холодной комнатѣ. Самый слабый корневой отпрыскъ, будучи посаженъ въ Апрѣлѣ или Маѣ, въ грунтъ, къ осени дастъ растеніе, способное цвѣсти; его вынимаютъ съ землею, сажаютъ въ горшокъ и оно къ Рождеству распускается. Посадивъ нѣкоторое количество этихъ растений, надлежитъ, чтобы имѣть ихъ въ цвѣту всю зиму, вносить въ комнату или оранжерею по нѣскольку штукъ. Размножается черенками весною, причемъ осенью, растеніе уже дѣлается пригодно для цвѣтенія. После того какъ отцвѣтутъ, ихъ держать въ холодномъ мѣстѣ, весною опять сажаютъ въ грунтъ, причемъ отсаживаютъ корневые отпрыски. Требуешь смѣсь глинистой земли съ листовенною.

T. grandifolia. Дѣлаетъ весьма красивый видъ, будучи сажено у воды.

1768. *Tydaea.* См. Ахименесъ.

1769. *Turpha.* *Рогозъ. Палочникъ.* Изъ семейства *Typhosaceae.* Дикорастетъ по болотамъ.

1770. *Typhonium Roxburghii.* Изъ семейства Ароидныхъ. Тепличное, многолѣтнее, клубневое растеніе, съ пурпуровыми цвѣтами.

1771. *Uhdea bipinnatifida.* Красивое, декоративное, тепличное растеніе. Размножается въ Февралѣ, посредствомъ черенковъ. На лѣто высаживается въ грунтъ.

1772. *Ulex europaeus.* *Дикій терновникъ.* Дикорастущее, но можетъ содержаться въ оранжереѣ. Вѣтви его покрыты колючками, отчего и получило названіе, (ас—остріе, по-Кельтски).

1773. *Ulmus.* *Илемъ. Вязъ.* Семейство *Ulmaceae.* Дикорастущее

дерево или кустарникъ, разводится въ садахъ и паркахъ. Цвѣты появляются до листьевъ. Размножается сѣменами, которые высѣваются лѣтомъ, тотчасъ послѣ того, какъ созрѣютъ, также разсадою отпрысковъ. Употребляется въ столярномъ дѣлѣ. Молодые листья употребляются, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ чай.

Виды: *U. adiantifolia*. *U. americana pendula*. *И. плакучій*.

U. campestris. *Ильмъ*. *Берестъ*. *Карагачъ*. Выносить зиму, но отъ сильныхъ морозовъ страдаютъ молодые побѣги, а въ очень суровую зиму замерзаетъ все дерево; потому его слѣдуетъ сажать на возвышенной, сухой почвѣ, въ защищенномъ положеніи. Разновидности его *U. nuda*. Съ морщинистой корою, самая обыкновенная форма.

U. betulaefolia. Съ мелкимъ листомъ.

U. major. *U. stricta*.

U. campestris fol. argent. Variegatis.

U. c. fol. purpureis. Съ темно-красными листьями, вымерзнетъ до линіи снѣга и образуетъ кустарникъ.

U. curculata. Тоже.

U. Dampieri. *И. пирамидальный*.

U. effusa. *И. стебельковый*. Не вымерзаетъ.

U. laciniata. *U. fulva*. *U. miniata*.

U. pyramidata. *U. pumila incisa*. *И. малоросный*. Сибирская порода.

U. parvifolia. Сѣверо-Китайскій видъ; у насъ зимы не выносить.

U. rubricaulis. *И. красивый*. Американская порода.

U. tilaefolia. *U. alata*. *И. крылатый*. Американское дерево.

U. integrifolia. *И. Индѣйскій*. Съ цѣльными листьями. Нашей зимы не выносить.

U. montana fastigata. Листья почти круглые.

U. m. gigantea. *U. macrophylla*. *И. пестрый, мелколистный*.

U. superba. *U. glabra*. *U. exoniensis*. Одинъ изъ самыхъ красивыхъ видовъ Ильма.

U. suberosa. *И. пробочный*.

U. suberosa fol variegatis. Тоже *пестролистный*.

1774. *Ungnadia speciosa*. Изъ семейства *Sapinaceae*. Оранже-
рейнное растеніе, съ розовыми цвѣтами. Легко размножается
черенками. На лѣто выставляется на воздухъ.

1775. *Urania Madagascariensis*. Вельма красивое, тепличное
растеніе.

Другой видъ: *U. speciosa vera*. Съ весьма плотными,
толстыми, лоснящимися листьями, формою, нѣсколько похожи-
ми на листь Канны, но болѣе округлыми. Любитъ сильную
поливку.

1776. *Uropedium Lindenii*. Тепличная Орхидея. Требуется той
же культуры, что и другіе эпифиты.

1777. *Uropetalum Welwitschii*. Оранжевейное, луковичное ра-
стеніе, съ зеленоватыми цвѣтами.

1778. *Uroskinnera spectabilis*. Изъ семейства *Ucrophulari-
aceae*. Тепличное растеніе, съ фіолетовымъ цвѣткомъ. Зимую
требуетъ много тепла и мало воды. Чтобы укрѣпить расте-
ніе, на самое жаркое время лѣта, его выставляютъ на воз-
духъ.

1779. *Urostigma*. См. *Ficus*.

1780. *Urtica dioica*. *Крапива*. Семейство *Urticeae*. Многолѣт-
нее, дикорастущее растеніе, при прикосновеніи какъ бы обжига-
етъ тѣло, волосками, покрывающими стебель и листья растенія,
отчего и получило свое названіе. (*Uro* — жечь). Молодые
листья употребляются для приготовленія зеленыхъ щей; изъ со-
зрѣвшаго стебля отбивается волокно, составляющее суррогатъ
пеньки.

Другой видъ: *U. cannabina*. *Остязкая конопля*. Дико-
растущее.

1781. *Utricularia montana*. Изъ семейства *Lentibulariaceae*.
Красивое, тепличное, эпифитное растеніе, весьма оригиналь-
наго вида. Цвѣты крупные, бѣлые съ желтымъ. Любитъ тор-
фяную землю и сырой мохъ.

Другой видъ: *U. Humboldtii*. Цвѣты лиловые съ синимъ
и желтымъ.

1782. Uvularia. Зимуетъ на воздухѣ, при надежной крышеѣ. Пригодно для ранней выгонки. Употреблялось какъ лекарство въ болѣзни языка, отчего и получило названіе. (*Uvula* — язычекъ).

Виды: *U. grandiflora*. Съ желтыми цвѣтами.

U. sinensis. Съ красно-бурыми цвѣтами.

U. flava. Цвѣты желтые, съ красными точками внутри.

U. perfoliata. Цвѣты колокольчикомъ, желтые, съ красными точками.

1783. Vaccaria grandiflora. Однолѣтнее садовое растеніе.

Другой видъ: *V. vulgaris*. *Тысячаголовъ*. Дикорастущее.

1784. Vaccinium myrtillus. *Черника*. Семейство *Vaccineae*.

Маленькій дикорастущій кустарникъ, съ цвѣтами багряными на верху и бѣловатыми въ середкѣ. Даетъ ягоду величиною съ горошину, почти чернаго цвѣта, покрытую синеватымъ налетомъ, на вкусъ кисловатую, но пріятную. На почву не прихотливое растеніе, но любитъ тѣнь; размножается сѣменами. Ягоды употребляются въ пищу свѣжія и сушенныя; кромѣ того идутъ на подкраску винъ и употребляются въ медицинѣ, противъ разслабленія желудка. Растетъ преимущественно въ еловыхъ лѣсахъ.

Другіе виды: *V. uliginosum*. *Голубика*. *Гонобобель*. Маленькій, всегда зеленѣющій кустарникъ. Любитъ влажныя мѣста; съ бѣлыми и розовыми, шаровидными цвѣтами, съ голубыми, довольно крупными ягодами. Утверждаютъ, что эта ягода имѣетъ опьяняющее свойство.

V. vitis idaea. *Брусника*. Маленькій, всегда зеленѣющій кустарникъ, съ ползучимъ стеблемъ. Даетъ маленькія, совершенно красныя ягоды, очень пріятнаго, кисловатаго вкуса. Употребляется въ пищу и въ медицинѣ. Любитъ холодный климатъ, сухую, песчаную или лѣсную почву и открытое, незатѣненное мѣсто. Имѣетъ листья постоянно зеленые, а потому разводится въ оранжереяхъ, для букетовъ. Производитъ цвѣтки бѣлые, съ краснымъ отливомъ. Размножается сѣменами: ихъ высѣваютъ смѣшанныя съ пескомъ, въ плошки, въ рыхлую торфяную или вересковую землю. Поливается очень осторожно, черезъ сито. Плошки ставятся въ холодный парникъ или оранжерею. По всходѣ, растеніе

разсаживается также въ плошку съ такою же землею, а потомъ пересаживается въ маленькіе горшки, и когда достаточно окрѣпнетъ высаживаютъ въ грунтъ.

Извѣстны также слѣдующія породы *американскаго брусничника*:

V. pencilvanicum. *В. пенсильванскій* употребляется въ пищу.

V. stamineum. Съ бѣлыми цвѣтами.

V. macrocarpon.

V. corymbosum. Употребляется въ пищу.

V. frondosum. *В. кудрявый.*

V. resinosum. *В. смолистый.*

V. arboreum. *В. древовидный.*

V. oxycoccon. *Клюква.* Маленькій кустарникъ, всегда зеленѣющій; любитъ болотистую, мшистую мѣстность. Ягоды съ крупную горошину, темно-красныя, пріятнаго кислаго вкуса, употребляется въ пищу въ различныхъ видахъ.

Разновидности: **O. palustris.**

V. o. macrocarpa. Ягоды вдвое крупнѣе обыкновенной клюквы.

1785. Valeriana alba. *Валериана бѣлая.* Однолѣтнее садовое растеніе, съ красными или бѣлыми цвѣтами; сперва высѣвается въ парникъ, а потомъ высаживается въ грунтъ; на почву не прихотливо; цвѣтеть съ Іюня по Октябрь.

Другіе виды: **V. coccinea.** **V. rubra.** *В. красная.* **V. congesta.** Содержатся въ оранжевѣхъ.

Дикорастущіе виды:

V. officinalis. *В. аптечная.* *Маунз.* Многолѣтнее, медоносное растеніе; цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ. Корень его употребляется въ лекарствахъ. Любитъ влажное, тѣнистое мѣсто.

V. Phu. *Земляной ладонъ.*

V. exaltata. *Cepniŭ.*

1786. Valerianella olitoria. V. carinata. *Салатъ. Рануніель. Салатъ полевой. С. дикій.* Имѣетъ обыкновенное употребленіе.

Лучшіе сорта: Обыкновенный съ мелкими листьями; большой широколистный; голландскій и большой итальянскій. На почву не прихотливъ; высѣвается въ половинѣ Іюня, пря-

мо на гряды — для осенняго употребленія, и въ Сентябрѣ для употребленія раннею весною, лишь стааетъ снѣгъ. Для употребленія молодымъ, срѣзывается у корня.

1787. *Vallisneria spiralis*. Весьма пригодно для акваріевъ. Имѣеть прозрачные, длинные, лентообразные листья, находящіеся подъ водою.

1788. *Vallota purpurea*. Оранжевейное растеніе.

1789. *Vanda*. Весьма красивая тепличная Орхидея; можетъ цвѣсти въ комнатѣ; довольно длинный стебель ея даетъ воздушные корни; производитъ большіе, душистые, цвѣты бѣлые, голубые, желтые или розовые съ крапинками. Зимой содержится почти сухо, причемъ изрѣдко только, обрызгиваютъ его корни. Стебли этого растенія, вмѣсто того, чтобы ихъ привязывать къ палкамъ, прикрѣпляютъ мѣдною проволокою къ узкой, обугленной доскѣ, однимъ концомъ укрѣпленной въ горшокъ, въ которомъ сидитъ растеніе. Корни Ванды обкладываютъ бѣлымъ мхомъ; требуетъ листовную землю, смѣшанную съ половиною вересковой. Размножается черенками, срѣзанными съ нѣсколькими воздушными корнями.

Виды: **V. Batemanni.** Большая кисть цвѣтовъ желтыхъ, испещренныхъ краснымъ, съ изнанки красныхъ.

V. suavis hrubiana. Великолѣпная Орхидея, съ большимъ листомъ и кистью крупныхъ цвѣтовъ, съ изнанки бѣлыхъ, малиново-пестрыхъ снаружи, съ малиновою нижнею губою.

V. tricolor. Цвѣты желтые, испещренные темно-малиновымъ; нижняя губа темно-фіолетовая.

V. Roxburghii. Превосходные цвѣты, бѣлые съ тыльной части и ярко-расписные коричневымъ, желтымъ и бѣлымъ — съ лицевой стороны.

V. densiflora. Съ прелестною, большою кистью бѣлыхъ съ желтымъ и фіолетовыхъ цвѣтовъ.

V. Lowei. V. gigantea. V. insignis. V. teris. V. coerulea. Съ лиловыми цвѣтами.

V. cristata. Содержится въ самомъ тепломъ отдѣленіи теплицы, во влажной атмосферѣ. Цвѣтетъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ. Весною и лѣтомъ требуетъ затѣненія. Сажаютъ его въ

сквозной горшокъ, въ свѣжій, торфяной мохъ, къ которому прибавляютъ бѣлаго, рѣчнаго песку и нѣсколько кусковъ древеснаго угля, съ малымъ количествомъ волокнистой, глинисто-дерновой земли.

V. denisoniana. Новая разность, найденная въ горахъ Бирманіи. Одна изъ лучшихъ тепличныхъ Орхидей, нѣжно-бѣлая съ розовыми крапинами по верхней губѣ.

1790. Vanilla. Тепличная Орхидея можетъ цвѣсти въ комнатѣ, будучи поставлена на южную сторону, съ большими душистыми бѣлыми или бѣлыми съ зеленымъ цвѣтами. Плоды этого растенія, въ видѣ длинныхъ, тонкихъ стручьевъ, весьма ароматическихъ, извѣстны въ продажѣ подъ именемъ „ванили“ и употребляютъ какъ пряность. Размножается черенками. Требуется листовую землю пополамъ съ вересковою. Растеніе сажается прямо въ землю; помѣщается, большею частію, у стѣны.

Виды: **V. phabenopsis.** Цвѣтокъ бѣлый и оранжевый внутри зѣва.

V. aromatica. V. plenifolia. V. viridis. V. guyanensis.

1791. Veitchia. Biihia. Родъ Пальмъ, съ гладкимъ стволомъ, достигающимъ до 60 футъ. Размножается отдѣленіемъ дѣтокъ, когда у нихъ уже образовался хотя одинъ корешокъ. Отсадокъ держится въ тепличѣ.

Виды: **storckia. V. Iohannis. V. globosa. V. spiralis. V. canterburyana. (Kentia canterburyana).**

1792. Veltheimia capensis. Оранжевое растеніе.

Другой видъ: **V. viridifolia.**

1793. Veratrum viride. Чемерица зеленая. Изъ семейства Liliaceae. Многолѣтнее садовое растеніе, зимуетъ на открытомъ воздухѣ; имѣетъ черный корень, отчего и получило свое названіе. (*vere* — настоящій, *ater* — черный).

Другіе виды: **V. nigrum.** Ч. черная. Съ темно-бурыми цвѣтами.

V. album. Ч. бѣлая. Съ бѣлыми цвѣтами. Корневище употребляется въ лекарствахъ, но въ большихъ приѣмахъ — ядовито.

1794. Verbascum blattaria. *Кнафликъ.* Изъ семейства *Scrophularineae*. Многолѣтнее грунтовое, садовое растеніе.

Другіе виды: *V. nigrum.* *Коровякъ черный.*

V. tapsus. *Царская свѣча.* Дикорастущее, двухлѣтнее, медоносное и лекарственное растеніе. Съ желтыми цвѣтами, цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ, любитъ сухую, песчаную почву. Стебли его замѣняютъ лучину, какъ освѣтительный матеріаль.

V. bastardii. *Коровякъ Бастарда.*

V. montanum. *К. горный.*

V. phoeniceum. *К. красный,* съ темно-фіолетовыми цвѣтами. Двухлѣтнее, размножается только сѣменами, которыя весною высѣваютъ въ плошки, слегка прикрывая сѣмена пескомъ или нѣжною землею. До всхода посѣвъ держать въ прохладномъ мѣстѣ, подъ стекломъ. На зиму ставить въ оранжерею. Вообще любить солнечное мѣсто и рыхлую, нѣсколько песчаную почву.

V. Lychnitis. *Кулиникъ.* Дикорастущее.

1795. Verbena. *Вербена.* Семейство *Verbenaceae*. Одно изъ самыхъ красивыхъ садовыхъ растений, имѣетъ много весьма разнообразныхъ разновидностей. Вербена въ сущности многолѣтнее растеніе, но разводится преимущественно какъ однолѣтнее; сѣется въ началѣ Марта въ умѣренной теплицѣ и вскорѣ послѣ всхода разсаживается въ горшки, въ смѣсь глины съ лѣсною землею. Разсаженная Вербена ставится на солнцѣ, когда укрѣпится высаживается въ грунтъ или оставляется въ горшкахъ для украшенія террасъ и балконовъ. Вербену можно разводить черенками. Производитъ цвѣты алые, розовые, бѣлые, синіе, малиновые, пунцовые, лиловые и даже пестрые.

Чтобы продолжить цвѣтеніе Вербенъ до Ноября, срѣзаютъ ихъ въ Іюль или Августѣ, даютъ имъ обильное питаніе и съ Сентября держать ихъ подъ стекломъ на воздухѣ.

Будучи посажены осенью въ горшки, взятая изъ грунта, Вербена успѣшно выдерживаетъ зиму въ оранжерей при весьма умѣренной поливѣ и достаточномъ свѣтѣ, затѣмъ цвѣтетъ весною, а высаживается въ грунтъ образуетъ превосходный, покрытый цвѣтами кустъ.

Однолѣтніе виды: *V. aublita.* Съ фіолетово-пурпуровыми цвѣтами.

V. buonariensis. V. pulchella.
V. erinoides. Съ лиловыми цвѣтами.
V. chamaedrifolia. Суриково-красные цвѣты.
V. teucrioides. Съ бѣлыми, пушистыми цвѣтами.
V. tenera. B. итальянская. Цвѣтокъ мелкій малиновый съ темнымъ.

V. melindres. V. incisa.
V. venosa. V. officinalis. Желтзнякъ.

Многолѣтніе виды:

V. Defiance или *Mistriss Wodroff.* Съ ярко-красными цвѣтами.

V. favorite. Съ душистыми, темно-фіолетовыми, съ бѣлою серединою, цвѣтами.

V. Lord Raglan. Съ амарантово-красными цвѣтами.

V. Marie Mardner. Цвѣты бѣлые, съ малиновымъ глазкомъ.

V. princesse Marianne. Бѣлый цвѣтокъ съ розовою полоскою на каждомъ лепесткѣ.

V. Mahonette или *princesse Elisabeth.* Цвѣты лиловые съ бѣлымъ.

V. Blue Boq. Съ душистыми голубыми цвѣтами.

1796. *Vernonia axillaris.* Тепличное растение съ свѣтло-фіолетовыми цвѣтами, распускается въ Ноябрь и Декабрь.

1797. *Veronica syriaca.* Дубравка. Изъ семейства *Scrophulariaceae.* Однолѣтнее растение съ синими цвѣтами. Сперва высѣвается въ парникъ, потомъ высаживается въ грунтъ.

Многолѣтніе виды грунтовой садовой *Вероники:* *V. australis.*

V. gentianoides. B. горечавколистная.

V. gentianoides variegata.

V. nitida alba.

V. serratifolia.

V. teucrium. V. verticillata.

V. virginica. B. виргинская.

V. officinalis. B. аптечная. Лезжанка. Имѣетъ лекарственные свойства.

V. spicata. B. колосистая. Цвѣтетъ въ Іюнь, бѣлыми или розовыми цвѣтами, на почву не прихотливо.

V. elegans. Съ синими цвѣтами.

V. hirsuta fol. variegatis. Съ бѣло-узорчатыми листьями и фіолетовыми цвѣтами.

V. incana. Съ голубыми цвѣтами; разводится въ цвѣтникахъ за его пестрые листья.

Дневораствующие виды:

V. anagallis. Ключевая.

V. B. officinalis. Лекарственная. Лежанка. Многолѣтнее, медоносное растеніе цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

V. Baccabunga. Порченная помощь. Цинготная трава. Многолѣтнее растеніе, разводится на огородахъ, для употребленія въ пищу раннею весною.

V. longifolia. Змѣйки.

V. latifolia. Змѣиная головка.

V. chamaedrys. Грызня. Дубровка. Съ ярко-голубыми цвѣтами, раскрытыми въ Маѣ и Іюнѣ.

Оранжевые виды: *V. speciosa.* Красивѣйшій видъ, съ сине-фіолетовыми цвѣтами, столбикомъ, раскрытыми всю осень. Требуется легкую землю, съ примѣсью нѣкотораго количества гуано и частой пересадки, все въ большій и большій горшокъ, причемъ съ величайшею осторожностью надлежитъ обращаться съ корнемъ, чтобы его не попортить. Любитъ сильную поливку лѣтомъ, но при этомъ надлежитъ предохранять корень отъ гніенія. Тщательно очищается отъ нападающей на него бѣлой вши и лѣтомъ держится на воздухѣ, въ затѣненномъ, нѣсколько влажномъ мѣстѣ.

V. speciosa rubra. Цвѣты пунцовые.

V. parviflora angustifolia. Цвѣты блѣдно-лиловые, въ густыхъ, колосовидныхъ метелкахъ.

V. Lindleyana. Вѣтвистый кустъ. Цвѣтокъ бѣлый—колосомъ. Лѣтомъ содержится въ грунтѣ; будучи воспитываемо въ горшкахъ, можетъ прозимовать въ парникѣ.

V. Andersoni. Цвѣты лиловые, у основанія желтовато-бѣлые.

V. atropurpurea. *V. formosa.* *V. Forstieri.* *V. Mamouth.* *V. meldensis.* *V. rubra splendida.* *V. Turneri.* *V. variegata.* *V. verschaffeltii.*

1798. *Verschaffeltia melanochaetes*. Тепличная, весьма красивая Пальма, со стеблемъ, усаженнымъ черными иглами. Размножается сѣменами.

1799. *Vesicaria*. Низенькое, однолѣтнее растеніе, сѣется прямо въ грунтъ, въ Маѣ, любитъ песчаную почву.

Виды: *V. gracilis*. Съ золотисто-желтыми цвѣтами.

V. oculata. *V. o. alba*. *V. o. hybrida*. *V. o. h. nana*.

V. o. cardinalis. *V. o. elegans picta*.

1800. *Vestia lycioides*. Изъ семейства *Solanaceae*. Оранжевейное растеніе съ желтыми цвѣтами, похожими формою на цвѣтокъ Фуксiи. Легко размножается сѣменами и черенками.

1801. *Vieusseuxia glaucopis*. Оранжевейное растеніе, изъ семейства *Iridaceae*. Цвѣты бѣлые съ синимъ пятномъ, отороченнымъ малиновымъ, на каждомъ лепесткѣ. Требуется той же культуры что *Ixias*.

1802. *Viburnum*. *Гордовина*. Семейство *Viburneae*. Кустарникъ съ гибкими вѣтвями, разводимый для украшенія садовъ и парковъ. Размножается корневыми отпрысками и черенками, но преимущественно сѣменами, высѣваемыми въ грунтъ осенью или весною. Сѣмена, предназначенныя къ посѣву весною, на зиму пересыпаются слоями песку. Любитъ влажную почву и тѣнистую мѣстность.

Виды: *V. dahuricum*. Бѣлые цвѣты, имѣющіе трубчатую, обратно конусовидную форму, чѣмъ и отличается отъ другихъ видовъ, весьма трудно выдерживаетъ нашу зиму, даже съ покрывкою.

V. dentatum. *Калина зубчатолистная*. Американскій кустарникъ. Листья съ большими зубчиками. Бѣлые цвѣты и круглыя, синія, ягоды.

V. Lantana. *Гордовикъ*. Красивый кустарникъ, растетъ скоро, съ бѣлыми цвѣтами и въ началѣ красными, потомъ черными ягодами. Изъ вѣтвей его дѣлаютъ чубуки, а изъ корней добываютъ птичій клей.

V. lantana flore pleno. Съ махровымъ цвѣткомъ.

V. lantana minor. *V. alnifolium*. *V. lantanoides*. *V. macrophyllum*. *V. montanum*.

V. opulus. *Бумденежъ*. Махровая калина, съ весьма кра-

сивыми бѣлыми цвѣтами. Можетъ быть доведено до цвѣтенія раньше Рождества, съ этою цѣлью, растенію дается большой сосудъ и оно обрѣзывается до крѣпкихъ глазковъ, начиная съ ранняго возраста; чтобы сдѣлать изъ растенія крону, оставляютъ одинъ годовой побѣгъ и обрѣзываютъ его, когда онъ превзойдетъ желаемую величину; если же такового побѣга не окажется, срѣзываютъ весь кустъ, до самаго грунта, послѣ чего пойдутъ прямые и хорошіе побѣги.

V. prunifolium. *К. сливолистная*, съ продолговатыми листьями.

V. pygmaeum.

V. pyrifolium. *К. грушелистная*. **V. tinus.** *Шамшитъ*. Дикое лавровое дерево. Съ бѣлыми цвѣтами. На зиму хорошо покрывается. Листья и молодые побѣги служатъ противозолотушнымъ средствомъ; съ цвѣтовъ его, въ Маѣ и Іюнѣ, пчелы берутъ взятокъ. Разводится исключительно отводками.

V. oxycoccos. Похоже на обыкновенную калину, съ красными, похожими на клюкву ягодами, у насъ въ пищу не употребляется.

V. edule. *Калина съдобная*. Похожа на предыдущую, но листья короче.

V. orientale. Съ большими листьями и маленькими, бѣлыми цвѣтами; зимуетъ въ грунту только при весьма надежной защитѣ; родина его Кавказъ.

V. acerifolium. Кустарникъ. Листья съ нижней стороны покрыты волосками, а листовые черешки въ молодости покрыты пушкомъ.

V. burejaticum. Кустарникъ въ 20 футъ вышины; растетъ на Амурѣ.

V. nudum. Американскій кустарникъ, съ маленькими бѣлыми цвѣтами.

V. lentago. Съ такими же цвѣтами и овальными, черносиними ягодами; выносить зиму безъ покрывки.

V. macrocephalum. Съ огромнымъ букетомъ бѣлыхъ цвѣтовъ, похожими на цвѣтокъ Гортензіи. Любитъ легкую садовую землю.

V. plicatum. Съ большими букетами бѣлыхъ цвѣтовъ. Выдерживаетъ зиму въ грунту, въ которомъ не любитъ влаж-

ности; размножается черенками и молодыми отпрысками от борня.

Оранжевые виды:

V. grandiflorum. *V. japonicum*. *V. sinense*.

V. suspensum. Съ пестрыми листьями.

V. Tinus fol. varieg. Содержится лѣтомъ на воздухѣ, гдѣ образуетъ осенью почки. столь развитыя, что если ихъ поставить въ тепло, могутъ зацвѣсть во всякое время зимы. Пересаживается только въ такомъ случаѣ, если слишкомъ вяло.

V. odoratissimum. Душистые листья его Китайцы подмѣшиваютъ въ чай.

1803. *Vicia faba*. Бобы. Однолѣтнее вьющееся растеніе, разводимое на огородахъ, зерна имъ производимыя, употребляются въ пищу сырыми или различнымъ способомъ приготовленными. Сажается прямо въ грунтъ, въ концѣ Апрѣля, на гряды шириною въ 1½ аршина и длиною въ 10 сажень, 2 фунта сухихъ сѣменъ. Большею частью, въ огородахъ если не имѣютъ въ виду разведенія бобовъ въ большемъ количествѣ, ихъ сажаютъ по краямъ грядъ съ морковью, свеклою и тому подобными овощами. Бобы не разборчивы на почву, они способны расти даже на тяжелой глинистой землѣ, но лучше родятся на старо-удобренной почвѣ. Послѣ всхода ихъ окучиваютъ. Когда нижніе цвѣтки распускаются, срѣзываютъ верхушку стебля, преимущественно для предохраненія отъ вшей, которыя сильно нападаютъ на это растеніе и заводятся въ его верхушкѣ. Чтобы имѣть постоянно молодые бобы, ихъ сажаютъ на нѣсколькихъ грядкахъ, каждый мѣсяцъ съ Апрѣля по Іюль. Почва вокругъ бобовъ разрыхляется и окучивается. На сѣмена оставляютъ потребное число растеній, съ которыхъ не срываютъ стручьевъ, пока совершенно не созрѣютъ.

Лучшіе виды бобовъ: *Малые Мацганскіе*, самые плодовые и ранніе, ими преимущественно обсаживаютъ гряды.

Винзорскіе большіе—самые крупныя.

Монархъ. Лейденскіе. Велозскіе. Майландскіе зеленые. Весьма нѣжные и плодовые; будучи высушены остаются зелеными.

Эрфуртскіе. Самые вкусныя, если ихъ употреблять молодыми.

Imperial. Низкорослыя.

Другіе виды: *V. serpum*. *Горохъ журавлиный*. *Горошекъ призаборный*. Дикорастущее, медоносное, многолѣтнее растеніе, цвѣтетъ среди лѣта.

V. sativa. *Мышиный горохъ*. *Вика*. *Кормовой горохъ*. Медоносное, дикорастущее растеніе, разводится какъ кормовая трава.

V. angustifolia. *Воробинный горошекъ*. Дикорастущее.

1804. *Victoria regia*. Такъ названа въ честь Англійской королевы Викторіи. Тепличное растеніе изъ семейства кувшинокъ (*Nymphaeaceae*); зимою сберегается въ сыромъ илѣ, а весною ставится въ воду. Отличается огромностью и красотою. Цвѣты снаружи бѣлые, внутри розовые достигаютъ 1 футъ въ діаметрѣ. Цвѣтутъ два дня, распускаясь около 8 часовъ вечера и закрываясь на слѣдующее утро. Для помѣщенія этого цвѣтка въ ботаническихъ садахъ строить особыя зданія.

1805. *Villaressia grandifolia*. Тепличное однолѣтнее растеніе, требуетъ сильной дерновой земли, смѣшанной съ лиственной.

1806. *Vallisneria spiralis*. Вѣчно зеленое, водяное растеніе, нѣкоторымъ образомъ, какъ бы необходимое для акваріумовъ. Его сажаютъ на дно акварія въ небольшихъ эземплярахъ. Длинные лентообразные листья этого двудомнаго растенія, сидятъ очень густо; спиральныя стебли женскаго цвѣтка, когда онъ, получивъ окончательное развитіе, сдѣлается способнымъ въ оплодотворенію, вытягиваясь понемногу, выносятъ цвѣтокъ на поверхность воды; въ это время плодотворная пыльмужскихъ цвѣтковъ, сидящихъ на короткомъ стеблѣ, окончательно созрѣвъ, отдѣляется отъ лопающихся пыльниковъ, поднимается на поверхность воды и, встрѣчаясь съ женскими цвѣтками, оплодотворяетъ ихъ.

1807. *Vinca*. *Барвинокъ*. Изъ семейства *Aprocynaeae*. Кустарничекъ съ нитеобразными, гибкими стеблями. Можетъ расти въ грунту, но зимою требуетъ надежной покрышки.

Виды: *V. herbaceae*. Съ фіолетовыми цвѣтами. Въ оранжереѣ цвѣтетъ въ Февралѣ.

V. herbacea fol. varieg. *Пестролистный Барвинокъ*.

V. major. *Б. великій*. *Б. раевый*. Съ синими, фіолетовыми или бѣлыми цвѣтами.

V. m. fol. variegatis. Пестролистный.

V. minor. *В. малый.* Съ синими, лиловыми, красными или бѣлыми цвѣтами.

V. m. fol. variegatis. *Малый пестролистный Барвинокъ.* При хорошей покрывкѣ, зимующее въ грунтѣ растеніе, весьма пригодное для многолѣтняго бордюра. Ползучіе, короткіе его побѣги, образуютъ сплошной дернъ, дающій весною множество голубыхъ цвѣтовъ. При появленіи молодыхъ, старые стебли вырѣзаются, также и тѣ вѣтви, въ которыхъ преобладаетъ зеленый цвѣтъ. Не терпитъ частой пересадки. При первоначальной посадкѣ его сажаютъ плотнѣе и весною, послѣ вырѣзки старыхъ побѣговъ, присыпаютъ листовой землей.

V. rosea. *В. розовый.* Цвѣтетъ почти всю зиму; для этого его сѣютъ въ Маѣ, лѣтомъ выращиваютъ въ парникѣ, а зимою держать близъ окна оранжереи во влажномъ воздухѣ, въ легкой, но питательной землѣ и тщательно предохраняютъ отъ нападенія красного паучка.

1808. Vincetoxicum officinale. *Чертова борода.* Дикорастущее.

Другой видъ: **V. sibiricum.** *Полевой огурецъ.* Тоже.

1809. Viola tricolor. Семейство *Violariae.* *Иванъ да Марья.*

Анютины глазки. **Viola** — *фіалка.* Въ сущности растеніе многолѣтнее, но разводится и какъ однолѣтнее; сѣется въ Мартѣ въ парникъ или оранжерею; потомъ высаживается въ грунтъ. Бываютъ только тогда вполне хороши, когда перезимуютъ, а потому лучше поступать такимъ образомъ: сѣять въ Іюнѣ или Іюлѣ, въ хорошую землю, на грядѣ; когда всходы будутъ имѣть два листа, ихъ разсадить шире, тоже на грядѣ; отсюда въ Августѣ или въ началѣ Сентября, либо самую раннюю весною, съ комомъ высадить въ цвѣтникъ.

Если растеніе съ развившимися почками, въ октябрѣ высадить въ горшки, въ глинистую, жирную землю, то они будутъ цвѣсть всю зиму.

Viola можетъ быть разводима дѣленіемъ корней и черенками. Землю требуетъ, составленную изъ лиственной пополамъ съ навозною, съ примѣсью четвертой части навознаго перегноя и четвертой части песку. Цвѣты бываютъ разныхъ цветовъ, даже махровые; самые цѣнные для любителей—чисто-желтые, безъ малѣйшей разрисовки.

Вобстз, въ журналѣ Россійскаго Общества Любителей Садоводства, за 1864 годъ, кн. XII, предполагаетъ слѣдующій способъ ухода за *Анютиными глазками*.

Для сада. Высѣвается въ началѣ Марта въ плошки съ легкою землею, присыпая сѣмена на столько, чтобы только покрыть ихъ, ставятъ въ тепло и поддерживаютъ постоянную влажность. Лишь появятся всходы ихъ разсаживаютъ въ мелкіе ящики, въ смѣсь дерновой и лиственной или навозной земли и ставятъ ближе къ стекламъ, въ холодной оранжереѣ. Въ началѣ Апрѣля эту рассаду ставятъ въ полутеплый парникъ и часто его провѣтриваютъ, когда же саженцы подрастутъ и окрѣпнутъ ихъ разсаживаютъ на гряды, на солнечномъ, защищенномъ отъ вѣтра мѣстѣ. Въ концѣ Мая когда покажутся цвѣточные почки, растеніе пересаживаютъ стуломъ на назначенное имъ мѣсто, въ цвѣтникъ, на открытое мѣсто, но не на припекъ, въ рыхлую глинистую почву, съ примѣсью совершенно перегорѣвшаго коровьяго, конскаго или голубинаго навоза. При сухой погодѣ *Анютины глазки* требуютъ сильной поливки, тщательнаго опалыванія и разрыхленія вокругъ ихъ земли.

Для горшковъ. Первоначально растеніе выводится и содержится вышеуказаннымъ порядкомъ, когда-же закусится и начнетъ цвѣсть, его вынимаютъ стуломъ изъ гряды и сажаютъ въ 3 или 3½ вершковыя горшки, въ смѣсь трехъ частей дерновой и одной части лиственной земли, съ примѣсью голубинаго помета, роговыхъ опилокъ или толченаго угля. Горшки сильно поливаются, зарываются въ гряду на открытое мѣсто или ставятся на землю и промежутки между ними набиваются мхомъ.

Въ торговлѣ извѣстны слѣдующіи разновидности *Анютиныхъ глазокъ*:

Черно-цвѣтная Фауста. Англійскія крупно-цвѣтныя. Полосатыя. Пестрыя. Фиолетовыя съ бѣлою коймою. Пеларгонисвидныя. Баронъ Ротшильдъ. Съ пятью пятнами.

Другіе виды *Viola*:

V. odorata. Душистая Фіалка. Первый прелестный фіолетовый цвѣтокъ, распускающійся весною въ нашихъ лѣсахъ. Многолѣтнее растеніе дикорастущее и разводимое въ садахъ.

Въ спальнѣ на ночь не слѣдуетъ оставлять букеты фіалокъ, такъ какъ отъ ихъ сильнаго запаха болить голова.

Нѣкоторые виды этого растенія требуютъ надежной покрышки на зиму, а именно:

V. odorata alba plena. Махровая.

V. o. coerulea plena.

Тоже. *lilacina, rubra, arborea.* *V. o. arborea* Brandyana. *V. o. Czar.*

V. capillaris. Оранжевейное растеніе съ голубоватыми цвѣтами. Любитъ на половину листовую землю съ пескомъ и черноземомъ. На лѣто высаживается въ грунтъ. Размножается черенками, на которые употребляются полуодревѣнѣлыя побѣги.

V. altaica. *Фіалка алтайская.* Съ большими темно-фіолетовыми цвѣтами, можетъ цвѣсти въ горшкѣ почти всю зиму, для этого ее сажаютъ въ Іюль, въ питательную землю, срѣзываютъ цвѣточный стебель и держать въ тѣни до морозовъ.

V. cornuta. Съ голубыми цвѣтами, распускается глубокою осенью.

Наиболѣе пригодно для поздняго цвѣтенія, посѣянное въ Апрельъ или Маѣ.

V. mirabilis. *Маткина душка.* Многолѣтнее растеніе, разводимое въ садахъ.

Разновидности его: *V. m. cuculata.* *V. m. obliqua striata.*

V. canina. *Подльсокъ.* Дикораствующее.

V. arenaria. *Поднимокъ.* Тоже.

V. hirta. *Васелечекъ.* Тоже.

1810. *Virgilia intrusa.* Оранжевейное растеніе.

1811. *Viscaria.* *Вискарія.* Однолѣтнее, грунтовое растеніе, употребляемое въ цвѣтникахъ преимущественно для бордюровъ.

Виды: *V. oculata.* Высѣвается въ Мартѣ. *V. o. cardinalis.* *V. o. alba* съ бѣлыми цвѣтами.

V. elegans picta. Красивая разновидность съ ярко-розовыми и блѣдно-розовыми, весьма обильными цвѣтками.

V. vulgaris. *Смолка.* *Bourbonais.* *Сонг-трава.* *Сонюла.* *Дрема.* Дикораствующее въ лѣсу, съ розовыми цвѣтами. По народному повѣрью нагоняетъ сонъ.

1812. *Viscum album*. *Омела*. Изъ семейства *Loronthaceae*. *Parasiticeae*. Чужеродное, дикорастущее на большихъ деревьяхъ растеніе, въ видѣ густаго кустика. Главный стволъ его раздѣляется на двое, каждая вѣтвь опять надвое и т. д.

1813. *Visnago*. Однолѣтнее садовое растеніе, не заслуживающее разведенія.

1814. *Vitex agnus castus*. *Прутникъ*. Дикорастущее, по содержать и въ оранжереѣ. У древнихъ грековъ пользовалось особымъ уваженіемъ, какъ эмблема цѣломудрія.

1815. *Vitis*. *Виноградъ*. Изъ семейства *Sarmentaceae*. Лозовыхъ. Вьющійся кустарникъ съ мелкими, душистыми цвѣтами; размножается черенками, отводками и сѣменами. Требуется лиственную землю, съ примѣсью четвертой части дерновой. Употребляется для закрытія бесѣдокъ, заборовъ и тому подобнаго. Можетъ расти и въ комнатѣ, причѣмъ на зиму ему надлежитъ давать отдыхъ, постепенно уменьшая поливку до Ноября въ Ноябрь и Декабрь, растеніе держать почти сухо, а съ Января опять начинаютъ поливку, постепенно ее увеличивая. Сидящее въ грунтѣ растеніе, на зиму надлежитъ закрывать.

Виды: *V. amuriensis*. Вновь вывезенный виноградъ изъ Амурскаго края. Растетъ быстро, осенью пригибается къ землѣ и зарывается ею; размножается осенью черенками; любитъ солнечную теплую мѣстность.

V. quinquifolia latifolia. Преимущественно пригоденъ для бесѣдокъ.

V. Rayleana. Очень нѣжный сортъ, не пригодный для сѣвернаго климата.

V. antaresica. Оранжерейное растеніе.

V. Thunbergii. Изъ Японіи. Оранжерейное растеніе. Въ Октябрѣ листья его, передъ отпаденіемъ принимаютъ великолѣпный ярко-красный цвѣтъ.

V. labrusca. Растетъ весьма быстро и употребляется для украшенія стѣнъ. Посаженное въ грунтъ осенью, пригибается къ землѣ и покрывается сухими листьями. Размножается осенью черенками; любитъ солнечную теплую мѣстность.

V. vinifera. *Виноградъ съидомый*. *Настоящій виноградъ*. Въ сѣверныхъ мѣстностяхъ на открытомъ воздухѣ не растетъ. Содержится въ особо устроенныхъ теплицахъ.

1816. *Vittadenia*. Однолѣтнее садовое растеніе, не заслуживаетъ разведенія.

1817. *Vriesia corallina*. *Коралловая Вриэзія*. Съ пунцовыми цвѣтами, тепличное многолѣтнее растеніе, любитъ песчанистую вересковую землю, съ примѣсью третьей части глинистой; лѣтомъ затѣняется и хорошо провѣтривается; размножается отдѣленіемъ укоренившихся побѣговъ.

1818. *Waitzia*. *Сухочивътъ*. Однолѣтнее содовое растеніе, съ красными золотисто-желтыми цвѣтами; уходъ за ними тотъ же, что и за *Rhodante*.

1819. *Wahlenbergia*. Однолѣтнее садовое растеніе не заслуживаетъ разведенія.

1820. *Wallichia*. Родъ Пальмъ. Тепличное растеніе можетъ существовать и въ комнатѣ; не имѣетъ стебля. Цвѣтетъ только разъ въ своей жизни; имѣетъ листья до 4 аршинъ длины, похожіе на хвостовыя перья рыбъ; цвѣты имѣютъ видъ большей желтоватой кисти; размножается сѣменами; зимою требуетъ умѣренной поливки; земля дается этому растенію дерновая, пополамъ съ листовенною, при небольшой примѣси песку.

Виды: *W. dentiflora*. Цвѣтокъ фіолетовый.

W. Dittichu. Болѣе замѣчательный видъ.

W. Caryotoides. *W. porphyrocarpa* *W. myriostigma*.

1821. *Warrea cyanea*. Орхидея. Съ большими чисто-бѣлыми цвѣтами, съ лиловымъ или фіолетовымъ. Воспитывается какъ и прочія воздушныя Орхидеи.

1822. *Watsonia iridifolia* var. *fulgens*. Изъ семейства *Irideae*. Грунтовое растеніе съ огненно-красными цвѣтами. Сажаютъ въ началѣ Октября въ горшокъ, съ очень хорошимъ водооткомъ, въ смѣсь дерновой земли съ вересковою и ставятъ въ оранжерею. Когда совершенно прекратятся морозы, высаживаютъ въ грунтъ, когда отцвѣтетъ и листья начнутъ вянуть, бульбы вынимаютъ и просушиваютъ на вольномъ воздухѣ, до Октября. Сѣется весною; черезъ годъ, посѣянное растеніе цвѣтетъ.

1823. Weigelia. Вейгелія. Изъ семейства *Caprifoliaceae*. Кустарникъ, служащій для украшенія садовъ; на зиму вынимается изъ грунта и сохраняется въ простѣнѣхъ или подвалѣхъ. Любитъ землю, смѣшанную изъ лиственной, дерновой и перегнойной.

Виды: *W. amabilis*. Съ розовыми цвѣтами.

W. hortensis rubra. Съ пурпуровыми цвѣтами.

W. h. nivea. Съ чисто-бѣлыми цвѣтами.

W. isoline. Съ свѣтло розовыми цвѣтами.

W. intermedia. W. Middendorffii. W. rubra flava.

W. rosea. Оранжевое растеніе. Съ большими розовыми цвѣтами, на лѣто высаживается въ грунтъ.

W. amabilis striata. Съ бѣлыми, въ розовыхъ жилкахъ и разводахъ, цвѣтами.

W. van Huttei. У цвѣтка одинъ лепестокъ бѣлый, другой малиновый или бѣлый, съ малиновымъ.

W. Werschaffeltii. W. stelzeri. Съ пурпуровыми цвѣтами.

Будучи содержимо въ оранжереѣ, *Weigelia*, распускается очень рано.

1824. Welfia. Родъ Пальмъ. Съ гладкимъ стволомъ и двухлопастными листьями.

Виды: *W. regia*. Тепличная Пальма, съ Амазонской рѣки. Листья на маленькихъ черешкахъ, гладкіе, съ двулопастными лепестками и бронзовымъ отливомъ, въ первую пору развитія.

Другой видъ: *W. georgii*.

1825. Wellingtonia gigantea. Огромнѣйшее, американское хвойное дерево, достигающее 300 футъ высоты и 29 футъ въ поперечникъ; чрезвычайно величественное и красивое. Можетъ расти въ комнатѣ и притомъ очень скоро. Размножается сѣменами и черенками. Требуется вересковую землю съ примѣсью восьмой части лиственной и восьмой части дерновой земли. Зимой мало поливается и обыкновенно содержится въ оранжереѣ.

Другой видъ: *W. gigantea pendula*. Разновидность предидущей, имѣетъ вѣтви такъ наклоненны, что налегая другъ на друга, образуютъ плотную, коническую массу.

1826. *Wettinia*. *Веттинія*. Родъ Пальмъ. Колючіе корни этого растенія выходятъ изъ земли и подпираютъ высокій, нѣжный, голый стволъ съ перистыми листьями.

Виды: *W. augusta*. *W. maynensis*. *W. panamensis*.

1827. *Whitfieldia lateritia*. Тепличное кустарное растеніе, съ пунцовыми цвѣтами. Размножается черенками, на которые рѣжутъ концы вѣтвей, въ началѣ лѣта и держатъ ихъ подъ стекляннымъ колпакомъ. Любитъ тучную землю и умѣренную поливку.

1828. *Whitlavia grandiflora*. Изъ семейства *Hydrophyliaceae*. Однолѣтнее садовое растеніе вышиною въ футъ, покрытое желѣзистыми волосками. Производитъ темно-голубые цвѣты. Сѣется въ плошки, въ Апрѣлѣ и потомъ высаживается на солнечное мѣсто.

Другой видъ: *W. gloxinaeflora*.

1829. *Wigandia caracasana*. Изъ семейства *Hydroleaceae*. Весьма красивое оранжерейное растеніе; размножается сѣменами и черенками. Любитъ солнечную, защищенную мѣстность и сильную поливку во время роста. Даетъ нѣжно-голубые цвѣты съ желтыми тычинками и пестиками.

1830. *Wistaria*. *Вистарія*. *Haricot en arbre glycine*. Изъ семейства *Leguminosae*. Кустарникъ, служащій для украшенія садовъ; на зиму вынимается изъ грунта и сохраняется въ простѣнѣ или подвалѣ.

Виды: *W. chinensis*. Оранжерейное растеніе.

W. frutescens. Цвѣты свѣтло-фіолетовые съ желтою кистью.

W. Brachybotrys. Съ кистью фіолетовыхъ цвѣтовъ.

1831. *Witsenia*. *Витсенія*. Очень красивое оранжерейное кустовое растеніе, съ ярко-красными или желтыми цвѣтами; можетъ расти въ комнатѣ, но требуетъ тщательнаго ухода, постоянной и равномерной влажности; особенно надо быть къ нему внимательнымъ зимою, держать его ближе къ свѣту и давать ему отдыхъ, постепенно уменьшая его поливку. Разводится черенками, требуетъ землю, составленную изъ дерновой, вересковой и лиственной.

Виды: *W. corumbosa*. *В. щитковатая*. Съ голубыми

цвѣтами, въ холодной оранжереѣ, распускающимися въ Январѣ и даже осенью.

W. Maura. Цвѣты темно-фіолетовые съ желтымъ. Любитъ затѣненное мѣсто, размножается черенкомъ, на который употребляется молодой побѣгъ, его срѣзываютъ у колѣна, очищаютъ отъ листьевъ, не отрѣзывая, а отщипывая ихъ, черенокъ сажается въ маленькій горшечекъ съ бѣлымъ пескомъ и ставится подъ стеклянный колпакъ.

1832. Wolkensteinia Theophrasta. Прекрасное декоративное, тепличное растеніе; листья стерху ярко-зеленые; снизу блѣднѣе. Остаются нѣсколько лѣтъ. Даетъ желтые цвѣты. Любитъ рыхлую, глинистую, смѣшанную съ перегноемъ и пескомъ дерновую землю. Пока растеніе молодо и не дало еще сильнаго роста, поливается весьма осторожно и то только теплою водою. Цвѣтетъ въ Ноябрь. Размножается черенками.

1833. Wriesea glaucophylla. Изъ семейства **Bromeliaceae.** Тепличное растеніе, съ большимъ цвѣточнымъ, испещреннымъ желтыми, розовыми и красными крапинками — колосомъ, изъ котораго выходятъ голубые съ желтымъ цвѣты. Требуется той же культуры, что и **Aechmea.**

1834. Wrightia tinctoria. Индѣйское растеніе, изъ листьевъ его добывается вещество, похожее на индиго.

1835. Xanthium. *Колочка.* Дикорастущее.

Другой видъ: **X. strumarium.** *Дуркананъ.* Тоже.

1836. Xanthoceras sorbifolia. Изъ семейства **Tapindaceae.** Грунтовое растеніе, съ большимъ букетомъ бѣлыхъ, съ малиновою середкою, цвѣтовъ.

1837. Xanthorrhoea hostile. Изъ семейства **Asphodeleae anomalae.** Оранжерейное растеніе, представляетъ собою красивый видъ, подобный бьющему фонтану, съ большимъ цвѣткомъ въ видѣ столбика. Изъ этого растенія вытекаетъ смола, отчего оно и получило свое названіе. (**Xanthos** — желтый и **rheo** — истекать).

1838. Xanthosoma lindenii. Тепличное растеніе, съ стрѣловидными листьями.

1839. Xeran themum annum. *Сухоцветъ. Безсмертникъ.* Однолѣтнее, садовое растеніе, достигающее 2 футъ, съ бѣлыми или бѣлыми съ краснымъ цвѣтами, которые срѣзаютъ прежде чѣмъ они вполнѣ раскроются. Стебель и листья растенія покрыты бѣлымъ пухомъ. На почву не прихотливо. Высѣвается прямо въ грунтъ.

Другіе виды: **X. annum flore pleno albo.** Тоже — **flore rubro.** Тоже — **flore roseo.**

1840. Ximenesia encelioides. Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

1841. Xyphion junceum. Изъ семейства **Irideae.** Воздушное, грунтовое растеніе, съ золотистыми цвѣтами; растетъ на скалахъ Алжира, Марокко и Сициліи.

Другіе виды: **X. filifolium.** Многолѣтнее луковичное растеніе, съ фіолетовыми въ желтыхъ пятнахъ цвѣтами. Растетъ на открытомъ воздухѣ, въ грунтъ.

X. tingitanum. Луковичное растеніе съ большими, фіолетово-пурпуровыми цвѣтами, съ золотисто-желтымъ дискомъ.

1842. Yucca. Смотри—**Ioussa.**

1843. Zalacea. Родъ Пальмъ. Почти всѣ виды безъ ствола. Листовые черешки съ крѣпкими иглами, въ нѣсколько рядовъ. Въ нашихъ теплицахъ имѣется только одинъ видъ: **Z. Wageriana.** Размножается отдѣленіемъ дѣтокъ, когда у нихъ образуется корешокъ, причемъ молодое растеніице содержится въ теплицѣ.

1844. Zamia. Изъ семейства Цикадовыхъ. Тропическое растеніе, выдерживаетъ комнатную культуру. Листья до 2-хъ аршинъ длины. Цвѣты женскіе—въ видѣ еловой шишки,—мужскіе—пирамидою. Размножается сѣменами и отростками. Зимой поливается весьма умеренно. Требуешь землю, составленную изъ лиственной и дерновой, съ примѣсю половинной пропорціи песку. *Zamia* раздѣляются на: а) *Собственно zami.*

Разновидности ея: **Z. pugmea.** **Z. muricata.** **Z. integrifolia.**

б) *Макрозамія.*

Разновидности ея: **M. spiralis.**

M. fraseri. Съ узкими листьями.

в) *Цератозамія*.

Разновидности ея: *C. Mexicana*.

C. Kusteriana.

и г) *Лепидозамія*, изъ которыхъ замѣчательная разновидность *Peroffskyana*.

Въ каталогѣ у Вагнера мы находимъ слѣдующія *заміи*:

Z. altensteini. Можетъ содержаться въ оранжереѣ при 5—8° Р.

Содержатся въ теплицѣ: *Z. caffra*. *Z. concinna*. *Z. horrida*. *Z. lanuginosa*. *Z. furfuraceae*.

Существуетъ также оранжерейное, кустарное растение *Z. tenifolia*, съ ярко-зелеными, на бѣломъ основаніи, цвѣтами.

1845. *Zamioculcas Loddigesii*. Изъ семейства Ароидныхъ. Тепличное, многолѣтнее растеніе, съ зелеными, широкими чехлами.

1846. *Zantoxylum piperitum*. Японское растеніе, даетъ сѣмена, употребляемыя японцами вмѣсто перца.

1847. *Zauchneria californica*. Изъ семейства *Oenotheraceae*. Съ ярко-пунцовыми цвѣтами, похожими на Фуксію. Содержится въ болѣе широкомъ, чѣмъ глубокомъ, хорошо дренированномъ горшкѣ, въ оранжереѣ, или въ болѣе тепломъ климатѣ, въ грунтъ, у стѣны, при надежной крыше на зиму. Размножается безъ затрудненія черенками.

1848. *Z. mays*. *Кукуруза*. *Маисъ*. Одно изъ главныхъ хлѣбныхъ растений, съ питательными сѣменами, употребляемыми въ пищу въ различныхъ видахъ. Высѣвается прямо въ грунтъ, когда уже минуютъ утренники. Для ускоренія созрѣванія шишекъ, стебель послѣ цвѣтенія срѣзывается, надъ самымъ верхнимъ початкомъ.

Другіе виды: *Z. altissima*. Однолѣтнее садовое растеніе.

Z. mays foliis variegatis. (*Japonica*).

Пестролистная кукуруза. Однолѣтнее растеніе, съ серебряными полосами на листьяхъ. Въ нашемъ климатѣ не достигаетъ такой зрѣлости, чтобы дать сѣмена. Сажается въ горшки, которые ставятся въ парникъ и въ половинѣ Мая высаживается въ грунтъ, въ рыхлую, сильно удобренную почву. Достигаетъ 2-хъ аршинъ вышины; кустится съ самаго основанія

и представляет собою въ цвѣтникѣ роскошное декоративное растеніе.

Z. gigantea. *Исполинская кукуруза.* Достигаетъ 4-хъ аршинъ высоты; разводится въ садахъ какъ декоративное растеніе и требуетъ той же культуры, что и предыдущій видъ. Сажается въ Февралѣ въ горшки и потомъ высаживается въ грунтъ.

1849. *Zephyranthes candida.* Оранжевое растеніе.

1850. *Zichya.* Тепличное растеніе, съ бѣлыми, шарлаховыми или карминовыми цвѣтами. Распускается въ Мартѣ.

Виды: *Z. angustifolia.* *Z. floribunda.* *Z. Moly.* *Z. tricolor.* *Z. villosa.*

1851. *Zinia.* *Циния.* Изъ семейства *Compositae* — *senecionideae.* Однолѣтнее, садовое растеніе, можетъ существовать и въ комнатѣ. Имѣетъ множество разновидностей, цвѣты которыхъ, простые или махровые, представляютъ собою всѣ переходы отъ бѣлаго цвѣта къ красному, пурпуровому, темно фіолетовому и оранжевому. Сѣется въ парникъ, въ Мартѣ или въ плошки въ оранжереѣ. По всходѣ разсаживается по одиночкѣ въ небольшіе горшки, затѣмъ, когда хорошо укрѣпится, пересаживается въ грунтъ; часть оставляется для цвѣтенія въ горшкахъ, причемъ ихъ изрѣдка поливаютъ очень жидкимъ растворомъ навозной жижи. Требуется листовную землю пополамъ съ дерновою и съ примѣсью четвертой части навозной.

Виды, существующіе въ торговлѣ:

Z. elegans.

Ея разновидности: *Alba.* *Atroviolaceae.* *Aurea.* *Coccinea.* *Purpurea.* *Sulphurea.* *Alba plena* — махровая. *Atrococcinea plena.* *Atropurpurea plena.* *Aurantiaca plena.* *Carnea plena.* *Coccinea plena.* *Karmesina plena.* *Lilacina plena.* *Purpurea plena.*

Z. grandiflora.

Z. pumila plena. Карличковая.

Z. tagetiflora plena.

Z. species ex Mexico.

Z. Haageana. Съ желтыми цвѣтами.

Z. Haageana flore pleno. Махровая, съ темно-оранжевыми цвѣтами; цвѣтеть до самыхъ морозовъ; предварительно высадки въ грунтъ воспитывается въ горшкѣ.

Виды съ пурпуровыми цвѣтами:

Z. multiflora. Z. tenuiflora. Z. verticillata.

1852. **Zingiber.** *Инбирь.* Корневое, травянистое растеніе, съ душистыми листьями и цвѣтами, желтыми съ красными. Можетъ расти въ комнатѣ. Зимой требуетъ крайне умеренной поливки. Размножается дѣленіемъ корней. Требуется земля, составленную изъ торфяной, дерновой и лиственной. Корневище употребляется въ лекарство и какъ пряность.

Виды: **Z. officinale.** Корневище даетъ настоящій *инбирь*.

Z. Zerumbet. Корневище нынѣ употребляется только на родинѣ его.

Z. Chrysanthum. Z. Capitatum.

1853. **Zizyphus vulgaris.** *Унаби* у Грузинъ. Изъ семейства *Rhamnaceae*. Плодъ похожъ на мелкій финикъ.

1854. **Zoegea leptaurea.** Однолѣтнее цвѣточное растеніе.

1855. **Zygopetalum maxillare.** *Зигонеталонъ.* Бразильская эпифитная Орхидея. (См. культуру Орхидей статья *Ascypera*).

Другіе виды: **Z. cerinum.** Цвѣтокъ бѣлый. Верхняя часть зѣва темно-фіолетовая, нижняя — желтая.

Z. lacteum. Съ маленькими, бѣлыми цвѣтами.

Z. gautieri. *З. Готье.*

Z. intermedium. Прелестное растеніе. Ароматическій цвѣтокъ его имѣетъ бѣлую бородку и пять верхнихъ лепестковъ, зеленые, съ темно-фіолетовыми пятнами. Ползучее корневище его привязывается къ обугленному чурбану, съ толстою подстилкою торфяника или сажается въ плоскіе горшки, съ отверстиями. Въ горшокъ кладется торфяникъ, (мохъ), куски древеснаго угля и немного мелкаго песку. Корневище прикрѣпляется къ горшку крючками.

Z. Wallisi. Бѣлый цвѣтокъ съ малиновыми пятнами по
краямъ и малиновою губою.

Z. Mackayi. *Z. crinitum*.

1856. *Zygophyllum fabago*. Червогонникъ. Паромистникъ. Дико-
растущее, медоносное растеніе, цвѣтетъ лѣтомъ.

Другой видъ: *Z. morgsana*. Содержится въ оранжереѣ.



РАСТЕНІЯ,

НАЗВАННЫЯ ВЪ ЭТОЙ КНИГѢ ПО-РУССКИ.

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.
Абельмощъ	2	Акація	379
Абрикосъ.	1433	—	620
Абутильонъ	7	—	1491
Авинвонскія зерна.	1465	Аконитъ	25
Авкуба	219	Акулька	1571
Авранъ	867	Александрійскій листь	398
Аврикуля.	1428	Алой	8
Агава.	59	Амарантъ	97
Агапантъ	56	—	985
—	1066	Амариллисъ	97
Адамова голова.	614	Амурская дѣвица	646
— —	746	Ананасъ	294
Адамово дерево.	405	Ангелонія	133
Адамова смоква	1218	Анемонъ	130
Адамово яблоко	496	Анисъ	18
Адiantумъ	42	—	784
Адонисъ	43	—	1364
Азалея	222	Анютины глаза	1809
Аиръ	26	Апельсинъ	496
Айва	606	Араукарія	162
Акація	8	Арбузное дерево	387

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ под- рымъ значится въ книгѣ	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ под- рымъ значится въ книгѣ.
Арбузь	592	Бамбы стручья	930
Арбутусъ	163	Бананъ	1218
Ардизія	172	Баобабъ	35
Арека	169	Баранецъ	1111
Аренга	171	Баранки	839
Аржанецъ	86	Баранчикъ	1428
Арженіеъ	1377	Баранья трава	183
Аристема	177	Барбарисъ	248
Арника	183	Барвинокъ	1807
Аройникъ	189	Бархатникъ	97
Аронникъ	189	Бархатцы	1685
Артишоки	489	Бархерія	736
Артокaрпусъ	186	Бататъ	549
Астра.	202	Баульчикъ	145
Астрагалъ	204	Бапманка	614
Астрапeя.	206	Бапмачки красные	614
Асфадиль.	195	Бегонія	242
Афцелія	54	Бедренець	1423
Аханія	17	—	1364
Ахилея	19	Бедряна	606
Ахименесъ	1768	Безвременный цвѣтъ	526
—	20	Безплодная трава	432
Бабучникъ	59	Безплодный кустъ	126
Багрянникъ стручковатый	439	Безсмертникъ	27
Багульникъ	1045	—	717
Багунъ	1045	—	851
Баданъ	654	—	857
Базиліеъ простой	1259	—	907
Базовникъ	1526	—	1472
Баклажанъ	1610	—	1839
Бакунъ	1246	Бель-де-журъ	549
Бальзаминъ	976	Бековина	1525
Бамбуъ	228	Береза	254

НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ.	№ под- рамъ знача тъ книгѣ.	НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ.	№ под- рамъ знача тъ книгѣ.
Березка	549	Борецъ	25
Березовый ерникъ, сланецъ	254	—	545
Берескледъ	779	Боровикъ.	266
Берестъ	1773	Бородавникъ.	500
Бессъ.	749	Бородачъ.	127
Бетель	1368	Бородка царская	1197
Бирюзель.	559	Борщевникъ.	921
Бирючина	1065	Борщъ	921
—	1465	Боярка	578
Бирючыя ягоды.	591	Боярышникъ.	578
Благовонная трава. . . .	1048	—	1450
Благодать	867	Братолюбъ	1338
Бобовникъ	114	Браунколь	288
—	844	Бредина	1522
Бобровникъ	1625	Бредникъ	1522
Бобъ испанскій.	1336	Бріонія	301
Бобы	1336	Бровникъ	1266 ⁿ
—	1803	Броколь	288
Богатинка	974	Бромеліевыхъ семейство .	45
Богородичное зелье	69	Брундышка	309
Богородская трава. . . .	1725	Брунецъ	1616
Богорожникъ	578	Брусина.	1321
Бодлакъ	46	Брусленъ	779
Бодуй.	902	Брускъ	1506
Божія милость	867	Брусника	1784
Божье дерево	185	Брусничникъ американ- скій	1784
Бозъ дерево.	1526	Брюква	288
Болбанъ	1465	Бубенчикъ	1760
Болиголовъ	545	Будра.	843
Болотникъ	834	—	1242
—	126	Будакъ	385
Болотный пѣвникъ. . . .	1266 ⁿ	Бузина	1526
Болчанъ	1687		

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.
Бузина	1634	Василекъ	1259
Бузлакъ	584	—	1525
Буковица	253	Василисникъ	1708
—	1636	Васильки	638
Буксъ	318	—	1525
Букъ	783	Вахта	1174
Булдуха	15	Вейгелія	1823
Бульденежъ	1802	Венеринъ башмачекъ	614
Бурачекъ морской	95	Венерины волосы	42
Бурачникъ	273	Верба	716
Буркунчикъ	1158	—	1522
Буркунъ	1158	Вербейникъ	1114
Бурундукъ	1158	—	1377
Бутень	451	Вербена	1795
—	1550	Верблюжий хвостъ	379
Бутунъ	79	Верболозъ	1522
Бѣлая трава	422	Верескъ	738
Бѣлена	954	—	998
Бѣликъ пустошковый	851	—	1225
—	1634	—	1351 ^a
Бѣлоголовка	1754	Вероника	1797
Бѣлоголовникъ	19	Веснуха	130
Бѣлокорка	185	Ветла	1528
Бѣлолистникъ	98	Вечерница	924
Бѣлоталь	1522	Вивсюгъ	220
Бѣлушникъ	792	Виноградъ	109
Вайда	988	—	1815
Валеріана	1785	Виргиліева астра	202
Вангъ Граммура	1291	Вирзингъ	288
Варахія	974	Вискаріа	1811
Варуха	514	Вистарія	1830
Васелечежь	1809	Витсенія	1831
Василекъ	422	Вишня	433

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ под- рмѣ значится въ книгѣ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ под- рмѣ значится въ книгѣ.
Війчіа	1791	Вонючій дягиль	164
Вика	1803	Вонючка	488
Винная ягода	791	Воробейникъ	1082
Вишеньки	1433	Воробьиное просо	121
Вишня	1433	Воробьиное сѣмя	1082
Властоцвѣтъ	913	Воронецъ	30
Водолистъ	1426	Вороника водяная	724
Водопьянъ	465	Вороній глазъ	25
Водосборъ	158	Вороньи ягоды	557
Воздушникъ	50	Ворсянка	678
Волкана	654	Восковникъ	1225
Волкомерія	503	Восковое дерево	943
Воловикъ	124	Восковой кустъ	1225
Воловій хвостъ	195	Вострець	326
Воловій языкъ	124	Вріезія	1817
Воловье око	311	Вязель	443
Воловыи очи	202	—	559
Воловья трава	1266 ⁶	—	1158
Вологладка	69	Вязиль	559
—	124	—	1038
—	1076	Вязожолдъ	968
Волосникъ	1746	Вязъ	1773
Волторошникъ	405	Вьюнокъ	361
Волчець	385	—	1412
Волчій корень	25	Вывишиникъ	839
Волчій блющъ	628	Выдольникъ	1073
Волчій ягодникъ	628	Вымяна	1423
Волчій перець	628	Выпадашная	1582
Волчюгъ	1266 ⁶	Вѣнечникъ	144
Волчье лыко	628	—	803
Волчье коренье	1569	Вѣтреница	64
Волчьи ягоды	628	—	130
Волчья трава	316	Вѣтрушка	920

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подъ ко- рымъ значится въ книгѣ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подъ ко- рымъ значится въ книгѣ.
Гавіарь	26	Гордовина	1802
Гайлярдія	807	Гордоквіа	820
Гвоздика	648	Горечавка	832
Гвоздичное дерево	395	Горицвѣтъ	43
Геліотропъ	910	—	1108
Георгина	624	Горлецъ	1412
Герань	834	Горловникъ	379
Гераній	745	Горлянка	140
Герардія	835	—	739
Геснерія	1230	—	1025
Гиля	840	—	1423
Гирча	1579	Гортензія	940
Гирчагъ	422	—	949
Гіацинтъ	948	Гортерія	862
—	1219	Гороховникъ	1038
Гіуръ—Агачъ	15	—	1491
Гладіолусъ	841	Горохъ	204
Гледичія	844	—	486
Глисинъ	849	—	559
Глистовникъ	185	—	1371
—	1610	—	1702
Глогъ	557	—	1715
Глодь	578	—	1803
Глоксинія	848	Горошекъ	1038
Гнидія	851	Горчагъ	1412
Гоіава	1435	Горчица	288
Головастикъ	563	—	1595
Голубика	1784	—	1601
Гольшъ	1525	—	1677
Гомбо	930	Горчичникъ	1601
Гомфрена	1456	Горшечникъ	1044
Гонобобель	1784	Горянка	732
Гордовикъ	1802	Грабельки	745

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ значится въ книгѣ	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ значится въ книгѣ
Грабъ	390	День и ночь	1299
Гравилотъ	839	Дербенникъ	1115
Граната	1446	Деревій	19
Гранатовое дерево	1446	Деревянка	1423
Гребеная трава	97	Дереза	937
Гребенникъ	1195	—	1491
Гребенщикъ	1687	Деренъ	557
Греча	19	Держи-дерево	1290
—	781	Дерябка	816
Гречиха	1412	—	1200
Гречишникъ	1412	Деяникъ	1178
Гречка красильная	1412	Дзиндзиверъ	1132
Грудника	7	Диеуша	1412
Грудница	7	—	1485
Груша	1450	Дирусучка	1465
Грушка красильная	1465	Діанка	647
Грыжная	648	Долгоустникъ	1582
—	1797	Долиха	1548
Грыжная трава	140	Донникъ	1168
Грѣчникъ	965	—	1634
Губанчикъ	1195	Драконово дерево	694
Губастикъ	1195	Дракоцефалъ	695
Губжа	492	Драцена	694
Гулявица	19	Дрема	1108
Гулявникъ	1234	—	1811
—	1601	Дремликъ	1266 ^н
Гумми-эластиковое дерево	1600	Дріаква	603
Гуньба	1168	Дрокъ	830
Гусячи лапки	1423	Дрявка	603
Даффебахія	659	Дубровка	1706
Двузубецъ	255	—	1797
Двушпорка	653	Дубъ	1453
Девясилъ	974	Дугласовъ цвѣтъ	1070

НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ.	№ под- рымъ значится въ книгѣ.	НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ.	№ под- рымъ значится въ книгѣ.
Дуля	1450	Жасминъ	1005
Дурманъ	631	—	1338
Душица	1268	Желудникъ	52
Душное дерево	452	Желтникъ	1484
Дшаранта	578	Желтовозникъ	1522
Дыкбэ	832	Желтосливникъ	1433
Дымянка	805	Желтофіоль	460
Дынное дерево	387	Желтуха	1462
Дыня	592	Желтый корень	1643
Дѣвица въ зелени	1249	Желтяница	391
Дѣвій корень	1710	Желѣзнякъ	379
Дѣдовникъ	1032	—	1795
Дягиль	132	Жеруха	1051
Дягильникъ	161	Живика	1636
Дяникъ	1178	Живительная трава	1512
Дятлина	1754	Живоблють	1109
Ежа	622	Живокистъ	1675
Ежевика	1507	Живобость	611
Ежеголовникъ	1623	—	638
Ежовка	163	Живучая трава	69
Ежовникъ	708	Живучка	1636
Ежовый глазъ	1720	Жигалоукъ	779
Ель	3	Жидовникъ	1317
—	1367	—	1491
Ендивій	487	Жизненное дерево	259
Епакрисъ	727	—	1722
Еранъ	1309	Жимолость татарская	1095
Еригеронъ	739	Жинъ-зенгъ	1291
Ерникъ	1522	Жминда	266
Жабинецъ	1456	Жонкиль	1233
Жабникъ	790	Жостеръ	1465
—	792	Жость	1065
Жабрей	149	Журавлинникъ	834

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОСЛ. КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОСЛ. КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.
Забируха.	1575	Змѣиная трава	292
Завальная	1114	Змѣйка	292
Завилецъ	160	—	441
Завязникъ	1423	—	1797
Залевъ	53	Зноиха	53
Залѣсъ	69	Зозульки пушистыя	614
Заманиха.	1109	Золотарникъ	379
—	1291	—	529
Замія	1844	—	1491
Запья трава.	1342	—	1612
Запъ	1342	Золотая корзинка	95
Заячья кровца	956	Золотая трава	1582
Заячья капуста.	1575	Золотая шапочка	1507
Заячьи крыльца	1720	Золотникъ	1423
Звонецъ	365	Золотое дерево	219
Звѣробой.	695	Золототысячникъ	748
—	832	Золотуха.	1612
—	956	—	1708
Зеленика.	1111	Золотушникъ	140
Зеленица.	1693	—	974
Земляная груша	906	Зольникъ	146
Земляника	798	Зоря	1064
Земляничное дерево	163	—	1456
Зерликъ	1416	Зяхикта	564
Зигопеталонъ	1855	Иберисъ	965
Зимовикъ.	526	Ива	1522
Златоцвѣтъ	478	Иванъ да Марья	1809
Змѣвникъ	832	—	1163
—	1412	Иванъ-чай	731
—	1511	Иголка придорожная	1109
Змѣеголовникъ	695	Икзора	1002
Змѣеобразная трава	1752	Илемъ	1773
Змѣиная головка	1797	Ильмъ	1773

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подъ кото- рымъ значится въ книгѣ	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подъ кото- рымъ значится въ книгѣ
Иммортель	907	Камчужная	1708
—	1472	Камышь	1567
Инбирь	1852	Канареечное сѣмя	1330
Инбирное дерево	957	Кандыкъ	749
Индиго	972	Каперсы	377
Инжиръ	791	Каприфолій	376
Иньямъ	667	Каприфолій	1095
Ипомеа	983	Капуста	288
Иракта	1367	— заячья	312
Ирга	573	— морская	576
Ирисъ	987	Карагачъ	1773
Иссопъ	961	Карды	610
Истадъ	1410	Каркасъ	419
Иудино дерево	439	Картофель	1610
Кавалерникъ	638	Кархорусъ	553
Кавалерская звѣзда	1303	Касатикъ	26
Какао	1713	Кассія	398
Кактусъ	321	Катранъ	576
—	1266 ³	—	1643
Калабасовое дерево	581	Катунь	214
Калика	288	Кашка	19
Каликантъ	355	—	1754
Калина	1526	Каштанъ	52
—	1802	—	400
Каля Эфіопика	1487	Квассія	1452
Калужница	354	Квиноа	465
Калуферъ	1688	Квитъ	606
Кальцеоларія	333	Кедръ	415
Камелія	364	—	998
Камнеломка	1547	—	1367
Кампарель	1233	Кервель	145
Кампешникъ	902	—	1227
Камфарное дерево	367	Кервельная рѣпа	1550

НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ.	№ под- рамъ значится въ книгѣ.	НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ.	№ под- рамъ значится въ книгѣ.
Кетлія	930	Ключь-трава.	1525
Кизиль	557	Кнафлиѣ	1794
Кизильникъ	573	Княжеѣ	213
—	1180	Кобеа.	511
Кизиль буяль	816	Кожевенное дерево.	1484
Кильза	288	Козелецъ	130
Кимчига	499	—	1456
Кипарисъ	595	—	1569
—	1687	—	1740
Кипрей	731	Козлобородникъ	1740
Кирказонъ	178	Козлятникъ вонючій	1266 ⁶
Китайбелія	1013	Козлятникъ	813
Кислецъ	1412	Козья лоза	376
—	1277	Козьякъ	813
Кислица	248	Кокорва	1149
—	1277	Кокорникъ	178
—	1450	Кокорышъ	53
Кишнець	556	—	805
Клеверъ	1754	Кокось	516
Клеродендронъ	503	Кокусъ	1473
Клеочка.	1438	Колокольчики морскіе.	832
—	1642	Колокольчикъ	158
Кленъ	7	—	365
—	15	—	369
Клещевина	1488	Колчаникъ	1265
Кливія	975	Колюча	1835
Кліантъ	505	Кольконія	1755
Клопецъ	1642	Кольраби.	288
Клоповникъ	1051	Комочки	1547
Клубника	798	Конопля	371
Клюква	1280	—	1780
—	1784	Конюха	1404
Ключевая	1797	Коралловое дерево.	38

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ значится въ книгѣ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ значится въ книгѣ.
Кордоны	610	Красотка.	1404
Корица	491	Красуля	577
Коровникъ	132	Крессъ	382
Коровякъ.	1794	—	1051
Корова	558	—	1234
Коростовикъ.	1548	Крестовикъ	1582
Косатикъ.	987	Крестъ Петровъ	1037
Косолисть	242	Кринъ	582
Костянецъ	198	Криптомерія.	588
Костяника	1507	Крокусъ	584
Котелычка	365	Крутай	708
Котовикъ.	1242	Крутикъ кустарный	107
Котятникъ	1754	Крученые панычи	983
Котылекъ	885	Крушина.	176
Кофе	204	—	1065
Коцімша	996	—	1465
Коцо	996	Крыжовникъ	1486
Кошачья трава.	1242	— барбадосскій	321
— —	1706	Кувшинка	1241
Кошатникъ	987	—	1257
Кошки	255	Кувшинковыхъ культура	1071
Крапива	227	Кудрявецъ	465
—	268	Кудрявка.	1740
—	1030	Куколица	1593
—	1048	Куколь вѣчная	65
—	1780	Кукуруза	1848
Крапъ	1506	Кукушкинъ ленъ	42
Красавочка	648	Кукушкины нитки	213
Красная трава	97	— слезки.	1106
Краснодневникъ	913	Кукушникъ	1966 ^н
Красное дерево.	557	Кулиникъ	1794
— —	1465	Кульбаба.	1048
Красные султанчики	1266 ^н	Куманика	1507

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ под- ривъ значится въ книгѣ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ под- ривъ значится въ книгѣ.
Кунжутъ.	1585	Ландышъ.	548
Купальница	1465	Лантана	1029
—	1760	Лапухъ	1032
Купена	1411	Лапчатка.	1423
Купиръ болотный	49	Ласточникъ	192
Куповка	1456	Лататный горшокъ.	1099
Купыръ	132	Латугъ	1023
Кура	765	Лебедя	214
Курелѣвъ	432	—	465
Курячья слѣпота	1030	Левкой	459
Куриная слѣпота	121	—	1150
—	354	Ледянецъ	1099
Курослѣвъ	44	Леехенольція	1053
—	121	Лежанка.	1797
—	130	Ленникъ	1073
—	354	Лень	1073
Курячи очи	121	—	1077
Курья слѣпота	1449	—	1347
Кустовникъ	1465	Лещина	564
Кучерявка	885	Лжеакація	1491
Лаванда	1040	Лизунъ	79
Лавровишневое дерево.	1433	Ливидамбаръ	1079
Лавруша.	628	Лилія	144
Лавръ	1039	—	913
Ладанъ	1687	—	987
—	191	—	1068
Ладонникъ	494	—	1292
Ладонъ	1785	Лимонъ	496
Лайникъ	1432	Липа	1730
Лакрица	6	Лиственница.	1037
—	850	—	1033
Лакъ фюль	460	Листникъ.	745
Ландышъ.	194	Листовень	192

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗАНИМАЕТСЯ ВЪ КНИГѢ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗАНИМАЕТСЯ ВЪ КНИГѢ.
Листоростникъ	303	Львиный хвостъ	1048
Лихоманникъ	832	Льнянка	1073
Лихорадочная трава	867	Магернія	1123
Лишникъ	997	Магнолія	1125
Ліана	6	Магонія	1124
— африканская	1266 ^д	Маисъ	1848
Лобазникъ	1634	Маитръ	79
Ложечная трава	517	Маіоранъ	1268
Ломоносъ	213	Макъ	1257
—	500	—	1296
Лонгиновое дерево	766	Малина	728
Лопушникъ	1525	—	1507
Лоскутный цвѣтъ	422	Мальва	94
Лотосъ	1237	—	1132
Лохъ	716	Мамура	1507
Луговой звѣрбой	956	Мандаринъ	496
Лукъ	79	Манжетка	74
Лупосѣмянникъ	1172	Маральки	266
Лупинусъ	1105	Марена	194
Лускачъ	192	—	1506
—	609	Маргаритка	244
Лѣчуха	561	Марика	1143
Лѣщина	564	Мартовъ цвѣтъ	1056
Любистникъ	1064	Маръ	465
Любовная вишня	1610	Маслина	1263
Любовное дерево	439	Масличное дерево	1263
— — яблоко	1610	Мастикъ	1369
Лютикъ	25	Материнка	486
—	130	Матиола	1150
—	1465	Маткина душика	1268
Люперна	1158	— —	1809
Лыщакъ	1428	Маточная трава	1499
Львиный зѣвъ	149	Маточникъ	1169

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІИ.	№ под- рѣзъ значится въ книгѣ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ под- рѣзъ значится въ книгѣ.
Матюшникъ	492	Молодило	1581
Матура	816	Молоканка	765
Мать и Мачиха	1767	Молочай	765
Мауна	1785	—	931
Махорка	1246	—	1048
Медвѣжье ушко	1428	—	1614
Медвѣжья ягода	163	Молочайникъ	765
—	167	Молочникъ	1740
Медовая трава	835	Молочное дерево	295
Медовикъ	1754	—	809
Медовичекъ	1444	Монардія	1202
Медовка	1169	Монополія	1207
Медуница	1444	Морель	1433
Медунка	1158	Мордовикъ	708
—	1444	Мордовникъ	708
Мелисса	695	Моревые пучки	145
—	1048	Морковь	412
—	1169	—	634
Метлика	326	Морозникъ	912
Метросидеросъ	395	Морошка	1507
Милоцвѣтъ	56	Мохъ	498
Миндаль	114	—	1576
—	613	Мошникъ	538
Миртъ	1229	Мушкетъ-борень	765
Млечникъ	937	—	1302
Младенческая трава	1412	Мукець	1412
Многочлѣнникъ	1410	Мурава	1391
Могущикъ	1423	Мухоловка	665
Можжевельникъ	998	—	1593
Можжуха	1357	Мучное дерево	578
Мокрица	1644	Мясная трава	365
Мокцафала	15	Мята	843
Молодило	1575	—	1173

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.
Мята	1242	Ноннея	1252
Мятлика	1391	Норичникъ	1635
Мяхунка	1357	Нѣжникъ	905
Мыло дикое	648	Обвойникъ	1317
Мыльное дерево	1533	Облѣпиха	937
Мыльнянка аптечная	1534	Обриетца	218
Мышки	392	Овесъ	220
—	1038	Овсяный корень	1740
Мышь вѣха	1512	Овѣче рунишко	130
Мышьякъ	1715	Огурецъ	987
Накамникъ	724	—	1200
Наперстная трава	660	—	1670
Наперстянка	660	Огуречная трава	273
Нарывная трава	500	Огурцы	592
—	1456	—	1589
Нарцисъ	1233	Одалой	765
Нарыжная	233	Одурникъ	215
—	747	Ожиг	1106
Настурція	1761	Окопникъ	1675
Натагичи	1534	Олеандръ	1244
Негнѣючка	1722	Оливковое дерево	1263
Недосѣлка	319	Ольха	81
Незабудка	1222	Омегъ	545
—	1264	Омежникъ	53
Некленъ	15	Омела	1812
Неспячекъ	163	Орлики	158
Петронъ мена	1194	Орлякъ	1439
Нехворощъ	185	Ормушъ	106
Нечуй вѣтеръ	931	Орхидея	50
Нигелла	1249	—	61
Нимбергія	1248	—	63
Ницелозъ	1522	—	119
Ноготы	335	—	138

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.
Орхидея	256	Орхидея	1265
—	265	—	1297
—	286	—	1328
—	287	—	1378
—	314	—	1398
—	330	—	1409
—	407	—	1415
—	411	—	1537
—	483	—	1543
—	520	—	1528
—	521	—	1559
—	525	—	1607
—	542	—	1617
—	562	—	1639
—	614	—	1747
—	617	—	1750
—	682	—	1789
—	699	—	1790
—	730	—	1821
—	737	—	1855
—	762	Орхисъ	1266 ^н
—	777	Оршумъ	1364
—	858	Орѣхъ	392
—	912	—	564
—	1010	—	996
—	1090	—	1038
—	1147	—	1226
—	1153	—	1440
—	1193	Орѣшина	996
—	1209	Орѣшина трава	753
—	1213	Орѣшникъ	114
—	1231	—	564
—	1260	Осина	1419

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подъ кото- рымъ значится въ книгѣ	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подъ кото- рымъ значится въ книгѣ
Ослинникъ	1262	Пальма	445
Осокоръ	1419	—	506
Осотъ	385	—	516
—	492	—	550
—	1584	—	565
—	1614	—	566
Остроковъ	968	—	623
Отмытная трава	1548	—	635
Отрава	609	—	645
Оттокантъ	1274	—	656
Очанка	764	—	677
Очитокъ	1575	—	703
Очная помощь	764	—	714
Очный цвѣтъ	121	—	760
Павилика	549	—	773
Падубъ	801	—	824
Пакленокъ	15	—	831
Паклунъ	69	—	833
Палочникъ	1769	—	875
Пальма	169	—	953
—	171	—	955
—	207	—	957
—	217	—	966
—	224	—	967
—	247	—	986
—	274	—	994
—	328	—	1011
—	357	—	1020
—	358	—	1021
—	359	—	1050
—	396	—	1062
—	410	—	1085
—	434	—	1089

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подѣ- рымъ значится въ книгѣ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подѣ- рымъ значится въ книгѣ.
Пальма	1116	Пальма	1791
—	1129	—	1820
—	1137	—	1824
—	1141	—	1826
—	1145	—	1843
—	1152	Пальма арека	169
—	1154	— винная	28
—	1184	— восковая	445
—	1189	— королевская	1266°
—	1210	— финиковая	1345
—	1261	Папоротникъ	197
—	1266	—	1416
—	1662 _д	—	1439
—	1315	Папороть	198
—	1344	—	1095
—	1346	Парадизочка	1450
—	1359	Паролистникъ	1856
—	1380	Парскій крессъ	1632
—	1383	Пасленъ	1610
—	1394	Пасочникъ	581
—	1429	Пастернакъ	1304
—	1443	Паточникъ	1603
—	1466	Пахучая	194
—	1468	—	327
—	1514	Поясень	801
—	1515	Пеларгонія	1309
—	1549	Пенстемонъ	1310
—	1551	Пенельница	490
—	1568	Первоцвѣтъ	1428
—	1608	Пережати поле	320
—	1669	Перелеть	1262
—	1721	Переломная	1423
—	1758	Переполошная	746

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ ЗНАЧИТСЯ ВЪ КНИГѢ.
Переступень.	301	Плоховецъ	1474
Перецъ	378	Плюмбаго	1390
—	1368	Плющъ	900
Перечневое дерево.	1553	Повелика.	549
Перистрофа	1318	—	1412
Персиковое дерево.	114	Повелица.	816
—	1321	Повитель.	599
Персикъ	1321	—	1412
Песочница	170	Повой	1109
Пестовникъ	735	Повойникъ	1317
Пестушки	735	Подбережникъ	1115
Петровъ крестъ.	204	Подбѣлъ	1322
Петрушка	1324	—	1767
Петунія	1325	Подлѣсокъ	1809
Печеночница.	130	Подмаренникъ	816
Печеночный бальзамъ	130	Поднимокъ	1809
Пигва.	606	Подорожникъ	77
Пижма	1688	—	1377
Пижмачка	44	Подорѣшникъ	191
Пимелея	1363	Подсѣжникъ	810
Пимпинель	1424	—	1565
Пискульникъ	987	—	1581
Питоспоръ	1373	Подсолнечникъ	906
Пихта.	3	—	1594
—	1367	Полевица	66
Пионъ.	226	Полевой горохъ.	443
—	1286	Поленика	1507
Плакунъ	956	Ползковый цвѣтъ	660
—	1115	Полимнія.	1413
Пламникъ	1343	Полынь	185
Платанъ	1379	Померанецъ	496
Плаунъ	1111	Поповникъ	478
Плеоктопомъ	1385	Порочникъ	1570

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подъ кото- рымъ значится въ книгѣ	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подъ кото- рымъ значится въ книгѣ
Портулакъ	1421	Пузырникъ	413
Порченая помощь	1797	—	538
Порѣзъ трава	999	Пузырное дерево	538
Посконникъ	763	— сѣмя	486
Постѣнка	159	Пулавка	143
Потогонъ	978	Пушпырь	451
Почка полевая	132	Пуховникъ	156
Почки земляныя	1547	—	1244
Поясень	1270	Пушица	743
Приворотъ	74	Пушки	739
—	422	Пушкинія	34
Придорожная иглока	1465	Пушникъ	580
Прикрытъ	1760	Пятилистникъ	1423
Приметь	589	Пьяная трава	126
Примочникъ	365	— —	1474
Примуля	1428	Пьянишникъ	1474
Пробковое дерево	1341	Пырей	86
Прозанникъ	23	—	326
Проломникъ	128	—	1015
Провѣска	1565	Пѣтушекъ лѣсной	422
Просвирка	7	Пѣтушій гребешекъ	97
Просвирникъ	94	— —	417
—	1042	Пѣтушекъ	806
Проскурка	1132	Пѣтушникъ	422
Проскурнякъ	94	Пѣтушья ножка	578
Просо	1295	Рай-дерево	1484
Проссо	127	Райское дерево	1218
Прострѣль	25	Разрывъ трава	1547
—	130	Ракита	1522
Прутьякъ	1814	Ракитникъ	620
Птицемлечникъ	1269	—	1522
Птицесердъ	117	Раковыя шейки	1412
Путовщица	429	Раминовое зелье	765

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІИ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ значится въ книгѣ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- РЫМЪ значится въ книгѣ.
Рамондея	1455	Размаринъ	1503
Ранункулъ	1262	Розовое дерево	116
—	1456	Рокамболь	79
Ранунцель	1786	Романцовія	1497
Рапотникъ	1262	Ромашка	1149
Рапсъ яровой	288	Ромашка римская	143
Расперстная	1423	— персидская	1449
Растигаръ	1706	Ромашникъ	1449
Растрогъ	1360	Роса каменная	198
Растъ	178	Ростъ	1762
Рафія (пальма)	1466	Росянка простая	74
Ревень	1470	Рошеа	1491
Редисъ	1457	Розля	1495
Резеда	1462	Руббенія	1508
Репейникъ	422	Рука дерево	461
Рецлія	1504	Румянка	711
Риттеръ шпоры	638	Рута	198
Робинія	1491	—	809
Рогозъ	1769	—	1514
Рододендронъ	1474	Рутвица	1708
Родянка	1575	Руэллія прекрасная	1510
Рожа	73	Рябина	1450
—	94	—	1618
Роженица	921	—	1688
Роженъ	435	Рябинка	19
Роза	1501	Рябчикъ	803
Роза дикая	1581	Рядникъ	365
— альпійская	1474	Рядовикъ	1529
— водяная	1257	Рыжикъ посѣвный	363
— китайская	930	Рѣдьга	1457
Разановія	1502	—	382
Розанъ Іерихонскій	123	Рѣжуха	1234
Розга	204	Рѣзакъ	974

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- рымъ значится въ книжѣ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- рымъ значится въ книжѣ.
Рѣзуха	128	Свинуха	1412
—	965	Свѣтлебей	1754
Рѣпа	288	Свѣчка орлиная.	1242
Рѣпей	385	Сельдерей	154
Рѣпейникъ	64	Сенеція	1582
Рѣпикъ	64	Сердечная	974
Сабаль	1515	Сердечная трава	1449
Сагусъ	1520	— —	1271
Сайгачъ корень.	692	— —	1571
Сакисъ Агачъ	1369	— —	422
Салать	1023	Сердечникъ	382
—	1786	Сердечное коренье.	765
Салепъ	1266 ⁿ	Сердечный корень	1423
Сальний корень	1675	Серебренникъ кустовой.	1423
Самбукъ	1526	Серебряная пуговка	1456
Самостой.	1582	Серебрянка	1708
Самшитъ	318	Серебряное дерево.	716
Санвиталя	1532	Серпій	1785
Сандалъ	1465	Серпуха	1584
Сапожки	614	Сплоцвѣтъ	1292
Сарали-гордъ	885	Спльфій	1594
Сарана	803	Снеглазка	25
—	1068	Синеголовникъ	746
Сарауссакъ	79	Синецвѣтка	422
Сассапарель	1606	Синій звѣробой.	365
Сафой.	288	Синюха	1289
Сахарные корни	1603	Синякъ	711
Саччи.	716	Синячникъ	988
Свекла	252	Спрень	1680
Свекловица	252	Скабіоза	1548
Свербежница	1548	Скерда	580
Свидина	557	Скипидарное дерево	1369
Свинуха	1317	Скорода	79

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ под- рымъ значится въ книгѣ	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ под- рымъ значится въ книгѣ.
Скордонера	1569	Сонуля	1811
Скочки	1581	Сонъ-трава	1811
Скучлиникъ	1132	Сорго.	127
Сладкая трава	921	Сорго.	1619
— —	1610	Сороко приточка	30
Сладкій корень.	1414	Сорокоприточная	1404
Сладкіе корни	1603	Сорочьи ягоды	266
Слива.	1433	Сосна.	1367
Слизунъ	79	Сосулька.	1030
Слюногонка	143	Сочевница.	1271
Слѣпка	1252	Сочевникъ	1271
Слѣпокуръ	557	Спаржа	193
Смолевка.	1593	Спарманя	1624
Смолка	1811	Спирея	1634
Смородина	1485	Спорышь.	1412
Снять.	14	Спрычь.	851
Сныть.	49	Стальникъ	1266 ⁶
Снѣжно-фруктъ.	1672	Столная трава.	86
Снѣжное дерево	1672	Становникъ	467
Сабачиха.	839	Старець	589
Сабачій зубъ	749	Стародубка	43
Собачка	1073	—	832
Собачья рожа	1042	Стевіа.	1657
Сокирки	638	Стенаксисъ	1646
Сокольникъ	931	Стефанотисъ	1653
Солнцеглядь.	765	Стираксовое дерево.	1666
Солодка	850	Столѣтнее дерево	59
Солодкій вербецъ	850	Столѣтникъ	59
Солодковый корень.	850	Страстей дерево	1303
Соломонова печать.	1411	Стручки царьградскіе.	435
Солоней	1643	Стручья мыши.	443
Солянумъ.	1610	Стрѣла	79
Сонная трава	215	Стрѣлошникъ.	79

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подл. кото- рымъ значится въ книгѣ	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подл. кото- рымъ значится въ книгѣ
Стѣнница.	1299	Татарникъ	1266г
Сузыкъ	1708	Тацетъ	1233
Сумахъ	1484	Тегенекъ	1290
Сунша	1158	Тековое дерево	1696
Сурѣница	233	Теофілея	1695
—	747	Тельникъ.	442
—	1595	Темноцвѣтникъ	67
Сусакъ	316	Тенбуръ	1368
Сухостебельникъ	42	Терновникъ	1433
Сухоцвѣтъ	857	—	1772
—	911	Тернъ.	848
—	1395	—	968
—	1406	—	1433
—	1472	—	1512
—	1818	Тетратека	1705
—	1839	Тимьянъ	1725
Сырное дерево	271	Тинъ	1606
Сырсонъ	708	Тисъ	1693
Сыть	613	Ткенна	1109
Сѣдачь	763	Толокнянка	163
Сѣянецъ мелкій.	79	Толстолистникъ.	577
Табакъ.	1246	Толстушка	1377
Таволга	1634	Толстянка	577
—	939	Тонконогъ	1075
Таволжникъ	1634	—	1391
Тавольникъ	1634	Топинанбуръ.	906
Таловая карла	1522	Тополь	1419
Таложчанникъ	1522	Топольникъ	1419
Тальникъ.	1522	Топтунъ	1412
Тамариксъ	1687	Торенія	1735
Таранушка	1485	Торнъ	765
Татарка	492	Трахелиумъ	1745
Татарникъ	492	Требула	1550

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- рымъ значится въ книгѣ	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ ПОДЪ КОТО- рымъ значится въ книгѣ.
Тресучникъ	406	Унаби.	1853
Трилистникъ.	1174	Уразная трава	1601
—	1754	Уркумки	564
Тритонія	1759	Усладникъ	1271
Трифоль	1174	Усовная	1766
Троецвѣтка	1404	Фабіана	780
Троецвѣтъ	158	Фасоль	1336
Тростникъ	190	Фенхель	796
—	1517	Фига	791
Трость	190	Фиговое дерево.	791
Трубоцвѣтъ	257	Филовникъ	178
Трясучка.	422	Фисташка	1642
Тубероза.	1405	Фисташковое дерево	1369
Тугостунъ	1095	Фитолакъ	1361
Тунбергія	1724	Фиттонія	793
Тундрица.	126	Фіалка	1809
Турнепсъ.	288	— ночная	924
Турретъ	1766	— альпійская	603
Тутовое дерево.	1211	Флюксъ	1343
Туя	1722	Фриттолярія	803
Тюльпанное дерево.	1125	Фукусія	804
—	1080	Фундукъ	564
Тюльпанъ	1762	Функія	806
Тѣминъ	393	Хамедорея	454
Тыква	592	Ханки	592
—	1025	Хвоцевикъ	735
Тысячелистникъ.	19	Хвоць	735
Увѣтная трава	1040	Хелишникъ желтый	1266
Ужовникъ	1569	Хетероцентръ	925
Укропъ	131	Хлопуцы	204
—	796	Хлопчатникъ	863
—	1337	Хлѣбное дерево.	186
Укусное дерево.	1484	Хмѣль	946

НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ.	№ подъ кото- рымъ значится въ книгѣ	НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ.	№ подъ кото- рымъ значится въ книгѣ
Хмѣль бѣлый	1172	Чабрець	1725
— голубиный	1754	Чаганъ	185
— дикій	213	Чагеранъ.	902
Хмѣлюкъ.	1754	Чажное дерево	1692
Хоктоза	254	Чай	1711
Хохлатка.	563	— мышій.	204
Хрустальная трава.	1178	Чай каменный	1643
Хрѣница.	1051	— чагирскій.	1547
Хрѣнь	514	— монгольскій	1547
—	181	— луговой	1114
—	576	— калмыцкой	880
Хурма	669	— лѣсной.	1076
Царскіе очи.	1547	— курильскій	1423
Царскій корень.	205	— американскій.	413
Царскіе кудри	978	Чайное дерево	1263
—	195	Чалмадудчатая и вѣтвистая.	195
Царь-зелье	638	Чахаль-кура.	1453
Царь-трава	25	Чашецвѣтъ	355
Цеаноть голубой	413	Чашковое дерево	578
Цедратовое дерево.	496	—	1180
Ценерарія	420	Чебрець	1706
Центифолій	1501	Чемерица	912
Церва.	1462	—	1793
Цикламень	603	Чепыжникъ	379
Цикорій	487	Червишникъ.	1423
Цинготная трава	1797	Червогонникъ	1856
Цинія.	1851	Череда	255
Цитварное сѣмя	185	Черемуха	1433
Цитваръ	185	Черемша	79
Цитизъ	620	Черепашникъ.	464
Цитронъ	496	Черешня	433
Цынготная трава	514	—	1433
Чаберъ	1542	Черная трава	614

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ пох- рымъ значится въ книгѣ	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ пох- рымъ значится въ книгѣ.
Черника	1784	Чиховець.	19
Чернобыльникъ	185	Чоловичій вѣкъ.	913
—	1424	Чубутникъ	1338
Черноголовникъ	1529	Чудоцвѣтъ	1197
Чернозябеникъ	1636	Чума Агачъ	557
Чернокорень	611	Шалабольникъ	422
Чернокудрешникъ	227	Шалфей	1525
Черноталь	1522	Шамшитъ	1802
Чернушка	1249	Шандра	721
Черный корень	30	—	1141
Чертова борода	192	Шалка	1685
—	1808	Шарлотъ	79
Чертополохъ	385	Шафранъ	584
—	422	Шевръ фель.	1095
Чеснокъ	79	Шелковая трава пестрая .	1330
— конскій	1706	Шелковица	296
Чечевица	538	—	1211
Чечина	1456	Шелюга	1522
Чешуйникъ	1037	Шельмовка	739
Чижникъ	1290	Шереда	695
Чилига	620	Шерошница	194
—	1491	Шильникъ	77
Чилчашная трава	204	Шиповникъ	1501
Чина лѣсная	1038	Шифлоръ	391
Чинарь	1379	Шипки	1180
Чистецъ прямой	1636	Шламда	1634
Чистотѣль	463	Шлемникъ	1571
—	765	Шнитколь	288
—	790	Шнитлуъ	79
—	1511	Шоколадное дерево	1713
Чистуха	77	Шомпольникъ	1634
Чистякъ	463	Шпажникъ	841
—	1456	Шпинатъ перувианскій .	465

НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подл. кото- рымъ значится въ книгѣ.	НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ.	№ подл. кото- рымъ значится въ книгѣ.
Шпинатъ американскій .	1361	Юкка	995
— Вестъ-Индскій .	499	Юстиція	1000
— Новозеландскій .	1701	Яблоко райское	1218
— Англійскій .	1511	Яблонь	1450
— Бразильскій .	242	Яворъ	15
— Малабарскій .	239	—	1379
— Китайскій .	97	Ягодки	628
Шпирсенколь	288	Язычекъ	922
Штокъ-роза	94	Ямбовое дерево	963
Щавель	1511	Ямбоза Кортальса	963
— воробьиный	1593	Ямбозовое дерево	963
— дикій	242	Ямсъ	667
— заячій	1277	Ясенецъ	654
Щетъ	135	Ясень	801
Щирецъ	97	— китайская	67
Щиръ	1175	Ясколка	432
Энгейсона	760	Яснотка бѣлая	1030
Эласисъ	714	—	
Элеборъ	912		
Энокорпусъ (Пальма)	1261		
Эмарсетъ кормовой	1266 ³	Кувшинковыхъ культура	1071
Эстрагонъ	185	Отводки дѣлать	1
Эхмез	45	Пальмъ культура	169
Этинантъ	51	Черенки дѣлать	7
Эшольція	752		

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ О. И. КОЛЕСОВА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ГО-
СТИННЫЙ ДВОРЪ № 22, МЕЖДУ ПРОЧИМЪ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮ-
ЩІЯ КНИГИ:

Настольная книга для русскихъ хозяевъ, 2 тома, цѣна 6 руб.

Основы Сельско-хозяйственной экономіи, и сельско-хозяйственного
счетоводства, цѣна 3 р. 50 к.

И. Г. Коппе. Земледѣліе и скотоводство, цѣна 2 р. 50 к.

Курсъ скотоводства, руководства къ разведенію крупнаго рогатаго скота,
овецъ, лошадей и свиней. К. С. Трипольскій, цѣна 3 р. 50 к.

А. Розенбергъ-Лининскій. Практическое земледѣліе, цѣна 3 р.

Ундрица. Домашній скотолечебникъ, руководство для леченія домашнихъ
животныхъ и краткое наставленіе объ уходѣ за ними и о
разведеніи ихъ, и дополненное особымъ отдѣломъ о поваль-
ныхъ и заразительныхъ болѣзняхъ. Леви, цѣна 2 р.

Фонъ-Горенъ. Естественные законы кормленія сельско-хозяйственныхъ
животныхъ, цѣна 5 р.

Русскій Огородъ, питомникъ и плодовой садъ. Шредера, цѣна 2 р.

Картофель, его культура, сохраненіе, болѣзни и сорта. В. А. Погген-
поль, цѣна 2 р.

Лѣсовозвращеніе, ученіе о производствѣ продуктовъ лѣснаго хозяйства.
Н. С. Шафронова цѣна 3 р. 50 к.

Лѣсохраненіе. Н. С. Шафронова, цѣна 2 р.

Посѣвъ и посадка лѣса. Буркгардта, цѣна 5 р.

Лѣсоустройство. Зобова, цѣна 2 р.

Труды IV-го Всероссійскаго съѣзда лѣсохозяевъ, цѣна 2 р. 50 к.